

Contra equos flores.

contra equos. flores.

Contra equos flores.

Contra equos flores. Contra equos flores. Contra equos flores.

Contra equos flores. Contra equos flores. Contra equos flores.

Contra equos flores.

Contra equos flores.



Philo


Post nubila Phœbus.
Cas: Stieber.

Cas: Stieber.

De Plantis omnibus, vnà cum earum iconibus, de quibus scripsit suis in commentariis in Dioscoridem editis, in eorum studiosorum commodum, atque vsum ; qui Plantis conquirendis, ac indagandis student.

*Opusculum de itinere, quo è Verona in Baldum montem Plantarum
refertissimum itur; iisdem studiosis utilissimum.*

Quæ quàm sint studiosæ posteritati profutura ; ex epistolis in huiusce operis initio editis, facile patebit.



VIN CENT

Venetis, In Officina Valgrisiana. M D L X X I.

SERENISSIMO PRINCIPI

FERDINANDO ARCHID. AVSTRIAE,

D V C I B V R G V N D I Æ, &c.

COMITI TYROLIS, &c.

Domino suo clementissimo.



AMETSI ingrauescente iam ætate decre-
uisssem SERENISS. PRINCEPS, omis-
sis studiis ac lucubrationibus, quod vi-
tæ reliquum erat, in otio atq; animi, &
corporis tranquillitate transigere, cùm ta-
men ab ipsis primordiis is à natura sim
factus, qui semper putem, si tantum pos-
sem, studiosam iuuare posteritatem, non potui meam non
immutare sententiam, nec multorum precibus non indul-
gere. Nam cùm non pauci, qui discendæ medicæ materiæ
magno, ac feruenti tenentur desiderio, me sæpe rogarent,
vt in eorum gratiam atq; vsum Compendium cōscriberem,
in quo plantarum icones cum nominibus, & compendiosa
earum historia extarent, vt eo duce quæcūque loca vbi stir-
pes proueniant, tutò ad eas noscendas indagandasq; adire
possent, ne de sua ipsorum in me confidentia frustrarentur,
Compendium hoc in eorum vsum cōscribere decreui, quod
quãuis succincto ac Laconico sermone conscriptum videat-
ur, erit tamen (ni fallor) & gratum, & perutile, non solum
iis qui indagandis, noscendisq; simplicibus medicamentis,
nauant operam, sed iis quoque, qui hanc facultatem iam
adepti, publicè morbis omnibus passim medentur. Siqui-
dem in hoc plantarum Compendio non solum earundem

omnium nomina, diuersarum nationum idiomate conscripta spectabuntur, & historiæ, ac quibus oriantur in locis, vt à me studiosi postulabant. Sed etiam qualitates cum primæ, tum secundæ, ac tertiæ & omnium quoque vires, ac singularia quædam nostra auxilia compendiosè descripta sunt. Cæterùm vbi quispiam plura, melioraque legere concupierit, ad nostra amplissima in Dioscoridem cōmentaria se conferre poterit, vbi (vt spero) quæ desiderabit inueniet. Atqui cum in adeo magnam molem opus illud excreuerit, vt haud commodè hincinde circūferri possit, non sanè absque ratione rogarunt me studiosi, de quibus diximus, vt Compendium conscriberem. quod cum rectè factum iri cognouerim, eò quoque libentius ad eum conscribendum me appuli, vt noscat futura posteritas quot modis Matthiolus illam iuuare contenderit. Verùm quoniam apud omnes scriptores mos inualuit, vt sub magnorum Principum, Heroumque nominibus, & auspiciis, sua scripta quique in lucem producant, cum ego quoque idipsum institutum sim semper sequutus, haud aliis iustius, & rectius compendium hoc meum consacrare potui, quàm tuæ Amplissimæ Celsitudini, quòd iam in sextum decimum annum in eius corporis cura (quæ sua est clementia, & optima de me opinio) primarij Medici munere fungar. Huc accedit, quòd quicquid est meæ substantiæ, & facultatum, id sanè omne tuæ Celsitudini acceptum referre possum. Quin etiam eiusdem liberalitate, beneficentia ac dilectione foueor, sustentor, & alor. Siquidem hæc me multis modis, si haud ad repōnendam gratiam, saltem ad declarandam gratitudinem, vel gratitudinis conatum me reum statuunt. quare cum Celsitudini tuæ mea hæc, qualiacunque sint, ei iure debeantur, eam suppliciter peto, vt hæc meas lucubrationes, & plantarum veluti manipularem libellum alacriter ac benignè excipere, meque in hac laboribus confectā

fecta ætate, suo patrocinio, gratia, & fauore prosequi, ac
tueri non desinat. Vicissim ego, quæ fidelem seruitorem,
& Clientem decent, summa fide, ac voluntate, pro virili
mea vsque ad occasum vitæ meæ me præstiturum pol-
liceor, meq; totum tuæ Celsitudini dedo, ac vo-
ueo. quam Deus Opt. Max. incolumen,
& modis omnibus florentem quàm
diutissimè conseruet.

E. Sereniss. Celsitudinis tuæ

Fidelis & humilis Seruitor

Petrus Andreas Matthiolus.

PETRVS ANDR. MATTHIOLVS
SENNENSIS, MEDICVS,

Franc. Calceolario Pharmacopœo Veronensi. S. P. D.



*Q*UOD iam diu desiderasti compendium à nobis conscriptum de Plantis omnibus de quibus diffusè satis in commentariis nostris in Dioscoridem meminimus ; in eorum studiosorum usum, qui indagandis, noscendisq; legitimis simplicibus nauat operam, iam pridem absolui, ac propediem typis excudendum mittam. Quamobrem tuum opusculum quod de itinere è Verona in Baldum montem omnium ferè fama percelebrem, & plantarum refertissimum ad me misisti, illi statim adnectendum curabo. Scio enim me hoc tuo libello apud multos bonos viros beneuolentiam longè maiorem initurũ, si etiam præter descriptas plantas, locum ostendam ubi eæ copiosissimæ ac non vulgares inueniantur. Ceterum id magis eos, & tibi, & mihi beneuolos reddet, q; in ipso tuo opusculo non solum itinerandi normam tradideris, sed vniuersis quoq; plantas descripseris, quæ unicuique montis ipsius loco ab imo ad summum gradatim enascuntur. Erit enim hoc omnibus adeo gratum, ut tibi senserint te ab inuidis morderi, existimationem tuam, probitatem, sinceritatem, atq; doctrinam modis omnibus tuebuntur, ita ut tibi honori, & studiosis utilitati libellus iste tuus sit futurus, præsertim cum me ipsum habeas promotorem, ac defensorem. Scio enim abs te non solum me amari plurimum, sed præ cæteris etiam obseruari. Ego verò ut de mea in te propensione, ob tuarum, nempe sinceritatis, fidei, solertiæ, peritiæ, diligentiaq; meritum aliquid dicam in obtreçtatorum tuorum censuram. admiror sanè quàm maximè ualeas in componendis absque omni fraude medicamentis, & ijs præsertim, quæ à clarissimis olim medicis magnis Imperatoribus parabantur. ut latius, & diffusius in commentarijs nostris in Dioscoridem, de tua admirabili Theriaca libro sexto præfati sumus. Scio tamen meis laudibus ibidem conscriptis, & tibi, & mihi inuidos complures comparatos, qui aliorum uirtutibus insidiantur. At cum inuidia uirtuti perpetuò sese opponat, & tandem inuidos ipsos quodam ueluti marismo conficiat, eorum maledicentium minimè curare debemus. Scio ego non deesse pharmacopæos, non in Italia solùm, sed in alijs quoque exteris regionibus, qui legitimorum simplicium peritiā habent, & in componendis, parandisq; medicamentis exercitatissimi sunt, adcò ut possint rectè & Theriacam, & cætera generosa antidota parare : de quorum laudibus possem quoq; multa scribere si mihi cum ijs perinde ac tecum intercederet consuetudo. &
medica-

medicamentorum, quæ ab ijs paratur, certam aliquam haberem notitiam. Sed cum id haud mihi fateri liceat alijs eorum laudes describendas relinquo, & te præceteris laudandum, promouendumq; mihi proponam: seruata tamen cæterorum fama, fide, peritia, ac sedulitate. Cæterum si quis (quisquis ille fuerit) de mea fide dubitauerit, tutus ad te accedat, tecum loquatur, tuaq; omnia uideat & examinet, non tamen malignis, ac distortis oculis, sed claris & apertis. Hoc si fecerit, cognoscet quidem apertissimè; non immeritò à Matthiolo laudari Calceolarium, & eius antidota præ cæteris commendari. Intrent penetrentq;, qui selectissima omne genus medicamenta noscere, ac manibus tractare cupiunt in tuum Musæum; in quo prætiosa, ac rara recondis. Apertum enim illud inuenient (quæ tua est cum omnibus liberalitas.) & te ad omnia videnda ostensorum habebunt. Quid dicent cum viderint, quæ ego vidi; Et probaui apud te tantum? Mirabunturne? profectò mirabuntur, & præ stupore obmutescent. cum inspexerint costum, Amomum, Aspalatum, Calamum odoratum, Folium, & quod magis mirum est, etiam Opobalsamum. Videbunt præterea fossilium complurium varia genera, ipsaq; admodum rara, & permulta quoque naturæ miracula, nempe plantas animaliaq; in lapides multiplices versa, & alia non minus monstrosa, à te adeò diligenter asseruata, & in ordinem digesta, ut omnes, qui tam rara tamq; præciosa monumenta inspexere, summoperè stupeant. Taceo rara admodum animalia, quæ inibi summo artificio arefacta spectantur. Taceo peregrinas, & novas plantas, fructus radices semina, quæ è remotissimis terrarum locis delata sunt, ne maiorem tibi inuidiam pariam. Quæ omnia magno sumptu, & labore tibi comparaſti non tam lucri faciendi causa, quàm iuuandæ Reipublicæ, & famæ consequendæ desiderio. Prætereo quoque, quæ in tuo Myropolio mirifica asseruas antidota. Theriacam, inquā, iam omnibus celebrem, Mithridaticam antidotum illam regiam, atque antidotum etiam illam nostram, & nostrum de Scorpionibus oleum, quæ tibi & mihi tam diligenter, fideliterq; paraſti, ut nihil addi possit. Præclarus es pharmacopæus. præclarus, & acerrimus simplicium indagator, ac censor, cur ergo curas uilitigatorum insidias? Velim omnino ne cures, cum tibi nihil officere queant. Non desunt tibi (mihi crede) medicæ materiæ periti, qui sua tantum autoritate te ipsum, & tua omnia tuebuntur. Scio ego non deesse eruditissimos medicos, quibus ex commentariorum nostrorum lectione ingens tua probitas, ac in parandis Antidotis peritia innotuit. qui cōfectis difficillimis, ac longis itineribus ad te profecti sunt non modo ut te de facie cognoscerent, sed ut à te velui ab Andromacho, & Galeno, Theriacam, & alia complura generosa antidota consequi possent. Inter quos licebit mihi nunc hîc commemorare Ioan. Baptistam Nocetum Pontremolensem & Ioan. Baptistam Olium Cremonensem Medicos sanè ac viros, singulari doctrina illustres, & materiæ medicæ peritos, qui suis literis se mul-

tum mihi debere fassi sunt, quòd ex commentariis nostris illis innotueris, te in-
uiserint, & præclarissima antidota abs te acceperint. Taceo laudes, quibus mul-
tis encomijs te prosequuti sunt, & quæ de his, quæ apud te videntur, enarrant.
Miranda enim sunt quæ de te scribunt, ac de tuorum medicamentorum mira-
culis. Prætermittam & ego quoque, quæ de mirificis Theriacæ tuæ operibus
dici possent, quod tamen non facerem nisi id prius in commentariis nostris in
Dioscoridem præstitissem. Quin etiam cùm Antidotus ipsa iam ubique de se,
suaq; ipsius præstantia dicat, loquatur, & prædicet, non est ut de ea plura præ-
fari contendam. Hoc tantum addam nescire Matthiolum, ubi ei parem adin-
uenias. Facinus esset magnum si ea velim in hominum usum promouere, quæ
scirem non carere imposturis, ut quidam fortasse faciunt. Quin etiam haud
minus facinus esset, si quæ scirem ad conseruandam tuendamq; hominum vitam
profutura, eadem non promouerem, & laudibus non commendarem. sed ne lon-
gius tuas prosequar laudes, & ne tam amplo meæ in te beneuolentiæ animoin-
uidorum aures obtundam, cætera tacere decreui, de quibus præclarissimi Medi-
ci Veronenses, qui omnibus ferè horis tecum versantur & viuunt, longè melius
ac diffusius quàm ego testari poterunt. Tu verò, ut semper soles, diligenter cu-
ra, ut antidotum & oleum nostrum de scorpionibus contra venena, & virulen-
torum animalium ictus, quorum parandi rationem in commentariis nostris de-
scripsimus, ad finem deducantur. Si quidem tametsi Romæ non desint, qui hæc
iam passim parent in multorum Heroum gratiam, & usum, sunt tamen eorum
plerique, qui sepe suis literis ad me datis antidota ipsa à me petant, quod sibi om-
nino persuadeant, quæ à nostris prodeunt manibus ceteris fore præstantiora.
Bene vale. Tridenti, Idibus Ianuarij. M D LXXI.

CATALOGVS IMAGINVM PLANTARVM,

quę in hoc Compendio continentur.

Quas omnes, vt commodius inueniri queant, è libro in librum,
ita digessimus.

*Excell. Borgarutij à Borgarutijs, in vniuersum plantarum Com-
pendium, distichon.*

Nomina, forma, locus, quod sit genus, atque facultas
Herbarum, exiguo, dabitur nunc nosse libello.

IN LIB. I.



BIES	37	<i>Cerasa racemosa</i>	118	<i>Ledum</i>	81
<i>Acacia</i>	87	<i>Cerasa austera</i>	119	<i>Lentiscus</i>	38
<i>Acacia al-</i>		<i>Chamecerasus</i>	120	<i>Ligustrum</i>	73
<i>tri</i>	88	<i>Cistus</i>	78	<i>Limonia mala</i>	128
<i>Acorum ve</i>		<i>Cistus fœmina</i>	79	<i>Lotus, siue Celtis</i>	134
<i>rum</i>	4	<i>Citria mala, siue medica.</i>	127	<i>Lotus Africana altera, siue lo-</i>	
<i>Acorum falsum</i>	5	<i>Cornus</i>	137	<i>ti Aphricanæ species</i>	136
<i>Acuta spina</i>	69	<i>Cotinus</i>	105	<i>Lycium</i>	83
<i>Alnus</i>	53	<i>Cotonea</i>	123	<i>Lycium Italicum</i>	84
<i>Amygdale</i>	147	<i>Crocum</i>	25	MAHALEB	75
<i>Aquifolium</i>	68	<i>Cuciophera</i>	111	<i>Malum punicum</i>	122
<i>Arbutus</i>	146	<i>Cupressus</i>	40	<i>Mala</i>	122
<i>Armeniaca mala maiora.</i>	125	<i>Cyperus</i>	7	<i>Mespilus prima</i>	132
<i>Armeniaca mala min.</i>	126	ELEAGNOS	90	<i>Mespilus vulgaris</i>	133
<i>Arundo</i>	57	<i>Erica</i>	60	<i>Meum</i>	6
<i>Arundo palustris</i>	58	<i>Erica altera</i>	61	<i>Morus</i>	156
<i>Asarum</i>	14	<i>Erica baccifera</i>	62	<i>Musa</i>	109
<i>Asarina</i>	15	<i>Euonymus</i>	86	<i>Musa cum fructu</i>	22
<i>Auellanę Indicę</i>	155	FAGVS	95	<i>Muscus arboreus</i>	23
<i>Aurantia mala</i>	129	<i>Ficus</i>	159	<i>Muscus terrestris</i>	24
BETVLA	54	<i>Ficus Indica</i>	160	<i>Myrica</i>	59
<i>Berberus vulgaris, siue Crespi-</i>		<i>Fraxinus</i>	49	<i>Myrthus</i>	113
<i>nus</i>	70	GALLA	102	<i>Myrthus Tarentina</i>	114
<i>Buxus</i>	85	<i>Gelsiminum</i>	27	<i>Myrthus exotica</i>	115
CALAMVS odoratus	22	HALYMVS	67	<i>Myrtillus</i>	116
<i>Cardamomum</i>	8	<i>Helenium</i>	26	NARDVS Indica	9
<i>Carpinus</i>	56	<i>Hypocisthis</i>	80	<i>Nardus Celtica</i>	10
<i>Cassia solutina</i>	19	IBERIS	162	<i>Nardus montana</i>	11
<i>Castanę</i>	100	<i>Ilex</i>	96	<i>Nuces auellanę</i>	154
<i>Castanę equinę</i>	101	<i>Iris</i>	1	<i>Nux iuglans</i>	150
<i>Cedrus</i>	44	<i>Iris syluestris maior</i>	2	<i>Nux Indica</i>	151
<i>Cedrus Phœnicia</i>	45	<i>Iris syluestris minor</i>	3	<i>Nux myristica</i>	152
<i>Cedrus Lycia</i>	46	<i>Iuncus odoratus</i>	21	<i>Nux metella</i>	153
<i>Cerasz</i>	117	<i>Iuniperus</i>	41	OLEA syluestris	92
		LARIX	35	<i>Olea domestica</i>	93
		<i>Laurus</i>	47	PALMA	106
				<i>Palma</i>	

Valeriana.

Palma elate	107	Staphyloidendron, siue Pistacia	Beta alba	228
Palma minor	108	agrestia	Beta nigra	229
Persea	161	Styrax	Beta rubra	230
Persea	124	Suber	Blitum	210
Phu maius	16	Suber aliud	Blitum rubrum minus	211
Phu minus	17	Sycomorus	Blitum album	212
Phu minimum	18	TEREBINTHVS	Bonus Henricus	339
Picea	36	Tilia mas	Brassica lenis	224
Pinus	29	Tilia fœmina	Brassica crassa	225
Pinus sylvestris montana.		VIBURNVM	Brassica capitata	226
folio	30	Virga sanguinea	Brassica marina	227
Pinus sylvestris altera, mugo		Vitex	Bulbus vomitorius	343
dicta	31	Vlmus	Bursa pastoris	316
Pinus sylvestris cembro	32	Vua spina	C A E P A	
Pinus maritimæ primum ge-		ZIZIPHA	Cæpa scetilis	301
nus	33		Cæpa fissilis	302
Pinus maritimæ secundum ge-			Cæpa Ascalonia	303
nus	34		Capparis	345
Pistachia	148		Caryophilli	323
Pyra	131		Caryophilli flores domestici.	
Phyllirea	74		folio	324
Phellodrys	99		Caryophilli flores sylvestres.	
Platanus	48		folio	325
Poma Adami	130		Caucalis	279
Populus alba	50		Cerofolium	276
Populus nigra	51		Chelidonium maius	336
Populus Lybica	52		Chelidonium minus	367
Prunus	142		Cicer	181
Prunus sylvestris	143		Cicer sylvestr.	182
Pseudonardus	12		Cichorium	257
Pseudonardus fœmina, siue La-			Cichorium verrucarium, siue	
uendula	13		Zacintha	260
Pseudolotus	135		Cichorium Constantinopolita-	
Pseudosycomorus	158		num	261
Q V E R C V S	94		Condrilla	264
R H A M N V S	63		Condrilla altera	265
Rhamnus ij.	64		Coronopus	249
Rhamnus iij.	65		Coronopus sylvestris	250
Rhus	103		Chrithmum	245
Ribes vulgare	72		Chrithmum ij.	246
Rosa	82		Chrithmum iij.	247
SABINA	42		Chrithmum iiij.	248
Sabina sterilis	43		Cucurbita	266
Salix	91		Cucurbita Indica	267
Sebesten	144		Cucurbita sativa	268
Siliqua	121		Cucumis longus	269
Sorba	139		Cyanus maior	262
Sorbus sylvestris	140		Cyanus minor	263
Sorbus torminalis	141		Cyclaminus	331
Spina infectoria	66		DENS Leonis	259
			Dracum-	

IN LIB. II.

A L L I V M

Allium anguinum

Allium vrsinum

Ampeloprasum

Anagallis mas

Anagallis fœmina

Anemone

Anemone ij.

Anemone iij.

Anemone iiij.

Anemone v.

Anguria

Aphaca

Aquileia, seu Aquilina

Arabis, siue Draba

Aracus

Arisarum

Arisarum alterum

Arum Aegyptium

Arum

Arum minus

Asparagus

Asparagus sylvestris

Atriplex

Atriplex sylvestris i.

Atriplex sylvestris ij.

Atriplex sylvestris iij.

Atriplex marina

Aucua

Auricula muris

BARBVLA hirci

Barbula hirci ij.

304

305

306

299

360

361

354

355

356

357

358

271

295

368

317

185

340

341

187

337

338

233

234

217

218

219

220

221

169

371

286

287

PLANTARVM.

<i>Dracunculus maior</i>	332	MALVA	213	<i>Ranunculus v.</i>	352
<i>Dracunculus minor</i>	333	<i>Malua arborea</i>	214	<i>Ranunculus vi.</i>	353
<i>Dracunculus aquaticus</i>	334	<i>Malua maior unicaulis</i>	215	<i>Raphanus</i>	199
<i>Dracunculus hortensis</i>	335	<i>Malua alterum genus</i>	216	<i>Raphanus longus</i>	200
ERVCA	280	<i>Milium</i>	171	<i>Raphanus rusticus</i>	201
<i>Erica sylvestris</i>	281	<i>Milium Indicum</i>	172	<i>Rapunculus</i>	197
<i>Erium</i>	192			<i>Rapum</i>	194
FABA	183	NAPVS	198	<i>Rapum longum</i>	195
<i>Faba sylvestris</i>	184	<i>Nasturtium</i>	311	<i>Rapum sylvestre</i>	196
<i>Faba Aegyptia</i>	186				
<i>Fœnum græcum</i>	177	OCIMVM	282	SCORZONERA Hispanica	
<i>Fru mentum Indicum</i>		<i>Ocimum ij.</i>	283	folio	288
<i>Fru mentum Saracenicum</i>		<i>Ocimum minus</i>	284	<i>Scorzonera Bohemica</i>	289
folio	165	<i>Ophioglossum</i>	336	<i>Scorodoprasum</i>	307
GINGIDIVM		<i>Oriza</i>	170	<i>Scilla</i>	344
<i>Gossipium</i>		<i>Ornithogalum</i>	290	<i>Segale</i>	168
HASTVLA regia, siue A-		<i>Ornithogalum alterum</i>		<i>Sesamum</i>	175
sphodelus	342	folio	291	<i>Sinapi</i>	308
<i>Hedera</i>	363	<i>Orobanches</i>	285	<i>Sinapi alterum</i>	309
<i>Hedera helix, siue minor.</i>		<i>Oxalis maior</i>	205	<i>Sinapi ij.</i>	310
folio	364	<i>Oxalis minor</i>	206	<i>Sifer</i>	202
<i>Hedera terrestris</i>	365			<i>Sifer alterum</i>	203
<i>Hippolapathum hortense</i>		PANICVM	173	<i>Sisimbrium hortense</i>	241
folio	207	<i>Panicum sylvestre</i>	174	<i>Sisimbrium sylvestre</i>	242
<i>Hippolapathum sylvestre</i>		<i>Pecten Veneris</i>	278	<i>Sisimbrium aquaticum</i>	243
folio	208	<i>Pepon</i>	270	<i>Sisimbrium aquaticum alte-</i>	
<i>Hordeum</i>	166	<i>Perficaria altera</i>	327	rum	244
<i>Hydropiper, siue Perficaria.</i>		<i>Piper</i>	320	<i>Sium verum</i>	239
folio	326	<i>Piper Aethiopicum</i>	321	<i>Sium vulgare</i>	240
INTVBVS maior	254	<i>Piper Indicum</i>	322	<i>Sonchus</i>	251
<i>Intubus minor</i>	255	<i>Phaseli</i>	189	<i>Sonchus levis</i>	252
<i>Intubus crispa</i>	256	<i>Pisum</i>	190	<i>Sonchus levis ij.</i>	253
<i>Intubus sylvestris</i>	258	<i>Pisum minus</i>	191	<i>Spinachium</i>	222
<i>Irio, siue Erisimum</i>	318	<i>Plantago maior</i>	235	<i>Succisa, seu morsus diaboli.</i>	
<i>Irio alter vulgaris</i>	319	<i>Plantago media</i>	236	folio	362
<i>Isatis domestica</i>	372	<i>Plantago longa</i>	237		
<i>Isatis sylvestris</i>	373	<i>Plantago aquatica</i>	238	TELEPHIVM, siue Faba-	
KALI	223	<i>Porrum</i>	297	ria	374
LACTVCA	272	<i>Porrum commune</i>	298	<i>Thlaspi j.</i>	312
<i>Lactuca florens</i>	273	<i>Portulaca domestica</i>	231	<i>Thlaspi ij.</i>	313
<i>Lactuca sylvestris</i>	274	<i>Portulaca sylvestris</i>	232	<i>Thlaspi iij.</i>	314
<i>Lapathum</i>	204	<i>Pseudorhizium</i>	330	<i>Thlaspi iiij.</i>	315
<i>Lampsana</i>	209	<i>Ptarmica</i>	328	<i>Trasi</i>	292
<i>Lepidium Pauli, & Plinij,</i>		<i>Ptarmica altera</i>	329	<i>Triticum</i>	163
vulgò Piperitis	346	<i>Pulsatilla</i>	359	<i>Tubera</i>	293
<i>Lens</i>	188				
<i>Linum</i>	178	RANVNCVLVS	348	VICIA	296
<i>Linum sylvestre</i>	179	<i>Ranunculus ij.</i>	349	<i>Visnaga</i>	277
<i>Lupini</i>	193	<i>Ranunculus iij.</i>	350		
<i>Lolium</i>	176	<i>Ranunculus iiij.</i>	351	ZEA	167

INDEX

IN LIB. III.

A GARICVM	375	Bellidis tres species	588	Geranium	336
Abrotanum mas.	409	Botrys	535	Geranium ij.	537
Absointhium	404	Buphthalmum	585	Geranium iij.	538
Absointhium Ponticum	405	CALAMINTHA	429	Geranium iiij.	539
Absointhium marinum	406	Calamintha montana	430	Geranium v.	540
Absointhium Seriphium	407	Calaminta aquatica	431	Geranium vi.	541
Acanthum	395	Camepytis	611	Gnaphalium	542
Acanthus	396	Cannabis	502	Gratiola	413
Acinus	442	Carduus aculeatus	393	HEMEROCALLIS	552
Adonis	582	Carduus non aculeatus	392	Hemerocallis altera	553
Aiuga altera	612	Carduus lacteus	398	Hemionytis	578
Alcea	601	Carduus benedictus	501	Herba gattaria	432
Alisma	606	Carota	456	Hieracium	469
Alliaria	528	Carum	461	Hieracium minus	470
Althea	599	Capea	605	Horminum	566
Althea altera	600	Centaurium maius	383	Horminum sylvestre	567
Aloe	403	Centaurium minus	384	Hypericum	607
Alyssum	498	Chamaedris altera	507	Hysopum	412
Amaracus	438	Chamaeleon albus	385	IMPERATORIA	477
Amaracus tenuifolia	439	Chamaeleon niger	386	LABRUM Veneris	388
Ambrosia	533	Chamaeleon niger alter	387	Labrum Veneris alterum	389
Ambrosia altera	534	Clinopodium	502	Leontopodium	504
Ammi	467	Clinopodium alterum	503	Leucoium album & purpu-	
Anagyris	603	Colutea	483	reum	555
Anagyris altera	604	Consolida regalis	466	Leucoium aureum	556
Androsæmum	609	Conyza	549	Leuisticum vulgare, seu hip-	
Androsaces	575	Conyza minor	550	poselinum	474
Androsaces altera	576	Coniza iij.	551	Ligusticum	452
Anethum	462	Coriandrum	468	Ligusticum alterum	453
Anisum	460	Coris	610	Lilium	509
Anonis, siue Ononis	397	Cuminum satium	463	Lilium conuallium	554
Anthemis, siue Chamæmil-		Cuminum sylvestre	464	Lithospermum maius	591
la	581	Cuminum sylvestre alterum	465	Lithospermum minus	592
Aparine	439	DAUCVM	480	Lonchitis aspera maior	596
Apiastrum, siue Melissophil-		Daucum alterum	481	Lonchitis aspera minor	597
lum	513	Dictamnium Cretense	420	Lunaria minor	580
Apium hortense	471	Dictamnium album	421	Lychnis	508
Apium palustre	472	Dulcis radix	382	MARRUBIVM	512
Aristolochia	380	ELAPHOBOSCVM	478	Martagon	510
Aristolochia longa	381	Eryngium	400	Marum	441
Artemisia	532	Eryngium marinum	401	Melanthium satium	492
Ascirum	608	Eryngium planum	402	Melanthium sylvestre	493
Asplenium	577	FERVLA	479	Melanthium sylvestre alie-	
Atractylis	500	Fenicium	490	rum	494
BACCHARIS	443	Filipendula	544	Melilotus, siue Sertula Cam-	
Ballote	511	GALEGA, seu ruta capra-		pana	440
Bellis maior	586	ria	447	Melissa moluca, siue Constan-	
Bellis minor	587	Gentiana	377	tinopolitana	514
		Gentiana minor	378	Melissa moldauica	515
		Gentiana minima	379	Mentha	425
				Mentha	

<i>Mentha altera</i>	426
<i>Mentastrium, siue mentha syl-</i>	
<i>uestris</i>	427
<i>Mentha græca</i>	428
<i>Moly</i>	448
<i>NYMPHÆA alba</i>	572
<i>Nymphæa lutea</i>	573
<i>Nymphæa parua</i>	574
<i>ŒNANTHE j.</i>	545
<i>Oenanthe ij</i>	546
<i>Oenanthe iij.</i>	547
<i>Oenanthe iiij.</i>	548
<i>Onosma</i>	571
<i>Origanum</i>	415
<i>Origanum onitis</i>	416
<i>Origanum vulgare</i>	417
<i>PALMA Christi maior</i>	562
<i>Palma Christi minor</i>	563
<i>Parthenium</i>	583
<i>Pœonia</i>	589
<i>Pœonia fœmina</i>	590
<i>Panaces heracleum</i>	449
<i>Panaces Asclepium</i>	450
<i>Panax chironium, siue flos so-</i>	
<i>lis</i>	451
<i>Pastinaca domestica</i>	454
<i>Pastinaca sylvestris</i>	455
<i>Petroselinum Macedon.</i>	473
<i>Peucedanum</i>	491
<i>Phalangium</i>	519
<i>Phalaris</i>	593
<i>Phyllitis</i>	518
<i>Phyllum</i>	557
<i>Pirethrum</i>	484
<i>Pirethrum alterum</i>	485
<i>Polium</i>	525
<i>Polium alterum</i>	526
<i>Poterium</i>	394
<i>Pseudodiētamnum</i>	422
<i>Pseudolonchitis aspera</i>	598
<i>Pseudomelanthium</i>	
<i>Pseudoſtachis</i>	517
<i>Pulegium</i>	419
<i>RHABARBARVM</i>	376
<i>Rosmarinum</i>	486
<i>Rosmarinum coronariū</i>	487
<i>Rosmarinum sylvestre</i>	488
<i>Rubia sativa</i>	594
<i>Rubia sylvestris</i>	595
<i>Rutha</i>	444

<i>Rutha sylvestris</i>	445
<i>Rutha sylvest.harmola.</i>	446
<i>SALVIA</i>	423
<i>Salvia minor</i>	424
<i>Satureia</i>	434
<i>Satureia altera</i>	435
<i>Satyrium</i>	564
<i>Satyrium Erythronium</i>	565
<i>Sclarea</i>	568
<i>Scordium</i>	527
<i>Securidaca maior</i>	569
<i>Securidaca minor</i>	570
<i>Semen sanctum</i>	408
<i>Sena</i>	482
<i>Serpillum</i>	436
<i>Serpillum alterum</i>	437
<i>Seseli massiliense</i>	457
<i>Seseli Aethiopicum</i>	458
<i>Seseli Peloponense</i>	459
<i>Sferracavallo</i>	579
<i>Smirnum</i>	475
<i>Smirnum Creticum</i>	476
<i>Sphondylium</i>	489
<i>Spina alba</i>	391
<i>Stachys</i>	516
<i>Stæchas</i>	414
<i>TANACETVM</i>	584
<i>Testiculus j.</i>	558
<i>Testiculus ij. & iij.</i>	559
<i>Testiculus iiij.</i>	560
<i>Testiculus v.</i>	561
<i>Teucrium</i>	505
<i>Tragacantha</i>	399
<i>Tragoriganum</i>	418
<i>Trifolium asphaltite</i>	520
<i>Trifolium pratense</i>	521
<i>Trifoliū pratense alterū</i>	522
<i>Trifolium acetosum</i>	523
<i>Trinitas</i>	524
<i>Trissago, seu chamedris</i>	506
<i>Tussilago</i>	529
<i>Tussilago maior</i>	530
<i>Tussilago altera, siue Farfu-</i>	
<i>gium</i>	531
<i>Thymum</i>	433
<i>Typha</i>	543
<i>VERONICA</i>	410
<i>Veronica fœmina</i>	411
<i>Vincetossicum</i>	499
<i>Virga Pastoris</i>	390

<i>Viscum</i>	496
---------------	-----

IN LIB. IIII.

A CHILLEA	674
<i>Aconitum Pardalian-</i>	
<i>ches</i>	735
<i>Aconitum Pardaliäches Pli-</i>	
<i>nij</i>	736
<i>Aconitum Pardaliäches Theo-</i>	
<i>phraſti</i>	737
<i>Aconitum Pardalianches mi-</i>	
<i>nus</i>	738
<i>Aconitum pardalianches fal-</i>	
<i>sum</i>	739
<i>Aconitum ij.</i>	740
<i>Aconitum iij.</i>	741
<i>Aconitum iiij.</i>	742
<i>Aconitum v.</i>	743
<i>Aconitum vi.</i>	744
<i>Aconitum vii.</i>	745
<i>Aconitum viii.</i>	746
<i>Aconitum ix.</i>	747
<i>Adiantum</i>	839
<i>Aegilops, siue festuca</i>	842
<i>Aegilops altera</i>	843
<i>Aethiopis</i>	800
<i>Ageratum</i>	712
<i>Alypum</i>	901
<i>Alſine</i>	763
<i>Amaranthus</i>	710
<i>Angelica</i>	814
<i>Angelica sylvestris</i>	815
<i>Anchusa</i>	658
<i>Anchusa altera</i>	659
<i>Anchusa tertia</i>	660
<i>Antora</i>	750
<i>Anthirrhinum</i>	835
<i>Anthirrhinum ij.</i>	836
<i>Anthirrhinum iij.</i>	837
<i>Anthirrhinum iiij.</i>	838
<i>Apios</i>	896
<i>Apocynum</i>	753
<i>Apocynum repens</i>	754
<i>Aster Atticus</i>	818
<i>Aster Atticus alter</i>	819
<i>Auricula muris</i>	633
BALSAMINA, seu momor-	
dica	905
Betonica	613

Balsamina

I N D E X

<i>Balsamina altera</i>	906	<i>Epipactis, sine helleborū.</i>	804	<i>Isopyrum</i>	821
<i>Bistorta</i>	615	<i>Epithymum</i>	899	<i>Iuncus</i>	699
<i>Blutaria</i>	799	<i>Equisetum</i>	690	<i>Iuncus floridus</i>	700
<i>Buglossum, siue Borrage</i>	826	<i>Equisetum ij.</i>	691	<i>LACOPUS</i>	650
<i>Buglossum vulgare</i>	827	<i>Equisetum iij.</i>	692	<i>Lachyris</i>	884
<i>Buglossum alterum sylvestre,</i>		<i>Equisetum iiij.</i>	693	<i>Laurus Alexandrina</i>	851
<i>flore nigrum</i>	828	<i>Erinus</i>	663	<i>Laurus Alexā. altera</i>	882
<i>CALTHA</i>	919	<i>Eufragia</i>	687	<i>Lens palustris</i>	764
<i>Cardiaca</i>	777	<i>Eupatorium</i>	680	<i>Lens palustris altera</i>	765
<i>Caryophyllata</i>	651	<i>Eupatorium vulgare</i>	681	<i>Leontopodium verum</i>	833
<i>Caryophyllata montana</i>	652	<i>FILICULA, seu Polypodiū.</i>		<i>Lichen</i>	701
<i>Chamaedaphne</i>	854	<i>folio</i>	910	<i>Limonium</i>	647
<i>Chamaelea</i>	888	<i>Filix</i>	907	<i>Limonium alterum</i>	648
<i>Chrysanthemum</i>	711	<i>Filix fœm.</i>	908	<i>Lotus urbana</i>	808
<i>Cicuta</i>	751	<i>Flammula</i>	626	<i>Lotus sylvestris</i>	809
<i>Cirsium</i>	817	<i>Fragaria</i>	686	<i>Lupulus</i>	849
<i>Clematis</i>	623	<i>Frangula</i>	894	<i>Lysimachia</i>	617
<i>Clematis altera</i>	624	<i>Fumaria</i>	805	<i>Lysimachia altera</i>	618
<i>Clematis tertia</i>	625	<i>Fumaria altera</i>	806	<i>MANDRAGORAS</i>	732
<i>Clymenum</i>	638	<i>Fumaria corydalis</i>	807	<i>Mandragoras mas</i>	733
<i>Cneorum candidum</i>	890	<i>Fungi</i>	756	<i>Medium</i>	654
<i>Colchicum</i>	257	<i>GALIOPSIS</i>	778	<i>Melongenā</i>	734
<i>Colchicum orientale</i>	758	<i>Galium</i>	780	<i>Mercurialis</i>	913
<i>Colocynthis</i>	898	<i>Genista</i>	865	<i>Mercurialis fœmina</i>	914
<i>Consolida media</i>	629	<i>Gladiolus</i>	655	<i>Millefolium aquaticum</i>	788
<i>Consolida minor</i>	630	<i>Gramen</i>	664	<i>Millefolium stratiotes</i>	789
<i>Coccum insectarium</i>	694	<i>Gramen mannæ</i>	665	<i>Millefolium minus</i>	790
<i>Cortusa</i>	653	<i>Gramen alterum</i>	666	<i>Muscus marinus</i>	783
<i>Cnicus</i>	912	<i>Gramen Parnasi</i>	667	<i>Muscus marin. alter Pli.</i>	784
<i>Cucumis sylvestris</i>	861	<i>Gramen aculeatum</i>	668	<i>Myriophyllum</i>	811
<i>Cuscuta</i>	900	<i>HELICHRYSUM</i>	706	<i>Myriophyllum alterum</i>	812
<i>Cymbalaria</i>	773	<i>Helichrysum italicum</i>	707	<i>Myrrhis</i>	813
<i>Cynocrambe</i>	915	<i>Helichrysum creticum</i>	708	<i>NAPELLUS</i>	749
<i>Cynoglossum</i>	829	<i>Heliotropium minus</i>	916	<i>Narcissus j.</i>	866
<i>Cynoglossum vulgare</i>	830	<i>Heliotropium minus</i>	917	<i>Narcissus ij.</i>	867
<i>Cynoglossum vulgare flori-</i>		<i>Heliotropium alterum</i>	918	<i>Narcissus iij.</i>	868
<i>dum</i>	830	<i>Helxine</i>	762	<i>Narcissus iiij.</i>	869
<i>Cytisus</i>	810	<i>Heri i Paris</i>	748	<i>Narcissus v.</i>	870
<i>DAPHNOIDES</i>	853	<i>Hermodactylus</i>	759	<i>Narcissus vi.</i>	871
<i>Dentaria minor</i>	631	<i>Hiacynthus</i>	714	<i>Narcissus vii.</i>	872
<i>Dentaria maior</i>	632	<i>Hiacynthus orientalis</i>	715	<i>Narcissus viii.</i>	873
<i>Diapensia</i>	685	<i>Hiacynth. orientalis alter</i>	716	<i>Narcissus ix.</i>	874
<i>Dryopteris</i>	911	<i>Hippoglossum</i>	834	<i>Nerū, siue Rhododēdrō</i>	755
<i>EBVLVS</i>	895	<i>Holostium</i>	634	<i>Numularia</i>	779
<i>Echium</i>	661	<i>Hypocoum</i>	720	<i>OPHRIS</i>	859
<i>Elatine</i>	678	<i>Hyoscyamus</i>	721	<i>Osyris</i>	845
<i>Elleborum album</i>	855	<i>Hyoscyamus albus</i>	722	<i>PAPAVER erraticum</i>	717
<i>Elleborum nigrum</i>	856	<i>Hyoscyamus tertius</i>	723	<i>Papaver sativum</i>	718
<i>Elleborum nigrū alterū</i>	857	<i>IACCEA, siue flos Trin.</i>	834	<i>Papaver corniculatum</i>	719
<i>Ephemerum</i>	761	<i>Iaccea altera</i>	825	<i>Paronychia</i>	704
				<i>Paronychia</i>	

PLANTARVM.

<i>Paronychia altera</i>	705	<i>Sambucus montana</i>	892	<i>Stachas citrina</i>	709
<i>Perfoliata</i>	803	<i>Sambucus aquatica</i>	893	<i>Symphytum petreum</i>	627
<i>Personata maior</i>	801	<i>Sanguisorba, seu Pimpinella</i>		<i>Symphytum maius</i>	628
<i>Personata altera</i>	802	<i>maior</i>	697	TAXVS	752
<i>Pepbis</i>	885	<i>Saxifraga</i>	642	<i>Thapsia</i>	
<i>Peplis</i>	886	<i>Saxifraga ij.</i>	643	<i>Tithymali</i>	876
<i>Perichymentum</i>	639	<i>Saxifraga iij.</i>	644	<i>Tithymalus myrsinites</i>	877
<i>Phoenix</i>	688	<i>Saxifraga iiij.</i>	645	<i>Tithymalus paralius</i>	878
<i>Phyteuma</i>	832	<i>Saxifraga magna</i>	646	<i>Tithymalus helioscopius</i>	879
<i>Pilosella</i>	635	<i>Scabiosa</i>	636	<i>Tithymalus ciparissias</i>	880
<i>Pimpinella saxifraga</i>	695	<i>Scabiosa minor</i>	637	<i>Tithymalus dendroides</i>	881
<i>Pimpinella sanguisorba</i>	696	<i>Scammonia</i>	887	<i>Tithymalus leptophyllos</i>	882
<i>Pithyusa</i>	883	<i>Scorpioides</i>	920	<i>Tormentilla</i>	616
<i>Polygala</i>	844	<i>Scrophularia</i>	779	<i>Tragum</i>	698
<i>Polygonum mas</i>	619	<i>Semperuium maius</i>	766	<i>Tribulis</i>	640
<i>Polygonum fœminæ</i>	620	<i>Semperuium minus</i>	767	<i>Tribulus aquaticus</i>	641
<i>Polygonum minus</i>	621	<i>Semperuium minimum</i>	768	<i>Trichomanes</i>	844
<i>Polygonatum</i>	622	<i>Semperuium arborescens</i>	769	<i>Thymelea</i>	889
<i>Potamogeton</i>	785	<i>Semperuium arborescens alte-</i>		VERBASCVM	791
<i>Potentilla</i>	682	<i>rum</i>	770	<i>Verbascum ij.</i>	792
<i>Primula veris</i>	797	<i>Senecio</i>	781	<i>Verbascum iij.</i>	793
<i>Primula veris altera</i>	798	<i>Senecio maius, siue flos S. la-</i>		<i>Verbascum sylvestre</i>	794
<i>Pseudoapios</i>	897	<i>cobi</i>	782	<i>Verbascum tychmite</i>	795
<i>Pseudohelleborum</i>	858	<i>Serratula</i>	614	<i>Verbascum aliud</i>	796
<i>Pseudomyagrum</i>	816	<i>Sesamoides paruum</i>	860	<i>Verbenaca</i>	713
<i>Pseudohermodactylus</i>	760	<i>Sideritis</i>	669	<i>Vesicaria, siue halicacabum</i>	
<i>Psyllium</i>	724	<i>Sideritis ij.</i>	670	<i>repens</i>	728
<i>Psyllium alterum</i>	725	<i>Sideritis iij.</i>	671	<i>Virga aurea</i>	673
<i>Pulmonaria</i>	702	<i>Sideritis iiij.</i>	672	<i>Vitis sylvestris</i>	902
<i>Pulmonaria altera</i>	703	<i>Smilax aspera</i>	846	<i>Vitis alba</i>	903
<i>Pyrola</i>	649	<i>Smilax levis</i>	848	<i>Vitis nigra</i>	904
QUINQUEFOLIUM	683	<i>Solanum hortense</i>	726	<i>Vitis vinifera</i>	921
<i>Quinquefolium album</i>	684	<i>Solanum halicacabum</i>	727	<i>Umbilicus Veneris</i>	771
RICINVS	875	<i>Solanum somniferum</i>	729	<i>Umbilicus Ven. alter</i>	772
<i>Rhodia radix</i>	689	<i>Solanum somnif. alterum</i>	730	<i>Urtica</i>	774
<i>Rubus</i>	675	<i>Solanum maius</i>	731	<i>Urtica ij.</i>	775
<i>Rubus Idæus</i>	676	<i>Sparthium</i>	864	<i>Urtica iij.</i>	776
SAGITTA	786	<i>Sparganium</i>	665	XANTHIVM	841
<i>Sagitta maior</i>	787	<i>Staphis agria</i>	862	<i>Xiris</i>	657
<i>Sambucus</i>	891	<i>Stellaria</i>	820	ZARZA parilla.	847

Indicis Plantarum, Finis.

Name	Age	Sex	Occupation
John Smith	25	M	Farmer
Mary Smith	22	F	Homemaker
James Smith	18	M	Student
Elizabeth Smith	15	F	Student
William Smith	12	M	Student
Anna Smith	10	F	Student
Thomas Smith	8	M	Student
Sarah Smith	6	F	Student
Robert Smith	4	M	Student
John Smith	2	M	Student

IRIS, Græcè *I^{ris}*.] Arabicè, *Asmeni iuni*, & *Aiersa*.] Italicè, *Giglio celeste*, & *Giglio pavonazzo*.] Germanicè, *Blauwiggen*, *Veilmurtz*, & *Himmel Schuvertel*.] Hispanicè, *Lirio Cardeno*.] Gallicè, *Glayeul*, & *Flambe*.] Boemicè, & Polonicè, *Kofatec*.

I R I S .



G E N E R A .

Alterum domesticum, alterum sylvestre. Illius tres numerantur species, versicolor, lutea, candida. Huius tantum duæ, Maior, & Minor. *Matt.*

F O R M A .

Folia gladios referunt, flores versicolores Iridis cœlestis modo habentur, caules laeves, cubitales, radices albicantes, solidæ, geniculatæ, numerosis inferna sede agnatis. *Idem*

L O C V S .

Nascitur in hortis, & Viridarijs.

Q U A L I T A T E S .

Excalfacit, & siccit ordine secundo. *Anicem.*
Incidit, abstergit, trahit, aperit, concoquit, deiecit, emollit. Sarcotica est, acris, amara, & odorata.

V I R E S .

Radix ex aceto pota, Serpentiū moribus aduersatur. Recens ex melle subdita partus extrahit: cōcta, & illita strumas, veteresq; duritias emollit: cum rosaceo autem, & aceto capitis dolores mulcet. Ex melle illita cum albo veratro, maculas in facie delet. Huius succus potus aquas extrahit, quin etiam bilem crassam, & pituitam, ex hydro melite septem drach. pondere potus. Eiusdem decoctum tineas ventris pellit, menses, & vrinas ciēt, dentium dolores mulcet, & pectus expurgat. Aridæ farina, cum cinna-
DIOSC. Gal. Anicem.
momi, & Anethi pondere dimidio, & croci momento testium tumores, doloresq; tollit, vbi coctio-
Matt.
neo panno, albo meraco infuso excipiat, & calidum apponatur. Hæ morrhoidas fotu eiicit. Radicis succus naribus infusus cerebrum à pituita mirificè purgat. Potum radicis decoctum obstructions a-

perit, præsertim vbi crassa, fuerit impacta materia. renum calculos eiicit. Datur potandum commodissime Ictericis & aqua intercutem laborantibus. Eadem in passo decocta & cum hordeacea farina illita, parotidas bellè discutiant.

IRIS, Sylvestris maior, Græcis, Ἰρίς αἰπία μέγας.] Italis, Giglio azzurro
salvatico.] Germanis, Unild blaun gilgen.] Gallis, Flambe Sauvage.

IRIS SILVESTRIS
MAIOR.

FORMA.

Matt. Folia, caules, flores, radix,
perinde ac in domestica
habentur, verum mino-
ra, & rudiora.

LOCVS.

Idem Nascitur in saxosis colli-
bus, & asperis locis.

QUALITATES.

Idem Excalfacit, & siccit valen-
tius tamen quàm dome-
stica.

VIRES.

Idem Easdem cum domestica vi-
res habet, sed acriores,
ac etiam valentiores.



IRIS, Silvestris minor, Græcis Ἰρίς ἀγρία μικρά.] Italis, Giglio azzurro piccolo.] At quidam falso Iridem Illicam vocant.

IRIS SILVESTRIS
MINOR.



F O R M A.

Folia habet Gladioli paulo *Matt.* longiora, radicem tenuem, subrufescentem, inodoram, & graminis fere modo repētem, caulem breuem, florem cæteris minorem, odore Armenici mali, purpureum, & aureis quibusdam lineis varium.

L O C U S.

Nascitur in montibus, col *Idem* libus, & pratis.

Q U A L I T A T E S.

Excalfacit, & extenuat ordine primo, aut secundo inchoante. *Matt.*

V I R E S.

Præstat eadem, quæ cætera *Idem* Iridis genera, minori tamen efficacia. Fit è floribus oleum, quo quidam

vtiliter vtuntur, ad tumentes ex partu mammas, & ad testium inflammationes.

ACORVM, Græcis ἀκρόν.] Mauritanis, *Uage, aut Ugi.*] Italis, *Acoro,*
vulgò perperam calamo Aromatico.] Germanis, *Kalmus.*] Boëmis,
Prust Vuorec.] Polonis, *Tatarskie, Ziele.*

A C O R V M .

F O R M A .

DIOSC. Folia habet Iridis, angustiora tamen: radices non dissimiles complicatas, non in rectum, sed obliquum actas, & summo cespice sparsas, geniculis interceptas. gustu acres; amarèque odore haud ingrato.

Matt. ¶ Numerosis infima sede capillamentis.

L O C V S :

DIOSC. Nascitur in Ponto, Colchide, & Galatia.

Q U A L I T A T E S .

Anicn. Radix exalfacit, & siccatur ordine tertio, incidit, aperit, prouocat, & acris est, amara, atque etiam odorata.

V I R E S .

DIOSC. Pota radix urinam, menses, & secūdas trahit: lateris dolores tollit: Iocinorosos, & lienosos iuuat: Pectori quoque pdest: urine stillicidijs, & à serpente demorsis mirificè auxiliatur, hocq; præsertim noie in Antidotis addit. ¶ Halitū mirificè cōmēdat: decoctę radice vapor hiātī ore exceptus tussim sanat.

Matt. ¶ Halitū mirificè cōmēdat: decoctę radice vapor hiātī ore exceptus tussim sanat.

C E N S V R A .

Matt. Proculdubio aberrant, qui Acorum calamum odoratum esse existimant, quemadmodum & qui Galangam Acorum faciunt.



ACORVM falsum, Græcis *ψευδοάκρον*.] Italis, *Giglio giallo*, & *Acoro bastardo*.] Germanis, *Geel lilien*.] Gallis, *Flambe de Rivieres*.] Boemis, *Kosatec žlti falešni*.] Polonis, *Mieczy Konne Korzenie*.

ACORVM FALSVM.



FORMA.

Foliis est Iridis longioribus, quemadmodum & caulibus, & floribus, qui tamen haud versicolores, sed lutei spectantur, differunt tamen facie, quippe quod minores sint, & angustioribus foliis. Radice nititur Iridis maiore duriorēq; , subrubēte, & inodora.

LOCVS.

Nascitur in palustribus, & aquosis.

QUALITATES.

Radix, cuius tantum est usus, exiccat, sed non nisi parum excalfacit. Nulla enim est acredine prædita: attenuat, roborat, resoluit.

VIRES.

Constat multorum experimento, valere pseudoacorum, propria sua ipsius vi, ad omnes nervorum, & cerebri affectus.

MEVM, Græcis Μῆνις.] Arabicis, *Mu.*] Italis, *Imperatrice*.

Ger. *Brennholz*

MEVM.

FORMA.

DIOSC. Folia fert Anethi, caulem geniculatum, umbellas flavescentes, radices copiosas, odore cum quadam graueolentia suavi, sapore subdulci, atque etiam acri.

LOCVS.


Matt. Nascitur in montibus, & collibus apricis. Optimum affertur ex Gargano Apuliæ monte. In Hispania & Macedonia copiosum.

QUALITATES.

Gal. lib. 7. simp. med. Excalfacit ordine tertio, & siccat secundo, incidit, digerit, aperit.

VIRES.

DIOSC. Radix ventriculi flatus discutit, ictis à serpētibus mirificè subuenit. Feruesfacta radix ex aqua, vel trita citra coctionē præclusos renes, & fæctam quoque pituitosis excrementis, vesicam, atque vrinæ difficultatem expedit: quin etiam ventriculi flatus discutit: Torminibus, vterinis affectibus, articulorumq; cruciatibus medetur. Auxiliatur quoq; pectoris fluxionibus ex melle delincta: Menses pellit in desensionibus addita. Infantium pubi illita urinam mouet: caput attamen dolore afficit, vbi copiosius fumatur.



CYPERVS, Gręcis κύπερος.] Afris, *Saherade.*] Italis, *Cipero.*] Germanis, *Uilder galgan.*] Hispanis, *Iuncia anellanada.*] Gallis, *Sonchet.*] Boemis, *Galgan plancy.*

CYPERVS.



G E N E R A.

Duo habentur genera, radice tantum differentia.

F O R M A.

Foliis & caule anetho similis est, binum fermè cubitorum altitudine attollitur, sparsis in obliquum, rectūq; radicibus, lōgis, tenuibus, odoratis. linguam excalfacientibus.

L O C V S.

Nascitur in palustribus, & humectis locis.

Q U A L I T A T E S.

Radix absque morfu exal Gal. 7. facit, & exiccat, quin ē simp. roborat, & adstringit: ac med. simul incidit & aperit. Eupolitica ē, & odorata.

V I R E S.

Radices ex aqua feruefactæ vel tritæ citra coctionem præcluserum renum, vesicęq; farctæ vitia potu leniunt: vrinæ difficultati medentur. stomachi inflationes discutunt. torminibus, affectæ vuluæ,

articulorum doloribus, atque fluxionibus pectoris, tritæ cum melle in eclegmate auxiliatur. Mēses pellūt; defessionibus feruefactę. Infantibus autem imo ventri illitæ, vrinās mouent: Quòd si plusquā par sit ex eis bibatur, caput dolore afficiunt. Ictis à serpēte mirificè p̄sunt.

CARDAMOMVM, Græcis Καρδάμωμον.] Mauritanis, Cordumeni.] Italis, Cardamomo.] Germanis, Cardamomelin.] Hispanis, Grana de paraiso.] Officinis, Melegeta, & grana paradisi. Ger. paradis Hönner.

C A R D A M O M V M.

G E N E R A .

Matt. Tria ad nos afferuntur genera : Maius, Medium, & Minus.

F O R M A M A I O R I S .

Idem Maioris capitulum fici, seu pyri faciem refert : semine intus subrufescente, angulosoq; : Medium folliculo contegitur oblongo, triquetro, striatoq; , in quo semen est oblongum, colore minus rufescente. Minus minore constat capitulo, ipsoq; triangulari : semine subrotundo, asperiusculoque : semen omnibus acre & odoratū : maioris tamen acrius, & odoratius. Minus, ut medium acridinis vehementia superat, ita, & odoris fragrantia.

L O C V S .

Idem Affertur in Europam ex Alexandria Ægypti, ac etiam à Lusitanis ex India Orientali.

Q U A L I T A T E S .

Gal. 7. simp. me. Semen facultatis est admodum calidæ, non tamen usque adeo, ut nasturtium, sed quanto suavius, magisq; fragrans est, tanto imbecillior ei calida facultas est : quin etiam quiddam amaritudinis respicit. ¶ Caterum hæc Galenus de suo scribit Cardamomo.

Matt.

V I R E S .

DIOSC. Datur ex aqua comitialibus, Ischiadicis, vulsis, resolutis, torminosisque, & contra latas venteris tincas : ex vino verò renū affectibus, urinæ difficultatibus, scorpionū ictibus, ac cæterorum venenosorum animalium, auxiliatur : Idem cū radicis lauri drachma potum, calculos comminuit.

C E N S V R A .

Cum in vulgari Cardamomo, quo passim utimur, nihil sit amaroris, nec eius odor caput feriat, nec semen fractu contumax sit, affirmare quidem non ausim, hoc nostrum, esse illud, cuius antiquiores meminerunt.



NARDVS Indica siue spica Nardi, Græcè Νάρδος, & Νάρδου σάχχης.] Mauritanis, *Stumbel*, siue *Senbel*.] Germanis, *Spikenarde*.] Italis, *Spico*, & *Spigonardo*.] Hispanis, *Azumbar*, aut *Espige sil.*] Gallis, *Aspic de vltre mer.*] Boemis, *Nardus Indiansky*. Ger. *Indianische Spikanardj*.

NARDVS INDICA.



FORMA.

Spica non est, quæ in cul- diosc.
morū summitate oritur: Gal.
Sed radix quæ spicæ figu- Matt.
ram habet. Complures
enim ab vna basi oriun-
tur spicæ, perinde ac in li-
lij aut allij radice, verū
capillaceæ, & comosæ, co-
lore ferrugineo, pluribus
ima parte capillamentis,
odore haud iniucundo.

LOCVS.

Nascitur in India in monti- diosc.
bus, & circa Gangem flu-
uium.

QUALITATES.

Excalfacit ordine primo, & siccatur secundo completo: Adstringit, ex- Gale. 8.
tergit, & aperit. sm.

VIRES.

Pota vrinas elicit, & aluum sistit, cohibet subposita vteri quascunque diosc.
fluxiones. Præstat ad ventriculi erosiones, & flatus. Medetur splene-
ticis, & iocinorosis, atq; etiam ictericos iuuat. Auxiliatur eius deco-
ctum in defessionibus, vteri inflammationibus: præstat & ad gla-
bras oculorum genas, siquidem densiore pilo eas cohonestat. Ad-
ditur in antidotis: & vritur in fictili nouo ad ocularia medicamenta.

CELTICA NARDVS, siue Spica Celtica, Græcis, Νάρδος κελτική.] Italis, *Spica Celtica.*] Germanis, *Celtischer nardus.*] Gallicè, *Nardus Gaulois.*] Boënis, *Celtika Nardus.* Gr. *σπινθή.*

NARDVS CELTICA.

FORMA.

DIOSC. Exigua planta est, foliis
Matt. oblongis, colore flauo,
sed languido, floribus
luteis. [Caule tenui, &
imbecilli, radice squa-
mosa, Spicæ faciem re-
ferente, è qua tenues,
& numerosæ prodeunt
fibræ.

LOCVS.

Matt. Nascitur in Liguriæ mon-
tibus, in Istria; & in
Carinthiæ, & Styriæ al-
pibus.

QUALITATES.

Gal. li. 8. Excalfacit magis quàm In-
simp. me. dica, minus vero sic-
cat.

VIRES.

DIOSC. Eadem omnia præstat quæ
Gal. Indica, & Syriaca: sed vehementius vrinam cit, & stomacho utilior
est, auxiliatur Iocinoris inflammationibus, & felle suffusis. Bibitur
ex absinthij decocto ad ventriculi inflammationes, & ex meraco ad-
uersus lienis, renum, & vesicæ vitia, & venenatos ictus.

CENSURA.

Cæcutiunt, qui Celticam Nardum Saliuncam faciunt.



NARDVS montana, Græcis Νάρδος ὄρεινη.] Italis, Nardo Montano. *Græc. Νάρδος ὄρεινη.*

NARDVS MONTANA.

FORMA.



Folia habet maioris Phu, *Matt.*
sed minora : caulem
spithamę longitudine,
umbellam puniceo co-
lore. Radices duas An-
torę, aut testiculi mo-
do, subnigricantes, ac
fibratas, odore Phu,
aut Asari.

LOCVS.

Nascitur in Dalmatię mō *DIOSC.*
tibus, & Cilicia. *Matt.*

QUALITATES.

Excalfacit, & siccat, sed *Gal. li. 8.*
cæteris longè minus. *simp. me.*

VIRE.

Iisdem cum cæteris viri- *DIOSC.*
bus pollet. ¶ Sed illis *Gal.*
quoq; ad cætera est im-
becillior.

PSEVDONARDVS, seu Nardus Italica.] Italis, *Spigo.*] Gallis, *Aspic.*] Boemis, *Spikanard domaci.* Ger. *Spicanard.*

PSEVDONARDVS SIVE NARDVS
ITALICA.

GENERA.

Matt. Alterum mas, alterum foemina, quę propria Lauędula vocatur.

FORMA.

Matt. Mas folio constat latiore, longiore, robustiore, albidiorę; quā foemina. Tota planta fruticosa est, ac lignosa rosmarini modo, foliis numerosis, longiusculis, cauliculis tenuibus, angulosis, dodrante longioribus, spicatos flores gerentibus, purpureos, & odore fragrantibus, verum adeo acuto, ut nares feriat.

LOCVS.

Matt. Nascitur in collibus, & locis saxosis, à Sole illustratis, & feritur in hortis.

QUALITATES.

Matt. Excalfacit, & siccatur ordine secundo completo : Aperit, attenuat, resoluit, concoquit.

VIRES.

Matt. Confert omnibus frigidis cerebri affectibus, vetriculum roborat, & Iecur ab infarctu liberat. Lienosos iuuat, vterum calefacit, & menses ciet. Flores ex vino decocti, & illiti vrinam pellunt, & flatu dissolunt. Eorundem decoctum ictericis auxiliatur, à iocinoris infarctu affectis, additis Marrubio, & Foeniculi radicibus. Stillatitia florum aqua pota, amissam reddit loquelā : Præstat eadem ad animi deliquia cum pota, tum naribus, & arteriis admota. Oleum quod è floribus distillat, insinitur ubi excalfacere sit opus.

CENSURA.

Qui hanc plantam, aut lauendulam, Cneoron album esse contendunt, omnino hallucinantur,



PSEVDONARDVS Fœmina siue Lauendula.] Italis, *Lauanda*.] Germanis, *Lauendel*.] Gallis, *Lauande*.] Boemis, *Lauendula*.

PSEVDONARDVS FOEMINA SIVE
LAVENDULA.



F O R M A.

Planta est fruticosa, pseudo *Matt.*
nardo similis, sed foliis
angustioribus, breviori-
bus, tenuioribusq; . Flo-
ribus pariter purpureis,
atque spicatis, sed paten-
tioribus, & mitiore satis
odore, ac magis grato.

L O C V S.

Oritur sponte in collibus *Idem*
saxosis, & apricis, sed ple-
rumque in hortis, & viri-
dariis colitur.

Q U A L I T A T E S.

Excalfacit, & extenuat, mi- *Idem*
tius tamen quàm pseu-
donardus.

V I R E S.

Ea omnia potest, quæ mas *Idem*
Pseudonardus. Atqui pe-
culiariter vestibis inter-
posita, eas à tinearum ro-
sione vindicat, & odo-
ratis reddit.

C E N S V R A.

Ridendo tenentur errore, qui Lauendulam Cneoron album esse fa-
tentur.

ASARVM, Græcis, *Asapov*, ac etiam *Napdos Ægyptia*.] Arabibus, *Asaron*.]
 Italis, *Asaro*, & *Baccara*.] Germanis, *Haselnurtz*.] Hispanis, *Asara*
baccara.] Gallis, *Cubaret*.] Bohemis, ac pariter Polonis, *Kopytnik*.]
 Ger. *veinwand Asarum*.

ASARVM.

FORMA.

Matt. Foliis est hederaceis, rotū-
 dioribus tamē, ac mino-
 ribus, prælōgis nitenti-
 bus pediculis, floribus
 purpureis, cytini effigie,
 semine vinaceorum nu-
 cleis similis, cauliculis
 angulosis, radicibus nu-
 merosis, geniculatis, te-
 nuibus, & odoratis.

LOCVS.

Diosc. Prouenit in vmbrosis mon-
Matt. tibus. ¶ In syluis, aliisq;
 opacis locis.

QUALITATES.

Mes. Excalfacit ordine secūdo,
 & ficcat tertio, aperit, at-
 tenuat, resoluit, incidit.
 acris est, subamara, &
 odorata.

VIRES.

Diosc. Vrinam cit, hydropicos, &
Mes. ischiadicos iuuat. ¶ Pota-
 aluū, & vomitiones ciet:
 pituitā, & bilē deiicit. Fa-
 cit quoq; ad iocinoris,
 & lienis infarctus & ad
 scyrrhosos tumores. Cō

fert quoq; diuturnis febribus ab obstructionibus proueniētibus. Radi-
 ces senis drachmis ex mulso potē menses trahunt. Oleū in quo Asarū
 diu fuerit insolatū, vna cū Ladano spinæ dorsi illitū sudores puocat.

CENSURA.

Decipiuntur, qui Asarū, & Baccharē nihil inter se differre contendunt.



PHV, Græcis *φού* aut *Αγρία Νάρδος*.] Mauritanis *Fu*.] Italis, *Valeriana*.]
 Hispanis, *Yerva benedetta*.] Germanis, *Baldrian*.] Boemis, *Košlyk*.]
 Gallis, *Valerienne*.] Polonis, *Košlek*.

P H V.

G E N E R A.

Matt. Genera habentur tria, Ma-
 ius, Minus, Minimum.

F O R M A.

Diosc. Maius folia fert olus atri
Matt. seu Elaphobosci: caulem
 cubitalem, aut procerio-
 rem, leuem, cauum, &
 purpurascensem genicu-
 latumq; , umbellâ ex pur-
 pura albicantem, radicē
 minimi digiti crassitudi-
 ne, adnatis inferiori parte
 fibris, subflauo colore,
 odore graui, simul & iu-
 cūdo, nardū æmulâtib⁹.

L O C V S.

Matt. Nascitur in montibus, ac
 etiâ cāpis, vliginoso solo.

Q U A L I T A T E S.

Gal. lib. Excalfacit excessū primo, &
8. simp. siccāt secundo comple-
med. to. ¶ Aperit, attenuat,
Avicen. cōcoquit, & prouocat.

V I R E S.

Diosc. Phu maioris radix vrinam,
Matt. & menses cit, hausta fla-
 tus pellit, auxiliatur late-
 ris compunctionibus.

¶ Præstat quoq; aduersus stranguriam, veterem tussim, & asthma cū
 dulci radice, vuis passis, & Aniso decocta. Miscetur Antidotis, quòd
 venenatis bestijs, & pesti resistat: oculorum claritatem adiuuat, vbi
 vinum, in quo decocta fuerit, guttatim instilletur. Additur quoque
 in potionibus internorum vulnerum.



PH V minus, Græcè *φοῦ μικρον*.] Italis, *Valeriana minore*.] Germanis, *Ge-
mcin Baldrian*.] Hispanis, *Ycrua benedetta*.] Gallis, *Valerienne des
prez*.] Boemis, *Kopitnik*.

P H V M I N V S .

F O R M A .

Foliis prouenit Fraxino, *Matt.*
aut Sorbo similibus, ni-
gricantibus, humi stra-
tis : caulibus maiori si-
milibus, sed longiori-
bus . Umbella etiam si-
mili, aut paulo minore:
radicibus numerosis al-
bicantibus, odore cum
quadam grauitate iu-
cundo .

L O C V S .

Nascitur humecto solo . *Matt.*

Q U A L I T A T E S .

Excalfacit, & siccat valen- *Idem*
tius, quàm maius :

V I R E S .

Radix viribus omnibus *Idem*
prædita est, quibus &
maior, gustu tamen a-
crior est: quo fit, vt ma-
iori aperiendi, attenuã-

diq̃ue sit facultate. Nam & venenis magis resistit. Peculiariter au-
tem valent eius radices ad testium tumores à frigiditate, aut flatu
genitos : si in vino decoquantur: & vapore fumi suffiantur testes.

PHV minimum, siue Valeriana montana.] Italis, *Valeriana minima.*]
Germanis, Klein Baldrian.

P H V M I N I M V M .

F O R M A .

Matt. Folio est maioris effigie, sed admodū minore, cauliculis angulosis, dodrantalibus, foliis vtrinque per intervalla emergentibus. Umbella in cacumine exigua, colore subpurpureo. Radice tenui, prælonga tamen, & numerosis capillamentis, fibrata, iucundi odoris.

L O C V S .

Idem Nascitur in montibus vliginoso solo.

Q U A L I T A T E S .

Idem Excalfacit, & siccit, sed cæteris minus.

V I R E S .

Idem Vires sunt illi, quæ cæteris eadem, sed longè imbecilliores.



CASSIA solutiua, siue Ægyptia Siliqua.] Officinis, *simpliciter Cassia.*]
 Italis, *Cassia.*] Gallis, *Casse laxative.*] Boemis, *Cassia.* Ger. *Cassia Baum.*

CASSIA SOLVTIVA.



F O R M A .

Arbor qui Cassiam pro- *Matt.*
 fert, procera est, folio si-
 liquæ acutiore, solida,
 accompaeta materie,
 pullo intus colore, cor-
 tice cinericio, radicib⁹
 magnis . Siliquas pro-
 fert, sesquicubitales, te-
 retes , ligneo putami-
 ne, sed tenui, ac fragili ;
 colore in rubrū nigricā-
 te, nigra, pingui, dolci-
 que intus medulla, se-
 mine siliquæ omnino
 simili.

L O C V S .

Prouenit in Ægypto , sed *Matt.*
 primas tenet, quæ cir-
 ca Cayrum habetur .

Q V A L I T A T E S .

Pulpa excalfacit, & hume- *Mes.*
 ctat ordine primo, re-
 soluit, & sedat dolores.

V I R E S .

Sanguinem mundat , bi-
 lisq; feruorē extinguit,
 aluū item commodissi-
 mē citat, vrinæ difficul-

tatibus mirificè auxiliatur. Bilem & pituitā excernit, pectus, & fau-
 ces mulcet. Renes expedit, addita præsertim dulci radice. Frequēter
 deuorata, calculos in renibus renasci prohibet. Auxiliatur biliosa fe-
 bre affectis, fœlicius tamen operatur addito Hieræ puluere . Exte-
 rius illita Erysipelas extinguit, & cæteras, quæ cute tenus habentur
 inflammationes. Sumenda parum ante cibum . Nam si secus suma-
 tur, facilè in nutrimentum transit.

COSTVS vulgaris, Officinis, *Costus*, *sed perperam.*] Italis, *Costo bastardo*, & *Costo di Puglia*. *Ger. Costus officinalis.*

PSEUDOCOSTVS.

F O R M A.

Matt. Foliis exit pastinacæ domesticæ maioribus, densioribusq; crispis, & asperiusculis, humi procubentibus, caule cubitali, rotundo, geniculato, ramosoq;. Umbellas in summitate gerit, floribus melinis. Semine nudo, ac subrotundo. Radice nititur vegeta, cortice crasso, ac carnosio, colore subalbicante, non sine splendore.

L O C V S.

Idem Nascitur in Apulia, monte Gargano.

Q U A L I T A T E S.

Idem Excalfacit, & siccat ordine secundo completo. Aperit, abstergit, incidit, attenuat. Amara est, & acris.

V I R E S.


Idem Præstant (ut referunt, qui ad nos cõportant) Pseudocosti radices ad omnes cerebri, & nervorũ

frigidos affectus, ad pectoris vitia, & ad ventriculi cruciatus, & viscerum omnium obstructions, & ad renum, vesicę, & vteri morbos. Ideoq; auxiliantur diutino capitis dolore affectis, vertiginosis, comitialibus, stupidis, veteriosis, cõnulsis, resolutis, asthmaticis, tussientibus, ictericis, & hydropicis. Eadẽ flatus pellunt, vermes necant, vrinam ducunt, calculos pellunt, menses, & partus cient. Infunduntur earundem decocta, ad coli cruciatus, & coxendicum affectus.



IVNCVS odoratus, Græcis, Σχολvos ἀρωματιστός.] Arabibus, *Adcher.*]
 Italis, *Squinanto.*] Germanis, *Camelisch heuu.*] Hispanis, *Paya de*
mequa.] Gallis, *Squinanthum, & paisture de Camely.*] Boemis, *Siti*
Vuonne.

IVNCVS ODORATVS.



F O R M A .

Folia profert caricis vel zæ ro-
 bustiora, tamen sursum spe-
 ctantia, & sese stipantia. Cul- *Matt.*
 mos edit zæ modo, genicu-
 latus, & flores in summitate
 odoratos. Radicē habet ima
 parte villosam, odoratamq;

L O C Y S .

Nascitur cum in Arabia, & Sty *Theoph.*
 ria, tum in campestribus, &
 pascuis, tum etiam ubi sta-
 gnantes aquæ siccantur.

Q V A L I T A T E S .

Modicè excalfacit, modicèque *Gal. 8.*
 adstringit, nec plane à tenui *simp.*
 tatis natura alienus est. *med.*

¶ Aperit, digerit, pellit, inci *Matt.*
 dit, excoquit, modicè ad-
 stringit.

V I R E S .

Cit vrinam, & menses, flatus re *Diosc.*
 soluit, & venarum spiracula
 laxat. Epoti flores medentur
 cruenta expuentibus, quin
 etiam ventriculi, pulmonis,
 iecinoris, renum, & vteri do-
 loribus. Radix adstringen-
 tior est. Datur eadem vtiliter
 aliquot diebus potanda cum
 pipere, hydropicis, atque cō-
 uulsis. Decoquitur ex gallina *Matt.*
 ceo iure tota planta, sitque
 hinc potus admodum vtilis
 fœminis, quæ vteri doloribus

in puerperijs laborant. Miscetur antidotis.

C E N S V R A .

Manifesto tenentur errore, qui contendunt Schœnianthum, quo utimur, esse suppo-
 sititium.

CALAMVS odoratus; Græcis κάλαμος ἀρωματικός.] Italis, Calamo aromatico. Ger. *indianische Calamus*.

CALAMVS ODORATVS.

F O R M A.

Plin. Non differt forma.
Theoph.

L O C V S.

Theoph. Nascitur in India, quin etiam in Iudæa, trans Libanum montem.
Diosc.

Q U A L I T A T E S.

Gal.lib. Modicè excalfacit, modicèq; adstringit, nec planè à tenuitatis natura alienus est. Aperit, incidit, ac pellit.
8. sm.

V I R E S.

Diosc. Urinam potu ciet, quare decoquitur ad potiones cum apij semine ad hydropes: renum vitia, & urine stillicidium. Menses tum potus: tum in defessionibus additus pellit: suffitur utiliter tussientibus, cum per se, tum cum resina Terbinthina, hausto per arundinem, aut infundibulum fumo. Expetitur ab vnguentarijs ad eorum odora menta, nã & suffitionibus odoratis, & vnguentis adijcitur.



C E N S V R A.

Matt. Acori radices sunt, quæ in Myropolijs calami odorati vicem præstant. Siquidem odoratus calamus: iam diu periit: verum eadem Acori radices rectè admodum eius loco supponi possunt.

MVSCVS, Græcis, Βρύον ἢ ἀπλάχνον.] Aphris, *Axnech*, aut *Usnee*.] Ita-
lis, *Mosco*.] Germanis, *Moëß*.] Boemis, & Polonis, *Mech*.

MVSCVS ARBOREVS.



FORMA.

Capillacea est materia, ex *Matt.*
annosis plerumq; arbo-
ribus dependens colore
subalbicante, ac incano.

LOCVS.

Nascitur in quercubus, po *Matt.*
pulo, cedro, picea, pi-
nu, abiete, larice, & alijs
quandoq; arboribus.

QUALITATES.

Refrigerat, sed parum, & *Gal. 6.*
propinquū est ferè me- *simp. m.*
diis. Adstringit, dige-
ritque.

VIRE S.

Huius dilutum ex vino *Gal.*
pluribus diebus paratū, *Serap.*
& haustum somnum in *Matt.*
ducit, ventriculum rō-
borat, vomitiones, & al-
uum cohibet. Recens
decerptus, & oleo rosa
ceo imbutus capitis do-
lores à calore exortos
mirificè mulcet. Sanguini *pullat. ex. Diet.*
nem è vulneribus ma-
nantem compescit im-
positus arcteq; adalliga-

tus. Expetitur quernus, lariceus, ac etiam abiegnus vnguentarijs ad-
pulvres odoratos parandos, quos Cyprios vocant.

MVSCVS terrestris.] Italis, *Mosco terrestre*.] Germanis, *Beher Lab.*
waldmoss

MVSCVS TERRESTRIS.

F O R M A .

Matt. Longas viticulas, funiculi instar gignit, oblongis numerosissimisq; foliolis vndiq; stipatas, quę sæpe ad septē, octoq; vlnarum longitudinē protenduntur, compluribus vtrinq; adnatis ramulis. Serpit humi, nititurq; radicibus capillaribus plurimis, ex ipsis viticulis prodeuntibus, hederæ modo. Gignit quoque Iunio mense in ramusculorū cacumine Inulos, Corylaceis ferè similes, subflavo colore.

L O C V S .

Idem Nascitur in sylvis, sabulosis, & inuijs locis, inter saxa.

F A C U L T A T E S ,

E T V I R E S .

Matt. Præstat eius decoctum ex albo meraco paratū, ad frangendos, educendosq; renū calculos. Decoctus in aqua, & deinde cōtus, mulcet admotus, & inflammationes, & earum dolores: proinde non desunt qui hoc auxilium vsurpent ad calidam podagram. Superioris ætatis Pharmacopœi diu hac planta vti sunt, manifesto errore Celtica Nardi vice.



CROCVM, siue Crocus, Græcis, Κροκός.] Arabis, Zahafaran, siue Zaffran.] Italis, Zaffarano.] Germanis, Saffran.] Hispanis, Azaffran.] Gallis, Zaffran.] Boemis, Sfran.] Polonis, Szafran.

CROCVM.



FORMA.

Comosis prouenit foliis, *Matt.*
longis, angustis, capil-
laceis, planis, non ro-
tundis, Tragopogoni
modo: Floribus purpu-
reis, colchico simili-
bus, rubentibus intus
staminibus, inter au-
reas quasdam ligulas
exortis: Radice nititur
bulbosa.

LOCVS.

Seritur in campis, & hor- *Idem*
tis, bulbis tantum trans-
positis.

QUALITATES.

Excalfacit excessu secun- *Gal. 7.*
do, & exiccat primo, *simp. me.*
quin etiam frigidi, ter- *Diosc.*
reiq; nonnihil obtinet.
¶ Aperit, pellit, digerit,
roborat, & emollit.

VIRES.

Elegantem colorem præ- *Diosc.*
stat: ex passo potum
crapulam arcet. Ex hu-
mano lacte illitum ocu-
lorum fluxiones cohi-

bet. Additur in potionibus, quæ interaneorum causa temperantur.
ad vuluæ etiam, sedisq; cataplasmata vtiliter inditur. Venerem Sti-
mular, vtile & auriû collectionibus. ¶ Lætitiâ affert, ob id additur vti *Matt.*
liter medicamētis ad cor facientibus. Sunt qui scribant exitiosum esse
crocū tribus drachmis in aqua potū. Vrinā mouet radix ex passo pota.

HELENIVM, Græcis, ἑλένιον.] Arabibus, *fasm*, siue *Rasen*.] Vulgò of-
ficinis, *Enula campana*.] Italis, *Iella Enoa*, siue *Enola*.] Germanis,
Alant.] Hispanis, *Raiz de Alla*.] Gallis, *Aulned*.] Boemis, *Vuoman*.]
Polonis, *Oman*.

HELENIVM.

FORMA.

Matt. Folia habet Verbasco ma-
iora, latiora, longioraq;,
hirsuta, & in acutū desi-
nencia: caulem profert
magnum, hirsutum: flores
aureos Chrysanthemi-
mō, sed maiores: semen
verbasci simile, tactu
pruritus faciens. Radi-
ce nititur magna, vege-
ta, crassaq; intus albā,
& exterius nigricante,
subacri, & amaro sa-
pore.

LOCVS.

Idem. Loca amat Vliginosa.

QUALITATES.

Gal. li. 6 Excalfacit, non tamen pri-
simp. me. mo gustatu: verum ca-
Matt. lida, & sicca est, cum re-
crementitia humidita-
te. ¶ Aperit, prouocat,
concoquit, incidit.

VIREs.

Diosc. Potum radice decoctum
menses, & vrinas ciet.

Auxiliatur omnibus pe-
ctoris affectib⁹ in ecleg-
mate sumpta, ob idq; datur asthmaticis, & suspiriosis: Eadem fla-
tus pellit, & demorsos à serpente iuuat. Stomacho quoq; utilis est
Matt. in passo condita. ¶ Precordiis medetur, & ventris tineas necat, illi-
nunt tum radix, tum folia, ad coxēdicos affectus. Aqua à radicibus
destillata, maculas in facie delet, & cutis nitorem conciliat.



GELSIMINUM, Arabibus, Zambach, siue Sambach aut Iesemin.] Italis,
Gelsimino. *Cor. vult. 3. gel. gurtum. vult.*

GELSIMINUM.



FORMA.

Viticulosa, sarmentosaque *Matt.*
est planta, & topiario
operi, umbraculisque
contexendis peridonea.
A radice viticulæ oriun-
tur longæ, flexiles, len-
tæ, viridesque, è quibus
oblonga prodeunt fo-
lia, septena ex vno pedi-
culo, mollia, & in acu-
tum desinentia, flores
mittit modo candidos,
modo cæruleos, modo
flavos, lilij parui effi-
gie, odoris perquam iu-
cundi acuti que.

LOCVS.

Amat amenos, & calidos *Idem*
tractus, habeturque in
viridariis, & hortis.

QUALITATES.

Flores excalfaciunt, & sic- *Idem*
cant ordine secundo.

VIRES.

Præstat oleum, quod in- *Serap.*
solatis in eo floribus pa- *Mes.*
rat, ad omnes frigidos *Matt.*

dolores, excalfacit. n. & laxat. Illinitur quoque vtiliter mulieribus, ad
frigidos vteri cruciatus, frigidosque quoscunque neruorum, & articu-
lorum affectus.

CENSURA.

Aberrant, qui putant Iasminum vnguentum antiquis parari solitum,
ex nostrate Gelsimino.

STYRAX, Græcis, Στύραξ.] Arabibus, *Mehn* siue *Astarach*.] Officinis,
Storax calamita.] Italis, *Storace*.] Hispanis, *Estoraque*. *Styr. calamita*

STYRAX.

FORMA.

Matt. Styracis planta cotoneæ
 malo similis est, foliis
 tamen minoribus soli-
 dis, robustis, subrotun-
 dis, lentis ramorû fur-
 culis. Flores habet albi-
 cantes, Aurantiæ mali,
 haud longè dissimiles.
 Baccas longis pediculis
 nitentes, albicante la-
 nugine obductas, pro-
 minente anteriore par-
 te cacumine.

LOCVS.

Diosc. Nascit̃ in Syria, Iudeaq̃;
Matt. circa Gabala, & Mara-
 thunta, quin etiam Pi-
 sidiã, Ciliciã, & Cassiũ
 Seleucię montē. ¶ Na-
 scitur quoq; in Roma-
 no agro circa Tybur.

QUALITATES.

Gal. 8. Excalfacit Styracis lachry-
simp. me. ma ordine secundo, &
Diosc. desiccat primo. Emol-
 lit, concoquit, resoluit.

VIRES.

Diosc. Styracis lachryma mede-
 tur tussi, destillationibus, raucedini, grauedini, & vteri præclusioni-
 bus, duritiebusq̃;. Menses cit, cùm illita, tum pota, aluum quoque
Matt. emollit, si exiguum cum Resina, Terebinthina, catapotij modo de-
 uoretur. ¶ Cum autem sit odorata, suffitur odoris gratia, & vn-
 guentariis expetitur ad odora menta. Oleum ex ea paratum, hæc om-
 nia valentius præstat.



PINVS, Græcè Πίτυς.] Arabicè, Sonabar.] Italicè, Pino.] Germanicè, Hartzbaum, & Kinholtz.] Hispanicè, Pino.] Gallis, Pin.] Boemis, Barounee.] Polonis, Soszna. *Sinn, Paim.*

P I N V S .



dis dolorem sedant. Nuclei boni, crassiq; succi sunt, & multum nutriunt, sed non facile concoquantur. Impinguant, Venerem sollicitant, tabidos, resolutos, & stupidos iuuant, & renum, & vesicæ ulcera sanant.

G E N E R A .

Domesticum, Montanum, Maritimum. *Matt.*

F O R M A .

Domestica pinus, numerosos fundit ramos, superiori caudicis parte, circumuagantes, comosis, ac robustis foliis, longis, angustis, numerosis, & in tacumine aculeatis. Nuces edit magnas, ponderosas, compactas, solidasq; oblongis intus nucleis, duro crassoq; putamine obductis, gustu dulci, ac iucundo. *Idem.*

L O C V S .

Copiosa habetur, in agro Rauennate, non longè ab Hadriatici maris litore. Habetur etiam & in aliis Italiae locis, & præsertim in Cœnobiorum hortis, & viridariis. *Idem.*

Q U A L I T A T E S .

Cortex exiccat: folia refrigerant, resina autem excalfacit, discutit, & purgat. emollit. *Diosc.*

V I R E S .

Tusa, & illita folia inflammationes prohibent. Suffitus cortex partus, & secundas eiicit, potus verò aluum sistit, & vrinam ciet: Foliorum ex aceto decoctum, vtiliter colluitur in dentium dolore; præstat idem, & nucis cortex, quin etiam ligni ipsius tade. Virides aciculæ contritæ, & ex meraco potæ, cordis dolorem sedant. *Diosc.*

*Gal. 2.
de facul.
aliment.*

PINVS sylvestris, Græcè, *πίτυς ἄγρια*.] Italicè, *Pino saluatico*.] Germanis, *Vuildfichtenbaum*.] Gallicè, *Pin sauvage*.

PINVS SYLVESTRIS MONTANA.

GENERA.

Matt. Alterum montanum, alterum maritimū: Huius duę habentur species: illius autem tres.

FORMA PRIMAE.

Idem— Primę in montano genere eadē ferè, quę domesticę facies est, coma tñ breuiori, foliis rudioribus, & acutioribus. Nuces edit Cupressinis paulò crassiores, longiores, & in acutum desinentes, resinosas, autumno dehiscentes.

LOCVS.

Idem— Nascitur in montibus, & cliuosis locis.

QUALITATES.

Idem— Cortex, sicciore præstat facultate, vt resina, calidiore quā domesticæ.

VIRE.

Idem— Folia, cortex, resina, nuces eadem præstare possunt, quę in domestica diximus, ac etiam valētius. Nucum recentium

succus, vuluam angustiores reddit infusus, & mammas, nimis in virginibus extuberantes, cohibet. Idem præstat stillatitia earum aqua, sed non adeò valenter.

CENSURA.

Non desunt qui pinum montanum hanc, Dioscoridis piceam esse contendunt, sed proculdubio hallucinantur.



Hanc Ananienses in Tridentino agro appellant mugo. Latinis, Pinus Sylvestris repens dicitur. at Græcis, quod stipite careat, rectè πίτυς ἀστέλεχος vocari poterit. Græc. τὴν αὐτὴν οὐκ ἐστὶν ἡ δὲ φύσις αὐτῆς.

PINVS SILVESTRIS ALTERA,
MUGO DICTA.



FORMA.

Caudicem nullum edit, *Matt.* sed humo tenus ramos a radice fundit, qui longo tractu repunt. Fructum profert prædictæ similem, vegetiorem tamen paulò, resinofum, nec inodorum, nullo intus nucleo, qui mandari possit.

LOCVS.

Nascitur plurimū in sum *Idem* mis montium cacumini bus. nos eam primū vidimus in Rauena, Ananiensium monte.

QUALITATES.

Huic eadem sunt qualita *Idem* tes, quæ cæteris pini generibus.

VIRES.

Iisdem quoq; viribus pol *Idem* let, quibus & cætera

pinorum genera. Incolæ ramis vtuntur ad vasa vinaria cingenda, circulis inde paratis.

PLINIVS PINVM Tarentinam appellat, Ananienſium & Rhetico-
rum ſyluani homines Cembro, & Cermolo.

Germ. Driandlſper od Tyrolenſch Nidſumbarnd.

P I N V S S Y L V E S T R I S
C E M B R O .

F O R M A .


Matt. Specioſa adoleſcit proce-
ritate, facie alijs haud
abſimili, ſpiſſiori ta-
men, ac tenuiori co-
ma: Strobilis piceis
crasſitudine ſimilib⁹,
breuioribus tamen:
ſubpurpuraſcētibus,
fragilibuſq;: Nuceſ
concludit triquetras,
domesticis longè mi-
nores, fractu faciles,
vt potè quæ dentibus
facilè rûpuntur. Ineſt
hiſ nucleus puſillus,
dulcis, albicans, ſub-
ruſa cōtectus mēbra-
na, nō ingratus eſui.
Reſinam caudex fun-
dit albā, & odoratam.

L O C V S .

Idem Nascitur copioſa in Ty-
rolenſi Comitatu, ac
aliis circumſtantibus
montibus in Vultu-
renæ alpibus.

Q V A L I T A T E S .

Idem Qualitate à cæteris Pini
generibus non variat.




V I R E S .

Idem Eedem proſecto quæ cæteris: Tabulis ex ea paratis ad hypocauſta ex-
truenda maximè vtuntur Germani, odoris gratia: ac etiam ad alia
ædium ornamenta.

PINVS Maritima, Græcis θάλασσις πίτυς.] Italis, *Pino marino*.
 Germ. *Wälderndyke Firsbaum*.

PINVS MARITIMAE
 PRIMVM GENVS.

FORMA.



Folia habet angusta, præ- *Matt.*
 longa, raraq; in capilla-
 menti modum proten-
 sa, squamosis ubique ra-
 mis, Iulis sursum spe-
 ctantibus. Conos edit
 cæteris sylvestribus lō-
 giores, crassioresque,
 præduros, nucamentis
 in acutum extuberanti-
 bus, in quibus inanes
 concluduntur nuces.

LOCVS.

Prouenit in Maritimis Ita *Matt.*
 liæ, Agro cūm Pisano,
 tūm Senensi, & (vt au-
 dio) apud Calabros.

QUALITATES.

Cortex eius mitius exiccat *Idem*
 minusq; resina exalfa-
 cit quàm cæterorum syl-
 uestrium.

VIRES.

Eædem quæ cæteris illi sunt facultates. Utuntur incolæ pinguissima *Idem*
 eius materie ad nocturnas faces.

Eadem quæ alteri.

Pinus austriaca gosselii & Pinus austriaca gosselii

PINVS MARITIMAE
SECUNDVM GENVS.

FORMA.

Matt. Comosior huic opacior
quæ quàm alterius, sed
breuioribus capillamē
tis. Strobilos profert
maiores, longiores, du
riores, ac pulchriores,
prominentibus vndi
quaque nucamentis,
vacuis intus nucibus,
ac superuacuis.

LOCVS.

Idem Nascitur haud longè à
mari, iisdem ferè vt al
tera locis.

FACULTATES.

Idem A cæteris qualitate haud
differre videtur.

VIRES.

Idem Viribus ab aliis minime
discrepat.



LARIX, Græcis Λάριξ.] Italis, Larice.] Germanis, *Larchenbaum*.]
Gallis, *Melze*, sine *Meleze*.

L A R I X .



F O R M A .

Arbor est eximiae proceritatis. materie æterna, cortice perquam crasso, in rimas dehiscente, & intus rubente: Ramos emittit circa caudicem ferè totam: extremitatibus salicis modo lentis, subluteo colore: odore nõ iniucundo: foliis gregatim circum ramulos prodeuntibus, densis, oblongis, mollibus, comosis: Conos edit Cupressinis æmulos, molliores tamen, flores purpureos, & odoratos. Resinam fundit liquidam, ac copiosam, quin etiã Agaricũ gignit. *Matt.*

L O C V S .

Prouenit in montibus, & cliuosis locis. Larice abundant Tridentinae alpes: & circumstantia loca. *Idem*

Q U A L I T A T E S .

Cortex siccatur pini modo: Resina excoctat, atque minus quam pinea, & Abiegna. *Matt.*

V I R E S .

Resina aluum ducit, abstergit, prouocat, aperit, glutinat, attrahit, Suppuratos, & tabidos iuuat; delineta purulenta extrahit. Renes, & vesicam expurgat; calculos expellit: deuorata articulorum dolores lenit. Gonorrhæam sistit addito succino, & corallio, aut caphuræ momento, oleum ex ea distillatum cum ad plura utile, tum *Idem*

maxime vulneribus glutinandis, & neruorum affectibus.

C E N S V R A .

Qui Laricem nostratem non esse legitimam dicunt hallucinantur: & qui Vitruuius, & Cæsaris commentarijs addicti, Laricem igne haud quaque comburi posse negant. cum tamen eius materies resinosis cæteris resiniferis plantis habeatur. antiquorum omnium testimonio qui de ea scripserunt, *Matt.*

PICEA, Græcis πεύκη.] Italis, *Pezzo*.] Germanis, *Rot tannenbaum*.] Hispanis, *pino negro*.] Gallis, *Pesse, Pignet, siue Garipoolt*.

PICEA.

FORMA.

Matt. Facie est Abieti adeo æmula, vt Syluanos quãdoq; fallat. Est tamen nigrioribus folijs, latioribus, læuioribus, mollioribusq; ac minus aculeatis. Hæc ramos circumquaq; vestit atque operit. Conos edit Spithamę longitudine: fragili nucamétorum congerie, in quibus semen concluditur. omnino inutile.

LOCVS.

Idem Nascitur in montibus, & syluis.

QUALITATES.

Diosc. Siccat cortex, adstringit, Pini modo, ita resina pari facultate exalfacit.

VIRES.

Diosc. Ea omnia præstat, quæ pi-

Matt. nus, & si Resina ignobilior est, & minus efficax. Materies cum ad ædium, nauiumque fabricas, tum ad vasa vinaria, & alia domestica utensilia aptissima habetur. Cortex coriariis expetitur ad densanda coria.



ABIES Græcis, ἐλάτη.] Italis, *Abete*, & *Abeto*.] Germanis, *Dannen-*
baum.] Gallis, *Sapin*.

ABIES.



FORMA.

Piceam tota facie æmula- *Matt.*
tur, angustioribus tamē
folijs, & aduersa parte
candicantibus. Resinam
fundit liquidam, larignę
similem, quam, lachry-
mam abiegnam vocant:
splendidiorē tamen,
& gustatu amariorem,
ac odoratiorem multò.
Gignitur lachryma intra
corticem excitato tumo-
re, quo resecto, collachry-
mat. Annosę arbores in-
canę spectantur, ob de-
pendentes vndique mu-
sci comas.

LOCVS.

Nascitur in altis mōtibus, *Matt.*
inter larices, & Piceas.

QUALITATES.

Cortex exiccat Piceę, & Pi- *Matt.*
nus modo. Lachryma ve-
rò magis quàm Larigna

excalfacit, & eadem præstat valentius. glutinat mirificè recentia
vulnera, & præsertim caluarię, vbi tñ cerebri mēbrana haud detecta
appareat. Iuuat sumpta semuncię pondere Ischiadicos, podagricos,
ac calculosos: quin & Asthmaticos, suspiriosos, ac purulentos.

LENTISCVS, Græcis Σκῖνος.] Mauritanis, *Daru.*] Italis, *Lentisco.*] Hispanis, *Mata*, aut *Arueira*. Gallis, *Lentisq.*.] Germanis, *Mastixbaum*.

LENTISCVS.

F O R M A .

Matt. Foliis est Myrto proximis, octonis ex vno processu prodeuntibus, saturatè virentibus, ac perpetuis. cortice subrufo. Fructum profert racemosum, rubentemq; in vix modum, è quo oleum elicatur. corniculos quoque gignit, in quibus liquor est limpidus, pusillis refertus culicibus. Resinam quoq; fundit, quam Mastichen vocant, grumofam, duramq;e, sed omnium præstantissimam.

L O C V S .

Idem Nascitur plurima in Chio, Creta, Cypri, & aliis Ægei maris insulis. quin etiam in Italia, & præsertim in Hetruria, & Campania.

Q U A L I T A T E S .

Gal. li. 7 *simp. m.* *Diosc.* Planta exiccat secundo ordine completo, aut tertio incipiente: in caliditatis autem, & frigiditatis differentia, mediū tenet, adstringit, roborat, resoluit. Resina hæc omnia potest, at præter hæc emollit, & excalfacit.

V I R E S .

Diosc. Lentiscus auxiliatur sanguinè reiicientibus, dysentericis, mensium profluuiis sedisq; & vteri procidentis. Idem caua vlcera explet, ossa ferruminat, vrinam pellit, dentes commotos firmat. Oleum è baccis pressum adstringit, & præscripta omnia potest. Resina autem præter hæc peculiariter tussis veteri medetur, stomachichos iuuat, & durities emollit. Eadem commansa pituitam elicit, & halitum commendat. Articulorum frigidos dolores tollit atque mulcet, si cum cumino, salvia, & Lauri baccis illinatur.

Matt.



TEREBINTVS, Græcis τέρρινθος.] Arabibus, *Baton, Botin, aut Albo-*
tin.] Italis, *Terebinto.*] Gallis, *Terbentin.* Germ. *Cypripfer Terpeninbaum.*

T E R E B I N T H V S.



F O R M A.

Foliis est Fraxini, crassioribus, *Matt.*
 pinguioribus, & rotundiori-
 bus, Cotino proximis: mate-
 rie Lentisco haud absimili,
 perinde ac cortice. Floret oleæ
 modo, & fructus rubentes, ra-
 cemososque gerit: cornicula
 quoque edit rubentia, capri-
 uis haud minora, liquore quo-
 dam, & culicibus referto: vt in
 Lentisco. Resinam fundit li-
 quidam, & odoratam, Lari-
 gnæ, aut Abiegnæ similem,
 cæterisq; præstantiorem, Len-
 tiscina excepta.

L O C V S.

Prouenit in Syria, Cypro, Iapi- *Diosc.*
 dia, & multis Italiæ locis. ha- *Matt.*
 betur & Romæ, in antiquo-
 rum domorum ruinis. Nasci-
 tur, & in Tridentinis monti-
 bus: saxosa enim & calida a-
 mat loca.

Q U A L I T A T E S.

Folia, cortex, & fructus excalsa *Gal. 8.*
 ciunt, & siccant ordine secun- *simp.*
 do, adstringunt, roborant, re- *med.*
 pellunt, contrahunt. Resina *Matt.*
 verò excalfacit, extrahit, emol-
 lit, abstergit, deijcit.

V I R E S.

Aridæ baccæ potè vrinam cient, *Gal.*
 & lienosos iuuant. Resina hausta vnciæ pondere renes expedit, & vesicam, & arti *Diosc.*
 culorum morbis auxiliatur. Medetur eadem delincta tussientibus, tabidis, suppu-
 ratisque, crassa, purulentaq; expectorat: scabiem, & lepram sanat. aluum emol-
 lit, vrinam cit, vulnera, & vlcera purgat, & carne replet. Additur in antidotis.

CYPRESSVS, Græcis κυπάρισσος.] Arabibus, *Saro*, *sive Sero*.] Italis, *Cipresso*.] Gallis, *Cypres*.] Germanis, *Cipressen*.] Hispanis, *Cipres*.] Boemis, *Cypriis*.

G E N E R A .

Duum est generum. Mas alterum, alterum Fœmina. Hæc fastigiato est culmine. Illa ramos in latum spargit.

F O R M A .

Matt. Vtraq; procera rectaq; , caudice glabro, & ramos in summitate tantum habens. Foliis viret perpetuis, Sabinæ bacciferæ proximis. Conos gerit Lariceis æmulos, solidiores tamen compactioresque, in quibus minutum concluditur semen. Resinam fundit liquidam sed modicam, odore hand ingrato. Ligni materies solida, spectabilis, & suauiter odorata.

L O C V S .

Idem Plurima in Creta sponte nascitur, aquosos odit tractus, & colles, & montes amat.

Q U A L I T A T E S .

Gal. 7. Coni folia, & germina exiccant, absque insigni acrimonia, & per quâ moderate exalfaciunt. Adstringit Cupressus omnibus suis partibus, roborat, glutinat, & resoluit.

V I R E S .

Diosc. Folia ex passo, & mirrhæ exiguo posita, vesicæ rheumatismis, & urinae difficultati auxiliantur: pilulae autem ex vino tusa dantur commodissime potandæ disentericis, tussientibus & orthopnea affectis, sanguinemque reiicientibus. Enterocellas tam potu, quam illitu reprimunt. Pilulae, cum arboris coma suffita, culices abigunt: folia trita & imposita vulnera conglutinant. Sanguinem supprimunt: trita ex aceto capillum tingunt. Illinuntur per se, aut cum hordeacea farina ignibus sacris, vlceribus, quæ serpunt, carbunculis, & oculorum inflammationibus. admota cum cerato stomachum corroborant.

Matt.

¶ Pilularum decoctum ex aceto paratum dentium rheumatismos cohibent. Eorundem & mulorum vnguium cinis oleo myrtino exceptus opitulatur illitus capillorum defluuiis.

C Y P R E S S V S .



IVNIPERIS, Græcis, ἀρνειδῖς.] Arabibus, *Arconas*, *sive Archenchas*.] Italis, *Ginepro*.] Germanis, *Vueckholz*, *sive Krometbaum*.] Hispanis, *Enebro*.] Gallis, *Geneure*.] Boemis, *folanuec*.] Polonis, *Zolanuec*.
Mr. Gordon ad hunc Arconas sive Archenchas

IVNIPERVS.

G E N E R A .

Duo eius genera: Alterum maius: alterum minus.

F O R M A .

Folio utraque est aculeato, longiusculo, & angusto. ligni materies dura, compacta; ac odorata: Baccas edit caeruleas, copiosas, erui magnitudine, odore haud ingrato: Resinam quoque fundit mastiche haud ab similem, quam Arabes Sandaracem vocant.

Matt.

L O C V S .

Nascitur in collibus, ac etiam montibus, arido præsertim tractu.

Plin. lib.
16. cap.
18.

Q U A L I T A T E S .

Excalfacit, & siccat ordine tertio: Baccæ tamen siccant ordine tantum primo. Attenuat, aperit, digerit, resoluit, adstringit, roborat.


Gal. 6.
simp. me.
Matt.

V I R E S .

Bibuntur folia, aut eorum succus vtiliter contra Viperarum morsus. Earundem decoctum menses elicit, & vrinas: Baccæ stomacho vtilis: Præstât eadem contra pectoris vitia,

Matt.
Vetterp. 3.

tussim, inflationesq;. Resina suffita, aut aspersa destillationes sistit: hausta verò mensium abundantiam cohibet. tinea ventris necat, resolutis nervis medetur. & sanguinis excreationes supprimit, quin et fluentes hæmorrhoidas; In solutionibus dentium addita dolorē mulcet, quæ & baccarum decoctum ex vino efficit. Carbones è Iuniperi ligno paratos, & suo ipsius cinere sepultos, integro anno igne fouere Chymistæ promittunt.



SABINA, Græcis, *Βράβυς*.] Arabibus, *Abel Abehel*, *sive Alhorar*.] Italis, *Sabina*, & *Sauina*.] Germanis, *Sebenbaum*.] Hispanis, *Sabina*.] Gallis, *Sauinier*.] Boemis, *Klaßterka chuuogka*.] Polonis, *Szauuina*.

S A B I N A

G E N E R A.

Diosc. Genera duo : Alterū frugi-
Matt. ferum, alterum Sterile :

F O R M A.

Diosc. Fructifera foliis exit Myri-
Matt. cæ crassioribus, minimè
aculeatis. Differentia in
baccis. In altera. n. cæru-
leæ, in altera rubentes
spectantur.

L O C V S.

Matt. Seritur in apricis, & colli-
bus, in hortis, & virida-
riis, ac etiam sponte per
se prouenit.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 6. Tenuum maximè est par-
simp. me. tium : Excalfacit, & sic-
Matt. cat ordine tertio : gustu
acri, & amaro, & adstrin-
gente. ¶ Digerit, resol-
uit, aperit, prouocat, ab-
stergit, penetrat, sitim ac-
cendit.


V I R E S.

Diosc. Vrinā sanguinolentā ducit:
Gal. ibid. Menses elicit: fœtū inter-
Matt. ficit, ac ēr expellit, cū po-
ta, tū suffita. Vtriusq; fo-

lia nomas cohibent, vlcera in capitibus puerorum manātia sanāt, fo-
liorū puluere, & butyro bubulo illito: Suffita gallinarum pituitā, &
grauedinē excutit. Ex butyro, & melle delincta asthmaticis medet.
Nigra, & sordida vlcera cū melle purgat: Additur quoq; multis in
antidotis.

C E N S V R A.

Qui Sabinam bacciferam non concedunt, aperte delirant.



SABINA Sterilis, Græcis, Βράβυς σερπτικὸς.] Italis, *Sauina Sterile*. Germ. *Weglin Dornbaum*

SABINA STERILIS.

FORMA.


Vulgaris est notitiæ, foliis *Matt.*
cupressi ferè similibus,
sed acuto pungentiq;
cacumine, grauitè olē-
tibus, amariusculis, fer-
uentibusque.

LOCVS.

Nascitur in apricis. & feri *Idem*
tur quoq; in hortis &
viridariis.

QUALITATES,
ET VIRE.

Non adeò multum differt *Matt.*
à baccifera, verùm tum
acrior est, tum quoque
grauelentior: Excalfa-
cit, & siccat tamen va-
lentius. Digerit, resol-
uit, aperit, abstergit,
prouocat, & parumper
adstringit.



CEDRVS Græcis, Κέδρος.] Arabibus, Serbin.] Italis, Cedro.] Resina autem eius Latinis, Cedria, Græcis, Κεδρία.] Arabibus, Kitran, Sut, Alkitran.] Italis, Cedria. Germ. Cedrenbaum.

G E N E R A .

C E D R V S .

Matt. Duum generum est: Maius videlicet, & Minus: Maioris genera duo: quemadmodum & minoris.

F O R M A .

Idem Procera arbor est, Abieti perquam similis. Quæ in maioris genere floret, fructum non fert. Altera vero contra, nunquam floret, sed conos tamen profert cupressi longè maiores. Resinam fundit laudatissimam. Ligni mareries æterna.

L O C V S .

Matt. Maior in Syria, Iudæaque provenit, & præsertim in Libano monte.

Q U A L I T A T E S .

Gal. 7. simp. me. Vtraque est calidæ, siccæque temperaturæ, tertio quodammodo ordine secundum utranque: At Cedria quartum ferè gradum attingere videtur, abundè calida simul, & tenuium partium. *Matt.* Eadem attenuat, digerit, resoluit, expellit, putrefacit.



V I R E S .


DIOSC. Cedria infusa defuncta corpora conseruat, & viua putrefacit: additur ocularibus medicamentis, magno iuuamento. Vermes aurium necat: cauis dentium indita eos frangit, & dolores leuat. Conceptum impedit inuncto ex ea genitali ante coitum: pediculos illitu enecat: pulmonum vlcera purgat, & obesos extenuat.

CEDRVS PHOENICIA, Græcis, ὀξυέδρος.] Italis, Cedro minore.

Germ. in andor ysslof 3 Cedronbaum.

CEDRVS PHOENICIA.

FORMA.



Arbor est Iunipero per *Gal. lib.*
omnia similis. § Sed 7. *f. m.*
maioribus foliis acu-
leatisque: baccis qua-
druplo maioribus, co-
lore aureo rufescente,
sapore dulci, esui
hand ingrato.

LOCVS.

Nascitur in Iapidię mon- *Matt.*
tibus non longè à Pe-
fino oppido.

QUALITATES.

Excalfacit, & siccat or- *Gal. l. 7.*
dine ferè tertio. § Ape- *simp. m.*
rit, prouocat, resoluit,
digerit.

VIRES.

Baccę Stomacho aduer- *Diosc.*
santur: auxiliantur ta-
men tussientibus: cõ-
uulsis, & vrinæ stillici-
dio laborantibus. Eæ-
dem cum pipere potæ

menes ducunt. Sumuntur quoque contra leporem marinum, ex vi-
no. Inunctæ toti corpori ex ceruina medulla, aut adipe: à serpētibz *Morret des Affamgen.*
hominem tutum reddunt. Ideoque bellè adduntur in Antidota.

LYCIA Cedrus, Græcis, Κέδρος λύκια.] Italis, Cedro Lycio.

Ἰνδῶν: ἐν γούβῳ δὲ Κεδρενβαῖνῳ.

L I C Y A C E D R U S.

F O R M A.

Matt. Foliis constat Phœniciaë longè minoribus, frequentioribusque longè minus aculeatis, ita ut Juniperum parvā quandantenus referat. Eadem, si digitis atterantur non insuavē spirāt odorem. talis enim habetur, qualis ferè in pineorum strobilis percipitur. Cortice caudex obducitur subrufo. ramos emittit lentos, vitilium instar: baccas gerit alterius. minores, rubentesque amaro sapore: odore non ingrato.

L O C U S.

Idem Nascitur in quibusdam Moravię montibus.

Q U A L I T A T E S.

Idem Excalfacit, & siccat: minus tamen, quā Oxycedrus.

V I R E S.

Idem Eadem ferè omnia præstat quę oxycedrus, sed non adeo valenter.



LAVRVS, Græcis, Δάφνη.] Arabibus, *Gaur*, *sive Gar.*] Italis, *Lauro.*] Germanis, *Lorberbaum.*] Hispanis, *Lauret*, *sive Laurerio.*] Gallis, *Laurier.*] Boemis, *Bobek.*

LAVRVS.



G E N E R A.

Laurus quædam tenui folio con DIOSC.
stat, altera latiore.

F O R M A.

Vtraque folia habet oblonga, *Matt.*
lata, in acutum desinentia, so-
lida, & odorata: flores vtrique
tenuis, muscosi; Baccas, oli-
vis haud dissimiles: è quibus
Laurinum fit oleum.

L O C V S.

Nascitur in apricis non longè
a mari, & circa amænos la- *Matt.*
cus, quòd frigoris & aloris
sit impatiens. In Italia copio-
sa in hortis, viridariis, & col-
libus feritur. ac etiam per se
nascitur.

Q U A L I T A T E S.

Folia, & baccæ excalfaciunt, & *Gal. l. 6.*
siccant vehementer, atque hæ *simp. m.*
quoque magis quam illa. Ra-
dicis autem cortex nonnihil
adstringit, & minus acris est,
& minus calida. ¶ *Laurus* atte- *Matt.*
nuat, aperit, puocat, incidit,
emollit, digerit, flatus pellit.

V I R E S.

Opitulantur fotu omnes lauri DIOSC.
partes vuluæ, & vesicæ vitiis.
Baccæ tritæ, & melle, aut pas-
so exceptæ, delinctæq; auxi-
liantur omnibus thoracis rheu-
matismis. Dantur cōtra Scor-
pionum ictus: Illitæ vitiligi-
nes emaculant. Earūdem suc-

cus vtilissimè aurium dolori, & grauitati instillatur, cum vino vetere, & rosaceo.
Radice cortex pota, calculos rumpit, & partus necat. ¶ Septem lauri baccæ à præ-
gnantibus propediem parituris, cum se dormitum recipiunt deuoratæ, facilem, fœ- *Matt.*
licemque partum præstant.

Das gluckliche, und heilsame gebäude.

PLATANVS, Græcis, πλατανός.] Arabibus, *Dulb.*] Italis, *Platano.*] Gallis, *Plan, siue Plane.*

F O R M A .

Matt. Procera, ramosaꝫ; arbor Platanus est, folio viti gineo, crassiore, inferna parte albicâte: Cor tice vestit crasso, subcâ dicâte. Flosculos edit tenues, pallidosꝫ; bac cis rotûdis, scabris: lô go à pediculo dependen tibus.

L O C V S .

Plin. Amat flumina & fontes, etsi vini irrigatione plurimum gaudeat.

Q V A L I T A T E S ,

Gal. li. 8 simp. me. Platanus humidioris, fri gidiorisꝫ; essentia est, non ita multò quam symmetra: Atqui cor tex, & pilulæ magis exiccant.

V I R E S .

Tenera folia prohibent, resoluunt, reprimunt, & phlegmonas nascentes adiuuant: in vino autem decocta, & illita oculorû fluxiones sistunt: corticis decocto ex aceto parato vtiliter colluuntur in dolore dentes: Virides pilulæ in vino potè serpentium moribus auxiliantur. Exceptæ autem adipe igni ambusta sanant.



FRAXINVS, Græcis, *μελία*] Italis, *Frassino.*] Germanis, *Eschenbaum.*] Hispanis, *Frasno.*] Gallis, *Fresne.*] Boemis, *Gelin.*] Polonis, *Zesion.*

FRAXINVS.

CENSURA.

Genera eius duo: Excelsum alterum, ac procerum. Alterum humilius, & minus auctile. *Theoph. lib. 3. c. 11. de usu st. plant.*

FORMA.

Excelsum lignū habet candidū crassiuenum, neruatū, mollius, enodius, ac crispus: Humile verò scabrius, durius, & flauius. Vtraq; foliis est laurinis haud absimilis, angustioribus tñ, & sensim per ambitū serratis, sorbi modo prodeūtibz. ¶ Fructum fert in siliquis linguis auricularum similem, subrubrum, & gustu amariu sculo, ac medicato. *Idem. Matt.*

LOCVS.

Nascitur in montibus, & cliuosis syluis. *Matt.*

QUALITATES.

Excalfacit & siccāt, adstringit, resoluit, abstergit, attenuat. *Idem.*

VIREs.

Folia, aut earum succus ex *Diosc.*

vino pota, viperarum moribus medentur. ¶ Spuma è viridi ligno manans dum incenditur, addito cyclamini, & rutæ succo: omnibus simul parumper calefactis surditati auxiliatur, si in aurem sanam infundantur, dum se cubitum recipit æger. Corticis recentis decoctum potum lienem absūmit. Fructus datur vtiliter potandus in lateris dolore, & ad vrinam ciendam. Idem venerem excitat, & in furno siccatus, potusq; calculo sis auxiliatur. *Matt.*



POPVLVS alba, Græcis, Λέυκη.] Arabibus, *Haur.*] Italis, *Populo bianco.*] Germanis, *Bellen, poppelbaum.*] Hisp. *Alamo blanco.*] Gallis, *Peuplier.*

G E N E R A .

POPVLVS ALBA .

Matt. Tria populi sunt genera: Alba de qua nunc sermo est, Nigra, & Lybica, siue Alpina.

F O R M A .

Idem Alba arbor est procera: crasso cortice, sed læui. Folia sunt illi vitiginea, inferna parte maximè albicantia, ac lanuginosa. Infrugifera arbor est.

L O C V S .

Idem Nascitur circa flumina, & vliginoso tractu.

Q U A L I T A T E S .

*Gal. li. 7
simp. m.* Mistæ quodammodo temperaturæ est, ex aqua tepida, & terrena extenuante essentia, quin etiam abstergentis facultatis est particeps.

V I R E S .

Diosc. Cortex vncie pōdere potius subuenit Ischiadicis, & vrinæ stillicidio: cū mulino rene haustus, sterilitatem inducit.

Matt. Idem præstant etiā folia à purgatione ex vino pota: Instillatur vtiliter foliorum succus in aurium doloribus. Gemmæ quæ primo foliorum partu extuberant, ex melle illitæ hebetes oculos iuuant. Tā alba, q̃ nigræ cortex particulatim incisus, & sulcis stercoreatis obrutus, quocunq; anni tempore edules fungos profert. Idē præstat alba populus humotenus secta, & aqua calida, quæ fermentū exceperit, p̃fusa: infra quatrimum. n. fungos dabit, esui quàm gratissimos.



POPVLVS Nigra, Græcis *ἄνελπος*.] Arabibus, *Haurromi*.] Italis, *Poplo negro*.] Germanis, *Aspen*, *sive popel Vueiden*.] Hispanis, *Alamo*, *Nigri-glio*] Gallis, *Tremble*.

POPVLVS NIGRA.

FORMA.

Nigra albam proceritate *Matt.* superat: folio est hederaceo: non tamen ut in alba dissecto: sensim per ambitum serrato, apice in acutū desinente. Fructum fert racemosum, baccis Erui magnitudine, in quibus copiosa, albaque lanugo concluditur. Cortex est illi cinereus, crassusq;: Materie alba ac contumaci ad ædium, & vtēsilium fabricas idonea.

LOCVS.

Nascitur in fluuiorū ripis, *Matt.* & scrobium aggeribus.

QUALITATES.

Flores excalfaciunt ordine *Gal. 6. simp. med.* primo, in desiccando vero, & humectando, parum tēperatis, & medijs ad siccus deflexerunt. Verū subtilium potius quàm crassarum sunt partium. Folia autem quodammodo floribus similia sunt, verū

imbecilliora: Flores, & folia digerunt, resoluunt, & attenuant: quæ omnia efficacius præstat resina. V I R E S.

Folia recentia ex aceto illita podagricos iuuant. Baccæ ex aceto potæ *Diosc. Matt.* comitialibus auxiliantur. ¶ Prima erūpentia germina odorata sunt, & glutinosa: conciliant eadem capillorum nitorem, ijs contusis cum recenti butyro, insolatis, & illitis.

D ij



POPVLVS Lybica, siue Alpina, Græcis, κερκίς.] Italica, popolo montana.
 Germ. Bûrgpopelbaum.

POPVLVS LYBICA.

FORMA.

Matt. Folio est cæteris tenuiore, rotundiore, anguloso-que, punctim albis notis consperso, tenuiq; pediculo appenso, continuo ferè se mouente, etiam si nullus in aere spiritus sentiatur. Cauldice est cæteris breuiore, nigrioreque cortice vestito, & materie imbecilliore, alba tamen, & tenaci: Fructum nullum fert nec flores.

LOCVS.

Idem. Nascitur in montium syluis, & syluestribus locis.

QUALITATES.

Idem. Qualitates illi sunt quales & cæteris generibus.



VIRES.

Idem. Folia eadem præstat, quæ Nigræ, non tamen adeò sunt efficacia.

ALNVS, Græcis, *πλήθη*] Italis, *Alno*, *Onio Onizo*: & *Auno*.] Germanis, *Erlenbaum*.] Gallis, *Auno*.] Boemis, *Uvolsa*.] Polonis, *Olsa*.

ALNVS.



FORMA.

Folio est coryli, crassiore *Matt.* cortice scabro, materie molli, rubet. Fructum fert viridem, oblongum, moris forma similem, squamosumque, maturescit autumno, minuto intus semine, fuluo colore.

LOCVS.

Nascitur secus flumina, *Theoph.* & vliginoso tractu.

QUALITATES.

Exiccat manifestè, sed in *Matt.* frigidi tate, & caliditate, parum à medijs abest.

VIRES.

Folia resoluunt, restringunt, delassatosq; recreant. Cortex verò præter hæc corroborat. Folia recentia illita tumores absumunt. Eadem pedum plantis subposita fatigatos viatores iuuant. Pulices necant, rore matu-

tino aspersa, & in cubiculis sparsa. Cortex, q̄ magis astringat, vsurpatur gallæ vice ad coria inficienda. Sunt etiam qui eo vnà cum fructu vtantur pro galla ad scriptorium atramentum parandum. Expetuntur pali ex alno parati ad edificiorum fundamenta, quæ in fluminibus, & aquosis locis struuntur, quòd in aqua nunquam putrescant.

BETULA Græcis, *Σπύδα.*] Italis, *Bettola: Betula, & Bidollo.*] Germanis, *Bircken.*] Boemis, *Brika.*

F O R M A.

Matt. Foliis exit, nigrae populi haud absimilibus, per ambitum serratis. Lulos edit, ut Corylus: sed fructum nullum. cortex illi albus, membranofusq; bituminosus, & pinguis. Materies candida, flexilis, ac tenax, caudice terebro perforato, aqua clarissima, copiosaue distillat. & potu non ingrato.

L O C U S.

Idem Nascitur in Sylvis Septentrionalibus, praesertim locis frigidis, ac nivosis.

Q U A L I T A T E S.

Idem Folia excalfaciunt, & siccant, resoluunt, attenuant, abstergunt, aperiant, & amara sunt. Cortex vero quod bituminosus sit excalfacit, & emollit.

V I R E S.

Idem Aquaque è pforato cau-

dice distillat, cum renum, tum vesicæ calculos eijcit. Illita faciei nitorem conciliat, & maculas delet. Eadē oris ulcera sanat. Foliorum succus coagulo admistus caseū à teredine, & vermibus praeservat. Ligni materies ad cingenda vinaria vasa peridonea est. Alpini è corticibus conuolutis nocturnas faces parant: Bituminosi enim cum sint, non minus quàm tēda flagrant, & incenduntur. optimi quoque è Betula parantur carbonēs ad fundenda metalla peridonei.

B E T U L A.



VLMVS Græcis, *πτελέα*.] Arabibus, *Didar*, *sive Luzach*.] Italis, *Olmo*.]
Germanis, *Ulmen*, *Ristenholtz*, & *Issenholtz*.] Hispanis, *Uline*.]
Gallis, *Orme*. *Lindbarts Holz*.

V L M V S.



G E N E R A.

Campestris, & Montana, quã *Theoph.*
Græci, *ὀρειπτελέα* vocant.

F O R M A.

Montana rectior, auctior, ac *Theoph.*
procerior. Campestris fruti-
cosior. Vtraque folium ha-
bet crispum, asperum, leui-
ter circumferratum oblon-
gumque. ¶ Folliculos pro- *Matt.*
fert magnos, numerosos, cri-
spos, humani scroti ferè effi-
gie, lento, claroq; liquore re-
fertis, culicibus quoque nu-
merosis cōclusis. Ligni mate-
ries nervosa, tenax, robusta,
non tamen spatiosa. Monta-
na siliquas & semen profert.
Cortex exterior illis est asper
crassusque, interior verò qui
lignum ambit, lori modo
lentus.

L O C V S.

Montana in montibus; campe- *Theoph.*
stris, in campestribus locis *Plin.*
habetur.

Q U A L I T A T E S.

Folia, & cortex adstringunt, in *Gal.*
spissant, absterunt, resol- *Matt.*
uunt, emolliunt, glutinant.

V I R E S.

Crassior cortex ex vino vncia. *DIOSC.*
tim potus pituitas, & aquas
trahit. Fouentur utiliter fra-
cta ossa, foliorum, & radicū

corticis decocto. Humor è medulla castratæ arboris, defluentem capillum reddit,
& continet ne fluat illitus. Liquor in folliculis contentus vitreo vase exceptus se- *Matt.*
pelitur in fimo equino calido, sale vasi substrato, vigintiquinque diebus, quo po-
stea vulnera celeriter sanantur, si cum splenijs illinantur. Quin etiam puerorum,
adulescentiumq; enterocellam sanat.

CARPINVS, Græcis, ζυγιά] Italis, Carpino .

CARPINVS.

FORMA.

Matt. Arbor est folijs vlmo proximis , tenuioribus tamen ; caudice procero , cortice subalbicante, scabro : ramis copiosis , robustis, foliosis patulisq;. Ex his per Æstatem petioli quidam pendunt, è quibus triquetra quædam folia sub pallida circumquaq; racematim exeūt, quorum medius apex, cæteros longitudine superat, & inter hos parua quædam capitula spectantur, ciceris magnitudine, aut paulo maiora, in quibus semen . Radicibus nititur firmis, crassisq;. Ligni materies alba, solida, tenaxq;, è quibus iuga bouum villi ci parant .

LOCVS.

Idem Crescit passim in omnibus fere syluis .



QUALITATES, ET VIRES.

Idem Qualitates, atque vires, nemo est (quod sciuerim viderimq;) qui describat .

ARVNDQ, Græcis, Κάλαμος.] Arabibus, *Casab.*] Italis, *Canna.*] Germanis, *Roebr.*] Hispanis, *Canas.*] Gallis, *Cannes siue Roseaux.*

ARVNDQ.

G E N E R A .

Domestica, quæ seritur, & *Matt.*
Aquatica spontè proueniens, quanquam Plinio Arundinum xxix. describantur genera.

F O R M A .

Satiua, quæ è radicū geniculis seritur, ad vitiū palos, ad decē cubitorū altitudinē adolefcit, robusta, ac firma, intus tñ inanis, compactis per interualla geniculis: cortice squamoso, aspero, subalbicante. Folia habet longa milij Indici similia, aspera vbiq; superficie: & acuta circumferentia. Radix illi est albicans, dura, tuberosa, & torta, informis, geniculataq; . Secantur quotānis humotenus: scæq; illico regermināt. *Idem*

L O C V S .

Domestica in imis vinearum locis seritur. Vliginoso præsertim solo: A- *Idem*
quatica autem spōte prouenit cū stagnantibus

aquis, tum quoque in fluminibus, & mari.

Q V A L I T A T E S .

Cortex adustus excalfacit ordine tertio, ac èt plus siccatur. Viridia folia refrigerāt. Folia, & cortex adstringunt, abstergunt, & corroborant: radix verò attrahit. *Gal. 7. simp. me.*

V I R E S .

Folia tusa, & imposita, ignibus sacris medent. Corticis cinere sanant alopecie. Radix pota menses, & vrinas ciet. Eadē recēs tusa, & illita scor- *Diosc. Matt.*
pionū ictib⁹ auxiliat, quin èt aculeos, et alia corporib. infixis extrahit.



Matt. ARVNDOPALUSTRIS, Græcis, Κάλαμος ἐλείος.] Italis, Canneilla, & cannuc-
cia aquatica. Græc. ἄλυσος ἡ τῆς ἐλείου

ARVNDOPALUSTRIS.

FORMA.

Idem Calamo est tenui, genicu-
lato, læuibus interno-
diis, inani, ac fragili,
foliis longis, asperis,
& per ambitum acu-
tis: paniculis in sum-
mitate comosis tactu
mollibus, læuibusque.

LOCVS.

Idem Prouenit sponte in palu-
dibus, lacubus, & cæte-
ris stagnantibus aquis.

FACULTATES,
ET VIRES.

Idem Vires sunt illi eadem,
quæ & cæteris generi-
bus.



MYRICA siue Tamarix Græcis, Μυρίνα.] Arabibus, *Tarfa*, seu *Carfa*.] Italis, *Tamarigio*.] Germanis, *Tamarisken*.] Hispanis, *Tamargueira*, siue *Tamaris*.] Gallis, *Tamarisc*.

MYRICA.



GENERA.

Duum est generum. Urbana- DIOSC.
num, & sylvestre.

FORMA.

Urbana, foliis est cupressi DIOSC.
viridioribus: Fructumq; Matt.
gerit gallæ similem. &
in altum arborescit. Syl-
vestris folia habet Sabinæ
bacciferae similia, te-
nuiora tamen, ac magis
virentia, fructum quasi
florem ferens compage
muscosum.

LOCVS.

Urbana, in Ægypto, & Syria DIOSC.
puenit: Sylvestris in flu-
uiorum alueis fruticat.

QUALITATES.

Abstergentis est, ac inciden Gal. li. 6
tis facultatis, absq; pspici- simp. me.
cua desiccatione: & ad-
strictionē nōnullā habet.

VIRES.

Domesticæ fructus dat vti- DIOSC.
liter cruenta expuenti-
bus, cæliacis, & contra
feminarum profluvia,
regium morbum, & phalā-

giorum morsus. Illitus tumores inhi-
bet: Vtriusq; cortex in eodē vsus
adhibetur. Foliorum decoctum potum ex vino lienem abs-
sumit, den-
tiumq; dolorem collatione sedat, & in desessio-
nibus muliebria cohi-
bet. Sarmentorū cinis aspersus ambusta sanat. Rami concisi, & ex aceto
illiti lienē attenuant. Cortex potus alui fluxiones sistit: Radicum deco-
ctum diutius cum passis vuis potum, lienosam elephantiasim curat.

Serap.
Alcan-
zius.

ERICA, Græcis, ἐρείνα.] Italis, *Erica*.] Germanis, *Heiden*.] Hispanis, *Queiro*.] Gallis, *Bruyere*.

F O R M A.

E R I C A.

Plin.lib. Frutex est non multum à
24.6.9. Myrica differens, colore
rorismarini, & penè fo-
lio. floret bis in anno, Ve-
re scilicet, & Autumno,
floribus parvis, copiosis,
subrubentibus.

L O C V S.

Matt. Nasctur in aridis, in cam-
pestribus, collibus, &
sylvis.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 6. Digerendi per halitum fa-
simp.me. cultatem habet.

V I R E S.

Diosc. Folia, & flores serpentium
Matt. ictibus illitu medentur.

¶ Foliorum, & florum
decoctum quinq; vncia-
rum pondere diebus tri-
ginta potum, vesicæ cal-
culos frangit, idq; fœli-
cius succedit, si à trigesi-
mo die in balneo eiusdē

decocti sederint affecti aliquot diebus continuis, & super ipsa Erica
decocta sederint: Florū decoctū potū lumbricorū: & ventris dolori-
bus medet: foliorū succus impositus oculorū imbecillitati succurrit.



ERICA altera, Italis, *Erica secunda*. *Grem. mi andr gylfisi B. Lindry.*

ERICA ALTERA.

FORMA.

Ramos edit tenues, foliis *Matt.*
alterius longioribus,
acutioribusq; angustis,
ac numerosioribus, qui-
bus circumqua; ramu-
li stipantur. Flores edit
paruos rubentesq;.

LOCVS.

Nascitur arido solo, & in *Idem.*
collibus apricis, & mō-
tibus non valde excel-

QUALITATES,
ET VIREs.

Si hæc planta Erica est: *Idem.*
Ericæ facultatibus pro-
culdubio insignitur.

CENSURA.

An hæc planta Erica legi- *Idem.*
tima sit, aliorum iudi-
cio relinquo.



ERICA baccifera, Matthiolo. *ver. Ginde mit Giften.*

E R I C A.

F O R M A.


Matt. Procumbit hæc planta humi, & latas occupat areas, foliis penè vulgaris Ericæ: Baccas edit in purpura nigricantes, iuniperinis non abfimiles, sed molliore pulpa, lenta, vt in prunis: Ramis est lignosis obsequiosisq; , quæ mense Augusto maturefcunt.

L O C V S.

Idem Prouenit in montibus, qui Boemiam à Silefia difterminant, & à quorum fontibus Albis fluuius originem ducit.

F A C V L T A T E S,
E T V I R E S.

Idem De qualitatibus, & viribus, quid certi dicam, non habeo.



RHAMNVS, Gręcis, *Ραμνος*.] Arabibus, *Nausig, siue Nauségi*.] Italis, *Ramno, siue Marruca*.] Hispanis, *Scambrones*.] Gallis, *Burguesspin, siue Neprun*. *Wunderbaum*.

R H A M N V S .

G E N E R A .

Trium est generum: Can- diosc.
didum : Candidius , ni-
grum .

F O R M A P R I M I .

Candidum ramos fert re- diosc.
ctos in acutę spinę mo *Matt*.
dum , foliis paruis , ob-
longis, subpinguibus, te-
nuibus . ♀ Baccis ruben-
tibus, pisi magnitudine,
cortice albo, & tenui .

L O C V S .

Fruticat in sepibus, & fru- diosc.
tetis .

Q U A L I T A T E S .

Desiccat, & digerit excessu *Gal. 8.*
secundo , & refrigerat *simp.*
primo completo, aut se- *med.*
cundo incipiente .

V I R E S .

Folio ignibus sacris, & ser diosc.
pentibus vlceribus effi-
caciter illinuntur .



RHAMNVS secundus, Italis, *Marruca bianca*.

F O R M A .

Matt. Primo candidior est: foliis salicis, auersa parte candidis, virgis aculeatis albicantibus: rubentibus inter folia baccis.

L O C V S .

Idem. Nascitur in fruticetis, & sepibus.

Q U A L I T A T E S ,
E T V I R E S .

Diosc. Viribus, & qualitatibus nihil prorsus à priori genere abesse videtur.

R H A M N V S S E C V N D V S .



RHAMNVS Tertius. Italis, *Marruca nera*.

RHAMNVS TERTIVS.



CENSURA.

Falluntur qui putant Rhamnum tertium, esse Dioscoridis Paliurum, sed adhuc magis cæcutiunt, qui idem esse Dioscoridi adulterinum contendunt.

FORMA.

Nigrioribus est foliis quadantenus ad ruborem vergentibus : Ramos ^{Diosc.} *Matt.* mittit quinum fere cubitorum, cæteris spinosiores, lævi cortice obductos, fuluo colore. Fructum edit latum cædidum folliculari specie, verticillo similem, in cuius medium officulum cōcluditur, in quo parvus inest nucleus. Aculei aliqui illi longi, rectique, nonnulli verò, ut rubi incurui.

LOCVS.

Nascitur in maritimis, in *Matt.* campestribus, & locis incultis.

QUALITATES,

ET VIRES.

Folia ignibus sacris, ac serpentibus vlceribus vtiliter illinuntur. Fama est ramo huius, valuis fenestrisve imposita veneficia depelli. Eadem omnia potest, quæ Rhamnus primus. ^{Diosc.}

SPINA infectoria . Italis *Spino merlo*, *Spino Cernino*, siue *Spino guercio*.]
Germanis, *Uuegdorn*. *Spino*

SPINA INFECTORIA.

F O R M A .

Matt. Arbuscula est nō magna, foliis pyri breuioribus, & angustioribus : Ramos fundit numerosos, quorum fastigium in aculeum desinit. Bacas edit copiosas ligustrinis æquales, quæ primum virides, & per maturitatem nigrescantur. Ligni materies exterius albicat, medullitus verò rufescit.

L O C V S .

Matt. Prouenit in sepibus, & fenticosis.

Q U A L I T A T E S .

Idem Exoluit aluum baccarum succus, aperit, & expellit, & caloris, & siccitatis haud est expers.

V I R E S .

Idem Fit è baccarum succo medicamentum aluum exoluēs, hoc modo. Sumuntur succi earundem librę duę, & sacchari sesquilibra, & coquantur ad Iulapij spissitudinem: demum linteolo percolantur additis Zingiberis, cinnamomi, & Caryophyllorum nonnihil, omnibus in puluerem contusis . Huius liquoris uncia epota crassam, lentam quę pituitam ducit: Ideoq; podagricis, Ischiadicis, paralyticisque belle confert. Baccarum succo vtuntur pictores : viridem colorem inde parantes .



HALIMVS, Græcis ἀλῖμος.] Arabibus, *Molochia*.] Italis, *Halimo*: Venetis *Bidone*. Germ. *Salzfrucht*. 3 *Wirtfrucht*.

HALIMVS.

FORMA.

Ramos plures à radice Diosc. fundit, lentos, & obsequiosos, foliis Oliue pinguioribus, albicantibusque, falso sapore. *Matt.*
Semen profert racemosum in caulium summitatibus.

LOCVS.

Nascitur maritimis locis, Diosc. & circa salinas.

QUALITATES.

Excalfacit temperatè, & Gal. 6. exiccat, & vt cætera sal- *simp.* fa corroborat, adstringit, & abstergit. *med. Matt.*

VIRES.

Cocta ex iure, aut aqua *Matt.* addito oleo, aut butyro aluum subducit: Radix cocta, denorataque lactis vbertatem facit, & conuulsa, rupta, torminaq; mulcet. Idonea planta est Halimus ad sepiendos hortorum toros, quippe obsequiosa cum sit, facile

quocunque distrahitur.

CENSURA.

An hæc planta legitima sit Dioscoridis Halimus non desunt rationes, quæ rem dubiam reddunt.

AQVIFOLIUM. Italis, *Aquifolium*.] Germanis, *vualdt dißeln* siue *Sechpalmen*.

F O R M A.

Matt. Planta est arborescens, ad acutę spinę magnitudinem, foliis Laurinis, perpetuis, & in toto ambitu per interualla sinuatis, aculeatisque, carnosiss, ac læuibus. Virgas edit lentas, & obsequiosas, viridi libro vestitas: baccas rotundas, rubentesq; rufci modo.

L O C V S.

Idem Arborescit in syluis, & syluestribus locis.

Q V A L I T A T E S.

Idem Radices emolliunt, discutunt, & resoluunt.

V I R E S.

Idem Fouentur radicum decocto vtiliter articuli, qui prius luxati duritiem contraxerunt. Idem ossa fracta ferruminat. Id quod valentius præstat radicum ipsarum cortex excoctus, & illitus. Folia suspenduntur circa funes è quibus falsæ carnes sub tecto pendent, ad arcendos mures. Sunt qui è tuso radicum cortice arte quadam uiscum parant ad aucupia.

C E N S V R A.

Hallucinantur qui hanc arborem Theophrasto Agriam, siue Ariam faciunt: atque in eodem errore versantur, qui eandem existimant eiusdem esse crataegonon.

A Q V I F O L I U M.



ACVTA Spina, Græcis, ὀξύκανθα.] Arabibus, *Amiberberis*, siue *Berberis*.] Italis, *Hetruscis*, *Bagaia*: *Ananiensibus* *Amperlo*.] Germanis, *Hagdorn*.

ACVTA SPINA.

FORMA.

Arbor est Sylvestri pyro similis, minor tamen, & valde spinosa. Baccas profert myrti, plenas, rubentes, fragiles, & intus nucleos radicem multifidam altè descendentem. ¶ Folia Apij hortensis modo diuisa, sed longiora: floribus racemosis, ac candidis, cortice scabro, & materie pyracea.

Diosc.
Matt.

LOCVS.

Prouenit in Syluis, sepibus, & fruticetis.

Matt.

QUALITATES.

Fructus est tenuium partium, & paulum quiddam incisium obtinet. Adstringit, roborat, & prohibet.

Gal. 8.
simp. me.

VIRE.

Baccæ deuoratae alui, & scæminarum profluvia sistunt. Radix illita aculeos, & spicula extrahit: Nuclei in puluerẽ triti, ac poti calculos

Diosc.

tum frangunt, tum eiiciunt.

CENSURA.

Deluduntur qui Berberum communis usus oxyacantham faciunt.

purp. sebof.
fair

BERBERVS Vulgaris, siue Crespinus. Italis *Crespino.*] Germanis, *Ver-*
sich.] Gallis, *Espine*, siue *Vinette*. *winfring.*

BERBERVS VVLGARIS
SIVE CRESPINVS.

F O R M A .

Matt. Compluribus ab radice fruticat ramis, siue aculeatis stolonibus. Cortice vestitur cādicanti, læui, tenuique. Lingui materies flaua sed fragilis. Tota planta acutissimis aculeis, ternis simul prodeuntibus, albis, planis, fragilibus. Folia habet punice tenuissimis circumdata spinis, flores aureos, odoratos, racematim dependentes. Fructus rubentes, baccis oblongis, racemosis, vinosisq; adstringenti, & acido gustu. Radicibus haud altis, fuluo colore.

L O C V S .

Idem Nascitur in sepibus, frutetis, ac senticosis locis.

Q V A L I T A T E S .

Idem Baccæ refrigerant, & siccant, cohibent, roborant, & adstringunt.

V I R E S .

Idem Vinum quod è baccis exprimitur, datur vtiliter potandum cum sirupo violaceo, & oxalidis aqua, in ardentibus, ac perniciosis febribus: cum myrtino autem, & aqua plantaginis, celiacis, & dysentericis, & in fœminarum profluuiis. Idem sitim sedat ex pristana haustum. Columellam procidentem gargarizatu reprimat. Auxiliatur quoq; sanguinè reicientibus.

Vlcera serpentia cohibet, & humida exiccat, faucium, & gutturi inflationes reprimat. Intestinorum animalia necat, ac pellit.

C E N S V R A .


Decipiuntur, qui vulgarem Berberim oxyacantham legitimam esse contendunt.



VVA SPINA, siue Crispa . Italis , *Vua spina, siue vua marina.*] Germanis, *Uuegdorn, siue Crutzbeer.*] Gallis, *Groiselier.*

Ädelweiss, Gemeiner Weiss.

VVA SPINA.



GENERA.

Altera Satiua, altera agrestis, ac sponte proueniens . *Matt.*

FORMA.

Vtraque arbuscula est parua, fruticosa, folio Apij, siue Oxiacanthæ: ramulis, ac virgis albicantibus, ubiq; aculeatis. Baccas profert rotundas, succosas, & hirsutas: & præsertim sylvestris, acido, ac austro sapore. At ubi maturitatem sensere, flavescent, & subdulces euadunt.

LOCVS.

Satiua in hortis, pomariis, & vineis feritur, *Idem*
Sylvestris in sepibus, & senticosis locis sponte prouenit.

QUALITATES.

Baccæ frigefaciunt: exiccant, roborant, & adstringunt. *Idem*

VIRES.

Baccæ veniunt in ciborum usum vix acerbæ modo: nã iusculis incoctæ appetitum excitant. Sitim sedant, & grauidarũ malaciæ succurrunt. *Idem*
Dantur deuorandæ cæliacis, dysentericis, & cruenta expuentibus.

RIBES vulgaris, Italis, *Ribes*.] Germanis, *S. Iohans, Treublein*.] Gallis, *Ribettes seu Raisins de oultre mer*.

G E N E R A .

Matt. Duum est generum Domesticum, & Sylvestre.

F O R M A .

Matt. Paruula utraq; est arbor, folio paruo, vitigineo: Ramulos habet lentos, è quibus fructus rubescentes, & vuæ modo racemosi dependent, baccis copiosis, rotundis, vinosis, piperis magnitudine, gustu acido, & adstringenti, cum aliqua dulcedinis specie.

L O C V S .

Idem Domestica scribitur ad sepies hortorum puluinos. Sylvestris, nascitur sponte in Boemia, in siluosis collibus, & in aliis Germaniæ locis.

Q U A L I T A T E S .

Idem Vuæ refrigerant, exiccant, adstringunt, & roborant.

V I R E S .

Idem Datur utiliter in acutis febribus: Ventriculum estuantem refrigerat, sitim restinguit, nauseam, & vomitiones sistit, cibi appetentiam incitat, cæliacos & dysentericos iuuat, & biliosis fluxionibus obnoxios, sanguinis feruorem demulcet, bilis acrimoniam retundit, & impetum domat.

C E N S V R A .

Cæcutiunt, qui hanc plantam Mauritanorum Ribem faciunt, ac pariter qui Vrsi vuam esse contendunt apud Galenum.

RIBES VVLGARIS.



LIGVSTRVM, Græcis, Κύπρος.] Arabibus, Kenne, & Henne,] Officinis, Alcanna.] Italis, Guistrico, Oliuella: Oliuetra, & Cambrassene.] Germanis, Beinholtz, siue Mundholtz, siue Reinneiden.] Hispanis, Alfena, siue Hallena.] Gallis, Troesne, siue Trezillon.

L I G V S T R V M .



F O R M A .

Arbor est oleæ foliis, latioribus tamen, mollioribus ac viridioribus: flore candido racemoso, sed qui decerptus statim flaccescat: Baccas profert in cacumine racematim coherentes, hæderæ minores, læuiorēs, ac nigriores, sapore amaro, ac iniucundo, purpureo intus succo: materie robusta, ac dura.

Diosc.
Matt.

L O C V S .

Prouenit in sepibus ac nemoribus.

Matt.

Q U A L I T A T E S .

Folia mistæ sunt temperaturæ, quin etiam & summa germina: Digerunt enim leuiter accedente aquea substantia modicè calida, quin etiam aliquid astrictoriæ possident facultatis: ex terrena frigida, & siccitatis non sunt expertes.

Gal.li.7
simp.me.

V I R E S .

Folia commanducata oris vlceribus medentur: & illita feruidis inflammationibus, & carbunculis. Decocto eorundem igni ambusta fouetur. Eadem trita, & illita capillū rufant: flores ex aceto frōti illiti, capitis dolores mulcent. ¶ Oleū in quo ligustri flores insolati fuerint, præ-

Diosc.

stat illitum ad vulnerum inflammationes. Item ad capitis dolorem à bile prouenientem. Aqua à floribus distillata præscripta omnia potest.

C E N S V R A .

Non minus hallucinantur, qui Cyprum, & ligustrum duas faciunt plantas, quàm qui ligustrum nostrum phillyream esse contendunt.

PHILLYREA. Græcis, *φιλυρέα*.] Italis, *Phillirea*.] Arabibus, *Ma-*
haleb.

F O R M A.

Diosc. Arbor est Ligustri magni-
tudine foliis oleæ ni-
grioribus, & latiori-
bus. fructu lentisci, ni-
gro, subdulci, racema-
tim cohærente.

L O C V S.

Diosc. Nascitur in asperis.

Q U A L I T A T E S.

Diosc. Folia adstringunt.

V I R E S.

Diosc. Ad ea omnia præstant Phil-
lyree folia, ad quæ Olea-
ster, cùm adstrictione
est opus, maximè ad o-
ris vlcera commandu-
cata, aut si eorum deco-
cto os colluatur. Uri-
nam quoque, ac men-
ses cient, Epoto deco-
cto.



C E N S V R A.

Aberrant qui *φιλυρέαν* Tiliam faciunt.

MAHALEB. Mauritanis sic dicta vnguentariis. Italis, *Machalep*.

MAHALEB.

FORMA.



Arbor est non admodum *Matt.*
 ppera, foliis Tilię haud
 longe absimilibus: Flo-
 res edit albos, è quibus
 bacce subnascuntur ni-
 grę, officulo intus cera
 soiu paulo minore, in
 quo nucleus recondi-
 tur, quo ad odoramen-
 ta, & smegmata vtun-
 tur vnguentarii.

LOCVS.

Nascitur in Montibus.

Idem

QUALITATES.

Excalfacit, emollit, abster- *Serap.*
 git, attenuat, resoluit, & *Auicem.*
 dolores sedat.

VIRES.

Nuclei contusi iliorum, & *Matt.*
 dorsi doloribus vtiliter
 illinuntur. Id quod ma-
 gis præstat oleum ex iis
 expressum. Ex mellicra-
 to hausti, animi deli-

quiis subueniunt: dantur quoque ad coli cruciatus, & renum cal-
 culos. ventris quoque tineas necant, & vrinam cient.

TILIA MAS, Græcis, *φιλύρα ἐνορχης*.] Italis, *Tilia maschio*, & *Carpino nero*.] Germanis, *Stein Linden*.

F O R M A.

TILIA MAS.

Matt. Arbor est magna, patentibus ramis, materie robusta spissaque, ac etiā sterilis: folia fert lata. oblonga tamen, in quibus fere omnibus numerosæ extuberant bullæ, in quibus muscæ gignuntur, quæ tandem are-scentibus receptaculis, inde gregatim euolant.

L O C U S.

Idem Prouenit in syluis, & montibus, saxosis locis.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem Quid de huiusce arboris facultatibus scribam, hætenus non habeo.



TILIA, Græcis, *φιλύρα*. Italis, *Tilia* *sive* *Tëio*.] Germanis, *Linden*.] Gal-
lis, *Til*, *sive* *Tilet*.

TILIA FOEMINA.

G E N E R A .

Quædam mas est, quædam *Theoph.*
fœmina. *li. 3. c. de*
hist. plâr.

F O R M A .

Fœmina folia fert hedera- *Idem*
cea, nisi quòd in angulū *ibidem.*
acutiorē rotūdantur. &
quanquā iuxta pediculū
curuatiōra, de medio tñ
in acutius coacta præte-
duntur: Flos calycula in-
tectus præter folij pedi-
culū, amērumq; futurū,
pediculo alteri adnexus,
viridis dum in calycula
est, detectus aut leuiter
flauus. Baccas fert orbi-
culatas, oblongas, ma-
gnitudine fabæ, quinis
eminentibus angulis:
Cortex fœminæ flexilis,
& materies alba, tenaxq;
cui exigua est medulla.

L O C V S .

Non solū in montibus: *Matt.*
sed in planitie quoque
prouenit, ac in cæmete-
riis, & edium areis.

Q U A L I T A T E S .

Adstringit: glutinat, discu-

tit: inspissat, abstergit.

V I R E S .

Cortex cōmansus, ac deinde illitus, vulnera recentia glutinat. Folia tri-
ta, & aqua conspersa pedū tñmores discutiunt. Humor è medulla
castratæ arboris defluens, capite illitus non solum capillos replicat,
sed fluentes continet. Aqua è floribus distillata sua peculiari dore
datur vtiliter Epilepticis. Ligni carbonēs in puluerem tusi, auxilian-
tur his qui ab alto deuoluuntur fractis, ac contusis.



CISTVS; Græcis, Κίσος ἢ κίσσαρον, καὶ κίσσαρον.] Arabibus, Romiet, Altheis, sine Ithaie, Althis.] Italis, Cisto.] Hispanis, Cerguacos.

Germ. Cistus & mindlin

CISTVS.

G E N E R A .

DIOSC. Mas vnum. Alterum verò fœmina.

F O R M A .

DIOSC. Mas ramosus frutex est, sed improcerus, & foliis rotundis, acerbis, hirsutis. Flos illi mali puniceæ haud absimilis.

L O C V S .

Matt. Nascitur in Apennino Italiae saxosis locis, & asperis.

DIOSC.

Q U A L I T A T E S .

Gal.li.7 Folia, & parua germina adstringunt, & exiccant non instrenuè: Frutex adeò frigidus est ut tepidi calidi sit particeps: Flores præter prædicta non instrenuè desiccant.

simp.me.

V I R E S .

DIOSC. Flores in vino austero bis in die poti, Dysentericis, ventris imbecillitatibus, defluxionibusque, & humiditatibus opem ferunt, & nomas per se illiti cohibent.

Matt.

Medentur quoque vetustis vlceribus, & igni ambustis cum cerato. Folia, & flores in deflusionibus cohibent fœminarum fluxiones. In summa non parum præstant, ubi adstringere, & roborare sit opus.



CISTVS fœmina : Græcis, Κίσκος θήλυς. Italis, Cista fœmina.] Patau-
nis, Salvia Saluega. Germ. Cistus dz weiblich.

CISTVS FOEMINA.

FORMA.

Folia gerit oblonga Salvię diosc.
æmula, albicantia, ac *Matt.*
hirsuta. Floribus albis
cisti maris longè mino-
ribus.

LOCVS.

Prouenit in collibus ari- diosc.
dis, & saxosis. copiosa *Matt.*
in agro Patauino.

QUALITATES,
ET VIRES.

Eædem illi sunt quæ mari
qualitates & vires. Ad-
stringit enim : & de-
siccant.



HYPOCISTIS, Græcis, ὑποκίστις.] Italis, Hipocisto.

Germ. *Cypripis*.

HYPOCISTIS.

F O R M A.

DIOSC. Forma est mali punice cy-
Matt. tino similis, aut oroban-
ches fastigiis colore va-
rio. Nam quædam rufa:
quædam herbacea: &
quædam candida visi-
tur. Liquat Acaciæ mo-
do. Cæterum tunditur
recens, & elicitur suc-
cus, qui insolatus asser-
uatur ad vsum.

L O C V S.

DIOSC. Nascitur iuxta cisti vtriuf-
que radices.

Q U A L I T A T E S.

Gal. lib. Magis adstringit quam ci-
7. f. m. sti folia. Vires habet
DIOSC. Acaciæ pares: verum
aliquanto magis siccatur.

V I R E S.

DIOSC. Efficax est auxilium ad om-
nium fluxionum affe-
ctus, nempe sanguinis
reiectiones, proflu-
via muliebria, Cælia-
cos, dysentericosq; af-
fectus. ¶ Quin si quam
Gal. partem roborare consi-
lium sit, quæ videlicet plusculo humore exoluta fuerit, robur, & fir-
mitatem illi non imbecilliter addit. Sic sanè Stomachicis, epi-
thematis, hepaticisque commiscetur, & ex viperis confecto anti-
do to inditur.



LEDVM, Græcis, Ἀνδύς.] Arabibus, *casus*: *Pingue autem quod ex eo colligitur*, Latinis, *Ladanum*.] Græcis, Λάδανον.] Arabibus, *ʃaden*, *sive Laden*.] Italis, *Laudano*, *sive Odano*.] Hispanis, *Xara*. *Græc. Λάδανον*

LEDVM.

G E N E R A .

Inter Cisti genera, & *Ladanū* est. *Diosc.*
Matt. Duū est generum. Alterū foliis grādi-
 oribus, alterum verò minoribus.

F O R M A .

Frutex est Cisti modo *na* *Diosc.*
 scēs, lōgioribus tamē
 foliis, & nigrioribus,
 quę Verno tpe quiddā
 contrahunt pingue.

L O C V S .

Prouenit in saxosis, & a- *Matt.*
 pricis collibus in cali-
 dioribus regionibus.

Q U A L I T A T E S .

Ladanū excalfacit exces- *Gale. 7.*
 su primo cōpletē, vel *simp. me.*
 in principio secundi. *Matt.*
 habet ēt adstrictionis
 paululū. Emollit, dige-
 rit, & coquit, venarū o-
 ra patefacit, & spissat.

V I R E S .

Capillum fluentē conti- *Diosc.*
 net addito vino, myr-
 rha, & myrteo oleo.
 Cicatricibus decorem
 reddit ex vino illitū.



Medetur aurium doloribus cum hydromelite, aut rosaceo infusum:
 suffitu secundas eiicit. Pessis immistū vuluę duritiem sanat. In-
 seritur in medicamenta, quę aurium dolorem, tussimque finiunt: ex vino ve-
 tere potum alium sistit, & vrinam ciet. Fiunt ex eo orbiculati globi:
 odorandi pestilentię tempore additis cinnamomo, Caryophyllis, San-
 talis, Agallocho, Mosco, & Ambaro.

ROSA, Græcis, Ροδὸν.] Arabibus, Nard, Kard, seu Naron.] Italis, Rosa.] Germanis, Rosen.] Hispanis, Rosas.] Gallis, Roses.

ROSA.

G E N E R A.

Matt. Domestica & Sylvestris. Domestica & si plura Plinio sint genera, nostro tñ ævo tria tantū in vsum venerunt, videlicet puniceum, album, & quod carnis colorem refert. In albo genere ea est admodū odorata, quā Moschetā, & Damascenā Itali vocant.

F O R M A.

Matt. Rosarum, & rosaceæ plātę forma cū omnibus notissima, explorataque sit, superfluum est hic eam describere.

L O C V S.

Urbana in hortis, Viridariis, pomariis, & vineis floret. Sylvestris in sepibus, senticosis, nemoribus, & campestribus provenit.

Q U A L I T A T E S.

Mesue Cōstant Rosę, diuersis sanè partibus, nēpe terrestribus, & aqueis, quibus substantiā, & adstrictoriam facultatem acceptā referunt. Aereis à quibus cū subdulcem, tū odoratū saporē accipiūt. Igneis a quibus amarorē sibi vendicant. In vniuersum autē refrigerant, & adstringunt.

V I R E S.

Diosc. Folia, cor, ventriculum, iecur, & retentricem insuper facultatem, corroborant, dolores

calidos, & inflāmationes auferunt. Aridis in vino decoctis expressus liquor facit ad dolores capitis, oculorum, gingiuarum, sedis, recti intestini, ac vuluæ pēna illitus, & infusus. Eadem sine expressione tusa, pręcordiorum inflammationibus, humidis stomachi vitiis, igni sacro illini prodest. Flosculi medi cum suis capillis gingiuarum defluxiones cohibent, & fœminarum profluvia capitula pota etiam aluum, & cruentas reiectiones sistunt. § Succus & corroborat, & aluum exoluit.

Matt.

Verum id longè magis pręstat dilutum pluribus repetitis macerationibus.



LYCIVM, Græcis, Λύχιον, ἢ πυξακάνθα.] Arabibus, *Hadhadh, Hadad, Kilulem, siue Felzakarag.*] Italis, *Licio.* *Germ. Lychm saftig Baum.*

LYCIVM.

F O R M A .

Arbor est spinosa, ramis trium **Diosc.** cubitorū, aut longioribus, foliis buxi, densis, fructu piperis modo nigro, leui, amaro, dēsoq; cortice pallido, radicib⁹ latis, obliq; lignosis.

L O C V S .

Nascitur in Lycia, vnde illi no **Diosc.** mē, & in Cappadocia atque aliis plerisque regionibus. Aspera amat loca.

Q V A L I T A T E S .

Digerit, & resiccat, secundo re **Gal. 7. 1** cessu, in calore autem me- **simp. me.** diis, & symmetriis pximū est. Adstringit quoq; sed nō adeò vehementer, nec abstergendi facultate vacat.

V I R E S .

Lycium, quod è baccarum suc **Diosc.** co, aut ramorū, foliorumq; diluto paratur, oculorum caliginem discutit, genarū scabiem, pruritus, & veteres fluxiones sanat: facit quoq; ad purulentas aures, tonsillas, exulceratas gingiuas, labiorū fissuras, sedis rimas, attritusque, illitum, ad celiacos, & dysentericos potū inditumque: datur ex aqua ruffientibus, & sanguinē excreantibus: deuoratur in catapotiiis aduersus rabidi canis morsus, aut bibitur: fla-

uos reddit capillos: serpentibus, putridisque medetur vlceribus, & suppositum fœminarum profluvia sistit. Illinitur ad suggillata, & oris sedisque phlegmonas.

C E N S V R A .

Officinarum Lycium omne adulterinum est. Lycij vires Dioscoridi explet amurca **Gale. 7.** in æreo vase decocta, aut Rhois spissamentum. **simp. me.**



LYCIVM Italicum. Italis, Licio nostrano. Germ. *Tridentisch Lycin*.

LYCIVM ITALICVM.

FORMA.

Matt. Planta est aculeata pruni sylvestris faciem referens, minoribus tamen foliis. Flores mitrit cādidos, è quibus bacca gignūtur, ligustri ferè similes, sapore acerbo, atque adstringēti, è quibus succus exprimitur.

LOCVS.

Matt. Nascitur copiosum in agro Tridentino circa Arcem de Gresta, saxosis locis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Matt. Adstringit, cohibet, roborat, siccatur, & reprimat & ubi legitimum lycium non sit ad manus, nihil prohibet, quin hoc eius vice succedere valeat. Succus è baccis à me extractus, hæc omnia belle præstat.



BUXVS, Græcis, πύξος.] Italis, Bosso. Germ. Buxbaum.

B V X V S .



F O R M A .

Buxus prouenit folio *Matt.* myrti minore, densiore, carnosiore, viridiorēq; . Fronde est perpetua, ob idq; topiario operi peridonea, flore herbaceo, fructu rutę simili: Materie spississima, flaua, dēssima, atq; ponderosissima, adeò, vt nec cariem sentiat, nec in aquis fluitet.

L O C V S .

Locis gaudet cū frigidis, tum apricis. In Corsica frequens, crassissima, prouenit. *Idem*

Q V A L I T A T E S .

Exiccat manifestè, sed in calore nō longè à mediis abest, adstringit quoque & roborat.

V I R E S .

Capillum rufant tum folia tum rami in lixiuio decocti. Non desunt quoque qui asse-

rant sanari alui defluuia ligni scobe deuorata, aut pota: Sunt & qui asserant buxi decoctum idem præstare, quod Guaiaci ad Venericum morbum.

C E N S V R A .

Delirant, qui Buxum & Guaiacum Indicum vnam, & eandem faciunt arborem.

EVONIMVS, Græcis *ευωνυμος*. *Hetruscis, Silio.*] *Italīs cæteris, Fusano, siue Fusaro, quod ex eo fusi à tornitoribus fiant.* Germ. *Spindelbaum & Haffensholz.*

EVONIMVS.

FORMA.

Theoph.
li. 3. c. vl
timo de
plāt. hist.

Arbor est mali punicæ magnitudine, atque etiam folio eiusdē, maiori quàm chamædaphne, molli, vt punica. Germinare incipit mense septembri, & floret deinde vere. Flos illi albæ violæ simili odore infestus, veluti cruorem inferens. Fructus cum putamine siliquæ Sesiame proximus, præter quàm quòd in uersus diuiditur quaternos.

Matt.

Materiæ est buxi modo pallida, ac solida, verū non adeò grauis.

LOCVS.

Matt. Nascitur frequens in Italia in sepibus, dumetis, & syluis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Theoph.
ibidem.

Matt.


Fructus deuoratus pecus enecat, quin etiā folium idem facit, & potissimum capras, nisi purgentur Anocho.

Lixiuum in quo bacce decoctæ fuerint (vt nostræ affirmant mulieres) capillos splendidos facit, fursures extergit, & pediculos necat. Ligni materies expetitur à tornitoribus ad fusos parandos.



ACACIA, Græcè *ἀκασία*.] Arabibus, *Achachie*.] Italis, *Acacia*.
 Græc. *Εσπυσσιν*. *Πλάσσανθρον*.

ACACIA.



G E N E R A.

Duum est generum : maius.
 & minus.

F O R M A.

Nascitur Spinę instar frutico-
 sa, non se in rectum attol-
 lens. Florem habet candi-
 dum, & semen Lupino si-
 milem in folliculis, è quo
 exprimitur succus & sicca-
 tur in vmbra.

Diosc.

L O C V S.

Primū in Ægypto nascitur.

Diosc.

Q U A L I T A T E S.

Succus maioris condensatus
 medicamētū est frigidū, &
 terrosum, immista ēt qua-
 dam essentia aquea ; & sa-
 nè coniectura est non esse
 simile, uerū quasdam
 habere in se dispersas par-
 tes tenues, & calidas, quæ
 in ipsa ablutione segrega-
 tur. Estq; etiam hoc tertij
 ordinis exiccantium, & se-
 cundi refrigerantium, vbi
 quidem elotum fuerit, illo
 tum verò primi.

Gal. 6.

simp. me.

V I R E S.

Succus utilis oculorum medi-
 camentis, valet ad ignem
 sacrum, & vlcera, quæ ser-
 punt. Perniones, pterygia,
 & oris vlcera: mensium a-
 bundantiam sistit: proci-
 duam vuluam cohibet, ci-

Diosc.

tam aluum supprimit, aut potus, aut suppositus, capillos denigrat. Spinæ deco-
 ctum solutos artus fortè committit. Gummi cutis spiracula obstruit, ambustis ex
 ouo illitum pustulas erumpere non patitur.

A P P E N D I X.

Vbi Acacia defuerit, licet eius uice, tum Rhois arbusculę folia, tum lentisci foliorū
 succum, tum etiam hypocistidem medicamenti immiscere.

Diosc.

ACACIA, altera Græcis, Ἀκακία ἐρέα.] Italis, *Acacia secunda*.

Germ. Lin. andros humilis schliefbaum.

ACACIA ALTERA.

FORMA.

Diosc. Prouenit ad Ægyptiæ spinæ similitudinē. longè tamen minor, tenerior, humiliorque: munitur etiā aculeorum vallo, folium habens rutæ. Fert Autumno semen, lenticula minus in siliquis connexis ternum, quaternumve, gustu etiam adstringente. *Matt.* Color siliquis inest aureus, & fulgore quodā respersus, adeò ut in sole auri modo splēdeat.

LOCVS.

Diosc. Prouenit in Cappadocia, *Matt.* & Ponto, quinetiam & in Italia.

QUALITATES,
ET VIRES.

Diosc. Adstringit, cohibet, roborat, & replet, atqui viribus alteri inferior est, & ocularibus medicamentis inutilis.



V I T E X.

GENERA . *Plin. lib.*
Duo habentur genera : maius, *24.ca.9.*
& minus .

Maiores in arborem salicis modo Plin.
effugit. Flores mittit album ibidem.

Maiores in arborem salicis modo
 assurgit. Florē mittit album
 cum purpureo: quæ & candi-
 da vocatur. Minor quam ni-
 gram appellant, ramosa assur-
 git, foliis candidioribus, & la-
 nuginosis, flore est tantum
 purpureo: Non mulrum à sa-
 lice vitilium vsu distat, & fo-
 liorum quoque aspectu, nisi
 odore gratior esset. Ramos ge-
 rit longos, fractu pericaces,
 & semē racemosum vt piper.

Plin.
 ibidem.
 DIOSC.

Nascitur in fluminum ripis, ma Diosc.
ritimisq; locis, asperis, & tor
rentium ripis.

Q U A L I T A T E S .
 Excalfacit , & fíccat ordine ter-
 tio, tenuisq; substantiæ habe-
 tur, cum gustu acris simul &
 adstringens, aperit, resolvit,
 saporẽ inducit, atq; emollit.

Gal l. 6.
simp. m.
 DIOSC.

Semen potū venenatis iētibus, hydropicis, lienosisq; auxilia tur, lacuocat, menses ciet, drachmæ pōdere in vino potum. Genituram exoluit, caput tentat, & saporem affert. Foliorum decoctum, & seminis, mulieribus vuluæ malo

oportunitis opitulatur. Semen cum Pulegio potum purgationes mouet, Instillatur capiti cum aceto, & oleo in lethargo, & phrenitide. Folia suffita, aut substrata venenata fugant: Illita quoq; serpentium moribus auxiliantur, testium duritias cū butyro, & foliis vitium emolliunt: Semen cum aqua illitum facit ad sedis rimas, & cum foliis, medetur luxatis, vulneribusque.

ΕΛΑΕΑΓΝΟΣ, Græcis, ἐλαίαγνος. Germ. Böhmiſche Ölbäume.

ΕΛΑΕΑΓΝΟΣ.

FORMA.

Theoph.
lib. 4. ca.
11. de
pla. hift.

Elæagnos natura fruticosa, cæteris amerinis non abſimilis, figura quidem cæteris proxima. ſed molli, lanuginoſoque folio. flore populi albe, ſed minore, fructu nullo.

LOCVS.

Matt. Nascitur in inſulis fluitantibus.

FACULTATES,
ET VIRES.

Matt. Cùm ſit hæc planta viti ci admodum ſimilis, crediderim ego ſimiles quoq; habere facultates.

APPENDIX.

Nascitur in Boemia plāta, cuius hic imago ſpectatur, quæ quidem notis omnibus Elæagno aſtipulari videtur. verùm cùm baccas oliuæ ſimiles, nō auſim ego affirmare ſtirpem hanc legitimam eſſe Theophrasti Elæagnum, cùm illi ſterilis habeatur. niſi fortasſe idem deceptus ſit, vel eius codex deprauatus, vt multis aliis in locis obſeruauimus.



SALIX, Græcis, ἡ ἰτέα.] Arabibus, *Bulef, Bhulles, Saffaf, sine Calif.*] Italis, *Salice, sine Salcio.*] Germanis, *Vueiden, sine Felbinger.*] Hispanis, *Salce, sine Salgueiro.*] Gallis, *Saulx.*

S A L I X .



G E N E R A .

Plura traduntur genera.

F O R M A .

Quædam in tantam proceritatem assurgunt, ut ex eis fiat perticæ, & pali ad vitium pedamenta, aliæ non tam procerè crescunt, colore rufescentes, sequacis admodum lentitiæ, quæ ligandis cadorum vinariorum circulis commodè fiunt. Has salices Græcas vocant. Rursus aliæ firmiores corbibus, & rusticanae suppellectili experite, aliæ namque sunt minuscule spectabili tenuitate texendis canistris, cistellis, ac calathis aptissimæ. Omnium folia oleagina, oblongaque sunt. Supernè virentia, & infernè candicantia.

L O C V S .

Nascuntur humecto solo, in fluviorum & in fossarum aggeribus.

Q U A L I T A T E S .

Flores exiccant absque morfu: *Gal. l. 6.*
Folia vim spissandi habent. *simp. me.*
Item Salix quandam habet adstrictionem.

V I R E S .

Trita folia cum exiguo pipere, & vino pota ileosis subveniunt sumpta per se, & cum aqua conceptum impediunt. Semē uti-

liter cruenta expuentibus datur. Cortex eosdem præstat effectus. Eiusdē cinis aceto subactus, & illitus callos, & clauos tollit. Succus foliorum, & corticis in malicorio cum rosacco calefactus aurium doloribus auxiliatur. Eorum decocto fouentur utiliter podagrici. Recentia folia adduntur in soporiferis lotionibus. Sparguntur eadem utiliter circa febricitantium lectulos.

Theoph.
lib. 3. c.

13.
Plin. lib.

16. cap.

27.
Matt.

Idem

Gal. l. 6.

simp. me.

Diosc.

Matt.

OLEASTER, aut Sylvestris Olea, Græcis, ἀγριελεία.] Italis, *Oliuo Salvatico.*] Germanis, *Vuilder oelbaum.*] Hispanis, *Zebuche.*] Gallis, *Chêne Sauvage.*

F O R M A .

Matt. Domestica, longe minor provenit: Foliis brevioribus, & aculeatis ramis. Baccæ & si numerosa fecunditate vincant, magnitudine tamen satius cedunt, quin & gustatu adstringentiore sentiuntur.

L O C V S .

Matt. Nascuntur in Hetruria copiosæ. Quin etiam in Dalmatia, & fere in omnibus Adriatici, & Ægei maris Insulis.

Q U A L I T A T E S .

Matt. Adstringunt magis, magisque; refrigerant rami, ac folia quam domestica. *DIOSC.* Oleum vehementer adstringit.

V I R E S .

DIOSC. Folia trita, & imposita ignem facrum, ulceraque; serpentia, Epy-nictidas, carbunculos, & nomas cohibent: quin etiam sordida ulcera repurgant, cutem à capite vulsam congiuntant, oris ulceribus commanducata medentur. Succus ob decoctum eorundem, eundem præstat effectum: Succus peculiariter facit ad sanguinis eruptiones, muliebrique profluviū, prodest vuæ, & pustulis oculorum: Ulcera, & veteres defluxiones sistit, quapropter in collyria additur, & ad palpebrarum erosiones per quam utilis est. auribus subueni, cum exulceratis, tum purulentis. folia illinuntur cœliacis utiliter cū hordeacea farina. Sudor emanans ex conflagrantibus lignis, scabiē, lichenas & furfures, sanat. Baccæ tritæ & illitæ medentur furfuribus, & depascentibus ulceribus. Ossium verò nuclei, ex adipe, & farina scabros ungues eximunt. Olenum sylvestris oliuæ inungitur, colluiturque; utiliter gingivis putrilagine laborantibus, dentes mobiles firmat, & gingivarum fluxiones sistit. Idem in doloribus capitis, utiliter pro rosaceo substituitur, defluentes capillos retinet, tardius canitiem sentiunt, qui eo quotidie perunguntur.

O L E A S Y L V E S T R I S .



OLEA sativa, Græcis, Ελεῖα ἡμερος.] Arabibus, Zaiton, siue Caiton.] Italis, Olivo domestico.] Germanis, Oelbaum.] Hispanis, Olivo, siue Azeytimo.] Gallis, Oliuier.

OLEA DOMESTICA.



G E N E R A .

Antiqui genera decem fecere, nostro autem ævo tria tantum habentur. *Matt.*

F O R M A .

Folia habent oblonga in acutū definentia, crassa, pinguiusque, superne virentia, & inferne albicantia, sapore amaro, & acriusculo; flores mittunt albos, racematim dependētes, è quibus baccae prodeunt primum virides, deinde pallescentes, & postremo purpureæ prius factæ, saturatè nigrescunt. *Idem*

L O C V S .

Seritur in collibus, & in campis. *Idem*

Q U A L I T A T E S .

Oliuæ rami quantum habent adstrictionis, tantum & frigiditatis participes sunt: fructus verò, ubi rectè maturuerit, moderate calidus est: immaturus autem magis tum restringit, tum refrigerat. *Gal. 6. simp. me.*

V I R E S .

Colymbades tritæ, & ambustis illitæ pustulas gigni prohibent, & sordida vlcera purgant. Oliua flaua, & recēs stomacho utilior est, & ventri difficilis: nigra autem & matura stomacho auersatur, & oculis, & dolorē capitis mouet. *Diosc.*

Arefacta autem illitur depascentia vlcera sistit, & carbunculos emarginat. Amurca in cupreo vase, ad mellis crassitudinem decocta adstringit, & ceteros præbet Lycii affectus. Illinitur dentium doloribus, & vulneribus cum aceto, vino, aut mulso. Additur in medicamenta ocularia: infunditur vtiliter, sedis, vuluæ, & genitalium exulcerationibus. Iumentorum scabiem sanat, cum lupinorum, & Chamæleontis herbæ decocto. Cruda, recensq; podagricis, & articulorum doloribus auxiliatur, peruncta in villosa pelle, & imposita hydropicorum tumores reprimat.

QVERCVS, Græcis, Δρῦς.] Arabibus, Chullot, Hullet, siue Belut.] Italis, Quercia.] Germanis, Eychbaum.] Hispanis, Robre.] Gallis, Chesne.

QVERCVS.

FORMA.

Matt. Foliis est oblongis, firmis, robustis, per ambitum vtrinque sinuatis, caudice crasso, cortice rudi, scabroque: in ramis vero læuiori. Materie robusta, dura, graui, compacta, firmaque. Glandifera est arbor, & præter glâdes gallas quoque producit cùm maiores, tum etiam minores, quas omphacitides vocant. Alios quoque fert fructus, de quibus Theophrasto lib. iij. cap. viij. & ix. de plantarum historia abundè scriptum est.

LOCVS.

Idem Nascitur vbiq; ferè in syluis.

QUALITATES.

Gale 6. simp. me. Quæcunque sunt in hac arbore partes adstringentis qualitatis sunt participes. Sed cæteris adstringentior est, quæ in trunci cortice membrana subest, tum quæ sub glandis ipsius calyce, ea videlicet, quæ fructus carnem conneſtit: folia etiam non instrenuè desiccant.

VIRES.

Diosc. Corticis decoctum, qui libro crassiori subest; quin etiã illius, qui glandium putamini succedit, datur vtiliter potandum dysentericis, cæliacis, & sanguinè reiicientibus.

Eadem in pecto supposita vteri fluxiones cohibet. Aqua à tenerrimis foliis distillata, sistit pora Iecorarias fluxiones, renū calculos comminuit: & alba mulierū profluvia cohibet. Datur quoque dysentericis, & sanguinè reiicientibus. Datur & in pestilentialibus febribus, q̄ aduersus venena non parū valeat. Recentia folia ventriculi ardorem tollunt, si super lingua teneantur. Aqua, quæ in marcescentium quercuum cavitatibus reperitur scabiem omnem vlcerosam sanat: Glandes urinam cient, & resistunt deuorata venenatorum morſibus. Intrita crudæ inflammationes leniunt.

Matt.



FAGVS, Græcis, Φηγός.] Arabibus, *Chinars, siue Chiacas.*] Italis, *Faggio.*] Germanis, *Buchbaum.*] Hispanis, *Haia.*] Gallis, *Fau.*

FAGVS.



FORMA.

Foliis est Carpini vulgaris *Matt.* non absimilibus, grandioribus tamē, læuioribus, minusq; rugosis: Fructus calyculo includitur rotundo, quadatenus echinato, hispidō, ac scabro, nucleo intus triāgulari, tunica castaneę simili circūtecto: Nucleus albicat, Sapore castanearū subdulci, & adstringente: Materies dura, sed nō admodum firma: Arbor in magnā assurgit proceritatem, ramis grandioribus ac patulis.

LOCVS.

Prouenit in syluis, tam in *Matt.* planitie quàm in montibus, & collibus.

QUALITATES.

Valētius adstringit, quàm *Gale. 6.* quercus, folia autem *simp. me.* renella, non instrenuē desiccant.

VIRES.

Folia trita, & illita tumoribus profunt, & imbecillas membrorum partes corroborant. Folia *DIOSC. Matt.* esitata labiorum, gingiuarūq; vitiis mirificē auxiliātur. Glandis fagineæ cinis renum calculis vtiliter illinitur. Huius pabulo maximē delectantur glires, & aues quę rostro sunt validiore.

ILEX, Græcis, Πρίνος.] Arabibus, (Armas, siue Barbes.) Hispanis, Azina, siue Azinbeira.] Italis, Elice, siue Leccio.] Germanis, Sthenpalmen.] Gallis, Yeuse.

G E N E R A.

Columel. Duum est generū, Alterum folio spinoso: Alterum sine spinis.

F O R M A.

Matt. Arbor est spectatæ proceritatis, cortice in rufum nigricante, materiæ admodum densa, graui, acrobusta, subrufescētisq;. Foliis est laurinis, perpetuò virescentibus, sensimque in toto ambitu, serratis, aut spinosis, & auersa parte albicantibus, robustis, ac duris. Glâdes fert quernis longè minores.

L O C V S.

Matt. Spinosa in Hispania frequentissima: Quæ verò spinis caret, in quam plurimis Hetruriæ syluis habetur.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 6. Nō differt qualitibus, à quercu, nisi quòd valentius adstringit.

V I R E S.

Diosc. Glandes, quernas viribus antecellunt.

Matt. Radicis cortex cum aqua coctus donec mollitus intabescat, & tota nocte illitus capillos denigrat, prius Cimolia terra purgatos. Cetera, cum quercu, & fago cōmunia sunt. Rubentes pilulæ, quas præter glandes fert, tritæ, cum aceto vulneribus recentibus, & cæuentis oculis vtiliter imponuntur.

C E N S V R A.

Non rectè sentiunt, Columellæ testimonio, qui Plinij, & Theophrasti autoritate freti putant, haud legitimam esse Ilicem, quæ foliis spinosis non prouenit.

I L E X.



Shinniray.
Shinniray.

SVBER, Græcis *φελύς*.] Italis, *Sugaro*.] Germanis, *Pantoffelholz*.

Bapt Holz.

SVBER.



GENERA.

Alterum foliis est prolixioribus, acuminatioribusque, alterum vero latioribus, brevioribus, & per ambitum serratis. *Matt.*

FORMA.

Arbor est perpetuæ viriditatis, fructu, & folio Ilicis, sed crassissimo cortice vestitur, atq; Ilici magnitudine cedit. Glandes quoque profert iligneis pares, paulo tamē minores, deterioresq;.

LOCVS.

Latifolium in Romano agro frequentissima nascitur. Quod verò prolixioribus folijs est, in agro Pisano puenit in Italia. *Idem*

QUALITATES.

Idē præstat quod Ilex, & eodē ferè modo adstringit. *Idem*

VIRES.

Suberis cortex tritus, ex aqua calida potus sanguinem ex vtralibet parte fluentem sistit. Eius- *Idem*

dem cinis ex vino calido haustus sanguinem excreantibus mirificè medetur. Eius glandes quemadmodum cæterarum glandiferarum arbores, in puluerem tritæ, potèq; drachmę vnius pondere ex succo plantaginis auxiliantur omnibus alui, & vteri fluxionibus. Decoctū earundem haustum datur aduersus venena. Illinuntur eedem cum axungia maleficis vlceribus. Calyx quo glandes in arbore sustinentur, easdem possident facultates, sed magis adstringunt.

SVBER, Angustifolium, Græcis, φελλὺς στενοφύλλον. *err. primo φελοφύλλον*

SVBER ALIVD.

FORMA .

Matt. Foliis est angustioribus, longioribus, acutioribusque. Cætera verò cum priori communia sunt.

LOCVS .

Idem Nascitur plurimum in Romano agro.

QUALITATES .

Idem Qualitatibus, ac temperamento nihil ab altero distat.

VIRES .

Idem Iisdem quoque viribus pollet, quibus & alterum genus .



PHELLODRYS, Græcis pariter φέλλοδρυς.] Italis, præsertimq, Hetruscis,
Cerrofugaro. Germ. Waldringey geyßlerfe auß waldijß lande.

P H E L L O D R Y S .



F O R M A .

Caudicem habet suberi *Matt.*
non absimilem, & fo-
lia & glandes quercui
sive cerro similia .

L O C U S .

Nascitur in agro Senen- *Idem*
si in montanis sylvis .

Q U A L I T A T E S ,
E T V I R E S .

Non differt suis in facul- *Idem*
tatibus ab aliis glandi-
feris .

CASTANEAE, Græcis Κάστανα ἢ καρδιάνα κάλανοι ἢ δῖος βάλανοι ἢ λυπῖμα.] Arabibus, *Sadianalach Castal, & Stebulot.*] Italis, *Castagne.*] Germanis, *Kesten.*] Hisp. *Marones.*] Gallis, *Caistaignes.*] Boemis, *Kaistany.*

CASTANEAE.

G E N E R A .

Matt. Domesticæ, & Sylvestres. In domesticarū genere habentur maiores, quæ marones vocantur, & minores, quæ peculiariter Castaneæ vocantur.

F O R M A .

Matt. Arbor est procera, amplaque, foliis oblongis, iuglandis similibus, uenosioribus tñ, & per ambitū fimbriatis, fructu echinato: nuce intus solida, altera parte plana, altera gibbosa triplici tegminis ambitu septa, membrana primū tenui, crispaque, & amara mox lento ac conaceo cortice, demum echinato calyce, alba intus pulpa, ac dulci. Ligni materies solida, ac diuturna. L O C U S .

Idem Mōribus, & opacis gaudet magis, q̃ apricis, & capestribus.

Q U A L I T A T E S .

DIOSC. Adstringunt, cum ipsæ nuces, tum quoque membrana subrufescens quæ carnē ambit.

V I R E S .

DIOSC. Dantur contra venena, & praesertim contra Ephemerum. Itē ad tussim antiquā: prunis inassatæ, & cum saccharo deuoratæ. Flatus gignunt, & cōcoctū difficiles sunt, sed ubi rectè concoquuntur, memorabile alimentū præbent,

Gal. lib. de cib. 60. Et mali succi. crudæ tamen magis nocent. Sistunt tum alui, tum ventriculi fluxiones. Dantur cruenta expuentibus. Tritæ cum sale, melleq; subactæ, imponunt vtiliter rabidorum canum moribus, & cum polenta, & aceto illitæ mammarum duritias excutunt. Venerem excitant, & caput grauant. Tenuis earum membrana ex vino austero pota duarum drach. pondere, sistit valenter immodicos alui fluores. & sanguinis reiectiones, quin etiam cum pari ramentorum eboris pondere, alba utriusque profluvia, ex Nymphaeæ aqua potæ.



CASTANEAE EQVINAE.

Germ. *Eggenbaum*. von Constantinopel

F O R M A .

Arbor est spectatae proce *Matt.*

ritatis, folio pēta-
 phylli, senis tamen diuisu-
 ris: & ricini folio lon-
 gè grandiore, longo, te-
 nuiq; pediculo niten-
 te. Echinos fert in ca-
 cumine magnitudine
 nostratibus æquales,
 subrufo colore, verum
 duriore ac crassiore, a-
 culeis raris sed robu-
 stis, ac firmis. Singu-
 li singulam includunt
 castaneam, nostrati-
 bus haud dissimilem,
 crassiorem tamen, ro-
 undioremque: Corti-
 ce subnigricante, præ-
 terquam anteriori par-
 te, ea enim albicat, ma-
 cula cordis figuram
 præferente. totus i-
 dem robustus est, nul-
 la alia intus tunica,
 quæ carnem ambiat:
 Sapor pulpe nostrati-

bus ferè similis habetur, sed dulcior paulò, nec adeo mandenti-
 bus gratus.

L O C V S .

Constantinopoli primum ad me allatæ sunt.

Idem

Q U A L I T A T E S .

Adstringunt: & flatus deuoratae pariunt.

Idem

V I R E S .

Equinae vocatae sunt, quod anhelosis, & tussientibus equis deuoratae
 sint salutare. Dantur quoque sang. reiicientibus.

Idem

GALLA, Græcis κκκς.] Arabibus, *Hases sine Hafus*.] Italis, *Galla*.] Germanis, *Galloëpfel, sine Eychöëpfel*.] Hispanis, *Galla & Bughala*.] Gallis, *Noix de galle*.] Boemis, *Galles aneb bublinki*.

GALLA.

GENERA.

Diosc. Altera omphacitis, altera plana.

FORMA.

Diosc. Omphacitis, parva est, rugosa, solida, nullo foramine peruia, vixq; acino magnitudine æqualis. Plana nucis iuglandis magnitudinem explet, corrice lævi fungosa medulla, perforataque, & anteriore parte coronata.

LOCVS.

Plin. Nascuntur gallæ, in omnibus glandiferis arboribus. Verùm in quercu copiosiores habentur, ac vtiliores.

QUALITATES.

Gal. 7. *simp. med.* Omphacitis exiccat ordine tertio, & refrigerat secundo, acerbum admodum est medicamentum, frigidum, terrenumque: repercutit fluxiones, & partes laxas contrahit, ac constringit. Altera, quæ maior est & flaua, desiccatur & ipsa quidem, sed tantò minus, quantò minus acerbæ qualitatis est particeps.

VIRES.

Diosc. Gallæ omphacitides trite excrementas in carne, fluxionesq; gingivarum atque oris ulcerationem cohibent. Nucleus dentium cauernis inditus dolorem sedat. Crematæ vino, aut aceto extinctæ, sanguinem supprimunt. Decoctum eorum ad vuluæ procidentia, fluxionesq; in deflectionibus vtile, capillos denigrant aceto, aut aqua maceratæ. Illinuntur vtiliter dysentericis, celiacisq; cum vino, aut aqua, ac etiam potui dantur. Integrarum decoctum, potu iisdem auxiliatur affectibus. In summa, ubi adstringere, siccare, ac sistere sit opus, præstantissima sunt auxilia, sedis inflammationes sanant, & procidentia cohibent.



RHVS, Græcis ρόςος.] Arabibus, *Sumach*, *Rosbar Sardisticos*, seu *Rosaidi*
cos. Italis *Rhus* siue *Somacho*.] Germanis, *Sumach*.] Hispanis, *Su-*
mach, & *Sumagre*.] Gallis, & Officinis, *Sumac*. *Verberbaum*.

R H V S.



F O R M A .

Arbustula est binum ferè ^{Diosc.}
 cubitorum altitudine,
 foliis oblongis, subru-
 bētibus in ambitu ser-
 ratis ilicis modo. Bo-
 tros profert acino qua-
 dantenus lato vuarū
 gracilium, densos, ma-
 gnitudine terebinthi.

L O C V S .

Nascitur in montibus in ^{Diosc.}
 ter saxa.

Q U A L I T A T E S .

Adstringit, & desiccat or- ^{Gal. 8.}
 dine tertio, & refrige- ^{simp. me.}
 rat secundo.

V I R E S .

Foliorum decoctum ca- ^{Diosc.}
 pillos denigrat, atque
 etiam vtiliter dysente-
 ricis infunditur, & po-
 tandum propinatur. In-
 stillatur auribus puru-
 lentis, folia ex aceto,
 aut melle illita gangræ-
 nas, & pterygia cohi-
 bent. Semen eisdem
 præbet effectus: cælia-

corum dysentericorumq; cibis inspergitur. Fracta, desquamataque,
 ac sugillata, illitū ex aqua ab inflammatione tuetur. Linguae asperita-
 tes cū melle abstergit, candida fœminarum profluvia sistit, hēmor-
 rhoidas sanat addito querno carbone. Gummi quod è trunco prosi-
 lit, cauis dentium inditum dolores finit. Recentium vuarum suc-
 cus, & seminis cortex, eadem omnia possunt. G iij

VIBURNUM, Italis, quibusdam Viburno, quibusdam verò Lantana.] Gal-
lis, Viorne & Maußane . Germ. Eslingbaum.

F O R M A .

VIBURNUM.

Matt. Ramis exit digitali crassi-
tudine, bicubitalibus,
foliis ferè ulmeis, cras-
sioribus & incanis sē-
sim p ambitū serratis.
Flores edit albos, um-
bellatim coherentes,
à quibus acini prodeū-
tentium modo pres-
si, qui primò rubescen-
tes, ultimò nigrican-
tes fiunt: Virgē adeo
lentæ, flexilesq; sunt,
ut ad fasces colligan-
dos, pidoneq; habeant.

L O C V S .

Idem Nascitur in sepibus, frute-
tis, & incultis collib⁹.

Q U A L I T A T E S .

Idem Folia aspera sunt, & gu-
stu adstringentia, fru-
ctus, ubi ad ultimam
peruenit maturitatē,
aluum exoluit.

V I R E S .

Idem Foliorum decoctū, ex vi-
no austero paratū, ua-
cillantes dentes con-
firmat, & gingivarum
rheumatismos cohibet, atqui longè magis valebit, si cum oliuæ fo-
liis decoquantur in posca: Gargarissatur idē ad Columellę prociden-
tiam, & ad faucium fluxiones. Acini immaturi in puluerem triti dan-
tur ad alui fluxiones. Paratur è radicum corticibus sub terra mace-
ratis, & diu tussis viscum ad aucupia haud inutile.

C E N S V R A .

Nō desunt, q̄ plantā hanc Viburnū minimè esse cōtēdāt, sed decipiunt.



COTINVS, Italis, Scotano, & Roso . *Græc. Endrobaimb.*

COTINVS.

FORMA.

Planta est fruticosa, folio *Matt.* saq; ramis tenuibus, numerosisq; , cortice rufescente: foliis densis, Terebinthi rotundioribus, ac latioribus, graueolētibusq; , materie adeò flaua, ut ad lanificia coloranda maximè insectoribus expetatur. Gerit in ramusculorum cacumine papposam quandā congeriem, colore ex candido rufescente, in qua siliquę oblongę hyperici ferè modo proueniunt.

LOCVS.


Prouenit copiosa in Tridentino agro, Veronēsi, & in aliis non paucis Italiae locis. & præsertim in Apennino monte. *Matt.*

QUALITATES.

Vis illi adstrictoria insignis, exiccans, cohibensque. *Matt.*

VIRES.

Foliorū decoctū in collutionibus adhibitū auxiliat̃ oris, & lingue vlceribus, quinetiā columnellæ, & faucium fluxionibus. Valet idē ad genitalium quoque vlcera, si eo sæpe abluantur. Adduntur folia in defessionibus, quę ad menses cohibendos parantur. Siccorum foliorum ac ramusculorum puluis, ventri prius aceto rosaceo illito ad motus, alui fluxiones quascunque compescit. Expetitur tota planta coriariis admodum ad suas spissandas pelles. *Matt.*



PALMA Græcis, *ελαιξ.*] Arabibus, *Machla, siue Nachal.*] Italis, *Palma.*] Germanis, *Dattelbaum.*] Hispanis, *Palmera.*] Gallis, *Palmiers, siue Dattiers.*

P A L M A .

G E N E R A .

Theop. Mas est & Fœmina: Vtraq; fructifera: quin etiam, & humilis palma habetur.

F O R M A .

Matt. Arbor Palma est procera, caudice squamoso ramos in cacumine tantum fundit in orbem actos cacuminibus ad terram pectatibus: foliis longissimis, duplicatis gladij figura: Flores profert numerosos, tenuibus qui bu dam villis appensos, in magni racemi modum, Crocinis facie similes, sed multò minoribus. Ij anteaquã emergant magno quodam concluduntur in uolucro, quod palmam elatè vocant, quo tandem dehiscente emergunt, & panduntur. Hinc subinde Dactyli prodeunt, qui per Autumnum vnà cum ficibus maturescunt, rufo colore, nucleo intus durissimo, oblongo, canaliculatoque.

L O C V S .

Matt. Nascuntur præstantiores in Iudæa, & Ægypto: Cypro, Lybiæque, & in aliis quoq; Europæ regionibus. Sed ibi rarò fructus ad maturitatem perducunt.

Q V A L I T A T E S .

Gal. 8. simp. me. Est adstrictoriæ facultatis omnibus suis partibus, at fructus eius, & maximè dulcis, nō paucam obtinet caliditatem.

V I R E S .


Diosc. Contra alui fœminarumq; profuua in vino austero bibitur. Hæmorrhoidas sistit, vulnera illitu glutinat. Dactyli dolore capitis inferunt, copiosiores in cibo inebriant. Sicciores sanguinem excreantibus, stomachicis, & dysentericis vtilis in cibo: Medentur esu faucium asperitati. Nuclei in crudo fictili ad albedinem vsq; cremati, Spodij vicem supplent. Vim adstringendi habent: Valentq; contra oculorum vnam, & pustulas: corporis excrescentias cum vino reprimunt, & vlcera ad cicatrices perducunt. Auxiliantur deuorati fœminis albo vteri profuuo laborantibus, & præsertim si exempto osse infriantur Eboris Scobe, Margaritis, corallio rubeo, & deinde sumantur à ieiunis quotidie tres aut quatuor.

Ma tt.



PALMA ELATE, Græcis, φοίνιξ ἐλατη.] Italis, *Inuoglio*, ouer *Corteccia di dattili*. Germ. *Dattelfrucht*.

PALMA ELATE.



FORMA.

Fructus palmarū adhuc *Matt.*
 florētium inuolucrū
 est magnum puluina
 ris faciem repræsen-
 tans, extremitatibus
 in acutum desinenti-
 bus, colore subrufo,
 fragili materie, ac te-
 nui. Dehiscit hæc suo
 tempore, & numero-
 sos pādīt flores, in ra-
 cemi magni modum,
 è quibus dactyli pro-
 ueniunt, parum race-
 mosi.

LOCVS.

Nascitur inter primos *Matt.*
 palmę ramos.

QUALITATES.

Vis ei adstrictoria, & *Gal. l. 8.*
 exiccans. *simp. me.*

VIRE.

Depascētia vlcera sistit. *Diosc.*

Luxatos artus com-
 mittit, prodest illita
 præcordiis, stomacho
 & iocinoti, mista con-
 ferētibus cataplasma-

tis. Eius decoctum subinde detersum, capillos denigrat. Idem da-
 tur potandum congruè, renum, vesicæ, ceterorumque viscerum vi-
 tiis. Vuluæ, ac ventris fluxiones sistit. Scabiem, cum Resina, & cera
 sanat, si x x. diebus recens apponatur.

PALMA Humilis, Græcis, χαμαιπρίζες.] Italis, *Palma minore.*] Siculis,
& Neapolitanis, *Cefaglioni.* Germ. *blauwe Dattel.*

FORMA.

PALMA MINOR.

Matt. Crescit sesquicubitali lō
gitudine, foliis ceteris
absimilibus, sed bre-
uioribus longè, & an-
gustioribus. Flores e-
dit ex obliquo capilla-
cea quadā coma emer-
gētes, è qbus baccæ ra-
cematim pdeūt. Pars
radici ppingor in glo-
bū extuberās internū,
germē quoddā qđ cere-
brū vocāt numerosis
inuolucris circūseptū
habet, tenerrimū, sapi-
dū, & ori gratissimū.

LOCVS.

Matt. Nasct̃ ī Sicilia, & Creta,
& aliis quoq; region.

QUALITATES.

Id m. Adstringenti pollent fa-
cultate. Itaque robo-
rant, & cohibent.

VIRE.

Idem. Germen quod cerebrum
vocant estur secundis
mensis pro bellarij cū
pipere, & salis modico,
perinde, ac cardu-
us, & cinara: Est. n. sa-


pidū, & ori gratissimum. Id (vt aliqui aiunt) ad vñerem excitādam
præstare haud parū creditur: folia præstant, ad sportulas, tegetes, &
capitis umbracula: Rami verò vna cum foliis ad scopas parādas, p
verrendis domibus, sunt. n. nō solū ad hoc peridoneæ, sed ēt vtilēs,
q nō cōterantur nisi tempore longo. Cætera cum maiori palma cōia
habet. Bacca sua adstringēti vi, dantur cōtra oēs corporis fluxiones.



Arabibus, Italis, Siculis, Cipriis, Musa.

Germ. Lin art d Dattly aus Egypten.

M V S A.



F O R M A.

Planta est vnicaulis quinū *Matt.*

ſenumve cubitorum longitudine, folio arundineo, quod tamē per quā longo latoque ambitu ſe diffundit, adeo vt tricubitali longitudine: latitudine verò ſeſquicubitali ac ēt quandoq; grandiore. caulis ſquamoso veſtitur cortice arundinū ferē modo. E vertice germen emergit molle cubitali lōgitudine a quo alia ab origine ad ſummū pdeunt germina, è quibus fructus quidam oriunt, cucumeris mediocris magnitudine, cortice ſici: Subſtantia pulpæ conſiſtit Melopeponum modo, nullo intus nucleo, aut ſemine, ſapore cum quadā inſipiditate dulci.

L O C V S.

Nascitur in Syria, Ægypto, *Idem* Cypro, & Sicilia.

Q V A L I T A T E S.

Excalfacit in medio primi, & in fine eius humectat.

Serap.

V I R E S.

Fructus eſtur in cibis. ſed parum alit. Priuatim prodeſt thoracis, pulmonis, & veſicæ ardoribus, aluum emollit, verū liberior eius vſus ſtomacho aduerſatur, quin etiam Iecur obſtruit: Fœtum in vtero alit, affectis renibus opitulatur, vrinam ciet, & Venerem ſtimulat.

Serap.


Musæ imaginem cum
fructu iam maturo,
hic etiam excudi cu-
rauimus, vt rei plan-
tariæ studiosis cumu-
latissimè satisfiat.

*Dattelfrucht
auch aus
Egypten.*



CYCIOPHERA, Græcis, Κουκιοφόρον.] Italis, *Cuciofera*. Germ. *perlsüßer und Indianiß*
Dattelfrucht arth

CYCIOPHERA .



F O R M A .

Palmam tum caudice, tum *Theoph.*
 foliis, hæc plâta refert: ve- *lib. 4. ca.*
 rum a Palma differt, q̃ hæc *4. de*
 simplex indiuiduaq; assur- *pl. 2. hist.*
 gat, illa verò cùm aliqua-
 tenus adoleuit, scindatur,
 & bifida fiat: iterumque
 horum vtrunque pari mo-
 do diuidatur, & subinde
 virgas breues & multas
 proferat. ¶ Nos tantū fru- *Matt.*
 ctum vidimus. quo fit vt
 plantæ imaginem hic ostē-
 dere nequeamus. ¶ Fructū *Theoph.*
 itaq; profert, magnitudi-
 ne, figura, & succo singula-
 rē. Quippe magnitudine,
 ferè qua manum impleat,
 figura rotundum, colore
 flauicantem, succo dulcē,
 & ori gratissimum, non ra-
 cematim congestum, vt in
 Palma, sed per singula di-
 scretū: nucleo magno ve-
 hemēter duro, ex quo anu-
 los detornant, quibus in
 versicoloribus stragulariis
 vinculis vtūtur. Materies
 à Palma plurimum distat.

Altera enim rara corpore, neruosa, & viridis, altera spissâ, grauis,
 carnosaque, & cesa crispa admodum atque dura.

L O C V S .

Prouenit copiosa apud Persas, & Indos.

Plin.

Q U A L I T A T E S , E T V I R E S .

Fructus non differt admodum à dactylorum facultatibus.

Idem

MALVM Punicum, Grecè *φοιδά*.] Arabicè, *Cuman*, *Ruman*, *sive Roman*.] Italicè, *Melagrano: sive Pomo granato*] Germanicè, *Granatoepffel*.] Hispanis, *Granadas, sive Romanas*.] Gallis, *Pomes de Grenades, aut Mygraines*.

G E N E R A .

Matt. Domesticum alterum, alterum Sylvestre: Domesticorum tria genera, alia enim dulcia sunt, alia acida: vinosa verò nonnulla.

F O R M A .

Idem Arbor quæ Punica poma profert minime procera est, foliis fere myrti, sed maioribus, rubro inhaerente pediculo. Rami illi sunt flexiles, aculeatiq; Flores punicei, calathi modo patuli, ore stellatim circumsepto, è quo folia prominent tenuia coccineo colore: agrestis papaveris æmula, granulis quibusdam capillamentis appensis, ut in Rosa: Poma cariaceo vestiuntur calyce, exterius rufo, interius flavo: innumeris granis referta, succosis vinosisq;, ossiculo intus latente, quæ intercurrentibus flavis, tenuibusq; membranis, miro quodam natura ordine distinguuntur. Ligni materies flava, cinereo libro vestita.

L O C V S .

Idem Scruntur in hortis, Vincis, & Viridariis. Sylvestres sponte nascuntur in collibus, & maritimis locis & aridis.

Q U A L I T A T E S .

Diosc. simp. me. Malum Granatum omne adstringentem facultatem obtinet. Acida tamen plus adstringunt, quàm vinosa. Et hæc magis quam dulcia. Acini longè magis adstringunt, ac exiccant, quam vinum. Et his valentius quoq; putamen, & cytini. Vinum autem præter adstringentem refrigerat, & exiccant.

V I R E S .

Gal li. 8. Dulcia stomacho utiliora, sed febricitantibus obsunt. Acida æstuantem stomachum iuvant, & urinam cient. Vinosa mediam sortiuntur naturam: Acinorum nuclei acidi punici, insolati, & obsoniis in pulverem sparsi fluentem aluum & stomachum sistunt. Dantur utiliter sanguine ulceri, Cytini & Balaufti sanguinolenta glutinant: & humida gingivarum vitia curant, & eorum decocto dentes commoti firmantr. Enterocellis quoq; utiliter illinantur. Malicorium hæc omnia præstare potest. Radicis decoctum potu latus ventris tinea pellit. Exprimatur è sylvestribus cytini succus, qui insolatus, hypocistidis vicem explet, Malicorium ex vino decoctum, ac illitum perniones sanat.

MALVM PVNICVM.



MYRTVS Græcis, *μυρσίνη*.] Arabibus, *Aes*, & *Alas* *sive* *As*.] Italis, *Myrto* *Mortina* & *Mortella*.] Hispanis, *Murta*, *sive* *Raiam*.] Gallis, *Meurte*.
Comm. Vossij Gindolbiv.

MYRTVS.



G E N E R A .

Duo Satiuum, & Sylvestre: Satiui *Matt.*
 duplex est genus, candidum, &
 nigrum: Extant quoque alia
 duo genera nempe Exoticum,
 & Tarentinum.

F O R M A .

Satiua facile in arborē adolefcit, *Idem.*
 at sylvestris magis fruticat. Fo-
 liis vtrāq; sunt oblongis, cras-
 sifusculis, firmis, odoratis, ī acu-
 tum desinentibus: ramis obse-
 quiosis; floribus cādidis, nume-
 rosis, intus capillamentis, exi-
 mio odore. Satiuarum utraq;
 genus baccas fert oblongas, a-
 grestes oleas quadantenus refe-
 rētes: & multo sylvestribus ma-
 iores, parvis numerosisq; intus
 nucleis.

L O C V S .

Satiua in hortis, viridarijs, Vi- *Idem.*
 neis, & aucupijs feritur, sponte
 vero nascens Maritimis pluri-
 mum prouenit locis, & circa a-
 mænorum lacuum ripas: sed in
 Hetruria in syluosis quoq; col-
 libus virefcit.

Q U A L I T A T E S .

Constat ex contrariis substantiis, *Gal. 7.*
 vincit tamen in ea frigidum ter- *simp. me.*
 reum, habet verò & tenue quid-
 dam calidum, vnde valenter de-
 ficcat.

V I R E S .

Semen datur sanguinem expuenti *DIOSC.*
 bus: & in vesicæ erosionibus.
 Baccarum vinum Stomacho vti-
 le vrinam cit, & prodest potum
 ad phalangiorum, & scorpionū
 ictus ex mero. Idem præsumptū
 crapulam arcet. Præstat idem et

semen, quo illito fluentes capilli continentur. Foliorum decoctum ad infestationes vbi adstri-
 ctione opus sit, plurimum præstat. Foliorum farina ex vino illita luxatos artus iuuat, inflam-
 matos ictus, quin & testium inflammationes. ¶ Myrteum condimentum languidos ventri-
 culos roborat, idcirco & cæliacis, & dysentericis vtile. Frondes, itemq; baccarum semen tri-
 tum contra fungorum strangulationem mirificè præstant. Bacca quoquo modo hausta, aut
 deuorata cor corroborant, & eius tremori mirificè conferunt.

Matt.

MYRTVS Tarentina.] Italis, *Mortina Tarentina*.

Græc. *Tarunijz Lindelbr.*

MYRTVS TARENTINA.

FORMA.

Matt. Folio est nostrate longè minore robustioreq; : fructu copiosiore, sed minusculo: & in summitate pluribus apicibus coronato. colore ex nigro purpurascente, minutis, crebris, albicantibusque intus ossiculis: floribus nostratis similibus.

LOCVS.

Idem Prouenit copiosa in Apulia circa Tarentum. vnde illi nomen.

QUALITATES,
ET VIRES.

Matt. Non differt viribus, qualitatibusq; à nostrate.



F O R M A.

Folio est nostrati haud *Matt.* absimili, dilutior tamen, acuminatio copiosioreque. & adeò denso, ut eo rami ubique stipentur. Fructū fert oblongum, è longoq; pediculo dependentem, seminibus refertum, flores albicant, ut in cæteris generibus.

L O C V S.

Seritur in Italia in hortis, & viridariis, tanquam peregrina ad topiaria opera contendenda. *Matt.*

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Non differunt viribus, *Matt.* & qualitatibus à cæteris generibus. Folijs siccis utuntur Coriarij non solum huius

sed omnium Myrti generum ad spissanda, crispandaque coria.



MYRTILLVS, Græcis *χαμαίμυρτος*.] Italis, *Myrtillo*.] Ananienſibus, *ca lauezza*.] Germanis, *Eidel beer*.

MYRTILLVS.

FORMA.

Matt. Frutex eſt cubitalis, cau dice duro, ramis tenuibus, virēſcētibus- que, folijs myrti minoribus, robuſtis, ſen ſimq; pambitū ſerratis: flores edit tintinnabuli effigie, inter folia è petiolis dependētes, colore ſub puniceo, ruſo intus ſtamine: è quibꝰ bac cæ ſubnaſcūtur, Myr ti non abſimiles, ſed paulò minores, nitro ſæ & auſteriuſculæ: & ſumma parte um bilicatę, caruleo colore ad nigrum inclinante.

LOCVS.

Matt. Prouenit in montibus, & ſyluis.

QUALITATES.

Idem Fructus refrigerat, exſicc at, roborat, reprim it, & cohibet.

VIRES.

Idem Dantur bacce cūm re centes, tum quoque ſiccæ deuorandæ dyſentericis, & celiacis. Edun tur quoque æſtate fragorum vice à paſtoribus. Nam auſteriuſculæ cum ſint, & vinoſę ſitim extinguunt, & non ingratus ſunt cibus. v- ſurpantur ab infectioribus ad coloranda ſtamina, caruleo colore; ac etiam à pictoribus: Germani autem Pharmacopæi ijs paſſim vtun- tur Myrti baccarum uice, cūm ijs deſtituantur.



CERASA, siue Cerasia, Græcis, κερασία.] Arabibus, *Sarasie*.] Italis, *Cirege*.] Germanis, *Kirschen*,] Hispanis, *Ceresas*.] Gallis, *Cerises*.

CERASIA.



G E N E R A.

Diuerſa ceraſorum ſunt genera: nam alia dulcia, alia ſub amara, alia auſtera, alia acida, alia inſipida habentur: quin etiam alia domeſtica, alia ſylueſtria.

Matt.

F O R M A.

Arbor folia fert, meſpilo latiora, per ambitū ferrata: flores albos, racematim prodeuntes, è quibus rubentes oriuntur baccæ, è longis pediculis dependentes. & prona parte diuiſæ, duro intus oſſiculo, piſi magnitudine, in quo nucleuſ includitur. Ligni materies fibroſa, compactaque, cortice læui, & inuolucris pluribus referto.

Idem

L O C V S.

Domeſtica Ceraſus in hortis, vineis, & viuidariis ſeritur. Sylueſtris in ſyluis prouenit, ac etiam in vallibus.

Matt.

Q U A L I T A T E S.

Quæ dulcia ſunt, magis quæ in inteſtinis ſunt, ſubducunt, ſed ſtomacho minus vtilia habentur. Contra verò auſtera: Quæcunque verò acida ſunt pituitofis excrementoſiſq; ſtomachis conueniunt: ſiquidem auſteris magis deſiccant, & non nihil etiam incidunt. Sylueſtria autem cæteris adſtringētiora ſunt.

Gal.li.7.
ſimp.me.

V I R E S.

Viridia alium leniunt: ſicca uerò cohibent. Gummi quod è trunco emanat, communem cum omnibus viſcoſis, & mordicitate carentibus medicamenti facultatem obtinet, quæ ad arterias exaſperatas accommoda eſt. Propriè autem calculis vexatos ex vino potum adiuuat. Idem cum vino potum veteri tuſſi medetur, colorem commendat, viſum exacuit, & appetentiam incitat.

DIOSC.
Gal. loco
civato.

DIOSC.

CERASA racemosa. Hetruscis Ciregie grappolose : cæteris verò Italis,
Ciregie del Grasso. Germ. *Walde rauhbeinige Kirsche*.

F O R M A.

Matt. Sunt in hoc genere quædam, quæ vno tantum pediculo, ternæ quaternæve baccæ contineantur, quædam verò quæ racematim in vno modum proueniant, ut palam est ex appicta hic imagine.

L O C V S.

Habentur peculiariter in hortis, vineis, ac viridariis.

V A L I T A T E S
E T V I R E S.

Non differunt ab aliis cerasorum generibus.

CERASA RACEMOSA.



CERASA austera. Romanis, Visciole. Senensibus, Ciregie amarine. in cæteris verò Italiae locis, Marasche. Germ. *Wirsfel*, *Päuer Girsfel*.

CERASA AVSTERA.



G E N E R A .

Varia, diuersaq; sunt ho *Matt.*
rum cerasorum gene
ra, quæ cunctis notio
ra sunt, quàm à me
describi possint.

L O C V S .

Habentur in hortis pas *Idem*
sim & viridariis atq;
etiam vineis.

F A C V L T A T E S .

Refrigerant, exiccant- *Idem*
que: quin etiam ad-
stringunt, roborant,
& cibi appetentiam
excitant.

V I R E S .

Nō ita facilè deuorata, *Idem*
vt dulcia, corrup-
puntur in uentricu-
lo, ideoq; febricitan-
tibus, ac sitientibus,
facilè conceduntur à

Medicis Germanis: à pediculis repurgata uis maturis admiscen-
tur, & deinde vinum ex his paratur, gustatu gratissimum, quod in al-
ui fluxionibus utiliter vsurpatur. Asseruantur condita cum saccharo,
ad arcendam sitim, & appetentiam cibi excitandam.

CHAMAE CERASVS, Græcis, χαμαικεράσος.] Italis, Ciregio nano.
 Germ. wild panderbush.

FORMA.

Matt. Arbuscula est Spitamæ paulò maior. Bacca, quæ cum austeris magnitudine certant, breui petiolo innituntur, sapore austero, ac adstringenti.

LOCVS.

Matt. Prouenit spontè cum in valle Anania in agro Tridentino, tum in Boemia, & Austria secus itinera, & prope sepes.

QUALITATES,
ET VIRES.

Matt. Bacce cum cæteris austeriora habeantur, etiam cæteris sicciora iurè fuerint, magisque adstringentia.

CHAMAE CERASVS.



SILIQVAE, Græcis, Κεράτια.] Arabibus, Charumb.] Italis, Carobe, & Carobole.] Germanis, S. Jhoannis Brodt.] Hispanis, Alfarbas Carrouges.] Officinis, Carobe.] Gallis, Caronge. *Wortelsbaum*.

S I L I Q V A E .



F O R M A .

Arbor, quæ Siliquas pro- *Matt.*
fert, folio virescit fraxino
latiore, duriore, ac ma-
gis circinnato. Floret di-
scedente hyeme, aut ve-
re iâ appetente, fructifi-
cat verò Æstate, & Au-
tumno, dependentibus
siliquis, primum viridi-
bus, & deinde cùm sic-
cantur, ex rufo nigricā-
tibus, mansu lignosis,
sed dulci pulpa, succoq;
præditis: Semine Ægy-
ptiæ Siliquæ haud dissi-
mili.

L O C V S .

Nascuntur copiosæ in Apu *Idem*
lia, Campania, Creta, Sy-
ria, Cypro, ac aliis cali-
dioribus regionibus.

Q U A L I T A T E S .

Adstringunt, & exiccant. *Gal. li. 7.*
simp. me.

V I R E S .

Recentes stomacho aduer *Diosc.*

santur, & aluum soluunt. Eædem siccatae sistunt, stomachoque utilio-
res fiunt. Vrinam quoque cient. ¶ Eædem etsi omnium consensu *Matt.*
adstringunt: compertum est tamen earum decoctum potum miri-
ficè iuuare tussientes, ob dulcem melleamque substantiam, quæ
iis inest.

MALA, Græcis, *Μήλα*.] Arabibus, *Tufa*, seu *Tufalta*.] Italis, *Mele*, seu *Pomi*.] Germanis, *Oepffel*.] Hispanis, *Mansanas*.] Gallis, *Pomes*.

M A L A.

G E N E R A.

Matt.
Gal.

Numerosum sanè est malorum genus, ac magis quàm explicari possit sapore, Forma: ac mole diuersum. § *Alia*. n. austerum, alia acidū, alia dulcem simul, & austerum, quædam dulcem, & manifestè acidum, & nonnulla cum acore acerbum saporem habent.

F O R M A.

Matt.

Malorum arbor vnico tantum exit caudice, ramos inde statim in longum, latumq; mit tens, crasso satis libro, colore exterius cinereo, & intus flauo: foliis virescit oblongis & tenuiter per ambitum serratis. Flores mittit albos, foliatos, aut ex cādido sensim purpurascens è quibus poma oriuntur, forma, colore, magnitudine, & sapore varia.

L O C V S.

Idem

Domestica in hortis, vineis, & pomariis habètur. Syluestria verò locis campestribus tum etiam in syluis, & collibus spontè nascuntur.

Q U A L I T A T E S.

Gal l. 1.
de alim.
facul.

Adstringentia mala, succum frigidum, terreumque habent. Acida autem frigidum quidè sed tenuium partium. Mediæ autem temperaturæ sunt dulcia, quæ ad calidius vergunt.

quemadmodum omnis qualitatis expertia, insipidave, ad frigidius inclinant. Syluestria cæteris adstringentiora habentur.

V I R E S.

Diosc.
Gal.

Cruda in cibis omnia ferè refrigerant ventriculum: quamuis dulcia quæ *Apia* vocantur minus lædant, & quæ in hyemem, & ver asservantur: vbi prius maturuerint.

Matt.

§ Præstant dulcia ad Melancholicos affectus: quin etiā, ad pleuriticos. Ea. n. si cineribus incocta, & Glycyrrhizæ succo, amylo, & Saccharo albissimo conspersa propinentur, tam mane, quàm vesperi, illos quidem mitificè iuuant.



COTONEA Mala, Græcè, Κυδώνια μήλα.] Arabicè, Saffargell.] Italicè, Mele [otogne.] Germanicè, Kitten, siue Quitten.] Hispanicè, Membrillos.] Gallicè, Pomes de Coing.

COTONEA.



uant, & vrinam cient. Præsumpta aluum cohibent, contra verò citant. Profunt cœliacis, dysentericis, & purulenta excreantibus. præsertim cruda. Succus crudorum datur vtiliter orthopnoicis. Decocto fouentur vtiliter sedis, & vulux procidentia: Illinuntur cruda ad cohibendam aluum, & vomitiones. Vinum ex his expressum hæc omnia quoque præstare potest, quin etiam oleum quod ex ipsis conficitur, inunctum. Seminum mucago illinitur vtiliter omnibus inflammationibus, & linguæ scabritiem læuigat.

G E N E R A .

Tria Cotoneorum numerantur **Diosc.** genera. Palma illis quæ ppriè **Gal.** Mala Cotonea nominantur. Secundo loco Struthia vocata, & tertio quæ media inter hæc habentur, Miluiana seu notha appellata.

F O R M A .

Præstantiora, & quæ primas tenent pressa sunt, & in toros ferè diuisa Melopeponum modo. colore ad aurū inclinato. Lanuginosa, & ceteris odore præstantiora Struthia maiore admodum corporis mole spectantur, & forma magis pyra, quàm mala referunt. Miluiana autem inter hæc media, cū facie tum sapore, odoreq; esse videntur. Arbor cōmuni malo ferè similis est: atqui folia angustiora sunt, læuiora, carnosiora, robustioraq;, & à tergo albicantia, florem fert album Sylvestris rosæ figura.

L O C V S .

Prouenit sata in hortis, vineis, & viridariis. **Matt.**

Q U A L I T A T E S .

Valenter adstringunt: cohibent, roborantq;: quin etiam refrigerant ordine primo, & siccant secundo. **Matt.**

V I R E S .

Cocta, tostave Stomachum iuuant, & vrinam cient. **Diosc.**
Matt.

PERSICA, Græcis, *περσικὰ μῆλα, καὶ ῥοδάκινα.*] Arabibus, *Sauchsen, Chauch.*] Italis, *Pesche, & Persiche.*] Germanis, *Pfersich.*] Hispanis, *Pexegos.*] Gallis, *Pesches.*] Polonis, *Broskuini.*

PERSICA.

GENERA.

Matt. Persicorum perplura reperiuntur genera: Quædam enim rubent, alia aureo colore fulgent, alia virescunt, alia albicant, alia sanguineo succo madent, alia duracina vocantur, quod duriore sint pulpa: & quæ ab ossæ non diducantur. Et alia Cotonea, alia nucipersica, quæ nucum Juglandium faciem representent, appellantur. Sunt etiã quæ pro nucleo Amygdalam dulcem habeant Persica amygdala appellata.

FORMA.

Idem. Persica malus arbor est foliis Amygdalæ per omnia similibus, quemadmodum & floribus, quamvis in persica magis purpurascens spectentur. Ligni materies fragilis, radicesque imbecilles, nec altè descendentes. unde fit, quod hæc arbor cito consenescat, & cadat.

LOCVS.

Idem. Habetur ubique; copiosa in Italia, sed in Apulia copiosissima provenit.

QUALITATES.

Gal. li. 7. simp. me. Germina, & folia vincem habent amaram qualitatem. Alioqui sanè etiam digerens medicamentum est. Fructus verò eius, nempe esculentum hoc persicum, humidior est, & frigidior temperie.

VIRES.

Diosc. Acerba Persica aluum cohibent, sed sicca vehementius. Decoctum è

Gal. li. de alim. fac.

Matt.

siccis alui stomachique fluxiones sistit. Præparati succi sunt, & quæ facile corrumpuntur. Flores recentes deuorati non solum aluum deiciunt, sed vomitiones quoque faciunt. Hydropicorum aquam pellunt: sed non absque ægrotantium incommodo. Lachryma arboris datur ex plantaginis, aut portulacæ succo ad sanguinis reiectiones. tussientibus verò, & anhelosis ex Tusilaginis aqua, & Croci momento: facit quoque ad raucedinem, & arteriæ impedimenta. Datur calculosis cum succo raphani, aut limonum, duarum drachmarum pondere. Recentia folia illinantur vtiliter ventri ad interaneorum vermes, ex aceto. Eorundem succus Vermiculosis, ac purulentis auribus vtiliter infunditur.



MALA Armeniaca, siue **Præcocia**. Græcis, Μηλα ἀρμενιακά ἢ προκόκκια, καὶ βερικόκκια μέγν.] Arabibus, *Mermex mex*, *Mesmes*, siue *Mismis*.] Italis, *Armeniache*, *Bacoché*, *Moniache*, & *Grisomele*.] Germanis, *S. Iohannis Pfersich*.] Hispanis, *Albincoques*, *Albarchigas*, *Aluaricoques*.] Gallis, *Abricoz*, *Carmaignoles*, & *Chicandeliz*.

Marillenöffe
Die grösste

ARMENIACA MALA MAIORA.



GENERA.

Plures eorum visuntur species, magnitudine, & sapore quoq; differentes. *Matt.*

FORMA.

Arbor rarò procera admodum visitur. Folia fert Piri haud absimilia, subrotunda, & per ambitū serrata. Flores albos, cerasi modò, è quibus fructus prodeunt persicorū forma ac ferè magnitudine, aureo colore, sepe cū purpura misto, os omnia infra se concludunt, vtraq; parte turgens, in quo nucleus cōcluditur, in quibusdam amarus, in quibusdam verò dulcis. *Idem*

LOCVS.

Habentur in hortis, vineis, & Viridariis. *Idem*

QUALITATES.

Fructus humidior, frigidior *Gal li. 7.* que est, vtrunq; secundo *simp. me.* quodammodo excessu.

VIREs.

Oleū è nucleis expressum, mirificè valet ad inflam-

matas hæmorrhoidas inunctum. Valet quoq; ad vlcerum tumores, & ad linguæ impedimenta: & pariter ad aurium dolores. Idem potus vnciarum quinque pondere, cum vini Cretici vncia, calculos pel- lit, & colicos iuuat.

ARMENIACA minora, Græcis, Μίλα ἀρμενιακά πίκρα.] Italis, præsertim-
que Hetruscis Armoniache, Bacoche, & Moniache minori: Insubri-
bus autem, & Venetis Armellini. Germ. *Wslim Marillenöffe*.

ARMENIACA MINORA.

FORMA.

Matt.

Arbor est, mali proceritate,
foliis albæ populi, flori-
bus, cerasi admodum si-
milibus, ac pariter race-
matim prodeuntibus.
Fructus edit mali Persici
effigie, minores tamen,
colore aureo subrutilan-
te, & odore iucundo.

LOCVS.

Idem

Habentur passim in hor-
tis, viridariis, & vineis.

QUALITATES,
ET VIRES.*Idem*

Non differunt suis in facul-
tatibus à maioribus. ve-
rùm tamē austeriori sunt
sapore.



CITRIA MALA, siue medica mala, Græcis, Μηδικὰ μῆλα, ἢ κεδρόμῆλα.] Italis, Cedri, & Citroni.] Germanis, Citron, Oepffel, siue Juden, Oepffel.] Hispanis, Cidras.] Gallis, Citron.

CITRIA MALA, SIVE
MALA MEDICA.



GENERA .

Maiora, & minora.

Matt.

FORMA .

Proueniunt maiora melopeponum magnitudine. Minora verò paulò limonibus grandiora : & gustu suauiora. Planta quæ perpetuo pomifera est, aurantium ac limonum arbores magnitudine æquat : Foliis virescit perpetuis, aurantium similibus, ubiq; veluti acu tenuissima perforatis, foraminibus, visum effugientibus. Flores edit ex albo purpurascens : solidos, calathi figura è quibus poma proueniunt, oblonga, rugoso cortice, flauo, ac suauem odorem spirante. Acidam includunt medullam, succo plenam : in qua semen recõditur hordei figura, sed quadatenus crassius : duro obductum cortice, amaro sapore. Arbor nunquam sine fructu visitur.

Idem

LOCVS .

Natale solum iis est calidis in Regionibus, maritimo præsertim tractu, & circa amœnos lacus, et si etiam serantur in hortis, & viridariis.

Idem

QUALITATES .

Succus vincentem habet qualitatem acidam, & siccam, vt ipse, tertij sit ordinis exiccantium, refrigerantiumq; . Cortex autem exiccat, & non parum habet acrimoniæ, & proinde desiccat secundo excessu, non tamen frigidus est, sed aut temperatus, aut paulò infra. Porro caro pariter crassi succi est, & pituitosa frigidaque. Semen amarum est, & digerendi videlicet, siccandi que facultatem obtinet, secundo quodammodo ordine à temperatis recedens. Folia verò & digerunt & exiccant.

*Gal. li. 7
simp. me.*

VIRES .

Semen in vino potum venenis resistit, peculiariter autem Scorpionum ictibus aduersatur, alium mouet: oris suauitatem commendat. Succus grauidarum malaciæ succurrit. Pomum vestiariis impositum, tineas abigit. Idem totum venenis aduersatur, & succurrit pestilentialibus febribus affectis. Cortex saccharo, aut melle conditus, ventriculum, & cor corroborat. Succus flauam reprimat bilem, & pestis contagia arcet, & sitim sedat.

Matt.

MALA Limonia, Italis, *Limoni.*] Gallis, *Lemons.* Germ. *frucht Limoni*

G E N E R A.

L I M O N I A M A L A. *erfte*

Matt. Maiora: & minora: quæ et succi bonitate differunt, & corticis crassitudine. Nā quæ grādiora sunt, & succo, & cortice, carneq; lōgè sunt præstantiora.

F O R M A.

Idem Plāta perpetua frōde viret, quēadmodū & Citrus, foliis etiā similibus, sed paulò angustioribus. Flores fert albos, & odoratos, à quibus poma oriuntur oblonga, citri faciē referentia, atq; etiam colore magis diluto. Eadē oīb⁹ ferè gen tibus nota sunt magis q̃ describi debeāt.

L O C V S.

Idem Serūtur tanq̃ peregrina in hortis, & viridariis, & quanq̃ māgonio cultorū in frigidis regionibus viuāt, q̃ hyeme ī camera-
tis cellariis recōdant, ea rū tñ pūctus nō est nisi ī locis calidis, & p̃sertim maritimis, & circa lacus amantissimos. Ideoq; in Apulia, Calabria, & aliis Regni Neapolitani regionibus copiosa limonia proueniunt.

Q U A L I T A T E S.

Idem Iisdem qualitatibus prædita sunt, quibus & Citria mala.

V I R E S.

Idem Sirupus q̃ è limonū succo parat, extinguit nō solū bilis feruorem, sed quoque ad sitim extinguendam, & ad pestilentes febres conducit. Aqua distillata è limonū acida pulpa: expetit mulieribus ad faciei nitore p̃ciliādū, quin et ad vitilignes, & corporis, cutisq; infectiones delēdas, nā & varos delet, & acaros quoq; iterimit. Sirupis admista, datur vtiliter acutè, aut p̃tagiosè febriētib⁹. Eadē lūbicos necat. Immaturo limonis succus, fescūcię pōdere cū vino potus calculos renū pellit.



AVRANTIA mala.] Italis, *Aranci.*] Germanis, *Pomerantz.*] Gallis, *Tomme d'Orenges.*

AVRANTIA MALA.



q̄ præstantissima habetur ad odora menta : præstat quoque pota sex vnciarum pondere ad sudorem ciendum : quare datur vtiliter contra febres pestilenciales, in quibus exanthemata spectantur in cute. Cor corroborat, & spiritus viuificat. Cortex saccharo conditus uentriculum roborat, & flatus pellit. Omnium succus sitim extinguit & febrientes iuuat, præter dulcium aurantium. Nam is febrientibus non adeò salubris est, nec sitim sedat.

G E N E R A .

Sunt quæ dulcia : quæ acida : & quæ *Matt.* inter hæc media habentur, vt de punicis quoque diximus.

F O R M A .

Arbor est citro similis, & perinde *Idem* ac illa perpetua coma uiret, foliis lauro lati foliæ proximis, ac suauiter odoratis, crassis, læuibusq̄, & in acutum desinentibus. Ramos habet flexiles, ac obsequiosos, topiariis operibus haud inidoneos, aculeis firmis, acutisq̄, refertos. Cortice ex viridi subalbicante : flores albos odore per q̄ præstanti, è quibus suauis admodum distillatur aqua. Poma fert rotunda, aureo colore, odorataque. Cortice crassiore, pulpa, & succo referta, in qua semen citri simile.

L O C V S .

Seritur in viridariis, & hortis : Ma *Idem* ritimis præsertim tractibus : Abundat iis Campania, Apulia, Calabria, & aliæ Regni Neapolitani regiones, quin et Liguria & Benaci Lacus viridaria.

Q U A L I T A T E S .

Refrigerant & exiccant, quæ scilicet *Idem* acida, & vinosa sunt : dulcia verò caloris non sunt expertia. Cortex omnium calidus est.

V I R E S .

Aqua è floribus distillata, præter q̄ *Idem*

POMA Adami.] Italis, *Lomie & Pomi d'Adamo.*

Urm. Limosifite.

POMA ADAMI.

FORMA.

Matt. Arbor quæ hæcedit poma, folio est Limoniæ Arboris maiore, parentioreque: ramis etiam similibus: floribus Citrei mali æmulis, fructu Aurantiis duplo, triplove maiore rotundo: Cortice haud crasso, pallido, crispo, & inæquali fissuris quibusdā apparentibus, perinde ac dēcibus demorso, succosa, acidaque mader pulpa, sapore limonū haud longè absimili, insipidiore tñ in qua semina latitant citrei mali, aut limonij emula. Hęc poma, quidam putant limonia esse seminini generis.

LOCVS.

Idem Seruntur cū Citrijs, limoniis, aurantiisq; malis, & iisdem, vt illa proueniunt locis.



QUALITATES.


Idem Refrigerant, exiccant, & adstringunt.

VIRES.

Idem Præstat eorum succus ad ea omnia ad quæ limonia præstare diximus: minore tamen efficacia: Peculiariter autē valent poma ad scabiem, si per medium secta: & tenuissimo sulfuris puluere aspersa, & deinde feruentibus cineribus calefacta, scabiosis corporis partibus infricentur.

PYRA Græcis, ἄπια.] Arabibus, *Humechte Cirmette, siue Kemetry.*] Italis, *Pere.*] Germanis, *Biren.*] Hispanis, *Peras.*] Gallis, *Poyres.*

P Y R A .



G E N E R A .

Multa ac varia pyrorum numentur genera, odore, sapore, colore, forma: ac prouentu differentia. Quin et Syluestria quoque copiosa visuntur. *Matt.*

F O R M A .

Varia est quoque pyrorum facies: quod cum omnibus notum sit quemadmodum & planta: nec huius nec illorum formam describere libuit. *Matt.*

L O C V S .

Proueniunt vbique in collibus, agris, Vineis, hortis, & viridariis. Syluestria verò locis incultis, & in syluis.

Q V A L I T A T E S .

Vim habent exiccandi: ac etià Gal. li. 5. adstringendi: Atqui Syluestria longè magis adstringunt. *simp. me. & 2. de* Huc quoque referri possunt *alim. fac.* quæ de malis & punicis dicta sunt: namque sapor vires palàm facit.

V I R E S .

Pyra adduntur utiliter in repellentibus cataplasmatibus. Decoctum siccorum, & cruda ipsa aluū adstringunt, ieiunos esitata lædunt. Recentia cocta esu stomacho grata sunt: Syluestria præstant dysentericis, cæliacis, & sanguinem excreantibus. Ligni arboris cinis datur utiliter potandus contra fungorum strangulationem: ad quod etiam valet pyrorum Syluestrium succus potui datus: Quin etiam si ipsa cum fungis coquantur, eos innoxios reddunt. *Diosc. Matt.*

MESPILVS prima Græcis, μέπιλον, ἢ μεπίλη.] Arabibus, Zarar Zarur,
 & Alzarur.] Italis, Azarolo.] Hispanis, pariter Azarolo.
 Germ. *verlijf* *Wespelbaum*.

GENERA.

Diosc. Duū Mespilus est gene-
 rum foliis, & fructu
 diuersum.

FORMA.

Matt. Primum genus arbor est
 spinosa, mediocris p-
 ceritatis, & materia
 Pyro haud absimili,
 foliis laciniatis Apij
 amulis, aut Oxiacan-
 the, floribus albicanti-
 bus, racematim cohe-
 rentibus. Fructus illi
 sunt Sorborum cras-
 situdine, rubētes, vul-
 garibus mespilis æ-
 quales, sed arctiore
 umbilico, tribus in-
 tus officulis.

LOCVS.

Idem. Copiosa Neapoli, ubiq;
 ī viridarijs, & vineis.

QUALITATES.

Gal. lib. 7. f. 174. Fructus acerbus est ante
 quam maturescat, re-
 frigerat, exiccat, & ad-
 stringit, quæ etiā qua-
 litas in germinibus &
 foliis viget.

Gal.

Diosc. Ventrīs fluxiones cohibent fructus, & multò fortius quàm sorba. Si-
 stunt faucium, gutturiſque fluxiones ubi eorum decocto os colla-
 tur. Dantur vtiliter in mulierum grauidarum malacia. Condiuntur
 cum zaccharo, & asseruantur ad omnia supradicta.

VIRES.



MESPILVS vulgaris, Græcis μέσπιλον ἢ μεμεκίλη.] Arabibus, Zaror zarur, & Alzarar.] Italis, Nespolo.] Germanis, Nesbel.] Hispanis, Nesper.] Gallis, Nesplier.

MESPILVS VVLGARIS.



F O R M A .

Foliis est mali, sed minori *Matt.* bus: flores fert albican- tes, Coroneę mali æmu- los: fructum rotundum, latiore umbilico, quin- que acutis processibus coronato.

L O C V S .

Habetur in vineis, hor- tis, & sepibus.

Q V A L I T A T E S .

Fructus acerbi admodum sunt, & strenuè coer- centes, multò fortius quàm sorba. *Gal.li. 7 simp.me. & 2. de alim. fa- cul.*

V I R E S .

Adstringunt vehementer, aluum fluentem cohi- bent. *Diosc. Matt.* Sicca folia in puluerem aspersa, re- centia vulnera gluti- nant, & sanguinis pro- *Plin. 2. de alim. fa- cul.* fluium sistunt. Dan-

tur vtiliter sanguinem reiicientibus. Mespilorum officula in pulue- rem contrita, renum calculos valenter pellunt, vbi cochlearis men- sura ex vino, in quo vulgaris Petrosilini radices decoctæ fuerint, ebibantur.

LOTVS, Græcis, *λότος*.] Arabibus, *Sedar*, siue *Alsadar*.] Italis, *Bagolaro*, siue *Perlaro*.] Germanis *Zurjelbaum*.] Hispanis, *Almez*.] Gallis, *Alysier*.

LOTVS, SIVE CELTIS.

FORMA.

Diosc.
Theoph.
Plin.

Lotus arbor est vastę magnitudinis, incisuras foliorum habet, perindę ac Illicis. Baccas fert Cerasi minores, per maturitatem nigrescentes; & longo pediculo nitętes cerasorum modo: nulli cortex iucundior, aut oculos excipiens blandius: nulli rami longiores, validioresque, aut plures, vt dixisse totidę arbores liceat.

LOCVS.

Plin. Montes, & valles amat, & expetitur domibus, ramorum petulantia.

QUALITATES.

Gal. 7.
simp. me.

Non ita multo adstrictorię facultatis est particeps, sed & tenuium est partium, & exiccatoria.

VIRES.

Diosc.

Baccę aluum sistunt, ramę torum ligni decoctum, siue potum, siue Clysmate infusum dysentericis, ac fęminis vterinis fluxibus laborantibus auxiliatur. Rufat capillos, & defluentes cohibet, & citam aluum cohibet.

CENSURA.

Sunt qui contendunt Athęneo Zyzzyphum nostratem lotum designare, sed decipiuntur, & hallucinantur.



PSEVDOLOTVS, Italis, Loto bastardo.

PSEVDOLOTVS.



F O R M A.

Arbor est procera, foliis la *Matt.*
tis oblongisque, fir-
mis, ac nervosis, fructu
Sebestenorum effigie,
sed longè minore, colo-
re, per maturitatem cę-
rulæo, pluribus intus
officulis, sapore non in-
grato.

L O C V S.

Italię peregrina hæc arbor *Idem*
est, & raris in viridariis
habetur.

Q U A L I T A T E S.

Eædem ferè illi qualitates *Idem*
sunt, quæ legitimæ lo-
to tribuuntur.

V I R E S.

Vires quoque eædem illi *Idem*
sunt, si rerum experi-
mentatoribus credi-
mus.

C E N S V R A.

Non rectè sentiunt, qui Pseudolotum hanc Guaiaci plantam esse pu-
tant,

Lotvs Africana altera, Italis *Legno santo*, sed falso.

Verm. Zureglbaum aus Afrika.

LOTVS AFRICANA ALTERA, SIVE
LOTI AFRICANAE SPECIES.

FORMA.

Matt. Arbor est procera, foliis alterius loti latioribus, baccis rotundis, acuminato tamen cacumine, colore cæruleo subnigricante. Hæ pediculis carent; calyculis tamen ima parte obductis, perinde ac glandes, & Mixa, arboris ramis, & surculis seriatim coherent.

LOCVS.

Idem. Habentur arbores multis in locis in Italia, è longinquis tamen regionibus allatæ.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem. Sunt qui velint arborem hanc eisdem cum loto pollere viribus. Id quod nos quoque putamus.




CENSURA.

Idem. Aberrant, qui hanc loti speciem, Guaiaci esse Plantam contendunt.

CORNVS, Græcis, *Kparta*.] Italis, *Corniolo* : *Fructus Cornole*, & *Cornie*.] Germanis, *Arbor Cornelbaum* *Kurberbau*, *sive Dierlen*, *Fructus Vuelsch Kirschen*.] Hispanis, *fructus Cornizolos*.] Gallis, *Cornier*, *Fructus verò Cornoille*.

C O R N V S .



G E N E R A .

Duum est generum. Quædam. n. *Theoph.* mascula est, quædam verò fœmina.

F O R M A .

Mascula folia habet Amygdalæ *Theoph.* (re autē vera virgæ sanguineæ *Matt.* vocatæ haud, dissimilia) Corticem nervosum, & tenuem, caudicem non nimis crassum. Cæterum fœmina virgas parvas amerinæ salicis modo è latere profert, & fruticosior est. Nodos ambę perinde ac Amerina, tum geminatos, tum inuicem congruos habent. Mari materies excors, totaq; solida. Fœmina verò medullam continet, & mollior est. Flos oleæ, bacce oliuæ similes, oblongæ, rufo colore, & singulari pediculo : plures ossiculum intus habent oblongum oliuæ modo, in quo nucleus, sapore dulci, odoratuq; gratus. Ambæ fructum ferunt, sed fœminæ vix gustabilem esse dicunt.

L O C V S .

Nascitur in syluis, in collibus, & *Matt.* dumetis.

Q U A L I T A T E S .

Fructus admodum acerbus est, *Gal li. 6.* ideo valenter adstringit, folia *simp. me.* quoq;, & germina acerba sunt, valenterq; desiccant.

V I R E S .

Baccae in cibo adstringunt, ideoq; albo profluuiio fœminarum atque disenterię salutare, fanies quę virentia folia torrendo resudarunt, impetigini conuenienter illiniuntur: folia maxima vulnera glutinant in duris hominum corporibus. Ligni materies, quod durissima sit, & admodum robusta, expetitur. pistrinariis fabris, ad parandum rotarum dentes. aduersatur lignum à cane rabido demorsis, nam huius tantum contactu in rabiem aguntur.

D I O S C .

M a t t .

VIRGA sanguinea, Italis, Sanguineo, & Sanguinello.

Græc. *ϕλῆνδα* *φάνδα*.

VIRGA SANGVINEA.

FORMA.

Matt. Arbor est fruticosa, virgis corno tenuiorib⁹, robustis, ac geniculatis, cortice sanguinis modo rufescēte, foliis firmis, nervosis, corno quē proximis. brevioribus tamen, ac latioribus: Floret vere, umbellis subalbicātibus, è quibus baccæ oriuntur orobi magnitudine, primū virides, & per maturitatem nigricantes, racemosq[;], è quibus oleum exprimitur rusticis, ad lucernarum vsum.

LOCVS.

Idem Nascitur in sepibus, & frutetis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem Baccæ, amaro, acerbo, adstringentiq[;]; gustu sunt, itaq[;] abstergunt, roborant, cohibent, ac repellunt. Idem quoque præstat oleum, quod ex eis elicatur.



SORBA, Græcis, ὄσα.] Italis, Sorba.] Germanis, *Spererling*, *Sporöe*
Pffel, *sive Sperbiern*.] Hispanis, Sorbas.] Gallis, *Sorbes*, & *Corimes*.]
 Boemis, Kzerbiny.

S O R B A .



G E N E R A .

Duo Sorbi domesticæ arboris ge
 nera, alterum quidem mas, al
 terum fœmina: quæ pomorū
 diuerſitate noſcuntur. Duo
 item quoq; Sylueſtrium, quo
 rum alterum Torminale vo
 catur. *Matt.*

F O R M A D O M E S T I C A E .

Vtraq; caudice exit recto, ac lon
 go, ramis in altum aſſurgen
 tibus: foliis fraxini, ſed angu
 ſtioribus, auerſa parte albican
 tibus, & per ambitū ferratis :
 flores p̄fert albos racematim
 prodeuntes, è quibus fructus
 pariter racemoſi, in altera qui
 dem orbiculati, & ſucco odo
 ratiore, ac mitiore, in altera
 verò ouati pyri faciem refe
 rentes, & guſtui aſperiores,
 inſuauioresq; , & minus olē
 tes, colore pallido, in latere
 ruſcente. Hic maris, ille
 fœminæ eſſe creditur. Ligni
 materies duriffima, & compa
 cta. Fructus ſtraminibus im
 poſiti, aut ſuſpenſi maturan
 tur. *Matt.*

L O C V S .

Habentur ferè vbique locorum *Idem*
 in Campis, Vineis, & Virida
 riis.

Q U A L I T A T E S .

Aſtringunt vt Meſpila, ſed im
 becilliore effectū. *Gal li. 8.*
ſimp. me.

V I R E S .

Sorba deuorata aluum ſiſtunt, & præſertim ſicca anteaquā matureſcant. Id quod præ
 ſtat earum farina, ſi polentæ loco ſumatur. Quod & decoctum eorum in potu præ
 ſtat. ¶ Datur vtiliter farina delingenda dyſentericis, cœliacis, & ſanguinem reii
 cientibus, ac etiam fœminis vterinis fluxibus opportunis. *Dioſc.*
Matt.

SORBUS Sylvestris, Italis, *Sorbo saluatico.*] Ananienfibus, *Temelo.*
Unm. wilder Spörling gegliedert.

F O R M A .

Matt. Folia, & ferè vniuerfa plā
 tē huiusce facies, à do-
 mestica parum diffe-
 rūt. Fructus verò aliter
 se habet. Ex muscariis
 enim, sambuci modo
 dependet, sed baccis
 quadruplo maioribus,
 colore aureo subruse-
 scente, sapore acerbo
 adstringentiq̃ue.

L O C V S .

Idem — Prouenit syluosis, ac fri-
 gidis locis inter cæte-
 ras agrestes plantas.

Q U A L I T A T E S ,
E T V I R E S .

Idem — Baccę adstringunt, siccāt,
 & repellunt. Asseruan-
 tur hyeme ad aucupia,
 quòd turdis gratissimę
 sint. Arboris virgę q̃
 solida, robustaq̃ue sint
 materie, expetuntur à
 rusticis pro stimulis boum parandis.

S O R B U S S Y L V E S T R I S .



SORBUS Tormalis, Italis, Sorbo Torminale, & Sorbo Saluatico.] Germanis, *Unilder Spernuerbaum.*] Boemis, *Vuofkerusse*.

SORBUS TORMALIS.



FORMA.

Folio exit virigineo, Plataniformi modo, læui, haud infirmo, baccis racematim cohærentibus, asperiusculis, & oblongis, coronato umbilico, colore ferrugineo: Sapore per maturitatē acido, & austero. *Plin. Matt.*

LOCVS.

Nascitur in syluis, cum cæteris syluestribus. *Matt.*

QUALITATES.

Baccę adstringunt, non tam adeo valenter, vt domesticę. *Matt.*

VIRES.

Possunt eadē omnia quę domestica: sed inefficaciora habētur: Adstringunt enim aluum, & dysentericorum torminibus vtilia sunt, vnde illi nomen. *Matt. Plin.*

CENSURA.

Decipiuntur profectò, qui hanc Tormalis Sorbi plantam Crateogonium esse censent, seiplosque accusant, negligenter legisse Plinium. *Matt.*

PRUNVS, Græcè, Κοκκυμήλος, Pruna verò Κοκκυμηλέα.] Arabibus *Anas, Auas, siue Agias.*] Italis, *Pruno susino, Fructus Sucine, & Susine* Germanis, *Pflaumen, & Kricchen.*] Hispanis, *Prunas, Andrinās, si Amexcas.*] Gallis, *Arbor Prunier, fructus Prunes.*

G E N E R A.

Matt. Prunorum genera, varia, & multiplicia sunt facie, magnitudine, colore, & sapore differentia.

F O R M A.

Idem. Arbor est pœra, radicibus haud altè descendentibus, paucisq; caudice subrecto, cortice scabro, multis ramis brachiato, foliis latis, oblongisq; per ambitum serratis: floribus candidis, foliatis, racematim prodeuntibus. Fructu carnoso, tenui vestitus cuticula, ossiculo intus oblongo, in quo nucleolus.

L O C V S.

Idem. In vineis, hortis, & viridariis habetur.

Q U A L I T A T E S.

Diosc. Folia refrigerant, exiccant, adstringunt, prohibent. Fructus verò aluum subducunt, idq; recentes magisq; sicci.

V I R E S.

Diosc. Folia Pruni in vino decocta, collutione, & gargarizatu, Columellam, gingivas, tonsillasq; fluxione laborantes reprimunt. Arboris gummi agglutinat, & ex vino potum, calculos rumpit. Idem ex aceto illitum infantium lichenas sanat. Recentia pruna deuorata stomacho inutilia sunt.

P R V N V S.



PRUNVS Sylvestris, Græcis, Κοκκύμηλος ἄγρια.] Fructus, Italis, Prugnole, Saluatiche.] Germanis, Schlehdorn arbor, Fructus, Schleen.] Boemis, Trnki.

PRUNVS SYLVESTRIS.



FORMA.

Humilis est arbuscula, *Matt.* fruticosa, & ubiq; aculeata, folio satinae Pruni longè angustiore, duriore, asperioreq; floribus albis, ac numerosis. Baccis vix Acinis equalibus colore in purpure nigricante. Viridi intus pulpa, austero, adstringente admodum gustu. In quibus os includitur cerasorum simile.

LOCVS.

Nascitur in dumetis, sepibus, & Syluis. *Idem*

QUALITATES.

Tota planta exiccantis, adstringentisq; est facultatis, quemadmodum & bacca. *Idem*

VIRES.

Baccæ Cæliacis, & dysentericis vtiliter denotantur. Eedem cum arbusculæ radicibus, ex aqua vel austero vino decoctæ, sanant oris, linguæ, gingivarum, Columellæ, &

faucium vlcera, & fluxiones tum collutione, tum gargarizatu, quare non parum recreantur hoc medicamento, qui hydrargyro peruncti oris vlceribus, & fluxione laborant, & præsertim addito Lycio, alumine, & rhodomelle. Idem decoctum in defæctionibus auxiliatur fœminis vteri profluvio obnoxiiis. Aqua è floribus distillata, interficit hausta intestinorum vermes, oculorumq; fluxiones cohibet.

SEBESTENA, Græcis, Μύσαι, μύξα, καὶ μυξάρια.] Arabibus, Sebesten
Motheica, Makeita, & Mokaita.] Italis, Sebesteni.] Gallis, Sebeste.

Syr. Sebesten Baum.

SEBESTENA.

FORMA.

Matt. Arbor est Sebesten? Pru-
 no non admodū diffi-
 milis, foliis comatur
 pruni rotūdioribus,
 ac firmioribus. Flori-
 bus albicantibus, ra-
 cematim prodeunti-
 bus, è quibus Baccæ
 oriuntur, prunis par-
 uis similes, calyculo
 quodā ut glādes ima
 parte colligatæ, ossē
 intus triquetro, ī quo
 nucleus. Ii maturita-
 tē adepti in atrū vire-
 scunt, gustu prædul-
 ci, ac lenta, tenaciq;
 pulpa, ex qua Syri, &
 Ægyptij viscū ad au-
 cupia parant.

LOCVS.

Idem Proueniunt in Syria, &
 Ægypto, vnde ad nos
 conferuntur.

QUALITATES.

Idem Emolliunt, sitim sedāt,
 & aluum citant.

VIRE.

Idem Baccæ à cortice purgatæ,
 linguæ asperitatem mirificè leniunt, & dantur vtiliter ex flaua bile fe-
 bricitantibus. Pectori opitulantur, quo fit vt tussientibus, & lateris
 dolore affectis opē ferāt. Ventris tineas pellunt, vrinæ ardoribus suc-
 currunt. Baccæ triginta, aut quadraginta ex iure carniū maceratæ,
 deuorataq; aluum commodissimè citant, sed pinguiore, crassio-
 resq; eligendæ sunt.



ZIZYPHA Græcis Ζίζυφα.] Arabibus, Hunen Zufalzes, *sive* Hanab.] Officinis Iuiubæ.] Italis, Giuggiole.] Germanis, *Rootburstbeerse*.] Hispanis, *Azufecifa*.] Gallis, Iuiubes.] Boemis, *Iuinba*.

Z I Z Y P H A .



F O R M A .

Arbor est Zizyphus Pruno *Matt.*
humilior, caudice contorto, cortice scabro, viti viniferæ haud absimili, materiæ Oxiacanthæ proxima, radicibus firmis, ramis vbiq; spinosis, è quibus quidam processus exeunt iunci modo lèti, tenuesq; sparti modo, spithama lógiore, è quibus vtrinq; per intervalla folia exeunt, impari tñ exortu, oblonga, non magna, firma, vt in Clematide prima, & sen-
sim per ambitū serrata. Flores edit pallidos, & baccas Oliuarum instar primum virides, subinde pallescentes, & per maturitatem rubentes, in quibus os concluditur oliuæ simili pulpa dulci, & gustui non ingrata. L O C V S .

Seruntur in hortis, & viri *Idem*
dariis.

Q U A L I T A T E S .

In humiditate, & caliditate temperata sunt.

Matt.

V I R E S .

Exiguū præbent alimentum, difficilè concoquuntur, & stomacho inutilia sunt. ¶ Conferunt pectoris, pulmonis, & lateris morbis, à caliditate genitis. Medentur quoque cū maximè renum, tū etiam vesicæ affectibus.

*Gal. 2.
de alim.
facul.*

ARBUTVS, siue vnedo Græcis κώμαρος.] Arabibus, *Hatiladib.*] Italis, *Albatro.*] Hispanis, *Madronho, & Madromethro.*] Gallis, *Arbausier.*
 Græc. *κώμαρος* *κώμαρος*.

ARBUTVS.

FORMA.

Matt. Folia p̄fert laurinis similia, breuiora tñ paulò, crassioraque, colore ex viridi pallescente, & in ambitu serrata, rubra p̄mediū excurrente costa. Caudex cortice vestitur subrubro, haud crasso, aspero tñ, & squamoso, à quo rami prodeunt rubentiores. floret mensibus, Iulio, & Augusto, Floribus cādidis, paruis, Liliij conuallij haud longè dissimilibus, race matim dependentibus, è quibus fructus gignuntur rotundi, Sorborum ferè magnitudine, qui primo exortu virent, deinde flauescūt, & per maturitatē rubēt, aspero tactu, nullo intus ossiculo, fragorū modo, quorū ē effigiē referunt. Sapor his insipidus, simul & austerus, & vbi eduntur, linguā, & palatum stimulant, acerosa quadā substantia. quæ exterius conteguntur, integro anno maturescunt.

LOCVS.

Matt. Nascitur in collibus, & syluosis vallibus.

QUALITATES.

Gal. 7. Arbor acerba vnà cum fructu est, qualitate: at fructus stomacho insensus est, & capiti dolorem infert. Adstringit, roborat, & inspissat.

Matt. Arboris folia experuntur Coriariis ad spissanda coria: Non desunt, qui foliorum stillatitia aqua vtantur aduersus pestem, eam in principio dantes cum puluere ossis ceruini cordis, magno (vt ipsi dicunt) auxilio. In summa vbi adstringere, & roborare opus est, Arbutus eximie præstat.

VIRES.



AMYGDALAE Græcis Αμυγδαλαί.] Arabibus, *fauz kanz*, sine Lauzi.]
Italīs, *Mandorle*.] Germanis, *Mandelkern*.] Hispanis, *Almen-*
dras.] Gallis, *Amandes*.

AMYGDALAE.



GENERA.

Alia dulces, alia amara, alia maio- *Matt.*
res, alia minores.

FORMA.

Arbor est utraque spectata proceri- *Matt.*
tatis, caudice crasso, cortice aspe-
ro, radicem habet ut plurimum
unicam robustam, grandem, altè
descendentem. Folia Persico per
omnia similia, ac etiam flores,
nisi dilutiori essent colore. Nu-
ces edit cordis figura, quæ antea
quam obdurescant, integræ cum
putamine comeduntur: duplici
conteguntur putamine, quemad-
modum iuglandes.

LOCVS.

Tractu gaudent calidiore, quo fit,
ut in Apulia, & Sicilia copiosissi- *Idem*
mè proueniant.

QUALITATES.

Dulces nihil prorsus adstrictoriae *Gal. li. 6.*
facultatis habent, sola enim ex- *simp. me.*
tenuandi, atque abstergerendi fa- *& 2. de*
cultate pollent, & moderatè cali- *alim. fac.*
dæ sunt. Amara omninò exte-
nuandi, & calefaciendi, & abster-
gerendi facultatem possident. Gū-
mi excalfacit, & adstringit.

VIRE.

Amara illa vitia cutis in facie *DIOSC.*
corrigunt. Eadem fronti admo-
ta, aut temporibus cum aceto,
aut rosaceo, capitis dolorē mul-
cent. Illinuntur ad vlcera putre-
scentia, serpentiaque, & cū mel-
le ad canum etiam morsus. De-
uorata ventriculi dolores sanāt,
aluum emolliunt, somnum fa-
ciunt, & vrinam cient: dantur ad
renum morbos, & ad pulmonū
affectus, cum resina terebinthi-

na. ¶ Præstant ad coli inflationes, & præcipuè oleum ex iis expressum. Quinis septenisve præ-
sumptis, ebrietatem non sentiunt potatores. A vulpibus deuorata eas interficiunt, quin etiā
& gallinas. Gummi datur vtiliter sanguinem reicientibus. Impetigines ex aceto illitum tol-
lit, tussi vetustæ cum diluto vino potum medetur, calculosis verò cum passo. ¶ Dulces impin-
guant, lateris dolores, ac tussim sedant, & præsertim earum cremor. Oleum ab iis expressum *Matt.*
mulcet intrinsecos dolores omnes intestinorum præsertim, vteri, ac renum, si calidum sex vn-
ciarum pondere bibatur, est enim certum auxilium.

PISTACIA, siue Pistacea Græcis *πισάκια*.] Arabibus, *Puſtech*, siue *Festuch*.] Officinis, & Barbaris *Fistici*.] Italis, *Pistacchi*.] Germanis, *Vuelfch Bimpernußlein*.] Hispanis, *Alloigo*.] Gallis, *Pistaches*.

P I S T A C E A .

F O R M A .

Matt. Tota arbor Terebintho similis est, foliis colore ex viridi in luteum inclinante: nuces racematim prodeunt in ramorum extremitatibus, rubra exterius tunica, & odorata, nuce intus alba, vnguentariæ glandi facie simili. Internus nucleus cuticula contegitur rufa, atqui medulla virescit, sapore pineæ nuci proximo, sed odoratior ac gratiores.

L O C V S .

Idem In Persia, Arabia, & Syria vnde in Italiam quoque aduecta sunt, copiosa proueniunt.

Q U A L I T A T E S .

Gal. & Anicen. Excalfaciunt, & humectant, impinguant, roborant, aperiunt, non tamen valde nutriunt.



V I R E S .

Matt. Stomacho amica sunt deuorata, aut ex vino pota. Profunt contra serpentium morsus. Venerem excitant, tabidos, & suppuratos iuuant. Glucinosæ obstructions aperiunt.

STAPHILODENDRON. Italis, *Pistaci Salvatici*] Gallis, *Pistaches sauvages*.] Germanis, *Unildpimpernußlin*.

STAPHILO DENDRON, SIVE
PISTACIA AGRESTIA.



FORMA.

Humilis Staphilodendron *Matt.*
est planta, folio Sambuci, materie admodum imbecilli. Floribus albicantibus, racematim dependentibus, quemadmodum & fructus, qui quibusdam in folliculis prouenit, colore subrufo, Ciceris ferè effigie, sed maior, in quo subuirens nucleus concluditur, sapore dulci, sed nauseam commouens.

LOCVS.

Prouenit in Syluis, & fructetis. *Idem*

QUALITATES,
ET VIRES.

Neminem habeo, qui de horum viribus, & facultatibus scripserit: verum cum nauseam moueant, si copiosè edantur, vomitiones eadem mouere posse non dubitamus. *Idem*

mitiones eadem mouere posse non dubitamus.

Nvx Iuglans, Græcis καρύα Βασιλικα.] Arabibus, *Iebuz leuz*, siue *Gianezi*.] Italis, *Noci*.] Germ. *Nuß*, & *Vuelfschnuß*.] Hisp. *Noeses*. Gallis, *Noix*.

F O R M A .

NVX IUGLANS.

Matt. Caudice assurgit pæro, ac crasso, ramis multis, ingentibus, & longè, lateq; diffusis, libro vestitur cinereo, crasso, acrimoso. Radicibus nititur præ longis robustisque, frondibus pluribus utrinque ab vno pediculo exeuntibus, ut in fraxino oblongis, & grauius olentibus. Bino germinatu panniculas quasdam edit, quæ breui flavescentes decidunt, quas nucs sequuntur, duplici obductæ monumeto, nèpe calloso primū calyce, mox ligneo putamine, crispo intus nucleo, quadripartitoque, callosa intercedente membrana. Leguntur nucs inchoante Autumno, perticis excussæ, & siccantur in umbra.

L O C V S .

Idem Proueniunt ubiq; in campis, & collibus.

Q V A L I T A T E S .

Gal. lib. Folia, & germina adstrictionem quandam possident, ceterum euidentem, multaq; in nucis putamine recenti pariter, ac sicco. Recetes nucs neq; adstringentis qualitatis, neque oleosæ conspicuè sunt participes. Nuclei inueterati verò oleosi sunt, & tenues.

V I R E S .

Diosc. Deuoratæ egrè concoquuntur, ideoq; stomacho inutiles sunt, biliosæ, & capitis dolores inferentes, & tussicibus inimicæ. Cum ruta verò, & caricis præsumptæ à ieiunis, venenis resistunt, nec minus si à veneni haustu comedantur largius deuoratæ tineas latas pellunt. Illinuntur vtiliter mamarum inflammationibus, cum mellis exiguo, & ruta, cum calyce suo perustæ, tunc deuoratæ tunc vmbilico admotæ, tormina sedant. ¶ Nuclei usti alopeciiis impositi præferti sunt remedio, recentes stomacho innocetiores sunt, & illitæ liuores auferunt. Panniculæ siccæ, & in puluerem tritæ ex uino albo potè vteri pfocationibus auxiliantur.



Nvx Indica. Italis, *Noce d'India.*] Mauritanis, *Neregin, Dabig, seu Giauz Jaland.*] Italis, *Noce de India.*] Germanis, *Indianisch nusz.*] Hispanis, *Noiez de las India.*

N V X I N D I C A .

F O R M A .

Arbor Palmæ faciem explicat. *Matt.*

Fructus tamen edit prægrandes, magnorū Melopeponū instar. Nanque magna in uolucrorum mole obteguntur; colore subrufescente, tenax, callosusque, ex villosa tamē materie constans; quæ manibus extrita, in capillamenta fatiscit. Hoc sub inuolucro nux occultatur. putamine plerunq; triquetro, villosa atque barbato. Cornu instar præduro, anteriori parte humanam fere faciem referēte, nucleo intus oui anserini magnitudine, inani, substantia pingui, duriuscula tamē, alba, callosa que, sapore butyroso tenui subaspera que; cuticula obtecto.

L O C V S .

Prouenit hæc arbor copiosa in *Idem* India Orientali. unde ad nos affertur.

Q V A L I T A T E S .

Nuces excalfaciunt, & humectant ordine primo: emolliunt, læuigant, & dolores sedant. *Idem*

V I R E S .

Additur nucleus à tenui cuticula repurgatus, in medicamentis, quibus extenuata corpora refocillantur. Idem genituram auget, & venerē allicit. Oleum, quod ex ijs *Idem*

exprimitur, utiliter inungitur ad hemorrhoidarum dolores, quin etiam lumborum, geniumque cruciatus mulcet. Præstat idem, ad neruorum dolores; & ad pectoris asperitates, non modo illitum, sed etiam delinctum. Raucedini opitulatur; macie affectos impinguat, & induratos articulos emollit: Quod autem lætiore sagina corpora reficiat: Idcirco maximè expetitur à strigosis mulieribus.

Nux Myristica, Græcis Μοσχοκάριον, μοσχοκαρίδιον κάριον μυρισικόν. ἢ καρπὸν ἀρωματικόν.] Arabibus, *fenzbaue Iusbague, sine Giunziban.*] Italis, *Noci Moscade.*] Germanis, *Muschcatnueß.*] Hispanis, *Nuez de especie.*] Gallis, *Nois Muscades.*

F O R M A .

M Y R I S T I C A E N U C E S .

Matt. Arbor, quæ Myristicas profert nuces, nostratibus Persicis haud absimilis est, angustioribus tñ foliis, ac brevioribus. Fructu nostratibus nucibus in arbore existentibus persimiles sunt. primò. n. crasso ac viridi cortice conteguntur: cui deinde subest nux ipsa duro satis putamine occlusa, nostrate tamen renuiore, quam macis (quem vocāt) reticuli instar ambit: putamine autem fracto, nux myristica inuenitur, quam vulgus medicorum Muscatam vocant. Id quod palam faciunt nuces integræ, quæ ex India melle asseruatæ ad nos cōuehuntur. Caterùm arbores absq; oī cultu fructus edūt suppeditante tñ natura. L O C V S .

Matt. Afferuntur ex India, ex insula præsertim nomine Badā.

Q U A L I T A T E S .

Auicenn. Excalfaciunt, & siccant ordine secundo completo, quin etiam adstringunt.

V I R E S .

Matt. Commāse oris suauitatē cōmendant, & fœtentis animę virus abolent. Lentigines in facie emendant. Visum acuunt, ventriculū corroborāt. Lienē absument, urinā cient, fluentē aluum sistunt, flatūs discutiunt, & frigidis quibuscūq; vteri affectibus mirificè prosunt. E recentibus prius cōtusis, & in cacabo calefactis, prelo exprimitur liquor, q̄ refrigeratus, cerē instar cōcrescit, fragrantissimū spirans odorē, & neruorū, & articulorū diuturnis doloribus, à frigore excitatis utilissimus. Idem expetitur Venereis vñctionibus. Mulcet myristicè nux ventriculi dolores, à flatu genitos, & contra venenosorum animalium ictum ex vino pota maximè præstat.



Latinis Nux Metella; Recentioribus Stramonium. Arabibus, *Leizalr-
chaba.*] Italis, *Noce Metella.* Germ. *Toel nüss, Sclafföffe.*

N V X M E T E L L A .

F O R M A .



Solanis eius planta adeò si *Serap.*
milis est, ut aliud nihil *Anicen.*
quàm ipsum represen- *Matt.*
tet: verùm eius folia opiũ
redolent. Flores gerit
albos, convoluuli ma-
ioris, siue lævis smilacis
æmulos. Fructus Mesp-
i lorum magnitudine,
circumquaq; aculeatus
umbilicatusque, viridi
colore, in quo semen,
Mandragorę simile.

L O C V S .

Seritur nũc passim in hor *Matt.*
tis, ut alia peregrina.

Q U A L I T A T E S .

Frigida est excessu quarto, *Serap.*
obstruit, mulcet, vomi-
tiones ciet.

V I R E S .

Pota quatuor granorum *Serap.*
pondere cum vino for- *Anicen.*

tem facit ebrietatem, duorum verò drachmarum pondere hausta,
statim interimit, nisi succurratur epoto butyro calido, vomitu, &
aquæ calidę balneis cùm brachiis, tum cruribus adhibitis.

γάρυμφος. NUCES Auellanae, seu Ponticae, seu Preneſtinae, Græcis, Κάρυα πόντικα
 ἢ λεπτοκάρυα.] Italis, Nocciuole, auellane, & nocelle.] Germanis, Hasel-
 nueß.] Hispanis, Auellanas.] Gallis, Noifilles, Noilettes, Auellaines.

NUCES AVELLANAE.

G E N E R A .

Mitt. Domestica, & Sylvestria. Caterum
 ex domesticis, alia oblonga, alia
 rotunda sunt, veruntamen oblon-
 gas præstantiores, & gustui gratie-
 res esse constat, & illas præsertim,
 quæ rufo sunt putamine, & fractu
 minimè contumaces.

F O R M A .

Idem Arbor est, quæ rarò procera specta-
 tur, sed quæ ab ipsis statim radici-
 bus fruticosa sit. Arboreſcit tamè
 ramis in summitate frondosis, fo-
 liis alni latioribus, crispioribus,
 tenuioribusq; & ambitu serratis.
 Cortice vestitur tenui, & enodi
 materie: floret hæc arbor nunquã,
 sed iulos emittit autumnò longi
 piperis figura, quo tempore folia
 decidunt. Noces eduntur æstate,
 quorum putamen viridi callosa-
 que vestitur membrana, molli, &
 quæ in barbæ modum simbriata
 protrahitur. Quanquã id non in
 omnibus fiat. Nuci nucleus, quan-
 doq; albus, quandoq; purpurea
 vestitus membrana, dulcis, ferè
 Amygdalarum modo, sed durior pulpa.

L O C V S .

Idem Domesticae habentur in hortis, vi-
 neis, & viridariis. Sylvestres ve-
 rò ubiq; proueniunt in syluis, &
 secus itinera.

Q U A L I T A T E S .

Gal. 2. Plus habent essentiaë terrestris, ac fri-
alim. fac. gida quàm iuglâdes, quin & plus
 & 7. alunt, si quidem densiores sunt,
simp. me. & minus pingues.



V I R E S .

Gal. Stomacho infestæ sunt, medentur tussî veteri, si trita in aqua mulsa sumantur. Tosta & cum
 DIOSC. exiguo piperis pota, deſillationes concoquunt. Crematarum cinis cum axungia, aut vrsi
 adipe illitus alopecii capillum reddit. Drucorata minus Amygdalis alunt, cibus in ventriculo
 supernatant, & caput tentant, sed virides innocentiores sunt.

AVELLANAE Indicæ, Italis, Nocivole d'India. *Germ. Indianisch Haselnuss.*

AVELLANAE INDICAE.

GENERA.

Tria nobis allata sunt genera.

FORMA.

Prima, quod Serapioni Fau- *Matt.*
fel appellatur, Myristicæ nu-
ci simillima spectatur, nisi
quod pars altera plana, alte-
ra eminentior est. Sed nullo
penitus odore referta, & sa-
po-
re adstringenti. Nascitur
hæc nux lanuginoso, seu po-
tius capillaceo involucro in-
clusa, Indicæ nucis modo
barbato. ¶ Arbor quæ eam *Serap.*
profert nuci Indicæ similis
habetur, proceritate tamen
minor. ¶ Secundum & ter-
tium genus, ex eorum ima-
ginibus hic expressis, facile
quispiam intelligere poterit.

LOCVS.

Afferuntur ex India vna cum *Matt.*
Myristicis Nucibus.


QUALITATES.

Refrigerat, quæ Faufel appel- *Serap.*
latur, corroborat, & valen-
ter adstringit.

VIREs.

Confert calidis morbis quibus *Matt.*

eunque tam hausta, quàm exterius illita : decoquitur in vino ad dentiū dolores, &
fluxiones. Si enim eo calido foueantur, non modò eorum dolores mulcet, sed va-
cillantes firmat : illinitur quoque ad palpebrarum scabiem, & additur in collvriis,
quæ parantur ad oculorum inflammationes. Est quoq; ad dysenteriam mirificum
auxilium, ex rubro vino austero drachmæ pondere quotidie pota, aut cotoneo-
rum malorum succo. De cæteris autem generibus quid dicam, non habeo.



MORVS, Arbor Græcis, *μορέα*, ἢ *συκόμυρος*.] Arabibus, *Tut*, *sive Thut*.] Italis, *Moro*.] Germanis, *Maulberbaum*.] Hispanis, *Moras*, *del Morral*.] Gallis, *Maurier*.

MORVS.

G E N E R A .

Matt. Duum est generum, album videlicet, & nigrum, a fructu appellationem sortitum.

F O R M A .

Idem Nigra Morus caudice plurimum est contorto, gibberoq; ac nodoso. Ramos edit crassos, in latum spatiantes, libro vestitur crasso, lento, ac flexili, cui materies subest robusta, & medullitus flava. Radicibus nititur numerosis, magnis, ac robustis, non tamen altè descendenti bus. Nigræ folia latiora, crassioraq; sunt, & ambabus in acutum desinentia, & circumquaq; serrata. Nigra fructum fert Rubi, grandio rem tamen, oblongioremque. Sanguineo succo per maturitatem madētem. In alba autem, bacca minores habentur, quæ ubi ultimam sēdere maturitatis coctionem, mellem prorsus dulcedinē recipiunt.

L O C V S .

Idem Alba ubiq; scatet Italia, ac etiam Hispania ad alendos sericeos Bombyces, tantum sata, Nigra verò etiam ubiq; habetur, aut in hortis aut in Viridariis.

Q V A L I T A T E S .

Gal. li. 8. Immatura Mora ubi aruerint, admodum ventrem restringunt. Maturo rum succus adstringit mediocriter: immatura verò, & tota arbor admissam qualitatem habent, ex restringente, & purgante compositam, in radicis autem cortice purgatoria cum quadam amaritudine exuperat qualitas.

V I R E S .

Diosc. Mori succus decoctus in areo vase atque insolatus adstringentior redditur. Idem facit ad fluxiones, & tonsillarum, vuarq; inflammationes, addito mellis exiguo. immatura, siccāq; cœliacos iuuant, & dysentericos. Radicis cortex decoctus in aqua, & potus aluum resoluit, latus ventris tinea excutit, & his quoq; auxiliatur, qui aconitum biberant. Succus foliorum potus valet contra Phalangiorum ictus. seruefacti corticis, & foliorum iure dentes aptissime in dolore colluuntur. Succus ex incisa radice emanans, ubi cōcreuerit, in dolore dentium efficax est. tubercula discutit, & aluum purgat.



SYCOMORVS, Græcis, Συκομόρος.] Arabibus, *Mumeiz*, & *Iumeiz*, *Aliumeiz*, & *Giumeizi*.] Italis, *Sicomoro*. Germ. *Wild figen Baum*.

SYCOMORVS.



FORMA.

Arbor est magna Fico simi ^{DIOSC.}
lis, frondosa, multo lacte ^{Theoph.}
abundans, foliis mori.
Fructum ter, aut quater
anno fert, non ramis, vt
ficus, sed caudice ipso ca-
prifco non dissimili, dul-
ciorem grossis, sine gra-
nis interioribus, qui nō
maturefcit, nisi prius vn-
gue, aut ferro scalpatur.
Decerptis fructibus, alij
ac alij ex eodē loco sub-
nascuntur, terno ita, &
quaterno partu copioſe.

LOCVS.

Nascitur plurimū in Ca- ^{DIOSC.}
ria, Rhodo, Syria, & Æ-
gypto.

QUALITATES.

Succus è vulnerato cortice *Gal.*
manans, conglutinat, di-
scutit, emolliti.

VIRES.

Fructus aluo utilis, sed perexiguum præbet alimentum, & stomacho ^{DIOSC.}
aduersatur.

PSEUDO SYCOMORUS. Italis, *Sicomoro falso.*] Mauritanis, *Azada racht.*
Germ. falsch roth faigen Baum.

PSEUDOSYCOMORVS.

FORMA.

Matt. Arbor est procera. Foliis vulgaris loti longioribus, & in acutum desinentibus. Baccas edit virides. è quorum ossibus Monachi verticillos parant, qui bus funiculo traiectis, suas numerant preces.

LOCVS.

Matt. Nusquam in Italia (quòd sciuerim nouerimque) hæc planta sponte nascitur. Habetur tamen aliunde allata, in Cœnobiorum claustris, templorum areis, & aliis in locis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Anicm. Deleterie facultatis participes est, sed quid præter id præstare valeat ignoratur.



CENSURA.

Ridiculum est credere vnà cum vulgo, hanc plantam esse sycomorum.

FICVS, Græcis, *σῦκα*.] Arabibus, *Sin Fin, seu Tin.*] Italis, *Fichi.*] Germanis, *Feigen.*] Hispanis, *Igos.*] Gallis, *Figues.*

FICVS.

G E N E R A .

Varia ficuum genera sunt, cùm facie *Matt.*
tùm colore diuersa.

F O R M A .

Arbor caudice plurimùm est breui, *Idem*
contortoq; , subalbicante libro, lacteoque succo madente, gustu adstringenti, ac amaro, adeo vt exulcerare possit, materies illi alba, & fungosa, tenaxq; . Radicibus nititur multis, sed summa tellure vagantibus. folia illi sunt aspera, ampla, firma, vitiginea, rotundis ac robustis pediculis nitentia. Fructus edit nullis apparentibus floribus, à foliorum exortu, extremis tantum ramis, turbinatos, & varios, siquidem alij pyri faciem repræsentant, alij sessiles sunt inter hos medij. Differunt etiam colore, quippe quòd alia alba, alia nigra, alia purpurea, alia virides, alia subrufa, alia pallida, & aliq; variegato colore spectetur. molli præterea sunt pulpa, granis minutis referta, & esui gratissima. L O C V S .

Habentur in hortis, vineis & viridariis, in Italia, & Hispania copiosa. *Idem*

Q V A L I T A T E S .

Commeabiles sunt, & facile in totum *Gal. 2.*
corpus penetrant, nam abstergendi vi polleunt haud obscura, flatuosa tamen sunt aliquatenus. Arida verò vim habent excalfaciendi ordine primo còpleto, aut secundo incipiente. Habent, & partium tenuitatem quandã. Pinguiores magis còcoquuntur, gustu verò aciores, magis extergunt, ac discutiunt. Arbor tenuium est partium. Lac & *DIOSC.*
foliorum succus valenter calidus est, coagulat, exulcerat, apit, soluit.

V I R E S .

Maturi Fici alium soluunt, sed facile *DIOSC.*

sistitur fluxio, cæterisq; autumnalibus fructibus sunt innocentiores, sitim sedant, caloremq; restringunt. Sicci vires alunt. Gutturis, renibus, vesicæ, Suspiriosis, Hydropicis, & comitialibus aptissimi sunt. Toracem purgant. Eandem decoctum cum Hyssopo tussi veteri, diuturnisq; pulmonum vitis conuenit. cum Cnici pulpa tusa, & deuorata alium emollit. Idem arteriæ, & tōsillarum inflammationibus vtiliter gargarizatur. Coctæ, illitæq; duritias discutiunt. Crematæ, & cerato addito perniones sanant. Lacteus fici succus, lac in ventriculo concretum dissoluit, exulceratq; . Potus menstrua ciet, & infusus vermiculosas aures sanat. Percussis à Scorpione, venenatorum ictibus, & rabiosi canis moribus auxiliatur. Canis dentium inditus dolorem tollit. Verrucas aufert circumlitus. Lac dum coquitur, si ficulneo assidue moueatur, alium soluit.



FICUS indica, Italicè, *Fico d'India*. Germ. *Indiavijg* *farigou*

INDICA FICUS.

FORMA.

Matt.

Arboris faciem repræsentat, quanquā sine caudice, sine ramis, germinibusq; cōstet, ut ex appicta hic imagine quispiā cernere potest. Si quidē hęc abscisso vno tantū folio, humiq; ad mediū vsque sepulto, prognatis ex se radicibus, paulò post folia supernè ex ipso prodeunt, adeò ut hac seriè foliis è foliis prodeuntibus in arboris speciē assurgat. Folia ei crassissima sunt, ita ut quandoque pollicis crassitudinē æquent, è quibus tenues, longę, acutæq; prominent spinæ, etsi sine spinis etiā habeantur. Pasit hęc in foliorū summiratibus, fructus pulpa, & sapore ficubus nostratibus similes, sed crassiores, & qui superiore parte in coronæ speciem desinant. Colore ex viridi purpurascente.



LOCVS.

Idem Peregrina in Europa est arbor, & in Italia à multis, in hortis colitur.

QUALITATES, ET VIRES.

De viribus, & qualitatibus, quid veri, certiq; afferam, sanè non habeo: referunt tamen, qui Orientales Indias sunt peruagati, eorū esu cruentā reddi urinā, nō sine sumentium terrore, qui horum vires ignorāt.

PERSEA, Græcis *περσέα*. Italis, *Persea*.

Cum. *persen baumb aus Egypten.*

P E R S E A.



F O R M A.

Persea arbor est aspectu *Theoph.* magna, formosaq; folio, flore, ramo, totaq; figura potissimum pyro vicina, nisi quod folio perpetua est. fructum abundè parit, omniq; tempore perficit: quippe novus anniculum semper occupat. Maturitas annuversariorum afflatu conficitur, reliquum crudiores auferunt, atque rescindunt. Idem est magnitudine pyri, figura oblongus Amygdalem modo, colore herbidus: nucem intus habet ut prunum, minorem tamen, & molliore. pulpa eius suavis, ac prædulcis, coctumq; facilis, & innocua, etiam largius sumpta. Materie constat robusta duraque, & visu decora.

L O C U S.

Nascitur in Ægypto circa *Theoph.*

Alexandriam, ac etiam in Perside, unde illi nomen: ibi enim cum *Gal.* exitiosa esset, in Ægyptum translata, mutata natura in cibos recepta est.

Q U A L I T A T E S, E T V I R E S.

Arida folia in farinam redacta illitu sanguinum eruptiones quascumq; sistit. *Diosc.*

C E N S U R A.

Proculdubio aberrant, q Ægyptiâ Perseâ, nostratè Persicû esse existimant.

IBERIS, Græcis, *Ιβέρης καρδαμυλλανή, ἢ ἀγρίο καρδαμύς.* Arabibus, *Seitaragi, Aseitaragi Scitharegi, sine Hausab.* Italis, *Iberide, seu Lepidio.* Germanis, *Unilde kresz.* Hispanis, *Nasturtio montefino.* Gallis, *Chasserage, & Passerage sauvage, sine Nasitort sauvage.*

I B E R I S.

F O R M A.

Diosc. Folia habet Nasturtij, Cau-
Damocr. lem cubitalem, ramo-
sum, florem lacteum, se-
men Thlaspi simile, sa-
pore acri, grauique o-
dore.

L O C V S.

Damocr. Nascitur secus itinera, in
rueribus, templorum
areis, & in agrorum in-
cultis extremitatibus.

Q U A L I T A T E S.

Excalfacit ordine quarto,
nasturtij modo, minus
tamen eo desiccatur.

V I R E S.

Gal. Radix contusa, cum salsa
Damocr. axungia, horis quater-
Diosc. nis adalligata, Ischiadi-
cis mirum in modum
medetur.

C E N S V R A.

Hallucinantur qui Iberi-
dem & Lepidium duas
contendunt esse plātas.



TRITICVM Græcis, *πυρός*.] Aphris, *Henta*, *Henca*, *sive Hantha*.] Ital-
lis, *Grano*, *sive Formento*.] Germanis, *korn*, *sive vneissen*.] Hispa-
nis, *Trigo*.] Gallis, *Fourment*. *veris*.

TRITICVM.



GENERA.

Plura notantur genera, cum à lo-
cis, tum à colore, viribus, matu-
ritate, prouentu, & spicarum
numero, forma ac magnitudine
denominata.

Matt.

FORMA.

Triticum omne radicibus nume-
rosis, ac prætenuibus nititur fo-
lio singulari, germinibus omni
no multis, sed quæ in ramos bra-
chiarum non possint. Tota hyeme
herbaceum est: remollito autem
calo, cauliculis de medio assur-
git, cuius tertio, aut quarto geni-
culo spica geritur, non prius cui
dens, quam folliculo inclusa.
cōsumato eo, flos erumpit quar-
to, aut quinto post die, ac totidē
ferē diebus perdurat, & post flo-
rem granum crassescit, quod ubi
maturuerit, demetitur.

Theoph.

l. 8. c. 4.

de his. p.

LOCVS.

Seritur vbique locorum. Locis
autem maritimis, & tractu ainc
niore, calidioreq; fragilius, ac
copiosius prouenit.

Matt.

QUALITATES.

Excalfacit foris impositum, non ta-
men refrigerat, nec desiccatur ma-
nifeste. habet etiam quiddam
glutinosum, & obstruens. Fermen-
tum autem excalfacit, & trahit.

Gal. l. 8.

simp. m.

VIRE.

Tritici farina illinitur ex hyoscya-
mi succo ad neruorū fluxiones,
& contra interaneorum inflatio-
nes. Furfures ex aceto decocti
turgentes mammas resoluunt:
viperarum morsibus, & tormi-
nosis auxiliantur. Tritici pollen,
si x hydrel æo decoquatur, om-

DIOSC.

nem discutit inflammationem. Glutinum ex similagine, & polline, quo chartæ glutinan-
tur, sanguinem excreantibus prodest, si frequenter delingatur. Panis è similagine confectus
plus alit, quàm cibarius. ¶ Commendatur tritici oleum ad vlcera sinus, ad manuum, pe-
dumq; rimas, atque ad cutim læuigandam: Paratur compressis granis inter calefactas igni
ferri laminas.

Matt.

FRUMENTVM Indicum. Indis *Maitz.*] Italis, *Grano*, *sive formento India*
no.] Germanis, *Turckischenkorn.*] Boemis, *Turecken Zÿto*.

FRUMENTVM INDICVM.

G E N E R A .

Matt. Quatuor est generum, quæ tan-
tum granorum colore diffe-
runt. Est. n. quod nigrum,
quod rufum, quod album,
quodq; fulvum semen pro-
ferat.

F O R M A .

Matt. Caule exit arundinaceo, quem
admodum & folio, crasso, ro-
tundo, procero, geniculato,
alba intus medulla, in cuius
cacumine paniculæ fundun-
tur diuulsæ, superuacue, nul-
lis intus granis. Fructum e-
dit folliculo membranaceo
inclusum è medio calamo
ex latere prodeuntem, cuius
spica piceæ arboris conum-
cum crassitudine, tum longi-
tudine equat, circa quâ om-
nino nuda coaceruantur gra-
na penitissime sese stipan-
tia, læuia, & subrotundâ, pi-
si magnitudine, alba intus
substantia. Radicibus niti-
tur numerosis, durisque.

L O C V S .

Idem Seritur in campis, & agris, ster-
corato solo.

Q U A L I T A T E S .

Idem Nostrate tritico paulò calidius
est, ac glutinosius.

V I R E S .

Matt. Farina utiliter miscetur cata-
plasinatis, quæ pus mouent. Id quod etiam valentius præstat fermentum ex eadẽ
farina paratum. Ex ea quoque rura alpinis tractibus pultem, quam suo idioma-
te vocant Polenta, conficiunt, & addito butyro, & caseo avidissime vorant. Est e-
nim cibus non insuavis, sed crassum præbet alimentum.



FRUMENTVM, Saracenicum. Italis, *Formentone*, & *Saracino*.] Germanis, *Heydenkorn*.] Boemis, *Pohanka*.

FRUMENTVM SARACENICVM.



F O R M A.

Foliis puenit primo statim exortu subrotundis, quę paulò post heraceam formam cōcipiunt: acutiora tamē sunt, & molliora. caulem edit rubentē, inanē, fragilē, bicubitalē, & saepe maiorē, foliosumque: flores candidos, paruos, racemosos, è quibus semē oritur triquetrum, pullo colore, sed alba intus medulla.

L O C V S.

Seritur passim in aruis, *Matt.* perinde ac alia frumētacea; bisq; in anno feri potest: nēpe vere, & post messē. Itaq; biferum est.

Q U A L I T A T E S.

Calfacit, & humectat, *Matt.* verum non multum à temperatis distat.

V I R E S.

Farina ex lacte decocta *Mat.* stat illita ad biliosas in-

flāmationes. Rura, non solùm ex ea panes pīfunt, sed pultē quoq; pīficiunt, quā polentā vocant, q̄ non ingratus est cibus, vbi rectē fiat, & caseo & butyro aspergatur. Ptissanam quoq; exutis granorū putaminibus, è granis parant, & ex carniū iure decoquunt ad esum.

C E N S V R A.

Proculdubio falluntur, qui Saracenicum frumentum, ocymum, quod pabuli genus est, esse statuunt.

Matt.

HORDEVM, Græcis κριθή.] Arabibus, Xahaen, siue shaix.] Italis, Orzo.] Germanis, Gersten.] Hispanis, Cenada.] Gallis, Orge.

HORDEVM.

GENERA.

Theoph. lib. 8. c. 4. de his. plant. Varia sunt hordei genera: aliud enim binis versibus, aliud ternis, quaternisve, cumque plurimum senis: est. n. vel cuiusmodi quoddam genus.

FORMA.

Matt. Folio exit tritici latiore, asperioreque, quin etiam culmo fragiliore, sed octonis articulis geniculato, simplici stipula, folioque, & eo quidem scabro, ac tritici latiore. Grana simplici amiciuntur tunica, quæ tamen solidè inhæreat. è cuius cacumine aristæ prodeunt firmiores, longiores, mordacioresque, quàm in tritico. Nitè fibrata radice.

LOCVS.

Idem Seritur in agris, perinde ac triticum.

QUALITATE.

Gal. 7. simp. me. Exiccat, & refrigerat ordine primo, pauxillumque; abstergit, & paulò plus desiccat, quàm farina fabacea, cui non infint cortices, cætera verò similia sunt, foris vrentibus.

VIRE.

Diosc. Minus quàm triticum alit. Pti sana verò præstat contra acrimonias, & gutturis scabritias, & exulcerationes. Eadè cum sceniculi semine cocta lactis vbertatem facit: & tu

mores concoquit. Farina cum ficu, ex mulsa decocta collectiones, & duritias discutit: cum meliloto autem, & papaueris calyce, lateris dolores finit. Hordeaceus panis ventriculum grauat, & frigidos, lentosque succos gignit. ¶ Pti sana febrientibus, & pleureticis commodissimè datur: quin etiam tabidis, & hæctica, aut marasmo laborantibus, & præsertim addito seminis melopeponis, cucurbitæ, cucumeris & papaueris cremore. Hordeum, quod non diu fuerit elixum, inflat, & ventriculo nocet.

Matt.



ZE A, Græcis Ζεία.] Arabibus, *Hais*.] Italis, *Spelta*, *Biada*, & *Tirra*.] Germanis, *Spelzt*, *Speters korn*, *kinkorn*, siue *Drückelkorn*.] Hispanis, *Spelta*.] Gallis, *Espeautre*.

Z E A .



G E N E R A .

Duum est generū, vna simplex, **DIOSC.**
altera in geminis putamini-
bus grana bina iuncta gerit.
& ob id dicoccos appellata.

F O R M A .

Folio prouenit tritico haud absi- *Matt.*
mile, tenuiore tñ culmo fir-
mioreque. verū spica à tritico
differt, q̃ plana sit, granis
tantum vtrinque è lateribus
simplicibus versibus, prodeū
tibus: aristis longis, ac tenui-
bus. Dicoccos grandiore fir-
mioreq; culmo, & spica ma-
iore prouenit.

L O C V S .

Seritur vbiq; locorum in agris, *Idem*
cæterorum frumentaceorum
modo.

Q V A L I T A T E S .

Vniuersa sua facultate quodam *Gal. l. 6.*
modo in medio est tritici, & *simp. me.*
hordei, itaq; ex illis cogno-
scatur.

V I R E S .

Valentius alit quàm hordeum. **DIOSC.**
Digeritur in panificia, sed
minus quàm triticum nutrit.
¶ Leues efficit panes, conco- *Matt.*
ctu faciles, haud ingrati gu-
stus. ¶ Ex Dicocco paratur **DIOSC.**
Halica, quæ plus alit, quàm
Oryza: aluumq; magis co-
hibet: stomacho longè vti-

lior. Decocta in aceto, ac illita lepras tollit, unguium scabrities extricat: insipienti-
bus egilopiis medetur. Infunditur vtiliter decoctum dysentericis, quos excruciat
dolor.

C E N S V R A .

Non recte sentiunt qui Halicā, & Far adorum vnam, & eandē esse rem existimant.

SECALE, siue Farrago. Italis, *Segala*.] Germanis, *Korn*.] Hispanis, *Centeno blanco*.] Gallis, *Seigle blanche*.] Boemis, *Zito*.

SECALE.

FORMA.

Matt. Folio prouenit tritici angustiore; stipula tenuiore, sed firmiore, ac proceriore, spica pendente, aristis infirmioribus, sed fœcûdis granis. diu floret; adeo, ut quadragesimo tñ die à flore maturescat.

LOCVS.

Seritur alpinis tractib°.

QUALITATES.

Matt. Refrigerat & humectat ordine primo: emollit, abstersione non vacans, & pus mouet.

VIRES.

Plin. li. 18. c. 16 Sordidos efficit panes, agrestibus hominib° idoneos, amarulêtos, ac lentos, atque facile permeabiles: minus alit quàm triticum, & hordeum. § *Matt.* Decocta integra ab equis deuorata, tineas eorum pellit. Farina additur in cataplasinatis, quæ puri mouendo parantur.

Idonea eadem est ad glutinum librariû parandum. est. n. cæteris tenacius: culmorum cinis aqua subactus, & illitus, pedum, manuumque rimas sanat.

CENSURA.

Cæcutiunt qui Secalem olyram esse putant, & pariter hallucinantur, qui Secalem cum Siligine confundunt.



AVENA, Græcis, Βρώμος.] Arabibus, *Cartamum*, *sive Churtal*.] Italis, *Na*, *sive Gena*.] Germanis, *Habern*.] Hispanis, *Avena*, *sive Auea*.] Gallis, *Avoine*.

AVENA.



FORMA.

Folio, & stipula nō admodum a tritico distat: Spica illi deuulsa, folliculis veluti paruis locustis bipedibus dependentibus, in quibus granum includitur oblongum atq; subalbicans.

LOCVS.

Seritur in cāpis. gaudetq; *Matt.* frigido tractui.

QUALITATES.

Similem hordeo vim habet. Illita enim deficcat, & digerit mediocriter, & sine morfu. temperiē autem habet paulò frigidiorē. & non nihil quoque adstringit.

Gal. li. 6. siup. me.

VIREs.

Avena in cibis aluum sistit, & eius pulte tussientes iuuatur. Eadem cū

Diosc. Matt.

putamine calefacta, & in sacculis adhibita flatuosos dolores tollit. utilis quoq; ad alēdos equos, ac etiam homines. Nam putamine exuta, vescitur a Germanis, ex iure carniū decocta. Sic enim parata cibis fit haud ingratus, & præsertim vbi estur antequam dissiliat.

ORYZA, Græcis, ὄρυζα.] Arabibus, *Arz*, seu *Arzi*.] Italis, *Riso*.] Germanis, *Reisz*.] Hispanis, *Arroz*.] Gallis, *Ris*.

O R Y Z A.

F O R M A.

Matt. Folio, puenit arundinaceo, carnosio, porraceo haud absimili: culmo cubito maiori, geniculato, triticeo crassiore, ac robustiore, in cuius cacumine spica geritur in ramulos diuisa, in qua semen vtrinque impari exortu conspicit: putamine sub flauo, aspero, striatoq; . quo exuto candidum remanet granum.

L O C V S.

Idem Gaudet locis vliginosis, ac palustribus. verum copiosissima prouenit in Asia, Syria, & Ægypto. Seritur & in Italia.

Q V A L I T A T E S.

Gal.li.8. simp.me. Habet adstrictorium quippiam, ac etiam siccandi, resoluendiq; potestatem.

V I R E S.

Diosc. Oriza in cibis mediocriter alit, sed aluum cohibet.

Matt. ¶ Ex lacte decocta, aut amygdalarum dulcium cremore, aut ex pinguium carniū iure; cibus fit haud ingratus. Quin etiā concoctu faciliior, & ori gratior. Datur in cibis vtiliter dysentericis, celiacis, & diarrhæa laborantibus; præsertim vbi prius torrefacta, in lacte, in quo igniti calculi extincti fuerint, decoquatur. farina bellè quidem admiscetur cataplasmatibus repellentibus. Eadem mammarum incipientes inflammationes arcet; cum rosis & anthemide decocta & illita.



MILIVM, Græcis, Κέϋρεος.] Arabibus, *Ieners*, *Geguers*, *sive Gjaures*.] Italis, *Miglio*, *sive Meglio*.] Germanis, *Hirsz*.] Hispanis, *Millo*, & *Miyo*.] Gallis, *Mil*, *sive Millet*.

M I L I V M.

F O R M A.



Miliū folia, pfert arūdina- *Matt.*
 nacea, panico haud lō-
 gè dissimilia, calamū bi-
 cubitalē, crassum, geni-
 culatū, lanuginosumq;
 radicē multiplicē, ac du-
 rā, paniculis diuulsis, ē
 cacumine depēdentib⁹,
 in qbus numerosa ha-
 bent grana, parua, sub-
 rotunda, solida, læuia,
 subflaua, ac tenui puta-
 mine obducta.

L O C V S.

Seritur in agris, pingui, & *Matt.*
 stercoreato solo.

Q U A L I T A T E S.

Refrigerat ordine primo, *Gal. 7.*
 & siccatur tertio exoluto, *simp. me.*
 aut certe secundo inten-
 so: paululum etiā habet
 tenuitatis. comestū mi-
 nimū confert nutrimen-
 ti, & ventrem desiccatur.

V I R E S.

Miliū & eius panis minus *DIOSC.*
 cæteris frugib⁹ alit. Eius
 pulte sistitur alius si de-
 uoretur, & promouetur

vrina. fit ex eo fomentū optimum ad siccandum citra morsum, vbi
 prius calefactum cum sacculis adhibeatur. ¶ Fitque magis efficax *Matt.*
 auxilium admistis sale, & anthemidis floribus: Siquidem rectè ad
 tormina adhibetur, quæ a flatu excitantur, & ad lateris dolores.
 Quæ in milijaceruo conduntur, diutius a carie, & putredine tuen-
 tur. imo & ipsæ carnes recentes in milioestate reconditæ, à putredi-
 ne vindicantur.

MILIVM Indicum. Hetruscis, *Sagina*.] Longobardis, *Melega*.] Venetis, *Sorgo*. *Græc. Indianis* *Sorgho*. *et* *velifera* *græc. Sina*

MILIVM INDICVM.

F O R M A.

Matt. Frugis est genus tā forma, quā proceritate arundinem referens. eius tamen calamus inanis nō est, sed alba farctum medulla, sambuci modo: Paniculas in cacumine gerit magnas, crassasq; , numeroſo semine reſertas, colore plurimū rubro: etſi nigro quoque, & ſubalbicante.

L O C V S.

Idem Seritur in campis aratro cultis, ac ſtercoratis.

Q V A L I T A T E S.

Idem Refrigerat, ſiccāt, cohibet, & reſolvit.

V I R E S.

Matt. Facultas ei haud milio diſſimilis. Rura ex eius farina panes conficiunt, ſed concoctū cōtumaces, & qui parū alant. Aluū adstringit. Seritur in Hetruria ſolum ad alendas columbas, & gallinas. calamorum medullæ cinis cum pipere, & ſpongiæ uſq; puluere, vitello oui aſſati excepta, propinatur vtiliter à cœna ſeptem diebus decreſcente Luna, ad gutturis ſtrumas. Florum puluiſculus a paniculis excuſſus, ex vino rubro drachmę pondere potus, rubra ſœminarum profluuia ſiſtit, ſi è rubris paniculis deligatur. nāque quod ex albis excutitur, alba profluuia cohibet. Datur pari iuamento etiam dyſentericis.



PANICVM, Græcis, ἔλυμος.] Arabibus, *Dochon.*] Italis, *Panico*] Germanis, *Pfemich*, *sive Heydelfemch*, *sive Pray.*] Hispanis, *Panico*, *sive Paniso.*] Gallis, *Paniz.*

P A N I C V M .

F O R M A .

Folio, radice, culmoq; milio *Matt.*
est per omnia simile: Pani-
culis autem differt: Nam
in panico panicula proue-
nit pedali longitudine, nō
ut ī milio diuulsa, sed præ
densis compacta racemis,
granis numerosis, & hir-
sutis .

L O C V S .

Seritur in campis mense ma- *Idem*
io, & quādoq; statim post
messem .


Q U A L I T A T E S .

Exiguum dat alimentum, *Gal. 6.*
exiccat, & adstringit, ut *simp. me.*
miliū, ac etiam refrige-
rat .

V I R E S .

Datur edēdum dysentericis *Matt.*
& aliis alui fluxionibus la- *Diosc.*
borantibus illinitur co-
ctum ubi siccare, & refri-

gerare sit opus . sed minus alit, & stringit, quā milium .



SESAMVM, Græcis, σησαμόν.] Arabibus, Semsem, siue Sensera.] Italis,
Sesamo.

S E S A M V M .



F O R M A .

Caule prouenit milio simi
le, crassiore tamen, ac
proceriore, foliis rubēti
bus, flore viridi, aut her
baceo, semine vasculis
incluso papaueris mo-
do.

Teoph. li
8. c. quod
plan. hist

L O C V S .

Seritur in campis, quos ste
riles reddit.

Q U A L I T A T E S .

Non parum glutinosum
est, & pingue, quare em
plasticum est, & emol-
liens, modicè calidum.
Eiusdem facultatis est,
quod ex eo conficitur
oleum.

Gal li. 8.
simp. me.

V I R E S .

Cibis inutile sesamum est,
& halitus grauitatem
facit, neruorum crassi-
tiem illitu discutit. me-
detur auribus fractis,
ambustis, inflammatio-
nibus, coli doloribus,
& cerastæ morsibus. fa-
cit & ad capitis dolores

DIOSC.

æstu concitados, ex rosaceo illitum. Eadem facit herba ex vino deco-
cta, quæ peculiariter oculorum inflammationibus, ac doloribus au-
xiliatur.

C E N S V R A .

Sesami imaginem, quam hic expressimus, vix probauerim ego esse legi-
timam, nam plures in ea desiderantur notæ.

LOLIVM, Græcis, *ἀλφα*.] Arabibus, *Sceilen*, *sive Zened*.] Italis, *Gioglio*.] *sive Loglio*.] Germanis, *Tunalch*, *Rueuueyssen*, *sive Iulch*. Hispanis, *Toio*.] Gallis, *Yuraye*.

LOLIVM.

FORMA.

Matt. Cùm hyeme nascitur, folio est longo. pingui, hirsuto, adultũ deinde culmum edit tritici graciliorem, in cuius cacumine spica exit longa, aculeatis siliquis, impari exortu vtrinq; referta, è quibus granatena quaternave cumulatim apertè prodeunt, contumaci obducta putamine. maturefcit vna cum tritico.

LOCVS.

Idem Nascitur in aruis e tritico, hordæque, corruptis vligine seminibus, aut per hyemẽ imbre nimio madidis. Corripitur contra & ipsum, & in triticum conuertitur.

QUALITATES.

Gal.lib. 6. s.m. Excalfacit in principio tertij ordinis, & exiccat in fine secundi. *Matt.* Item attenuat, resoluit, abstergit, inebriat, somnum mouet, & mentem tentat.

VIRES.

Diosc. Farina nomas, putrescentia vlcera, gangrenas compescit, cum raphanis, & sale illita. Ex aceto verò & sulphure viuo feros lichenes, & lepras sanat. Strumas quoque discutit, cum fimo columbino, & Lini semine decoctum in vino. rumpit, quæ ægre ad coctionem perducuntur. Illinitur vtiliter Ischiadicis ex aqua mulla decoctum. Si cum polenta, myrrha, & thure sufficitur, conceptionem adiuuat.



FOENVM GRÆCVM, Græcis, Τήλιν, καὶ Βούκερος.] Arabib. Olba, Helbe, seu Hebbe.] Italis, Fieno Greco.] Germanis, Femgrec, siue Bockshorn., Sibmgsbrunn. Hispanis, Alforas, vel Alloluas.] Gallis, Fenigrec, seu Se negre.

FOENVM GRÆCVM.



FORMA.

Planta est trifolio similis, foliis per ambitum serratis, caulibus exilibus, compluribusque. Flores edit albicantes, è quibus cornicula prodeunt incurua, longa, acuminataque, in quibus semen gignitur subfuluum, pingue, & graueolens. Radice nititur tenui, sed fibrosa. *Matt.*

LOCVS.

Seritur pingui solo Februario, & *Idem* Martio calidiori tractu.

QUALITATES.

Excalfacit ordine secundo, & siccatur *Gal. 8.* primo. ¶ Digerit, resoluit, emollit, pellit, & abstergit. *Simp. me. Matt.*

VIRES.

Farina ex multa aqua decocta duros tumores digerit imposita, sed feruentibus inflammationibus obest. Lienem extenuat cum aceto, & nitro illita. Mucoso seminis decocto iuuantur vteri præclusiones, ac tumores, si in eo insideant foeminae. Seminis mucago capillos, furfures, & manantia capitis vlcerata purgat, & muliebres locos dilatat, & emollit, cum anserino adipe supposita. Decoctum eius prodest ad tenasmos, & foetidam dysentericorum proluuiem. Oleum, quod ex eo exprimitur, & Myrto, capillos, & genitalium cicatrices absterget. ¶ Medetur vlcerosa scabiei, si cum quarta parte seminis nasturcij excipiat aceto, & subinde illinatur. Farina ex multa vsurpatur vtiliter ad genitalium tumores. Eadem cum sulphure, & nitro lentigines delet, quin etiam parotidas sanat. Podagrâ,

chiragram, & articulorum luxationes. Ex vino subacta, carcinomata purgat. Datur vtiliter potandum fœnogræci decoctum ad diutinam tussim; & vbi pectus fuerit exulceratum. Seminis mucago fronti ex linteolis adhibitum, oculorum fluxiones auertit. ¶ Decoctum verò eius ex aqua oculorum inflammationes arcet instillatum.

LINUM, Græcis, Λινόν.] Arabibus, Bazarichichen, seu Bezerchetan.] Italis, Lino.] Germ. Lien, sine Flachs.] Hispanis, Lino.] Gallis, Lin.

Bar

L I N U M .

F O R M A .

Matt. Caulē edit sesquicubitalem, tere-
tem, rectum, obsequiosum: fo-
lia oblonga, angusta, molliaq; :
ramulos promit in summitate
ternos, quaternosve, in quibus
cærulei emicant flores . semen
edit in orbiculatis folliculis in
acutum desinentibus, planum,
laue, cordis figura. Radice niti-
tur vnica, nō tamen sine fibris .

L O C V S .

Idem Seritur passim in campis, attrito,
ac stercoreato solo .

Q U A L I T A T E S .

Gale. 7. Excalfacit semen ordine primo,
simp me. mediumq; est inter siccitatem
Matt. & humiditatem. Quin etiā
emollit, resoluit, concoquit, &
abstergit.

V I R E S .


Diosc. Seminis farina cum melle, oleo,
& exigua aqua decocta, discu-
tit, atque emollit tam internas,
quā externas inflammationes .
Eadem cruda vitia cutis in fa-
cie, & varos tollit. Illita cum ni-
tro, & ficulneo cinere, paroti-
das, & duritias discutit. Ex vino
decocta fauos, & vlcera, quę ser-
punt expurgat. Scabros quoque
ungues eximit. cum pari nastur-
tio, & melle illita. Delincta cū
melle pectoris vitia extrahit, &
tussim lenit. Estur decoctum se-
men, melle, & pipere additis,
ad excitandam venerem . Eiuf-
dem decoctum infunditur ad
interaneorū, & vteri erosiones:
alui excrementa euocat, & est
vtile admodū in desessionibus
quæ ad vuluæ inflammationes
parātur. *Matt.* Oleum quod è semi-

ne exprimitur valet ad neruorum conuulsiones : perutile quoque est omnibus sedis affe-
ctibus, & ad emolliendos induratos fœminarum locos. infunditur vtiliter coli dolore vexa-
tis, daturq; magno auxilio, potandū pleuriticis, & nephriticis, Medetur ambustis, ex aqua
rosarum potum, & illitum. Præstat quoque ad Lucernarum vsum, quod diutius igni resi-
stat : Expetitur pictoribus, lapicidis, lignariis, cæmentariis, & ferrariis fabris .



LINUM Sylvestre, Græcis, Λινὸν ἀγρίον.] Italis, *Lino saluatico.* *Gr. vined flard 65 80*

L I N U M S Y L V E S T R E .



F O R M A .

Complures ab vna radi- *Matt.*
ce emittit caules, gra-
ciles, teretes, rectos,
ac flexiles, foliis in
caule vniuerso lini ex-
mulis, sed breuiori-
bus, ac firmioribus.
Flores ī cacumine e-
xeunt pusillis è ramu-
lis, aurei, lini floribus
facie haud absimiles.

L O C V S .

Nascitur sponte in con- *Idem*
uallib⁹ inculto solo.

Q U A L I T A T E S ,
E T V I R E S .

Herba ipsa vna cū flori- *Matt.*
bus decocta, & cum
recenti butyro illita
tumores resoluit, &
inflānationes lenit.
quin etiā induratos
articulos emollit, ad-
dita altheę radice, &
gallinaceo adipe.

C E N S V R A .

Linum sylvestre hanc plantam a nobis inuentam vocare libuit, non *Matt.*
solum, quòd linum facie referat, sed quòd lini modo in stamina
trahi possit.

Gossipium, Græcis, *ξύλον βάμβαξ*, siue *παμπάξ*, siue *ἐριόζωρον*.] Officinis, & Barbaris, (*otum, Bambax, seu Bambasum*.] Italis, *Bambagia, siue Cotone*.] Germanis, *Baumwul*.] Gallis, *Coton*.

G O S S I P I U M .

F O R M A .

Matt. Planta est quæ Gossipium præfert foliis vitigineis, floribus luteis, umbilicatenus purpurascētib⁹: fructu exigui mali magnitudine, barbato, nucis ponticæ ferè modo. is lanugine perquam alba refertus est, seminibus pipere maioribus, in quibus medulla est alba, ac pinguis. Planta seritur, adolescitque tribus, aut quatuor mensibus, ad arbusculæ proceritatem.

L O C U S .

Idem Seritur in Creta, Cypro, & Sicilia insulis, quin et in Apulia, & aliis in Regionibus calidioribus.

Q U A L I T A T E S .

Idem Lanugo excafacit, & exiccatur, seminis verò medulla excafacit, & humectat.

V I R E S .

Idem Lanugo combusta mirum in modum sanguinem è vulneribus manantem sistit. eadē accensa, & naribus suffita, vteri stragulat⁹ auertit. Seminis medulla tussientibus, & agrè spirantibus auxiliatur: genitale semen auget, & venerem stimulat. Oleum è semine expressum lentigines, alphas, & ceteras cutis infectiones in facie perunctum delet, & palpebrarum asperitates lenit.



CICER, Græcis ἐπέβινθος.] Arabibus, *Chemps, Hamos, seu Halhamos.*] Italis, *Ceci.* [Germanis, *kichern, kichererbs, siue Zisererbs.*] Hispanis, *Grauanços.*] Gallis, *Cices, siue chiches.*

C I C E R .



G E N E R A .

Satiuū est & Syluestre . Satiuū triū est generum , candidum columbinum vocatum. Rubeum venereum dictum , & nigrum arietinum appellatum. *Matt.* *Diosc.*

F O R M A .

Adolescit cubitali altitudine , foliis oblongis , denticulatis , subalbicantibus , pilosis : caule lignoso , ramis multis brachiato , floribus subpurpureis è quibus siliquæ prodeunt breues , turgentes , hirsutæ , in acutum tenuemque mucronem desinentes , in quibus ad summum grana duo concluduntur. *Idem*

L O C V S .

Seritur pingui solo vere appetente , & maturescit æstate. *Idem*

T E M P V S .

Demetitur arescentibus siliquis . nam si citius extirpetur , semen rugosum euadit. *Idem*

Q U A L I T A T E S .

Cicera calida sunt , & modicè humida , atque amaritudinis non omnino expertiar. ¶ Prouocant , abstergunt , aperiunt , attrahunt , discutiant , incidunt & flatus excitant. *Gal. 6.* *simp. me.* *Matt.*

V I R E S .

Satium Cicer vrinam ciet , colorē commendat , menses , & partus pellit . Lac auget cum eruo decoctum . illinitur vtiliter ad testium tumores , verrucosas formicas , scabiem , vlcera capitis manantia , & impetigines . Item cum melle ad carcinomata , & contumacia ulcera , addita hordeacea farina . *Diosc.*

Arietinum autem præter hæc præstat peculiariter cum rore marino ad hydropem , & regium morbum , epoto eius decocto . Lædunt Cicera exulceratam vesicam , & renes , attamen calculū frangunt . ¶ Venerem stimulant & genituram augent . Farina ex Intubi stillacitia aqua decocta , & illita locinoris tumores resoluit , & serpentium moribus medetur. *Matt.*

C E N S V R A .

Errant maximè Germani , qui pisorum ius , potandum exhibent ad abstergendum ventriculū , ubi persuadentes pisum columbinum esse cicer .

CICER Sylvestre, Græcis, ἐπίβυθος ἄγριος.] Italis, Ceci saluatichi.
 Græc. ῥιζὴν ἁγρίαν, ἡλίανθο.

CICER SYLVESTRE.

F O R M A.

Matt. Satiuo ciceri simillimū habetur, sed folia denticulata non sunt, & siliquæ minores rotundioresque spectantur. Est planta in vniuersum hirsutior, atque asperior.

L O C V S.

Matt. Nascitur sponte in agris, & locis incultis.

Q U A L I T A T E S.

Matt. Excalfacit & siccit, & cū plus amaritudinis habeat, magis quàm satium abstergit, & aperit.

V I R E S.

Plin. Ventrem subducit, sed flatus, & intestinorum dolores gignit.



FABA, Græcis, Κύαμος.] Arabibus, Hachille, Haballe, siue Bachale.]
 Italis, Fava.] Germanis, Bonen.] Hispanis, Haaas.] Gallis, Fave.

F A B A .



G E N E R A .

Plura fabarum extant genera, forma, colore, & magnitudine differentia. Aliæ enim magnæ sunt, aliæ parvæ, aliæ subrotundæ, aliæ compressæ, & aliæ quidem colore albicante, aliæ subrutilo, & aliæ subnigro.

Matt.

F O R M A .

Fabarum planta caule exit quadrangulo, obliquo, inani fragiliq̃ue: geniculis intersecto. alis etiam multis, è quibus flores complures ex vno pediculo racematim prodeunt. non vtrinque quidem, sed vno tantum latere seriatim appensi, versicolores, hirti, ac cristati. Exeunt è caule rami, in quibus folia habentur pingua, vtrinque quaterna. E ramusculorum cacuminibus clauiculae prodeunt prætenues, ac singulares, quæ facile perduntur. Siliquas edit ceteris leguminibus maiores, carnosioresq̃ue, in quibus fabæ concluduntur. Vnica nititur radici paucis adnatis fibris.

Idem

L O C V S .

Seruntur in agris cæterorum leguminum modo.

Matt.

Q U A L I T A T E S .

In exiccando, & refrigerando secundum vtrunque ad medium temperamentum propinquissimè accedunt. adstringunt, discutiunt, desiccant, abstergunt, impinguant, sed flatus gignunt.

Gal. 7.
simp. m.

V I R E S .

Ex posca decocta datur vtiliter deورا dysentericis, & caliacis. Locum mentum eius tum per se, tum cum farina hordeacea illitum, vulnorum inflammationes mitigat, cicatrices concolores facit, turgentes lacte mammas iuuat, & ab inflammatione vindicat: Lac extinguit, furunculos, sugillata, parotidasq̃; cum fœnogræci farina, & melle discutit: cum rosâ autem, thurâ, & oui candido, procidentes oculos, tumores, vuasq̃; reprimit. Subactum verò cum vino oculorum suffusiones, & ictus recreat. Manducata faba, & fronti illita fluxiones auertit. Fabarum putamine illiti, capillis, qui post euulsionem renascuntur, gracilescunt, & minus nutrimenti capeffunt. Fabalium caulium & siliquarum cinis cum vetere axungia illitus, præstat ad coxendices, & veterem nervorum dolorem.

Diosc.

Matt.

FABA Sylvestris. Græcis, κύαμος ἄγριος.] Italis, *fava saluatica*.
 Ger. *wild Bonny*.

FABA SYLVESTRIS.

F O R M A.

Mitt. Caules edit quadrangulos humi repentes, ac sese inuicem implicantes: foliis domesticæ fabæ similibus: Floribusque in purpura albicantibus, è quibus siliquæ prodeunt, lupinorum modo pressæ, sed fabarum longè minores. In quibus semen continetur rotundum, fabaceo sapore.

L O C V S.

Idem— Prouenit sponte in Apulia, cæpestribus locis.

F A C V L T A T E S,
E T V I R E S.

Idem— Sunt qui dicant hanc eandem cum domestica habere vires.

C E N S V R A.

Etsi non desint qui hanc plantam Aracum domesticum faciant, nos tamen sylvestrem fabam eandem esse censemus.



ARACVS, Græcis, ἀράκος.] Italis, Araco.

A R A C V S.

F O R M A.

Aracus humi repit, caule *Matt.*
anguloso, flexili, subas-
pero, cicerculæ haud
absumile. folia illi sunt
oblonga, caulem infer-
ne ambientia, quæ sum-
mo cacumine clavicu-
las tenues fundunt: flo-
res edit non magnos
erui ferè modo, è qui-
bus siliquæ oriuntur
pisi minores, in qui-
bus semen est asperū,
rotundum, pullo co-
lore.

L O C V S.

Nascitur inter segetes, *Idem*
campestribus locis.

F A C V L T A T E S,
E T V I R E S.

Abstergit, resoluit, desic- *Idem*
cat, & expurgat.



FABA Ægyptia, siue Colocasia, Græcis, Κύαμος αἰγύπτιος.] Italis, *Fava d'Egitto.*] Hispanis, *Hava de Egipto.*] Gallis, *Fave d'Egipte.*
Germ. Egyptische Bohnen.

FABA AEGYPTIA.

F O R M A.

DIOSC. Folia edit ampla instar galeri: caulem cubito longiorem digiti crassitudine: florem roseū, dupla papaveris amplitudine, è quo folliculus prodit oblongus, vesparū fauis similis, in quo fabæ supra operculum bullantis ampullæ modo prominent. Radice nititur arundinacea, grandi, Colocasia peculiariter appellata.

L O C V S.

DIOSC. Prouenit in Ægypto, Asia, & Cilicia. in Lacubus, & paludibus, serit humenti glebæ mandata, & ira in aquā demissa.

Q U A L I T A T E S.

*Gal. li. 1.
de alim.
facul.*

Sicuti nost ratem fabam, magnitudine præcellit, ita & naturam humidiores, magisq; excrementitiam sortita est.

V I R E S.

DIOSC. Manditur virens cruda, pariter & cocta: adstringendi facultatē obtinet, itaq; dysentericis, & celiacis prodest, insparso polentæ vice Lomēto. Cortices in mulso vino decocti, si terni inde mulsi cyathi bibantur, magis proficient. Quod in fabarū medio viride spectatur gustu amarum, facit ad aurium dolores, si tritum cum rosaceo instilletur.

C E N S V R A.

Qui sibi persuadent Ægyptiam Fabam, & Ægyptium Arum vnam, & eandem esse plantam, proculdubio cecutiunt.



ARVM Ægyptiū, Græc. ἀρον αἰγυπτιακόν.] Italis, *Aro*, *sive Gigara d' Egitto*.

ARVM AEGYPTIVM.

FORMA.

Ægyptium Arū folia fundit bina, & fortasse plura, prægrandia, Ari nostratis maiora, lineis numerosis exarata, ac lōgo, crasso, canaliculatoq; pediculo appesa. In regionibus nostris trāstatū, neq; caulē, neq; florē, neq; fructū gignit. Radice nititur bulbosa, rotunda, ima parte in caudā desinēte, agnatis circumquaq; multis, ari nostratis modo. *Matt.*

LOCVS.

Prouenit plurimum in Ægypto. *Idem*

QUALITATES.


Excalfacit & siccat, minus tñ q̃ nostrū: quin etiā abstergit, incidit, aperit, attenuat, puocat. *Idem*

VIRE.

Radix decocta, & melle excepta, medetur cunctis pituitosis pectoris morbis. Expectorat. n. valenter admo-

dū, quæ crassa, lentaq; sunt, & pituitosa: Quare asthmaticos maximè iuuat. Daſ elixa vtiliter tussietibus, ex pituitosis pectoris vitiis, ex amygdalino oleo: Idē p̃stat lac bubulū recēter mulsum, in quo radix ipsa decocta fuerit: Illinitur elixa epiphoris, suggillatis, inflāmatisq; tōsillis, fabacea farina addita, & defruto subacta: Præstat quoq; ex oleo illita ad tumētes hæmorrhoidas. *CENSURA.*

Non desunt, qui sibi persuadeant Ægyptium Arūm fabam esse Ægyptiam: sed proculdubio decipiuntur.



LENS, Græcis, φακός.] Arabibus, *Hades*.] Italis, *Lente*, & *Lenticchia*.]
Germanis, *Linsen*.] Hispanis, *Lenteyas*.] Gallis, *Lentille*.

G E N E R A .

Matt. Duum est generum. Album, quod altero minus est, & in cibis gratius. Cinereo colore alterū, orbe paulo maiore.

F O R M A .

Idem Folio exit vicæ, minore, flore haud longè absimili. Siliqua parua compressa, molliterq; in latitudinem fusa. in qua semina terna, aut quaterna concluduntur, rotunda pressa, tenui putamine connecta. Maiori flos inest in purpura candicans. minori simpliciter albus.

L O C V S .

Idem Seritur vbique in campis, cum ceteris leguminibus.

Q U A L I T A T E S .

Gal.lib. In caliditate, & humilitate medium tenet, desiccatur tamen ordine secundo. valenter quoque adstringit. Ipsum itaque eius corpus desiccatur, & sistit ventrem, decoctum verò prouocat. ¶ *Diosc.* Inflat, lenit, glutinat, extinguit, purgat, discutit.

V I R E S .

Diosc. Cum cortice cocta, & denotata aluum sistit: cōtra verò ius primum prouocat. Dantur vtiliter triginta grana delibata ad vetriculi subuersiones: cū farina hordeacea decocta, & illita, podagras lenit. Sinus cum melle glutinat, crustas rumpit, vlcera purgat. Decocta in aceto duritias, & strumas discutit: Cum coroneo malo, aut meliloto medetur oculorum inflammationibus. & addita maris aqua, valet ad nomas, quæ in gangrenas euaserunt. Cocta in aqua maris, & illita, lac in mammis concretum dissoluit. Frequenter in cibo sumpta oculorum aciem obtundit, ægrè concoquitur. Stomachum lædit, eumque & intestina inflat. Somnia tumultuosa excitat. estq; capiti, nervis, & pulmōni inutilis.

L E N S .



PHASIOLI, Græcis, φασιόλοι.] Italis, Fagioli.] Hispanis, Fasiolos.]
Gallis, Fasiolis. Germ. fasolny.

P H A S I O L I .



G E N E R A .

Diuerſa, variaq; ſunt Phaſio- *Matt.*
lorum genera, variis colori-
bus diſtincta. Nam cãdidi,
rubefcẽtes, melini, nigri, ac
diuerſis reſperſi maculis re-
periuntur.

F O R M A A L B O R V M .

Albi, & magis vulgares, qui in *Matt.*
campis ſeruntur, ſine peda-
mento per ſe reguntur, in
latum ſeſe pandentes, foliis
hederaceis, latiorib⁹ tamẽ,
& mollioribus, ternis ex v-
no pediculo prodeuntibus,
flore candido, piſi minore.
ẽ quibus cornicula prodeũt
incurua, ſpithamæ lõgitu-
dine, in acutum deſinẽtia,
quæ per maturitatem albe-
ſcunt. In his ſemina plura
concluduntur quadrupedũ
renibus ſimilia, alba, vmbi-
lico excepto, qui tantum in
iis nigricat.

L O C V S .

Seruntur in agris, mẽſe Maio, *Matt.*
& quandoque poſt meſſem,

Q U A L I T A T E S .

Excalfaciũt, & humectãt ordi-
ne primo. Atqui fului, flau-
& rubri, albis calidiores ſunt. *Simeon
ſethi.
Gale. 4.*

V I R E S .

In cibis ſumpti inflant, & vẽ-
triculo laborẽ faciunt, ſemẽ *ſimp. me.
c. 23.*

Matt.

tamen generant, & venerem ſollicitant, & præſertim ſi cum longo pipere, galanga,
& ſaccharo aſpergantur. Id autem valentius præſtant, ſi ex lacte bubulo coquantur,
quouſque rūpãtur. Redduntur in cibo innocentiores, ſi cum ſinapi, aut cariſemine
edantur. Tumultuoſa præterea, ac terrifica ſomnia reprẽſentant, cornicula dũ viri-
dia ſunt & tenera, elixantur, & cum pipere in acetariis, edũtur. phaſioli maſticati,
& illiti ſanant equorum morſus. Adduntur etiam in fucis, quibus mulieres faciem
concinnant.

PISUM, Græcis, Πισόν.] Italis, Pisello, & Bisò.] Germanis, Arbes.

PISUM.

G E N E R A .

Matt. Duum est generum, Alterū maius, alterū minus; Maius pedamēto gaudet, minus humi accumbit.

F O R M A M A I O R I S .

Idem Maius caulibus exit fistulosis, ramosisque, clauiculis multis è ramorum summitatibus prodeuntibus, foliis numerosis, longiusculis, subpinguibusq;. Si liquis cylindraceis, rotundo, & cādido semine se se intus stipante albi ciceris maiore. Flores edit papilionis animalis figura, umbilicoten⁹ purpureos, & quandoque in vniuersum candidos. Radice est imbecilli.

L O C V S .

Columel. lib. 2. Facilem & solutam terram desiderat, & in apricis feri.

Q U A L I T A T E S .


Gal. 1. de fac. alim. Exiccant, & refrigerant fabarum modo, attamē nō æquē vt fabæ sunt flatulenta; tum etiam, quòd detergendi facultatē non habent.

V I R E S .

Vbi faba non sit ad manus, pisum eius poterit esse succedaneum, præterquā iis in morbis, qui absterfione opus habent.

C E N S V R A .

Qui scribunt Pisorum iure hausto purgari puerperas, auriginosos sanari, & aqua intercute laborantes iuuari, proculdubio decipiuntur, quòd hæc haudquaquam præstare possit medicamentum, quod refrigeret & siccet. cicera enim, quæ pisa ij esse credunt, non ipsa pisa, id præstare possunt.



PISVM minus, Græcis, Πισὺν μικρὸν.] Italis, *Pisello minore*.] Gal-
lis, *Poix*. Gr. *ἡλμὸς ἀνθρῖς*.

PISVM MINVS.



GENERA.

Duum est generum al- *Matt.*
bum, & subnigrum,
quod Eruiliâ vocant.

FORMA.

Maiori per omnia simi- *Idem*
le, sed minora & gra-
ciliora illi sunt om-
nia, humiq; accum-
bit:

LOCVS.

Seritur, vt maius, apri- *Idem*
co loco, solo probe
culto, ac soluto.

QUALITATES.

In qualitatibus omni- *Idem*
bus nihil prorsus à
maiori differt.

VIRES.

Vires eadem minori in- *Idem*
sunt, quæ maiori in
se diximus.

ERVVM, Gręcis, *Opócus*.] Arabibus, *Herbum, Keisene, siue Kersene*.] Officinis, *Orobis*.] Italis, *Eruo, siue Mocho*. *Ver. Eruum, Mocho*

G E N E R A .

Diosc. Duum est generū, Candidū, & Rufum. Gal. quoq; tertium addidit, nēpe pallidū, inter prædicta mediū.

F O R M A .

Matt. Planta est sarmentosa, foliosaque, humi procubens, ramis sese implicantibus, foliis parvis, longiusculis, læte minoribus. flores edit paruos, subpurpureos, & quandoque candidos, siliquam pisi breuiorem, gracilioreque, in qua rotundum concluditur semē, conclusa inter granū & granū siliqua.

L O C V S .

Nascitur sponte in aruis, & feritur quoque.

Q U A L I T A T E S .

Gale. 8. simp. me. Calfacit ordine primo, & siccat secūdo intenso: quatenus autē amaritudinis est particeps, eatenus incidit, extergit, atq; obstructiōes aperit. Itē impinguat, urinā ciet, adeo ut qñq; sanguinē cū vrina trahat, qñ etiā emolliēdi vim habet.

V I R E S .

Diosc. Farina vlcera cum melle purgat, Lētigines, & vitia cutis in facie, & maculas in toto corpore affricta delet. Nomas, & gangrēnas diutius serpere non patitur. Māmarum durities emol-

Matt.

lit, carbunculos rumpit, atra vlcera emarginat, cum vino subacta, & illita, viperarum, & canum moribus medetur. urinæ difficultates, atque etiam tenasmos ex aceto mitigat. ¶ Melle excepta, ac delincta, crassa pulmonum excrēmēta eiicit. Eruum à ieiunis deuoratū lienem minuit, inguinum bubones resoluit ex melle illitū. Virentes siliquę cū suo caule, foliisq; contritę, illiteq; capillos denigrant. Farina vipereis pastillis additur. Damnatur autē Eruum in cibis sumptum.

C E N S V R A .

Astipulandum haud iis est, qui Eruiliam Pisi genus, Eruum esse contendunt.



LUPINVS, Græcis, Θέππος.] Arabibus, *Tarinus*, *Arinus*, *sen Tormus*.]
 Italis, *Lupino*.] Germanis, *vuickbonen*, *feigbonen*, *sive vuiffaschbonen*.]
 Hispanis, *Entramuces*, *sive entramucos*.] Gallis, *Lupins*.

L V P I N I .



F O R M A .

Matt.

Vnico exit caule, haud infirmo, folio septifariâ dissecto, piloso, molli, subalbicante, flore candido, siliquis fabaceis, compressis; albicantibus, per ambitum crenatis, in quibus quina, senave continentur grana membranis distincta, orbiculata, alba, præssa, umbilicata, & insigniter amara. Radice nititur subflavescente, ac diuaricata.

L O C V S .

Seritur in agris, sterili solo: nam ipse solum sibi impinguat. Idem

Q V A L I T A T E S .

Excalfacit, & siccatur manifestè, Idem
 abstergit, aperit, digerit, resolvit, & attenuat.

V I R E S .

Farina ex melle sumpta, ventris animalia pellit. Idem præstat ventri illita. Præstat hoc idem eorundem decoctum cum ruta, & melle potum. Idem
 Lienosos iuvat, quin etiam
 vlcera tetra, gangrenas, pustularum eruptiones, vlcera in capite manantia, vitilignes, maculasq; fotu sanat: menses, & partus extrahit in vellere subditum cum myrrha, & melle. Eorum farina cutē, & liuores abstergit: inflammationes quoque cum hor-

Diosc.
 Matt.

deacea farina, & aqua mitigat: coxendicum cruciatus ex aceto lenit. Cocta in aceto, & illita strumas dissipat, & carbunculos rumpit. Lupini in cælesti aqua decocti, quousque lentescant in pulvem, faciem abstergunt. Radicis decoctum ex aqua, urinam ciet. Ii ubi macerati dulcescere cæperint, cum aceto poti, fastidium detrahunt, & cibi auditatem faciunt.

RAPVUM, Græcis, ραπύλαν.] Arabibus, Selien, Selgem, Selgrem, siue Alse-
grem.] Italis, Rapo, & Rauo.] Germ. Rueben.] Hisp. Nabo.] Gal. Raue.

G E N E R A .

R A P V M .

Matt. Triū est generum sessile,
longum, rotundum.

F O R M A .

Idem Rapū adeo omnibus vul-
gare habetur, ut super-
uacaneum sit eius for-
mam describere.

L O C V S .


Idem Seritur in campis, citoque
prouenit, nam post mes-
sem satū, vbi seges prius
fuerat, alpinis tractibus
tribus mēsis p̄ficitur.

Q U A L I T A T E S .

Gal. Radix excalfacit & hume-
Matt. ctat. Semen verò calidū
est, & siccum : cum au-
tem sit etiam amarum,
abstergit, aperit, digerit,
prouocat, flatus gignit,
& venerem excitat.

V I R E S .


Diosc. Radix elixa ex iure carniū
alit, sed flatus gignit, hu-
mentem, ac mollē car-
nem creat. Venerem sti-
mulat. & præsertim cū
longo pipere deuorata.
fotum rapi decoctum
podagricos, & perniones iuuat. Si excauatę radici cera vna cum ro-
faceo adigatur, & feruenti sub cinere coquatur, auxilium non infi-
mum erit ad exulceratos perniones. Cymę prius elixę, deuorata, vri-
nam ciēt. Semen potum venenis aduersatur: quare in antidotis ad-
ditur. ¶ Constat experimēto valere ad variolas & morbillos. nam po-
tum semidrachmę pondere morbillos latentes ad cutim expellit.



RAPVM LONGVM.

Err. Longi

Forma tantum ab altero differt. Cetera verò nihil diffidet.



RAPVVM sylvestre, Græcis, γογγύλη ἀγρία.] Italis, Rapo siluatico.
 Ger. wild rüben.

FORMA.

Mitt. Prouenit sylvestre rapū foliis, caule, floribus, filiculis, & semine domesticis non absimilibus, sed omnia agrestiora, asperiora, hirsutioraq; spectantur. Radicem habet raphani modo longam, crassamque: sed sapore domesticis rapis, præditā, acriore tamen & amariore.

LOCVS.

Idem. Nasctur in agrorū marginibus, & iuxta semitas.

QUALITATES.

Idem. Radix, quod acrior, amariorq; sit, excalfacit ordine secundo, & siccatur in principio primi. At qui semen id longe valentius præstat: preterea abstergit, incidit, aperit, attenuat, & prouocat, magis quam domesticis.

VIRE.

Idem. Semen in farinam tritū, lentigines, & albos exurit: potū ventris aīalia pellit, & urinā ciet.

APPENDIX.

Tametsi scimus hanc plantam non esse Dioscoridis sylvestre rapum, cum tamē notis omnibus rapum referat, nobis sylvestre rapum ipsam appellare libuit.



RAPVNCVLVS, Italis, Raponzolo.

Gr. Raponzolo, ed incho feldvubloin

RAPVNCVLVS.



FORMA.

Planta est cubitalis, caulibus pluribus ab vna radice prodeuntibus, in cacumine ramosis. Folia profert antea quam caulem edat, oblonga, humi accubantia, sed quæ in caule sunt, angustiora, & longiora habentur. Flores fert in ramusculorū cacuminibus cæruleos. Semen concluditur simplici calyculo nigrum, acuminatum. Radice nititur longiuscula, crassiuscula, & media sui parte extuberante, alba, fragili, terrena, & subdulci sapore prædita. *Matt.*

LOCVS.

Nascitur in aruis non cultis, in collibus amœnis, & in pratis. *Idem*

QUALITATES.

In caliditate, & frigiditate radix non longè abest à temperatis, imo nec in aliis qualitatibus. *Matt.*

VIRES.

Estur cruda radix, ac pariter cocta in acetariis, quod maximè gustui placeat, & appetentiam excitet. Creditur quod radix elixa, & cum longo pipere deuorata, lactis vbertatem in nutricibus faciat.

CENSURA.

Non rectè sentiunt, qui putant Rapunculum, Rapum esse sylvestre Dioscoridis! Horum enim sententiæ repugnat Theophrastus lib. 7. c. 6. de plantarum hist. quippe qui sylvestre rapum radice constare longa raphani modo, breuiq; caule consistere scribit.

NAPVS, Græcis, Βουβιάς.] Italis, *Nauone*, & *Nagone*.] Germanis, *Steckruben*.] Hispanis, *Nabicas*.] Gallis, *Nauet*.

NAPVS.

G E N E R A .

Matt. Plura Theophrasto, & Plinio habentur genera. Verum nobis duo tantum seruntur, nempe album, & subflauum.

F O R M A .

Idem Folii, atque radice, raphano similis est, caule verò, floribus, & semine rapum æmulatur.

L O C V S .

Idem Seruntur napi in campis, raporum modo, & in hortis.

Q U A L I T A T E S .

Idem Radix excalfacit ordine secundo, & humectat primo incipiente: atque semen excalfacit & siccit, abstergit, aperit, digerit, prouocat, & incidit.

V I R E S .

Diosc. Cocta radix inflat, modicum alit. Semen potum venenorum vires hebetat, quare antidotis miscetur. Necat idem interaneorum vermes ex limonum, aut Citriorum succo potum: ex adianti autem decocto sumptum morbillos, & ex

anthemata ad cutim propellit, & morbi malignitatem superat. Datur vtiliter cochlearis mensura; addita Lini seminis drachma ad ciendam vrinam. Ventriculi cruditates vomitione extrahit ex oxymelite, & tepenti aqua sumptum. Datur quoque diebus pluribus quotidie drachmæ pondere ex marrubij stillatitia aqua, aut decocto, vtiliter potandum regio morbo laborantibus. Semen, tritum pressumq; copiosum remittit oleum, ad omnia vtile ad quæ semen.



RAPHANVS, Græcis, Ράφανος.] Lat. *Raphanus*, & *Radix*.] Arab. *Fugel*,
sue Fegiel.] Italis, *Rafano*, & *radice*.] Germanis, *Rettich*.] Hi-
 spanis, *Rauano*, & *Rauanillo*.] Gallis, *Reffort*.

RAPHANVS.

G E N E R A .

Duum est generum. Satiuū, & Syl- DIOSC.
 uestre, quod Armoraciā Latini
 vocauerunt.

F O R M A .

Folia fert napo similia, aspera, at- Matt.
 que hirsuta: caulis illi teres, flos
 albus, siliquæ tumentes, ac mu-
 cronatæ, semine intus rotundo,
 rufo, acuto sapore. Radice ni-
 titur varia. Nonnullis. n. inest
 longa, alba, teres, tenera: fragi-
 lis, nec admodum acris. Aliqui
 bus crassa napi figura, altera lon-
 gè durior, & acrior. Differt quo-
 que colore. nanque alba, &
 nigra ubiq; fere habetur non so-
 lum satiuæ, sed agrestis quoq;.

L O C V S .

Satiuus seritur in hortis, & agris Matt.
 Agrestis sponte prouenit in cam-
 pestribus in agro Romano.

Q U A L I T A T E S .

Radix exalfacit excessu tertio, & Gal. 8.
 exiccat secundo, sed in vtroque simp. me.
 agrestis efficacior. Semen autem
 longè efficacius est. Quin e- Matt.
 tiam digerit, aperit, prouocat,
 incidit, extenuat, rarefacit.

V I R E S .

Radix vrinam ciet. Decocta contra DIOSC.
 veterem tussim, & pituitæ crassi-
 tiem in pectore efficax est, lienos-
 is utilis, fuggillata cum melle
 delet. auxiliatur contra vipera-
 rum ietus. Alopecias ad pilum Gamb. sing.
 reducit. Lentigines cum lolia-
 cea farina emendat. valet aduer-
 sus fungorum venenum quo-
 quo modo sumpta: mēses ciet.
 Recens minutim incisa, & ex- Matt.
 albo meraco, & butyro in farta-
 gine calefacta, pubiq; adnota,

remorata vrinam pellit. Idem præstat eius succus duarum vnciarum pōdere ex vino Creti-
 co haustus. Corticis vncia cū mercurialis tātūdem croci granis quatuor. Casia odorata drach-
 ma. Et duabus succi fabina: omnibus rarissimo linteolo exceptis, & subpositis, subuenit præ-
 sentaneo auxilio agrè parturientibus. Radicis succus cum oleo amararum amygdalarum &
 vini albi nonnihil feruefactus, addito colocynthidis momento aurium sonitus curat.

C E N S V R A .

Errant profectò qui raphanum rusticanum de quo statim dicetur Armoraciam faciunt.

RAPHANVS longus. Italis, *Radice longa.*

Græc. ~~radix~~ folia raphan.


RAPHANVS LONGVS.

FORMA.

Radicis forma tantum ab altero raphano differt, quæ in hac longa, tenera spectatur, in altera dura solidaque habetur, ac magis quoque acris.

QUALITATES,
ET VIRES.

Cùm sit altera mitior: mitiores quoque vires possidet.



RAPHANVS Rusticanus. Græcis, Ραφάνις ἀγρότερος.] Italis, Rafano, & Rauano.] Germanis, Cren.] Gallis, Rafan, siue Reffort sauvage.

Microcarphus, fig.

RAPHANVS RVSTICANVS.

FORMA.



Foliis prouenit Hippolapa *Matt.* thi pximis, radice lōga, pollicis crassitudine, ac ēt crassiore, acerrimo gustu, sinapi haud absimili: floribus in cauliū summitatibus albis, & pusillis. LOCVS.

Nascitur spōte in pratis, vi *Idem* ridariis, & secus itinera.

QUALITATES.

Radix excalfacit, & siccatur ordine tertio cōpleto. Aperit, pellit, incidit, puocat, attenuat, & abstergit.

VIRES.

Ea omnia pōt, quę dome- *Idem* stica, et agrestis radix, sed valentius operat̃. Quin- ēt sinapi vires obtinet, vrinā, & arenā valētius pellit. Illinitur contrita radix ex vino albo, & recenti butyro calefacta, vtiliter pubi ad ciēdam vrinam, siue sit dolor ex renū calculis, siue ex crassa, lentaq; pituita vesicę

cervicē obstruēte. In quo casu datur quoq; , nō paruo auxilio, potā- dū vinū, in quo incisa radix fuerit ^{macerata}. Germani, Vngari, atque Poloni hac radice suos adiunt cibos, in quibus quanquā appetentiā facit, reuera tamen, & caput lædit, & nidorosas eructationes mouet.

CENSURA.

Rectius fortasse saperēt, q hanc plantā perperā Armoraciā faciūt, si Cra- teuq; Thlaspi, de quo in Thlaspi meminit Dios. eandē esse scriberēt.

SISER, Græcis, Σίσαρρον.] Arabibus, Culcas, Fifarum, sine Seisaron.] Italis, Sifaro. Ger. *Blindmorn*, *grinfemorn*, *grynle*.

F O R M A .

Matt. Folia promit^r hortensi pa-
stinacæ similia, breuio-
ra tamen, atque mino-
ra, caules etiam simi-
les habet, striatos. Se-
men in umbella proue-
nit, petroselini modo:
Radicibus nititur nu-
merosis, asphodeli mo-
do, teneris, fragilibus,
dulci sapore, & ama-
riusculo, origratis, te-
nui intus matrice.

L O C U S .

In Germania vbi passim
habetur, seritur in hor-
tis.

Q U A L I T A T E S .

Gal. 8. Radix excalfacit ordine
simp. m. secūdo, aperit, digerit,
vrinam ciet, adiuncta-
que habet amaritudi-
nem, cum leuicula ad-
strictione.



V I R E S .

DIOSC. Stomacho haud inutilis est, appetentiam iuuat. § Venerem stimulat.
Matt.

SISER alterum, Italis, *Carota bianca.*] Germanis, *Gierlin, sine Giergelin.*] Hispanis, *Chiruias.*] Gallis, *Cherüy, sine Giroles, aut carottes blanches.* *Cor. geyr. Unders, Hlinsgalmory.*

SISER ALTERVM.

F O R M A.

Folia, caules, umbellas, flores, & semen habet sylvestris pastinacę. Radix, napi effigiem representat, colore albicäte, aut subflauescente, sapore subdulci, ac simul amariusculo. *Idem*

L O C V S.

Seritur in hortis, ac etiam in agris, in vniuersa Germania, & Boemia. *Idem*

Q U A L I T A T E S.

Excalfacit, & humectat, inflat, aperit, vrinas mouet. *Idem*

V I R E S.

Valet radix ad ea omnia, ad quę Siser primum valere diximus. *Idem*

A P P E N D I X.

Tametsi sub Siseris alterius nomine hæc planta posita sit, nihil tamen cum legitimo Sisere habet cognationis.



LAPATHVM, siue Rumex, Græcis, Λάπαθον ἢ ὀξύλάπαθον.] Officinis, *Lapathum acutum.*] Arabibus, *Humad*, siue *Humad.*] Italis, *Lapatio*, siue *Rombice.*] Germanis, *Ampffer.*] Hispanis, *Labara.*] Gallis, *Lapais.*

wild

Ampffer

LAPATHVM.

GENERA.

Matt. Quina habentur genera: Oxylapathum, Satium, quod & Rumex, Sylvestre. Quartum quod quidam Oxalida, alij anaxirida vocāt. Et Hippolapathum.

FORMA RVMICIS, ET
OXYLAPATHI.

Idem Exit Rumex foliis betæ nigræ proximis, sed minoribus, plantagini ferè æqualibus, hami accubantibus. Caulis illi inest cubitalis, striatus, flore rubescente, semine minuto, pellucido, nigricante. Radicibus nititur longis, flauo colore. Oxylapathum autem foliis prouenit longioribus, in cacumine acutis. cætera Rumici similia sunt.

LOCVS.

Prouenit Rumex sponte in hortis, secus itinera, & incultis locis: oxylapathum verò, in aquosis, & palustribus.

QUALITATES.

Gal. lib. Lapathum moderate digerentē sortitus est facultatē, at oxylapathum mistam: nam cum eo, quod digerit, non nihil quoque repercutit. Semen autem eorum, manifestam quandam adstrictionem obtinet.

VIRES.

Gal. ibi. Vtriusque semen, & præsertim oxylapathi dysenterias, diarrhæas, ac cætera alui profluuia cohibet potum. ¶ Præstat ad canum rabidorum morsus, fotu vulneri applicatū, & herba ipsa illita, atque vna cum radicibus potui data. ¶ Vinū

Matt. in quo oxylapathum decoctum sit, diebus aliquot potum, auriginem pellit. Aqua tota planta distillata, vna cum caphuræ momento, pustulas in facie delet. Herba pubi illita, vrinam ciet. Quin etiam radicum ex vino decoctum potum, calculos renum frangit. Idem præstat radicum siccarum puluis. Earundem decoctum fomentis adhibitum scabiem sanat: Idemque præstat succus cum sulphure illitus.



OXALIS, Græcis ὀξύλις] Officinis, & Italis, *Acetosa*.] Germanis, *Sauer*, *Ampffer*.] Hisp. *Azederilla*.] Gallis, *Ozeille*, *Vinette*, *sive Saliette*.

OXALIS MAIOR.

G E N E R A .

Duum est generum. *Ma-* *Matt.*
ius & minus.

F O R M A M A I O R I S .

Maiores folia promit Lapa-
tho adeo emula, ut quā-
que oculos fallat: attamen
minora sunt, læ-
uiora, atque paulò angu-
stiora. Et ab ipsorum
exortu sagittali ferè fi-
gura, acido omnino gu-
stu. Radice nititur, ubi-
que fibrata, sed non ru-
micis modo fulva, sapo-
re perinde ac folia, &
caules. Semen profert
subrubrum, parvum, et
acuminatum. caulē cubi-
talē, & striatum, & succo-
sum. L O C V S.

Nascitur spontè in pratis, *Idem*
& seritur etiam à non-
nullis in hortis.


Q U A L I T A T E S .

Refrigerat, & siccatur exces- *Idem*
su secundo, digerit, ape-
rit, & nō nihil incidit.

V I R E S .

Herba ipsa biliosis, ac pe- *Matt.*
stilentibus febribus ad-

uersatur. Præstat & ad cordis affectus. Sitim sedat, putredini resi-
stet: vermes necat, appetentiam excitat. ¶ Semen fluentem alium *Diosc.*
cohibet, dysentericos, & cæliacos iuuat; stomachi fastidia tollit: Sa-
nat scorpionum ictus; quod si quis in potu præsumat, nihil molesti
patietur ex ictu. Hæc omnia præstat, non solum semen, sed vniuersa
quoque planta.



Oxalis minor, Græcis, ὀξάλις μικρά.] Italis, Acetosella, Saecciola, & sannicciola. *Græc. ὀξάλις μικρά.*

F O R M A.

Matt. Folia promit alteri longè minora, pinguiuscula, lanceæ cuspidis figura; leuia minutisq; ac rubētibus venulis exarata acidioraq; , quàm in maiori. cauliculos edit pedales, tenues, in quibus flosculi numerosi spectantur rubentes, ac foliacei, & semē vt in altera subrubēs, sed longè minus.

L O C V S.

Idem Crescit exoluto solo, & in culto.


Q U A L I T A T E S.

Idem Refrigerat, ac siccatur per inde ac altera: digerit, & incidit.

V I R E S.

Idem Omnia belle potest, quæ maior; nec infirmioribus pollet viribus.

O X A L I S M I N O R.



HIPPOLAPATHVM. Græcis, ἵππολάπαθον.] Officinis, *Rhabarbarum Mo-*
nachorum.] Italis, *Rombice maggiore.*] Germanis, *Munch Rabarba-*
ren.] Gallis, *Reubarbe de Marais.*

HIPPOLAPATHVM HORTENSE.



G E N E R A .

Duum est generum, alte *Matt.*
 rum Hortense, alterū
 sylvestre.

F O R M A H O R T E N S I S .

Planta est grandis, ac for *Idem*
 mosa, foliis, semine,
 radicibus, ac cæteris
 in vniuersum notis,
 minori lapatho simi-
 libus; sed omnia lon-
 gè maiora, nam folia
 grandia sunt, helenij
 ferè modo, radix pari-
 ter grandis, vegeta,
 fuluo colore.

L O C V S .

Seritur à pluribus spe- *Idem*
 ctaculi causa in hor-
 tis, & viridariis.

Q U A L I T A T E S .

Digerit, abstergit, mun- *Idem*
 dat, aperit, prouocat.

V I R E S .

Radicis succus cum sul *Idem*
 phure illitus scabiem
 sanat, cum lupinorū
 verò farina lētigines,
 alphas, & alias cutis
 infectiones exterit.

Radicis dilutum, ex vino paratum præstat, ad pellendos renum cal-
 culos. Idem facit sicce radicis pulvis: drachmæ pondere ex *meraco*
 potus: quin etiam ex marrubij decocto haustus, auriginem curat.

Androm.

LAMPSANA, siue Brassica sylvestris. Græcis, Λαμπράνη.] Italis, Canolo saluatico, & rapo falso, & rapastrella. Græc. *νιλόριβον λεγούσι*.

L A M P S A N A .



F O R M A .

Planta est pedalis altitudinis, hirsutis foliis, sinapi non absimilibus; flore melino subalbicante; semine in corniculis erucæ modo sursum spectantibus. *Plin.*

L O C V S .

Nascitur sponte in campis cultis, & incultis. *Matt.*

Q U A L I T A T E S .

Semen excalfacit, & siccatur, Gal. 6. abstergerendi, digerendi- *simp. m.* que nonnullam facultatem possidet.

V I R E S .

In cibum sumpta; succos *Diosc.* prauos procreat, & plus alit quàm rumex.

BLITVM, Græcis, Βεῖλλον.] Arab. Bachala, Iamenia, siue Bachale Aliama-
nie.] Ital. Blito, Biedone, & Bietolone.] Germ. Mayer.] Hisp. Bredos.]
Gal. Blitte.

guter Wein & gute Frucht
BLITVM.

G E N E R A.

Matt. Duum est generum, Ru-
brum, & Album, &
in rubri genere ma-
ius, & minus.

F O R M A M A I O R I S.

Idem. Rubrum maius, cre-
scit ad arbusculæ ma-
gnitudinem, foliis &
caule alterius longè
maioribus: flore gran-
di, numerosas veluti
pāniculas fundente,
cacuminibus deor-
sum spectantibus, at-
que rubentibus ama-
ranthi ferè modo, cau-
le brachiali crassitudi-
ne, firmo, lignoso ac
striato.

L O C V S.

Seritur in hortis, & viri-
dariis, & habetur e-
tiam fictilibus ad fe-
nestras opacandas.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 6.. Refrigerat, & humectat
simp. me. Blitum ordine se-
cundo.



V I R E S.

Gal. 2. de Sumitur in cibum, sed stomacho infestum est. ¶ Datur edendum ad-
alim. fac. uersus Scorpionum ictus, quinetiam succus idem facit, cum vino
Plin. li. potus. Illinitur ex oleo, ad lienis, & temporum dolores.
20. c. 22.

BLITVM rubrum minus, Græcis, Βληθὸν μίκρον.] Italis, *Blito*, *Biedone*, aut *Bietolone minore*, & *Gelosia*. *err. Not major d. wöl*

BLITVM RVBRVM MINVS.

FORMA.

Folia promit purpurea, *Matt.* amaranthi proxima, minus tamen rubescentia. Caulem quoque habet purpurascens, striatum, cubitalemque. flores edit spicatos, siue in racemi modum, pariter purpureos: Radicem multifidam, purpureo succo prægnatam.

LOCVS.

Seritur in hortis, ac etiam in ijs spontè pro- *Idem* uenit.

QUALITATES.

Refrigerat, humectat, & *Idem* emollit.

VIRES.

Auxilantur peculiariter *Matt.* ad menses remorantes

prouocandos, molas, & secundas educendas, si scæminæ vapore decocti calidi suffiantur, adeò, vt vapor ad vterum ascendat.



BLITVM album, Græcis, Βλήθρον λευκόν.] Italis, Blito, Fiedone, & Bietolone bianco.

Blito maggiore & Blito minore

BLITVM. ALBUM.

FORMA.

Matt. Folia profert Blito rubro minori similia, subalbido colore. Flores & semen racematim tenuibus insident ramusculis, ex alarum cauis prodeuntibus, panicularum effigie.

LOCVS.

Matt. Sponte nascitur in agris non cultis, secus itinera, ac etiam in hortis, & areis.

QUALITATES.

ET VIRES.

Idem Iisdem qualitatibus, & viribus pollet, quibus & cetera genera.



MALVA, Græcis, Μαλάχη.] Arab. Chubeze, seu Chabazi.] Italis, Mal-
ba, & Malua.] Germ. Pappel.] Hispanis, Maluas.] Gallis, Malue.

M A L V A .



G E N E R A .

Vna horrensis, altera agrestis, & v- *Matt.*
traque maior. Et minor.

F O R M A .

Vulgaris adeo notitiæ malua est, *Idem*
vt eam calamo delineare opus
non sit.

L O C V S .

Prouenit sponte, & fata quoque in *Idem*
hortis & viridarijs, & vbique.

Q U A L I T A T E S .

Domestica quanto plus habet a- *Gal. 7.*
queæ humiditatis, quàm agre- *simp. me.*
stis, tanto minus digerentis est
facultatis.

V I R E S .

Illinitur vtiliter ꝑ aculeatos apiū, *Diosc.*
& vesparum ictus, nec ab his fe-
riuntur, qui ea trita cum oleo
fuerint peruncti. Sanat capitis vl-
cera, & furfures: medetur sacris
ignibus, & ambustis decocta fo-
lia, & ex oleo illita. Eius decoctū
in sessione vuluas emollit, quin
etiam clysmate infusum, uesicæ,
& intestinorum erosiones sanat.
Ius decoctæ vnâ cum radice, bi-
bitur vtiliter contra omnia vene-
na, si continuò à bibentibus re-
uomatur. Contra phalangiorum
ictus remedio est. Semen ex vi-
no potum, lac euocat, vrinæ cru-
ciatus tollit. ¶ Feruefacta folia *Matt.*
in cibum apposita raucedines ex-
pediunt, ex sale autem, oleo, aut
receti butyro aluum citant. Folia

cum porris, & capis illita, præstant ad serpentium venenosorum morsus. Succus auribus in-
stillatus dolorem sedat. Foliorum, & radicum decoctum ad lentorem usq; feruefactum datur
potandum agrè parturientibus magno iuuamento. Idem præstat succus selibræ pondere po-
tus. Semen ex vino rubro potum, nauseam tollit. Cauliculi molles elixi, delibratiq; come-
duntur asparagorum modo, ad citandam aluum. In summa Malua ad multa utilis est, ideoq;
non immerito antiqui Maluam Omnimorbiam vocauerunt.

MALVA Arborea, siue Malua maior. Græcis, Δενδρμαλάκη.] Italis, *Malba*, siue *Malua maggiore*.] Germanis, *Grossen pappel*.] Gallis, *Malues de Iardin*.

Xoſon pappely
MALVA ARBOREA.

G E N E R A.

Matt. Duum est generum. Polycaulon alterum, Alterum monocaulon.

F O R M A.

Idem Polycaulon folia gerit hortensis Maluę grandiora subhirsuta, per ambitū hortensis maluę modo diuisa, longisq; pediculis appensa. Stolonibus pluribus ab vna radice prodeuntibus, tricubitalibus, & quandoque maioribus, subhirsutis, baculi effigiem referentibus: floribus in superiore parte caulium sese pendentibus, rosarum modo amplis, & foliorum multitudine similibus: colore in quibusdam purpureo, in nonnullis candido. Et in quibusdam subpurpurascente. Semen edit ceteris maluis simile, sed maius: Radicibus nititur validis, & multifidis.



L O C V S.

Idem Seritur in hortis, & viridariis, ac etiam in fictilibus, ad opacandas in æstate fenestras.

Q U A L I T A T E S , E T V I R E S .

Idem Ea omnia facile præstare potest, quæ & cætera maluarum genera.

MALVA maior unicaulis . Græcis, Δενδρομαλάχη μονοκαυλός.] Italis,
Malva Arborea, siue Malva maggiore, d'un gambo solo.

*Υπό το φύλλο γαργα-
 νισκ. αυτ. αυτ.
 αυτ.*

MALVA MAIOR VNICAVLIS.

F O R M A.

Grandescit arbusculæ *Matt.*
 instar, caule simplici,
 magno, rotundo, ba-
 culi faciem referēte,
 foliis amplis, raris,
 & quæ ad terrā sunt,
 non vt in altera diui-
 sa spectantur : sed tā-
 tum per ambitum le-
 uiter fimbriata. Ea ve-
 rò, quæ in caule sunt,
 vulgaris maluæ mo-
 do diuisa . Floribus,
 vt in altera rosæ maio-
 ribus, & non vt in al-
 tera versicoloribus,
 sed in quibusdā sim-
 plici omnino folio-
 rum ordine, syluc-
 stris rosæ modo, in a-
 liis verò multiplici.
 Radice nititur fir-
 ma, diuaricataque.
 Semine lupino ma-
 iori.

L O C V S.

Seritur in hortis, & vi- *Idem*
 ridariis.

Q U A L I T A T E S , E T V I R E S .

Præstat ad omnia, ad quæ cætera Maluarum genera.

Idem



MALVA hederacea, siue Montana. Italis, *Malva salustica montana*.

ver. wals. F. Berg pappaly.
FORMA.

FORMA.

Mat. Folia profert oblonga
Hederę helicis ferè
modo, per ambitum si-
nuata, sed haud pro-
fundè diuisa: pediculis
prælongis inhærentia,
caulibus multis, lētis,
ac foliosis: floribus,
ac seminibus hortens-
is maluę.

LOCVS.

Idem Prouenit sponte in altis
montibus.

QUALITATES.

Idem. Magis dixerit quàm domestica, minusque humilitatis habet.

V I R E S.

Idem. Non differt viribus ab aliis Maluæ generibus.



ATRIPLEX, Græcis, ἀτρίφαξις, ἢ χυσονάχανον.] Arabibus, *Cataf*, *fusc*
Caraf.] Italis, *Atriplice*, *Reppice*, & *Treppice*.] Germ. *Molten*, *ſeu Milten*.]
 Hiſp. *Armoles*.] Gal. *Choux*, *Arroches*, *Bonnes*, *Dames*, *Folles*, *ſeu Femés*.

A T R I P L E X .

G E N E R A .

Trium eſt generum, Hortē *Matt.*
 ſe, Sylueſtre, Marinum:

F O R M A .

Hortēſis Atriplex folia mit *Matt.*
 tit humotenus lata, in
 mucronē tamen deſinē-
 tia, ſagittarū inſtar, pin-
 guia, ſuccoſa, colore ex
 viridi in luteū langue-
 ſcente : caulem rubrū,
 multis vndique adnatis
 ramis, qui ad quatuor
 cubitorū menſurā ado-
 leſcit, ſemine ſpicato,
 preſſis, tenuibusq; folli-
 culis occluſo.

L O C V S .

Seritur à ruricolis in hor- *Matt.*
 tis, & in campis .

Q U A L I T A T E S .

Humida, & frigida tempe *Gal. lib.*
 rie eſt. Humida quidem *6. ſ. m.*
 ſecūdi ordinis à mediis,
 frigida verò primi, quā
 vtiq; tepidā eſſe calidi-
 tatē dicimus. cuiusmo-
 di in roſis ineſt, non tñ
 adſtriſtionis eſt parti-
 ceps, ſed aquea eſt, et mi-

nimè terrena: Hortēſis itaq; tū humidior eſt, tū frigidior ſylueſtri, &
 paululū omnino eſt, quod digerendi vim obtinet. Semen aut abſter-
 gendi vim habet.

V I R E S .

Panos diſcutit ſi cruda, ſiue cocta illinatur. Semen cum aqua mulſa po- *Diosc.*
 tum, regium morbum ſanat. ¶ Idem potum vomitiones ciet, & al- *Matt.*
 uum exoluit : Eſtur herba ceterorum olerum modo .



ATRIPLEX sylvestris, Græcis, ἀράπαξι ἀγρία.] Italis, Reppice saluatico.] Germanis, *Uild milten.*] Gallis, *Arroches sauvages.*

ATRIPLEX SYLVESTRIS I.

G E N E R A .

Matt. Trium est generum foliorum diuersitate dissimilium.

F O R M A .

Primum genus folia edit hortensi haud dissimilia, minora tamen, & quæ ad terram sunt per ambitum laciniata, sub albicâtiâq; : caulem sesquicubitalē, ramosum, ac etiam striatum; semē racemosum, & exile: Radicibus nititur numerosis, ac tenuibus.

L O C U S .

Nascitur sponte cū in hortis, & vineis, tum secus itinera, & locis incultis, & campestribus.

Q U A L I T A T E S ,
E T V I R E S .

Gal. 6. Humida est, & frigida, sed
simp. m. minus quàm hortensis. Itaque aliquantulo plus digerit.



ATRIPLEX SYLVESTRIS II.

Wild Milder, Ist and yellow.

F O R M A.

Foliis exit latiorib⁹, quercus modo per ambitū incisis, subalbicantibus. cætera cum altera paria sunt.

L O C V S.

Nascitur prope urbium mœnia, & locis quoque aliis incultis.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Eædem illi sunt qualitates & vires, quæ priori.



Wild milium of India

ATRIPLEX SYLVESTRIS III.

F O R M A.

Matt. Folia habet lata, viridia, carnosâ, per ambitû laciniata, & in acutum desinentia: semē racemosum, ceteris minutius, caule ramofo, firmo, atq; striato.

L O C U S.

Idem Nascitur intra, & extra urbium, & oppidorum mœnia, & in arcis.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem Viribus præstat, quibus, & præcedentes.



ATRIPLEX Marina, Græcis, ἀτρίπλαξ θαλασσία.] Italis, *Atriplice*, *sive*
Reppice marino. Græc. *Μήνιλον*.

A T R I P L E X M A R I N A.

F O R M A.



Caules humi repunt, in *Matt.*
 quibus folia exeunt al-
 bicantia, spanachij ole-
 ris figura, minora tñ,
 falso sapore: Semē pro-
 fert in caulium summi-
 tatibus racemosum, ra-
 dicē diuaticatam, mul-
 tifidamque.

L O C V S.

Nascitur sponte mariti- *Idem*
 mis locis; non procul
 à litore.

Q U A L I T A T E S.

Abstergit magis quàm cæ *Matt.*
 tera genera, magisque
 aluum citat, & digerit.
 Incidit, attenuat, li-
 quat, à putredine vin-

dicat, aperit, & abradendo expurgat.

V I R E S.

Humentem ventriculum siccat, hydropicos iuuat, pingues extenuat. *Idem*

SPANACHIVM, Græcis, Σπανάχιον.] Italis, Spinace.] Germanis, Spinat.] Arabibus, Spanach.] Gallis, Espinoches, siue Espinars.

Spinach

SPANACHIVM.

FORMA.

Matt. Nascitur septem diebus, à satione, foliis primùm triquetris, quæ deinde in sagittæ formā exeunt, mox à pediculo intybæ sylvestris modo lacinia ta euadunt. Exigua nititur radice, tenuibus capillamentis librata, caule cubitali, & quandoq; maiori, inani tamen. Flores gerit in vertice rotundos, paruos, herbaceosque, racematim cohærentes; semen aculeatum, angulosumq;.

LOCVS.

Idem Seritur passim in hortis ceterorum olerum modo.

QUALITATES.

Matt. Humidum est, & frigidū ordine primo, nec omnino vacat nitrosa qualitate.

VIRES.

Serap. Aluum emollit, sed flatus gignit. Succus foliorū potus, præstat ad scorpionum, & phalangiorum ictus. Incibum deuoratum, lenit exasperatas arterias.



KALI ita Mauritanis vocata. Italis, Soda. Gr. *Salzgras*.

K A L I.



F O R M A.

Cū primū è terra emergit *Matt.* folio est tereti, minori sedo non absimili, subinde verò crescens, caule erecta geniculato, nō multo post tempore, in digitalem ferè longitudinem adolescit. cū verò magis adoleuerit, è geniculis folia emittit pingua, crassaque, canaliculata, & ex lata origine in mucronem desinentia. Vbi deniq; planta adulta senescit, folia in caulium cacuminibus longè minora, exlioraq; conspiciuntur, rufo colore, è quorum origine exiles pilule p-deunt, in quibus minurum residet semen; caules illi sunt pingues, & rufescentes.

L O C V S.

Nascitur circa Salinas, in *Idem* maris littore.

Q U A L I T A T E S , E T V I R E S.

Sapor vniuersæ plantæ salsus. Itaque excalfacit, adstringit, dissoluit, attenuat, contrahit, & desiccatur citra apertam caliditatem, aut siccitatem. Huius cinere vtuntur ad vitra conficienda, qui vitriariam artem exercent. *Idem*

BRASSICA lævis, Græcis, Κράμβη λεία.] Arabib. *Corumb*, seu *Karumb*.] Italis, *Canolo liscio*, siue *Verza liscia*.] Germanis, *Koël*.] Gallis, *Choux Vers*, aut *Choils*. Hispanis, *Colhes*, seu *Couues*.

BRASSICA LAEVIS.

FORMA.

Matt. Folio exit grandi, ima parte vtrunque dissecto, per ambitum fimbriato, læui, pinguique. caule breui, firmo, subalbicante, alba intus medulla. Flores edit melinos, & semen rapi simile, ac similibus quoq; siliquis inclusis, subrufo calore, & subamarum.

LOCVS.

Idem Seritur passim in hortis.

FACULTATES.

Gal. 7. simp. me. Desiccandi vim habet, non tamen admodum acrem, quin etiam emolliendi, glutinandi, & abstergendi.

VIRES.

Diosc. Cæcutientibus, & tremulis deuorata prodest. Summo cibo sumpta crapulam discutit, & vini noxam restinguit. Crudus succus cum nitro, & Iride deuoratus, aluum emollit, ex vino verò potus, viperarum moribus auxilium. Cum scæno-græci farina, podagris, & articulorum vitiis commodè illinitur. Prodest sordidis, & vetustis vlceribus. Caput purgat naribus infusus; Menses trahit cum loliacea farina inditus. Illita folia per se, aut cū polenta, conferunt inflammationibus, & tumoribus, & igne sacrum, leprasq; sanant, carbunculos ex sale rumpunt, fluentes capillos retinent. Emelle cocta valent ad depascentia vlcera, gægrenasque. Cruda ex aceto lienosis prosunt. Mansa, & exueto succo retusam vocem instaurant. Decoctum eorum potum aluum, & menses ciēt. Semen potum tineas ventris pellit; lentigines, albosq; illitum in facie purgat, caulium cinis adipe suillo exceptus; illinitur vtiliter ad diuturnos laterum dolores: Brassica leuiter feruesceta aluum citat deuorata, percocta verò sistit.



BRASSICA crispa, seu Sabellica. Græc. κράμβη δουλής.] Italis, *Canolo crespo*, seu *Verza crespa*. Ger. *Wirsing*.

BRASSICA CRISPA.



FORMA.

Caule exit firmo, nodoso, *Matt.*
 è quo folia numerosa
 exeunt, lata crispaque,
 & quæ in medio sunt,
 crispiora, albicantia, &
 in orbem conglomerata,
 tenera, & in cibis
 grata.

LOCVS.

Seritur in hortis perinde, *Idem*
 ac altera.

QUALITATES,
ET VIRES.

Præstat ad ea omnia, quo- *Idem*
 rum in leui Brassica me
 minimus.

BRASSICA capitata, Græcis, Κράμβη κεφαλωτής.] Italis, *Caualo Capuccio.*] Germanis, *Cops, Kraut.*] Gallis, *Choux, Cabuz.*

Simple fruit

BRASSICA CAPITATA.

F O R M A .

Matt. Folia fert primùm ampla subrotunda, à pedamentò in girum sese fundentia, quæ deinde in orbē capitatum, ac solidum conglomerantur, qui in aliquibus rufescit. in quibusdam albicat, in nonnullis virescit.

L O C V S .

Idem Seritur in Germania in cāpis. In Italia verò in hortis.

Q U A L I T A T E S ,
E T V I R E S .

Matt. Viribus ab aliis brassicis non differt, nisi quod in cibis nocentior habeatur.



BRASSICA marina, Græcis, Κράμβη θαλασσία.] Italis, & Officinis, Soldanella.] Gallis, Chou de mer. Ger. Meer Kohl Soldanella.

BRASSICA MARINA.



F O R M A .

Facie à satiua prorsus ab-
horret: nanq; folia fert
Aristolochiæ rotundæ
similia, sed parua, singu-
la à ramis rubentibus
exeuntia singulari, vt he-
dera, pediculo, lacteo
succo prægnantia, falso
gustu, & aliquantum
amaro. ¶ Flores fert
leuis similacis vulgaris
haud absimiles, cala-
thi effigiem referentes.

Diosc.

Matt.

L O C V S .

Prouenit sponte locis ma-
ritimis, & præsertim in
litoribus Venetis, & A-
quileiensibus.

Matt.

Q U A L I T A T E S .

Cùm subfalsa, & subama-
ra sit, sanè etiam ad ex-

Gal.lib.
6. f.m.

ternos corporis vsus idonea fuerit, & ad omnia, ad quæ tales qua-
litates, accommodantur.

V I R E S .

Herba in totum stomacho inimica, acris, ciet aluum vehementissimè
in cibo cocta, & coquitur propter acrimoniam cum pingui carne.
¶ Præstat eius decoctum potum, cum Rhabarbaro, ad pellendas hy-
dropicorum aquas. Idem facit foliorum siccorum puluis, addito
rhabarbaro, & cubebis, pluries ex vino potus.

Diosc.

Matt.

BETA alba, Græcis, *ἑταλον λευκον*.] Arabibus, *Decka*, sine celb.] Ital. *Bietola*.] Germ. *Mangold*, sine *pieffen*.] Hisp. *Aselgas*.] Gal. *porree*.

G E N E R A.

Matt. Trium est generum, Alba, nigra, & rubra.

F O R M A A L B A E.

Alba foliis provenit cæteris gravioribus atriplicis aut horrensis rumicis ferè similibus, per ambitum leuiter fimbriatis, caulem gerit bicubitalem, striatumque: flores exiguos, sublutei coloris: semen copiosum, inæqualiter rotundum, ac subasperum: radice alba, raphani modo longa, ac etiam tenera.

L O C V S.

Idem. Seritur passim in hortis.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 8. Nitrosæ facultatis particeps est, quæ tum digerit, tum extergit, & per nares purgat. Cocta nitrositate oëm exuit, fitque facultatis leuiter digerentis. Porro ad detergendum, dirigendumque; validior est alba, quam nigra. succus absterforius est.


V I R E S.

Diosc. Succus naribus inditus caput purgat: aurium doloribus auxiliatur radice decoctum, & foliorum: furfures, lentesque; detergit: peruniones fortu mitigat. Crudis foliis vitilignes nitro antea perfritas, alopeciarum inanitates, scalpello prius exasperatas,

Gal. 2. de
alim. fac.

atque depascentia vlcera illini prodest. Eruptionibus papularum, igni sacro, ambustisque; cocta medetur. ¶ Huius cetera aliorum olerum exigua est alimonia. iecoris obstructionibus aptius, quam malua accommodatur: magis autem, ubi cum sinapi, aut aceto estur, lienosos item similiter manducata mirifice iuuat. Iure enim quis ipsam medicamentum potius, quam alimentum dixerit.

BETA ALBA.



BETA nigra, Græcis, τὸ μέλανον.] Arabibus, *Decka*, & *celb.*] Italis, *Bietola nera.*] Germanis, *Sbarzmangold*, & *Pieffen.*] Hisp. *Aselgas.*] Gallis, *Loatre*, *reparee*, siue *porree*.

BETA NIGRA.



FORMA.

Foliis, caule, floribus, se- *Matt.*
mine, ac radicibus pro
uenit albæ similibus,
paulò tamen minori-
bus, & nigricantibus
foliis.

LOCVS.

Seritur cum alba promi- *Idem*
scuè in hortis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Viribus ab alba paulò di- *Diosc.*
stat, attamen coquitur
cum lenticula ad cohi-
bendam aluû, id quod
magis præstat eius ra-
dix.

BETA rubra; Græcis, τὰ ἑλάν ἐρυθρὸν.] Italis, *Bietola rossa.*] Germanis, *Rot mangold.* *ῥοτ μανγκολδ*

BETA RUBRA.

FORMA.

Idem. Foliis prouenit cæteris angustioribus, durioribus, rubentibusq; : radice rapi longi modo crassa, sanguinolenta, adnatis circumquaque pdeuntibus: caulæ verò, pariter rubente, semine cæteris simile.

LOCVS.

Idem. Seritur passim in Germania in hortis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Matt. Nō adeò multum differt suis in qualitatib⁹, ac viribus à cæteris generibus. Hanc Germani hyeme, aut elixant in aqua, aut cineribus calentibus coquunt, & exutis subinde corticibus, incidunt, & in acetariis, asperso pipere, concinnant ad esum. Quin etiam semicoctas in aceto, & sale diu asservant, & cum assis carnibus vorant.



PORTULACA, Græcis, ἀνδράχνη.] Arabibus, Bakleancha, seu Bachele
Alhanicha.] Italis, Portulaca, Procacchia, siue Porcellana.] Germanis,
Burtzel Kraut.] Hispanis, Verdolagas, & Baldroegas.] Gallis, Porce-
laine, Pourpier, siue Pourchaille.

PORTULACA DOMESTICA.



G E N E R A.

Duum est generum, sativa, & syl-
vestris.

F O R M A.

Sativæ folia insunt latiora, pin- *Matt.*
guia, crassa, splendentia, & à ter-
go candicantia, gustu acido, &
austero: caulem edit crassum,
glabrum, erectum, subpurpureū
atque pinguem: semine nigro,
exiguo, in herbaceis calyculis
incluso. Radice multifida.

L O C V S.

Seritur in hortis passim ab olito-
ribus.

Q U A L I T A T E S.

Frigida, & aquea temperamento *Gal. 6.*
est; refrigerat quidem ordine *simp. me.*
tertio, humectat verò secundò,
viscosum etiam quiddam obti-
net. Succus magis adstringit,
quàm herba, quæ succum gi-
gnit modicum, eumq; frigidū,
humidū, & glutinosum.

V I R E S.

Portulaca cum hordei farina capi *DIOSC.*
tis doloribus, & oculorum in-
flammationibus vtiliter im-
ponitur: Quin etiam ventriculi
ardoribus, igni sacro, vesicæ do-
loribus auxilio est, commandu-
cata dentium stuporem sedat:
stomachi, & intestinorū æstua-
tionem, fluxionesq; mulcet. Ve-
neris impetus coercet. Succus
epotus simi. i. effectū prodest.
Contra teretes ventris tineas,
cruentam excreationem, dysen-
teriam, hemorrhoidas, & pro-
fluvia sanguinis, percocta effi-
cax est: ocularibus medicamen-
tis vtilissimè cōmiscetur. Inte-
raneis fluxione laborantibus,
atq; vulvarum erosionibus, in- *Gal. 6.*

funditur: contra dolores æstu excitatos, caput ex rosaceo, & oleo fouetur eruptiones papula-
rum in capite, cum vino emendat: vulneribus ad syderationem spectantibus vtiliter illini-
tur. ¶ Fluxiones calidas omnes repellit, & in febribus hecticis totis hypocondriis illinitur,
confert muliebri profluvio tum herba ipsa deuorata, tum eius succus potus. ¶ Præciduo vni-
bilico etiam imponitur. sanat quoq; , & mammarum, & podagræ inflammationes. *Plin. lib. & capite xx.*

PORTULACA sylvestris. Græce, ἀνδράκνι ἀγρία.] Italicè, Prochachia, & porcelana saluatica, & parimente grassola,
Cor. rubra portulaca sylvestris.

PORTULACA SYLVESTRIS.

F O R M A.

Matt. Portulaca, quæ sponte nascitur, caulibus exit rotundis, lentis, pinguibus, rufescentibus, humi sese diffundentibus, folia gerit alteri similia. sed minora, oblongiora, numerosioraque: cetera consimilia sunt.

L O C V S.

Idem Prouenit in hortis, vineis, cāpis, & agris incultis.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem Non differt à domestica, nisi quòd adstringenti vi, paulò sit potentior, atque etiam non nihil minus humectat. Ruricolæ integras plantas elixant: & deinde in sole siccant. & ad hyemales cibos asseruant.



ASPARAGVS, Græcis, ἀσπαράγος.] Mauritanis, *Halion*, siue *Helium*.] Italis, *Asparago*.] Germanis, *Spargen*.] Hispanis, *Esparagos*.] Gallis, *Esparge*.

A S P A R A G V S .

G E N E R A .

Duplex habetur, Altilis, & sponte nascens. Huius tria visuntur genera nempe Palustre, Græcis, ἑλαος vocatum, Montanum, & Petreum, corruda, propriè dictum.

F O R M A .

Thyrsum is primū, siue germē *Matt.* à radicibus mittit tenerum, cacumine crassiore in acutū desinente, perinde ac Orobachē, qui tandem, auctus, in ramos sese explicat, in quibus folia sunt capillacea, fœniculo breuiora, tenuioraq;. Florem edit exiguum, quo flaccescente, baccæ subsequuntur, primū virides, & deinde rufescentes. Radice nititur circa caulem spongiosa, à qua numerosæ oriuntur fibræ elleborigeræ modo, albicantes, crassioresq;, vt in rusco.

L O C V S .

Altilis passim in hortis colitur. *Matt.*

Q V A L I T A T E S .

Abstergendi vim habet, idque *Gal.lib.* citra manifestam, aut caliditatem, aut frigiditatem. *6, s.m.*

V I R E S .

Huius teneri cauliculi triti in vino albo, renum dolores sedant. Assus autem, siue coctus urinae stillicidium, difficultatemq;, ac dysenterias mitigat. *Diosc.*

Radix cum vino, aut aceto cocta, luxatos artus mulcet. Decocta cum ficis, aut ciceribus, sumpta, regium morbum sanat, coxendicis cruciatus, stranguriamque leuat. ¶ Seruntur ad esum, nam non ingratus sunt cibus, siue in acetariis, siue dum calescunt, asperso modico sale, recentique butyro, cum pipere deuorentur. *Matt.*



ASPARAGVS sylvestris, Græcis, ἀσπράγος ἀγρίος.] Italis, *Asparago saluatico*. *Gr. wild spargel.*

G E N E R A.

ASPARAGVS SYLVESTRIS.

Tria (vt in altili diximus) huius habentur genera, Palustre, Montanum, & Petræum, Corruda vocatū. F O R M A.

Matt. Mōtanus, & Palustris, facie vix ab altili differunt. Corruda verò caule exit lignoso postq̃ adoleuit, flexiliq̃; folijs exiguis, præduris, & aculeatis. huius cauliculi prima germinatione etiam in cibis veniunt. sed cæteris tenuiores sunt, et amariusculi: quo fit, vt et ingratiore habeatur in cibis.

L O C V S.

Idem Mōtanus, in montibus, Palustris, in paludib⁹, & Petræus, siue Corruda, saxosis locis, & in sepibus, prouenit.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem Palustris, & Montanus eadē oīa possunt, quæ altilis, nec imbecilliores, nec valētiores vires habent. Ceterum Corruda ob manifestam, quam possidet amaritudinem, longè magis aperit, prouocat, & abstergit, id quod manifestè patet ex fœtida quâ ciet vrinam.

A P P E N D I X.

Idem Nascentur tibi Asparagi altiles totius anni decursu, si, vbi fructum legeris, radices, quæ summo cespite vagantur, circumfoderis, ac aperueris.



PLANTAGO, Græcis, ἀρνύγλασσον.] Arabibus, *Lifen, aut Lefan alhamel.*] Italis, *Piantagine, seu Centinerbia.*] Germanis, *Vuegerich.*] Hispanis, *Lhantem, siue Tamehagem.*] Gallis, *Plantain.*

PLANTAGO MAIOR.

G E N E R A .

Plantaginis tria obseruauimus genera, nempe maius, medium, & minus, quod quidam longam Plantaginem vocant. sunt etiam, qui aquaticam addant, de quibus omnibus speciatim dicemus.

F O R M A .

Maior, latior, virentiorq; cæteris habetur, latis cōstans foliis, oleracei generis, neruis septem, & quando que pluribus secundum longitudinem excurrentibus, quo fit, vt à nonnullis septineruia vocitetur, Huius caulis cubiti altitudinem petit, & à medio ad verticē, tenui semine circundatur. Radicibus nititur teneris, hirsutis, candidis, digiti crassitudine.

DIOSC.
Matt.

L O C V S .

Nascitur plurimū in lacunosis, & humectis locis, in Plateis, in areis, & secus itinera, & sepes.

F A C V L T A T E S .

Mistæ est temperaturæ: habet enim quiddam aqueum frigidum, quid dā verò, & austerum, id quod terreum est siccum, frigidum. Itaq; refrigerat simul, & desiccatur ordine secundò. semen eius, & radix similes sunt facultatis, nisi quòd siccioris, & minus frigida. Sed semen subtilium etiam est partium: radices verò crassiorum. folia autem exiccata tenuioris, & minus frigida facultatis sunt.

Gal. 3.
simp. me.

V I R E S .

Folia malignis omnibus vlceribus, & fluxioni opportunis, atq; elephantice, sordidisque illita profunt: profluvia sanguinis, serpētia vlcera, carbunculos, nomasq; cohibent: vetera vlcera, & inæqualia cicatrice obducunt: chironia fa-

DIOSC.

nant: sinus conglutinant: canum moribus, ambustis igni, inflammationibus, panis, parotidibus, strumis, ægilopiis illita cum sale profunt. Folia cocta cū aceto, & sale dysentericos, cœliacosq; iuuant: Estur in Betæ locum olus ipsum, cū lenticula coctum, ad aquam intercutem, quam leucophlegmatiam vocant: foliorum succo vtiliter os colluitur ad sananda eius vlcera: gingiuis cruentis, & sanguinis reiectionibus in potu confert. Clystere dysentericis infunditur: valet ad vuluæ strangulationes, cum vellere suppositus: semen ex vino potum alui fluxiones, & sanguinis excreationes sistit. mansa radix dentium dolores sedat: eadem cum foliis vtiliter in passo datur ad vlcera, tum renum, tum etiam vesicæ.



figura mēso;
ita est
media & maior.

PLANTAGO Media, siue minor, Græcis, ἀρνόγλωσσον μικρόν, siue μέσον.]
Italica, Piantagine minore. Gr. ὕνκτον μέσον.

PLANTAGO MEDIA.

FORMA.

Matt. Folia habet angustiora, minora, molliora, læuiora, & tenuiora, cauliculo est anguloso, in terram inclinato, floribus spicatis, pallidis, pilosisq; : semine summis caulibus emicante : radicibus multifidis, tenuibus, albican-
tibusque.

LOCVS.

Idem. Nascitur, & hæc perinde, ac altera plurimum humectis, & vliginosis locis, in hortis, & secus vias.

FACULTATES,
ET VIRES.

Iisdem pollet facultatibus, & viribus, quibus, & maior.



LANTAGO longa, Græcis, ἀρνόγλωσσον μακρόν.] Italis, Piantagine longa, siue lanciola. *Ger. Stiefmutter kraut.*

PLANTAGO LONGA.

FORMA.

Folia gerit longa, cuspidis *Matt.* lanceæ modo, vnde illi nomen, striata, nervosaq; , humi accubantia: caules, flores, semina, ac etiam radices mediæ plantaginis, omnino similia.

LOCVS.

Nascitur locis incultis, ac ferè vbique.

QUALITATES,
ET VIRES.

Nō differt facultatibus, & *Idem* viribus ab aliis generibus, nisi quòd minus humidas qualitates habet.



PLANTAGO aquatica ita recentioribus appellata, Græcis, *incognita*.]
 Officinis, *Barba syluana*.] Italis, *Piantagine aquatica*.
 Germ. *Wasserviegwurtz*

F O R M A .

Matt. Foliis est hæc Planta, cæ-
 teris crassioribus, car-
 nosioribus, robustio-
 ribus, ac leuioribus ex
 lata origine in acutū
 desinentibus, lancea
 cuspidis modo, caulē
 gerit cubito longiorē,
 ramosum, vbique flo-
 sculis candidis refer-
 tum, radicibus niti-
 tur numerosis, albicā-
 tibus, ellebori modo.

L O C V S .

Idem Nascitur tantū in aquo-
 sis, & palustribus.

Q U A L I T A T E S ,
E T V I R E S .

Matt. Cum neminem antiquo-
 rum habeam, neque
 apud Græcos, neque
 apud Mauritanos,
 aut Latinos, qui hu-
 ius Plantæ memine-
 rit, nec de eius viri-
 bus aliquid scriptum
 reliquerit, nihil sanē
 habeo, quod de eius
 viribus tuto in mediū
 afferre possim.

P L A N T A G O A Q V A T I C A .



C E N S V R A .

Idem Non desunt, qui hanc Plantam Damasonium, siue Alysiam esse au-
 tument. Atqui proculdubio falluntur.

SIVM Græcis, Σίον.] Mauritanis, Rocathalmi, & Inhamehanella, seu Hamehanella.] Italis, Sio, & Gorgolestro.] Germanis, *Unassermerck*.] Hispanis, Rabacas.] Gallis, Berle. *wasmering, frösseping.*

SIVM VERVM.



FORMA.

Sium, caule exit recto, *Matt.*
expāsis foliis, per am-
bitum serratis, smyr-
nio similibus, sed mi-
noribus, & odoratis:
umbellas profert in
summis caulib⁹, flori-
bus albis, semine odo-
rato, aniso non dissi-
mili.

LOCVS.

In scaturientium fontiu Gal. 6.
riis, quorum aquæ *simp. m.*
hyeme calent, ætate
verò frigent, pluri-
mum nascitur, fe-
rè semper vnà cum
Sisymbrio aquatico.

QUALITATES.

Quātum gustu Siū odo- *Gal. li. i.*
raturum est, tantū etiā *simp. me.*
excalfacientis faculta- *Diosc.*
tis est particeps.

¶ Cruda folia coctave *Matt.*
esu, calculos rumpūt,
atque excernunt, vri-
nas cient, menses, &
partus extrahunt, dy-
sentericis in cibo au-

xiliantur. ¶ Hepatis obstructions quoque expedit, vniuersę plantę
decoctum potum, auriginem tollit, hydropicos iuuat. idem, aut
ipsa herba deuorata, visum acuit.

CENSURA.

Errant, qui Plinium secuti, aquaticum Sisymbrium Sium esse censent.

SIVM vulgare. Italis, *Sio falso*. Ger. *rausswappig* *Sub andri*

SIVM VULGARE.

F O R M A .

Matt. Caulem edit striatū, ramo-
sum, inanem, tenerum,
fragilemque: folia gerit
apij, non insuavia, flo-
sculos in summitate al-
bos, semine corniculis
incluso, paruo, minuto-
que: radice superuacua.

L O C V S .

Idem Prouenit tantum in aquis
decurrentibus, perinde
ac Sium verum.

F A C V L T A T E S ,
E T V I R E S .

Idem Excalfacientis est faculta-
tis, quæ tamen imbecil-
lior illi est, quàm legiti-
mo Sio.



SYMBRIVM satium, siue hortense, Græcis, Σισύμβριον ἡύμερος.] *ital. Sisembro domestico, Balsamita, seu mentha crespa.* Germ. Cozenbalsam.

SISYMBRIVM HORTENSE.

G E N E R A.

Trium est generum. Hortē se, Sylvestre, Aquaticū.

F O R M A H O R T E N S I S.

Folia profert circinnata, vulgaris menthæ latiora, rotundioraq; . crispa tamē : caulem edit quadrangulū, & flores spicatos: folia mēthæ aciora, odoratoraque.

L O C V S.

Seritur in hortis ferè omnibus.

Q U A L I T A T E S.

Tenuiū est partium, excalfaciens, & exiccans in fine secundi ordinis, aut in principio tertij: attenuat, digerit, resoluit, aperit, incidit, & prouocat.

V I R E S.

Flatus, & lumbricos pellit, tū herba ipsa in puluerē trita, tum eius decoctū potū: valet ad veteri inflationes, si vnà cū parthenio in calenti tegula calefactū, & odorato

meraco aspersum, imo ventri applicetur: valētius quoq; vterinis doloribus puerperarum subuenit, si cum parthenio, artemisia, & anthemidis floribus, tenuiter concisum: tribus aut quatuor ouis excipiat, & deinde in patella cū oleo lilino ad ignē fiat placenta, & calida ventri medio applicetur. Illinitur tā recens, q̃ siccū calefactum, & Cretico vino aspersum, cœliacis, & ventriculi doloribus à flatu prouenientibus. Succus testibus illitus, nocturnas pollutiones cohibet.



SISYMBRIUM sylvestre, Græcis, Σισύμβριον ἄγριον.] Italis, Sifembro saluatico.] Arabibus, Sifnabarion, seu Sifnabar.
 Gr. *σισυμβριον*, *σισυμβριον* & *σισυμβριον*.

SISYMBRIUM SYLVETRE.

F O R M A .

PROSC. Prouenit menthæ hortē
 Matt. sis similitudine, odoratus tamen, & foliolatiore: caule quadrangulari, radicibus longè vagantibus, tenuibus, villosis .

L O C V S .

PROSC. Nascitur inculto solo .

Q U A L I T A T E S .

Gal. 8. Tenuium est partium, digerentis, excalfacientis, exiccantis facultatis, & temperaturæ in tertio ordine. sed & semen eius tenuiū partium est, & calidum .

V I R E S .

PROSC. Bibitur semen eius contra stillicidia vrinæ, calculosq;: idem tormina, & singultus sedat: folia in capitis dolore à pituita genito, fronti aut temporibus illinuntur. Item contra vesparum, apiumque ictus. vomitiones potu quoque cohibet.



SISYMBRIVM aquaticum , Græcis, Σισύμβριον ἑτέρον .] Officinis , & Barbaris, *Senetion.*] Italis, *Crescione.*] Germanis , *Brum Kressen*, seu *Vuasser kressen.*] Hispanis, *Berros*, aut *Agriris.*] Gallis, *Cressen.*

SISYMBRIVM AQUATICVM.

F O R M A .

Folia promit primùm ro- Diosc
tunda, adulta cruce mo-
do finduntur.

L O C V S .

Riguis gaudet , & iisdem *Idem*
locis, quibus Sium.

Q U A L I T A T E S .

Nasturtio simile quiddam *Gal. lib.*
gustu præfert : cùm sic- 8. sm.
cum est, tertij enim est
ordinis excalfacientium,
& desiccantium : cùm
verò humidum est, &
viride, secundi.

V I R E S .

Vrinas mouet : estur cru- Diosc.
dum . purgat lentigi-
nes , cutisque vitia in
facie, noctibus imposi-
tum, matutinisque de-
tractum. ¶ Cum rapha-
no omni, & petroseli-
ni radicibus sectum, &

Matt.

ex albo meraco, & butyro calefactum, calidumque pubi admotum
vrinas educit, ac trahit. Sincipiti illitus veterinosos iuuat, & præser-
tim foliorum succus .

Q ij



SISYMBRUM aquaticum minus, Italis, *Crescione minore*.

Gr. Wasserkrasson od. Wasserkrasson, d. wasser gesslitz.

SISYMBRUM AQUATICUM
ALTERUM.

F O R M A.

Matt. Folia, & caules edit longè minores, ramulis numerosis: floribus pusillis, tenuibus albicantibus, in cacumine tantum comantibus.

L O C U S.

Idem. Non solū in riguis, & aquis prouenit, sed etiam in hortis, & secus itinera..

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem. Imbecillius est altero: nanque minus excalfacit, & siccat: vbi verò alterum non sit ad manus, hoc vti præstabit..



CRITHMUM, Græcis, Κριθμὸν.] Italis, Crithmo, Finocchio marino, & herba di San Piero.] Germanis, Baulen, & Meer Fenichen.] Hispan. Perexil de la mar, & Unhas de agnula yerua.] Gallis, Bassille, & Fenoil marin.

C R I T H M U M I.



G E N E R A .

Quatuor habentur genera, quo *Matt.*
rū tria Marina sunt, & quar-
tum terrestre.

F O R M A P R I M I .

Planta est fruticosa, & vndique *Diosc.*
foliosa, cubiti altitudinem
ferè petens, foliis pinguibus,
Portulacæ ferè modo, sed lō
gioribus, latioribus, numero
sis, albicantibus, ternis ex vno
petiolo dependentibus, falso
gustu, flores in umbellis qñq;
eādidi qñq; lutei spectantur, è
qbus semē oritur, ceu Rosma
rini, odoratum, molle, ro-
tundum, in quo nucleus tri-
tici effigie, radices fundit
tres, aut quatuor, digiti cras-
situdine, odoris grati, & iu-
cundi.

L O C V S .

Nascitur in maritimis, petrosis *Diosc.*
locis. § Scopulis, & rupibus, *Matt.*
in ipsis maris littoribus.

F A C U L T A T E S .

Gustantibus salsum quodāmo- *Gal. 6.*
do est, cum paucula amarita *simp.me.*
te, quamobrem facultas illi
est, tum exiccandi, tum ab-
stergendi: vtraque tamen in
eo est imbecillior, quàm in
amaris.

V I R E S .

Radix, semen, & folia incocta vino, potu vrinæ difficultati, & regio morbo auxi- *Diosc.*
liantur, menses cient, & aluum citant. semen ex vino potum, flatus pellit.

C E N S V R A .

Qui credunt Crithamum marinum, esse Empetron, manifesto errore cecutiunt.

CRITHMUM secundum, Italis, Crithamo secondo.
Ger. Wurfmüde das andre gessete

F O R M A.

C R I T H M U M II.

Matt. Non valde differt à primo, nisi quòd foliis est angustioribus, mucronatis, atq; pungentibus, falso, amariulo, & acuto sapore: caulibus verò prægnantioribus, succosioribus, vegetioribusq; , in quorum cacumine ramuli exeunt bini, terni, quaternive, suas singuli umbellas ferentes, albis flosculis refertas, è quibus semen oritur fœniculo quadantenus simile, cui radicem quoque, non absimilem habet.



L O C V S.

Idem. Iisdem prouenit locis in maris littoribus.

F A C U L T A T E S, E T V I R E S.

Idem. Ea omnia præstare potest, quæ primum Crithmi genus, nisi quòd vim aliquam incisiuam habere videtur.

CRITHMUM tertium, Italis, Crithamo terzo.

Ger. *Wachmigel* Das *Sint* *gesset*.

CRITHMUM III.



FORMA.

Planta est fruticosa, plu- *Matt.*
res ab vna radice emit
tens caules, rectos, cir
ca quos totos folia ha
bentur, per interual
la, plura ex vna origi
ne gregatim prodeun
tia, longiuscula, cras
sa, & falso etiã gustu:
sub horum exortu pe
culiare quoddam erũ
pit folium cæteris du
plo longius, è quo p
pè caulis cavitatẽ pe
tiolus exit, ex quo sex
septemve folia breuio
ra produntur. flores
fert in cacumine orbi
culatos, villososq; pal
lido colore, radice ni
titur longa, tereti, non
sine adnatis.

LOCVS.

Nascitur in littore Ma- *Idem*
ris, locis planis, non
cliuosis.

FACULTATES, ET VIRES.

Ea omnia potest, quibus pollere cætera genera diximus.

Idem

CENSURA.

Subscribam ego illis nunquam, qui hanc quoque plantam Empetron *Idem*
nominant.

CRITHMVM quattum. *Italica, Crithmo terreſtre.*

Ger. Wuchsmisſel das Vinn geſſigk.

CRITHMVM IIII.

FORMA.

Foliis prouenit longis, angustis, firmis, ternis ex vno petiolo, ipsoq; longo prodeuntibus, vtrinque denticulatis falcis frumentariae modo. Caterum quae in cauli summis partibus habetur, minora, breuioraq; sunt. caule gerit ramosum, alis concavum, geniculatūq;: in cuius summitate ramuli exeunt diuulsi, in quibus floridæ, albicantesque sunt umbellæ, quae postremo semen oblongū, acre, & odoratum mittunt: tota planta gustu salsuginoso percipitur, atq; amariuscule, ut cætera Crithami genera, quam non adeo vehementi. Radice coheret pastinacæ maiore gustati dulce, atq; subacri, odorata.



LOCVS.

Nascitur copiosa in Boemia in agro Pragensi, non solum inter segetes, sed in agrorum marginibus, ac etiam aliis in regionibus.

QUALITATES, ET VIRES.

Aperit, digerit, excalfacit, siccant, & mediocriter incidit.

CORONOPVS, Græcis, Κορονόποις.] Italis, *Herba stella.*] Germanis, *Kraen fouß.*] Hisp. *Guiabelha.*] Gallis, *Corn de Cerf, siue Sanguinaire.*

CORONOPVS.

G E N E R A .

Duo eius habentur gene- *Matt.*
ra domesticum & syl-
uestre.

F O R M A .

Domesticum folia fert lon- *Matt.*
ga, angusta, per interual-
la corniculata, crassiu-
scula, humi accubantia :
& in stellæ modum ra-
diantia, caulem, spicam,
florē, & semen gerit per
omnia Plantagini simi-
lia, nulla intercedente
differentia. Nititur vni-
ca tantum radice, nume-
rosis tamen adnatis ca-
pillamentis : foliorum
sapor Plantaginis om-
nino est, quo fit, vt cre-
diderim Coronopū eius-
dem esse generis.

L O C V S .

Seritur passim in hortis, *Diosc.*
nasciturq; sponte in ag-
geribus, locis incultis,
& secus vias.

F A C V L T A T E S .


E T V I R E S .

Iisdem pollet viribus, qui- *Diosc.*

bus Plantaginem pollere diximus, peculiariter tamen radix cœlia-
cis auxiliatur.

C E N S V R A .

Qui Capriolam seu sanguinellam vulgo vocatam Coronopum esse
censent, manifesto errore ducuntur, quemadmodum & ij qui ra-
nunculum Coronopum faciunt.



CORONOPVS sylvestris, Italis, *Herba stella saluatica*, at peculiariter Goritienſibus, *Serpentina* vocatur. *Ger. vſus ſub 33 videri poſſit*

CORONOPVS SYLVESTRIS.

F O R M A.

Matt. Folia fert tenuiora, capillaceaꝑ; rariuſculè corniculata, humi ac cubantia: caulibus, ſpicis, floribus, ſemine, hortēſi ſimilibus, ſed longè tenuioribus.

L O C V S.

Idem Prouenit in Goritienſi agro diluto, extenuatoꝑue ſolo, non longè à Sontij fluminis ripis, & aliis etiam in agris.

F A C V L T A T E S,
E T V I R E S.

Idem Radix ex vino pota viperarum, aliorumꝑue venenoſorū animalium morſibus, mirificè auxiliatur, ita vt ipſa ſola liberet demorſos. præferunt eam quoque ad hydropē, quā Anaſarcam vocant, epoto apozemate pluribus diebus, in quo radix conferbuerit.



SONCHVS, Græcis, Σόνχος.] Italis, Soncho, Cicerbita, seu Crespine.] Germanis, Vuilder hasen, Koe, sine Gens distel.] Hispanis, Serraya, & Serralha.] Gallis, Latteron, & Palais au lieure.

SONCHVS.

G E N E R A .

Duo sonchi habentur genera: *Matt.*
sylvestris, siue aspera, & læ-
uis, cuius duæ etiam sunt
species.

F O R M A P R I M I .

Folia profert Cichorii modo *Idem*
per ambitum laciniata, cri-
spa, aspera, aculeata, & sub
rubentia. Caulem gerit cu-
bitalem, inanem, fragilem,
lacte pregnantem, ac etiam
quandoque subrufescentē :
flores in summis caulibus
melinos, Senecioni haud
absimiles, qui deinde in
pappos euanescent.

L O C V S .

Prouenit in agris incultis, in *Idem*
vineis, in hortis, & secus iti-
nera.

Q U A L I T A T E S ,

Temperamentum eius quodā *Gal. li. 8*
modo mistum est : constat *simp. me.*
enim ex aquea, terreaque
essentia, vtraque leuiter fri-
gida, & est etiam adstrictio-
nis cuiusdam particeps.

V I R E S .

Illinitur vtiliter æstuanti ven- *Diosc.*
triculo, ac eius inflāmatio-
nibus. Sorbetur quoq; eius
succus ad stomachi rosio-
nes: lac elicit: in uellere sup-
positus, sedis, ac vuluæ col-
lectionibus opitulatur. Tō

herba, quàm radix illita vibratis à scorpione ictibus subuenit. ¶ Soncho vtuntur *Matt.*
Itali in acetariis, & præsertim eius radicibus, quæ cum teneræ sint, & dulces, frequē *Gal. 8.*
ter hyeme mensis expetuntur. ¶ In vino decoctus stomachi fluxionibus medetur, *simp. me.*
lacteus eius succus potus suspiriosos, & asthmaticos iuuat. idē auribus instillatus,
earū dolores mulcet, & præsertim in malicorio cū oleo decoctus: stranguriā quoq;
sanat vncie pondere potus. commanducata folia, oris graecolentiam tollunt.



SONCHVS lævis, Italis Cicerbita gentile.

Ger. garden goat's foot of the dormer.

SONCHVS LAEVIS.

G E N E R A .

Matt. Duo habentur genera ,
quę tantum foliis ali-
quatenus differunt.

F O R M A .

Idem Alterum leuioribus habe-
tur foliis, minus quo-
que laciniatis, & ma-
gis extensis, cætera ve-
rò (demptis aculeis)
syluestri similia spectā-
tur.

L O C V S .

Idem Nascitur in hortis, in vi-
neis, & locis incultis.

Q U A L I T A T E S ,
E T V I R E S .

Non differt à primo gene-
re, siccis in facultati-
bus.



SONCHVS laevis altera. Italis, Cicerbita gentile secunda.

Ger. *garden gromwell* & *andru gossyp*.

SONCHVS LAEVIS

ALTERA.

FACULTATES,

ET VIRES.

Huc referas quæ de aliis generibus dicta sunt.



INTYBEVS. Græcis, Σέπης.] Mauritanis, *Dumbebe*, *Aundebe*, seu *Endeba*.
 Italis, *Endiua*.] Germanis, *Enduien*.] Hisp. *Endiua*.] Gal. *Endiue*
maydyl.

INTYBEVS MAIOR.

G E N E R A .

DIOSC. Duo eius habentur genera, altera quidem hortensis, altera syluestris. Hortensis item duæ habentur species, altera maior altera minor, quam seriolā maiore, siue (vt officinæ) scariolā vocant. ¶ Quin etiam syluestris duæ species, quarum alteram scariolam minorem, siue *Cichorium satiuū*, alterā quidē syluestre *Cichoriū*, & *pocrin*, ab amaritudine vocant.

Matt.

F O R M A .

Matt. Hortensis maior, foliis prouenit latioribus, lactucæ similibus, caule bicubitali brachiato: floribus cœruleis, *Cichorij* similibus, semine paruo, oblongoque. Vnica nititur radice, ipsaq; villosa.

L O C V S .

Idem Seritur passim in hortis.

Q U A L I T A T E S .

Gal. 8. Domestica magis quàm agrestis refrigerat. Sed, & humiditatis multæ admistio siccitatem extinguit, verùm adstringentis qualitatis est particeps, sub frigida est, & subamara, ac moderatè adstringens. corroborat, abstergitq;.

V I R E S .

DIOSC. Stomacho utilissima est: cocta aluum sistit, si cum aceto edatur. Cardiacis ex hordei farina utiliter illinitur. Quin etiam podagris, & oculorum inflammationibus. Herba cum radice illita, ictis à scorpione subuenit: igitur sacro cum farina hordeacea medetur. Succus cum cerusa, & aceto additur utiliter frigidis illitionibus. Verùm enimvero vis eius magna quidem est ad calidos iocundioris morbos, oscula venarum eius extergit, & præsertim eius cum radice decoctum. Estur passim cruda, coctave in acetariis.

Matt.



INTVBVS minor. Græcis, Σέπης μίνα.] Italis, *Endivia minore*.] Offi-
 cinis, *Scariola domestica*. *Ger. Maydyle Sie Gleditsch arb.*

INTVBVS MINOR.



FORMA.

Folia gerit alterius longio *Matt.*
 ribus, angustioribus,
 humi accubantibus, cau-
 libus tenuioribus: radi-
 ce verò, floribus, & semi-
 ne maiori per omnia si-
 milibus.

LOCVS.

Seritur, & ipsa passim in *Idem*
 hortis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Nihil sanè differt suis in fa *Idem*
 cultatibus à maiore.

INTUBVS crispa, Italis, *Endivia crispa*. Ger. *Wunderkraut*.

I N T U B V S C R I S P A.

F O R M A.

Matt. Recensetur, & hæc inter maiora Intubi genera, siquidem amplo, foliosoq; cespite provenit, foliis magnis, sed in ambitu ubique crispis, ac fimbriatis, caule cæteris maiore: reliqua cum aliis paria sunt.

L O C V S.

Idem— Seritur in hortis ab olitoribus, quòd admodum in acetariis in cœnis placent.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem— Eadem omnia potest, quæ de hortensibus intubis superius dicta sunt.



INTUBVS sylvestris, Græcis, Σέπιδας ἄγρια ἢ μέγας.] Hetruscis, Tornaſole.]
 Italis cæteris, Cichoria domeſtica.] Germanis, Vneguneife, Vneguorſt]
 Hiſpanis, Almerones, & Cichoria.] Gallis, Cichorea.] Officinis, Sca-
 riola minor.

Wegwart wurz.
 Sommerwurz
 gindewurz.

CICHORIUM.



GENERA.

Duum est generū, Pichris
 sylvestrior, & Satiua, la-
 tioribus foliis, & ori gra-
 tior, minusq; amara.

FORMA.

Satiua foliis exit minori ſa-
 tiuoque Intubo simili-
 bus, angustioribus tñ
 atq; breuioribus: mi-
 nusque per ambitum
 laciniatis, ſed caule, &
 flore ſimilibus. Radicē
 habet pedali longitudi-
 ne, alba intus pulpa, te-
 neram, & ſubamaram.

LOCVS.

Seritur paſſim in hortis.

QUALITATES,
 ET VIRES.

Eadem omnia poteſt, quæ
 domeſtica Intubus: Ea
 tamen ſiccior eſt, & ma-
 gis extergens.

SYLVETRIS intubus, Græcis, Κίχώριον ἀγρία.] Italis, *Cichoria saluati-*
ca.] Germanis, *Unild Vnegunortz.*

I N T V B V S S Y L V E T R I S.

F O R M A.

Matt. Folia fert longa, sonchi as-
 peræ modo incisa & in
 summitate sagittæ in-
 star acuminata: rubea
 per medium excurrente
 costa, amaro sapore: cau-
 lis est illi durus, atque
 lignosus, flores à ceteris
 generibus haud absimi-
 les, quemadmodum &
 semen: Radice nititur
 domesticæ duriore, ama-
 rioreque.

L O C V S.

Idem Nascitur in agris incultis,
 in pratis, & secus iti-
 nera.

Q U A L I T A T E S.

Gal. lib. Oulus est subamarū, ob idq;
8. f. m. picrida ipsum quidam
 nuncupant. est autē ea
 frigide, siccæq; tempera-
 turæ, vtraque secundo
 excessu, & adstringen-
 tis qualitatē est parti-
 ceps.

V I R E S.

Matt. Iisdem pollet viribus, qui-
 bus cætera genera pollere diximus. verū cū plus amaritudinis
 habeat, magis quoque abstergit.

C E N S V R A.

Tiresia ceciores sunt, qui Hieracium, & sylvestrem lactucam Intu-
 bum sylvestrem faciunt.



DENS leonis , Græcis, præsertimq; Theophrasto , ἀράνα.] Italis , Dente di cane, & Pisciaalletto.] Germanis, Psoffenblatt, & Münich, Koepff.] *Forsl. grand.*
 Officinis, Taraxecon, & caput monachi, ac nonnullis Rostrum porcinum, & Ambubeia.

D E N S L E O N I S .



F O R M A .

E terra prodit ipso statim *Matt.*

Veris initio, foliis cichoraceis, frequenter laciniatis in sagittæ modū desinentibus, humi accubantibus, caule spithamæ magnitudine, rotundo, glabro, subrubente, intus concauo, lacteo, succo pregnante, flores gerit luteos, foliososq; , quibus decidētibus, subcrescit papposum caput. Radicem habet Cichorio proximam, lacteo succo plenā, sed longè amariorē.

L O C V S .

Prouenit in hortis, in campis, prope sepes, & in ruinosis ædificiorū muris, quin etiā in vineis, pratis, & viridariis. *Idem*

F A C V L T A T E S .

Adstringit, roborat, atque abstergit, magis quàm vtrunque Cichorium. *Idem*

V I R E S .

Cocta, stomachum dissolutum adstringit, cruda verò aluum sistit. eadē dysentericis auxiliatur, sed magis cum lente decocta. Succus potus prodest, quibus genitura effluit. in aceto decocta, vrinx tormina discutit. Vniuersę plantę decoctum potum Ictericam tollit. *Idem*

R ij

ZACINTHA, Italis, *Cichoria verrucaria*.

Ger. *Wurden wergurdt*.

CICHORIVM VERRVCARIVM,
SIVE ZACINTHA.

F O R M A.

Matt. Folia profert Cichorij asperiora tamē, ac minus laciniata. Caules edit cubitales, & quādoq; maiores, tenues, asperiusculosq; ī quo rum cacumine flores spectātur aurei cichoracea specie, quibus flaccescentibus semē remanet subnigrum, capituli instar, circūquaque secundum lōgitudinem secti, striative, radice nititur rapunculi æmula, tenuibus adnatis circumquaque fibris.

L O C V S.

Matt. Prouenit in campestribus, & à non nullis quoque feritur in hortis, & fœtilibus in medicum vsū.

Q U A L I T A T E S,
ET V I R E S.

Idem. Mira huius plantæ facultas est ad tollendas verruchas, siquidem scimus nonnullos, quorū manus verrucis admodum numerosis scatebant, sanatos esse, deuoratis in acetario semel tantum huiusce plantæ foliis. Idem præstat eius semen tribus diebus à drachmæ pondere cœna potum, dum se cubitum recipiunt verrucosi.



CICHORIUM Constantinopolitanum hanc plantam vocari libuit, & Constantinopoli missa fuerit.

CICHORIUM CONSTANTINO-
POLITANVM.

Ger. *unguicula von Constantinopol.*

FORMA.



Folia per omnia cichorio *Matt.*
sylvestri similia sunt,
caules edit glabros,
tenues, in quorum
summitate flos emicat
aureus, numerosis fo-
liis stipatus, qui tandē
in pappos evanescit, ra-
dicibus est numerosis,
asphodeli modo depē-
dentibus.

LOCVS.

Nascitur (vt audio) in pra *Idem*
tis, & herbosis locis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Et si haec huiusce plā *Matt.*
tae facultates nemo mi
hi aperuit, crediderim
tamen à cæteris Cicho-
raceis, suis in facultati-
bus ipsam minime dif-
ferre.

CYANVS maior, Græcis, *Κύανος*.] Italis, *fior Campese, fior Aliso, & Bat-
tisuocera*.] Germanis, *Korn blum*.] Officinis, *Batisecula*.

CYANVS MAIOR.

G E N E R A.

M. Duum est generum, ma-
ius, & minus.

F O R M A M A I O R I S.

Idem. Mains latioribus prouenit
foliis, albicantibus, to-
mētosis, & nulla in par-
te diuisis. vegetiores
quoque habet caules, al-
bicantiores, breuiores
tamen, & flores longè
maiores, & patentiores
quàm minor. Florū co-
lor cyane⁹, cæruleusve
spectatur, foliosus, & in
cristę modum extremis
oris laciniatus, calycu-
lis, è quibus prodit,
squamosis, ac subaspe-
ris.

L O C V S.

Idem. Prouenit in montibus fre-
quentius, quàm in cam-
pestribus.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem. Huiusce plantæ vires nul-
lus antiquorum, q̃ sci-
uerim, scriptis manda-
uit.

non desunt tamen recentiores, qui putent Cyanum propria do-
te pestilentibus morbis aduersari: maioris puluis datur utiliter ab
alto deuolutis, & sanguinem reiicientibus, ex aqua Plantaginis, aut
Portulacæ, aut maioris Simphyti, aut equiseti. succus illitus recen-
tia vulnera glutinat, & oris vlcera sanat.



CYANVS minor, perinde ac maius, tam Græcis, quàm Italis, & Germanis vocantur.

Ber. yunnan Gornblumy.

CYANVS MINOR.

FORMA.

Foliis exit longis, pilosis, al *Matt.*
bicatibus, barbulis quibusdam dissectis, caules edit plures, bicubitales, lanuginososq; minoribus refertos foliis: flores in cacumine profert cæruleos, in ambitu crenatis, squaroso è calyce prodeuntes.

LOCVS.

Nascitur in campis inter *Idem*
segetes, & floret Maio,
& Iunio mensibus.

QUALITATES,
ET VIRES.

Ea omnia præstare potest, *Idem*
etiam valētius, quæ de
maiori dicta sunt, peculiariter tamen huiusce
folia, ac pariter semen
ex vino decocta, & hausta, auxiliantur à scorpione, phalégioq; ictis,

quin etiam venenis omnibus resistunt: præstat quoque tota planta
ad pestilenciales, & pernecabiles febres.

CONDRILLA, Græcis, χοιδρίλλη.] Arabicis, Candarel, Cadaron, & Amiron.] Italis, Condrilla, & Terracrepolo.] Hispanis, Leitugas, & Leichugas dentre los planos.] Gallis, Leitteron.

G E N E R A .

Matt. Duo eius habentur genera, foliorum diuersitate differentia.

F O R M A P R I M A E .

Diosc. Prima, quæ quidem Cichorij species est, caulē, flo-

Matt. rem, & folia habet Cichorio similia : verūm planta tenuior tota est, in cuius ramulis gummi aliquando inueniri solet mastiches similitum : radice nititur Cichorio breuiore, & lacteo succo prægnante.

L O C U S .

Matt. Nascitur in agris non cultis, & secus itinera, atq; etiam in pratis.

F A C U L T A T E S .

Gal. 8. Non differt ab aliis Cichoraceis suis in facultatibus.
simp. me.

V I R E S .

Diosc. Tusa cum radicibus herba, melleque excepta, & admisto quoque nitro, vitilignes illitu emaculant,

gummi quod ab ea resudat subpositum scæminarum menses trahit, pilos inordinatos replicat. Quod item tenera radix efficit, ubi acus succo intincta pilis admouetur : ex vino pota, viperarum moribus auxiliatur : succus decoctæ in vino, aut per sese potus aluum sistit.

C O N D R I L L A .



[CHONDRILLA altera, Græcis, χονδρίλλη ἑτέρα.] Italis, *Chondrilla seconda*.

CHONDRILLA ALTERA.

F O R M A .

Folia fert oblōga, circum diosc.
rosa, humi sparsa: cau-
lem lacteo succo madē
tem : radice tenui, ro-
tunda, laui, vegeta, fla-
uescente, succosa.

L O C V S .

Nascitur in lætis, & cul- *Idem*
tis locis.

Q U A L I T A T E S ,
E T V I R E S .

Caules, & folia concoquē *Gal.*
di vim habēt, succus in diosc.
commodos palpebra-
rum pilos reflectit.



CUCURBITA, Græcis, Καλοκύνθα ἐσωδιδιμος.] appellatur Arabibus, *Hraha*, *Han*, seu *Carba*.] Italis, *Zucca*.] Germanis, *Kurbss*.] Hispanis, *Calabassa*.] Gallis, *Courge*, *Courle*, *sive causse*.

CUCURBITA.

G E N E R A.

Matt. Cucurbita tria recensentur genera, nempe longa, rotunda, & sessilis.

F O R M A.

Idem Hederaceis virescit foliis, sed amplis & subcandicantibus: flagellis farinētosis, angulosisq; humi repentibus, verū vbi adminiculū nacta fuerit, illud facile clauiculis comprehendit, quibus arbores, & per gulas scandit, & iis sese implicat. flores profert albos, grādioreq;, & in stelle ferè modum diuisos, verū non omnes frugiferi sunt. Frugiferi enim facile noscuntur ex conceptu sub ipsis extuberāte, fructus edit magnos, qui quidem in vno genere longi, in altero rotundi, & in altero sessiles visuntur, verū omnes in magnam extuberant molem.

L O C V S.

Idem Seruntur passim in hortis, & circa sepimenta.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 8. Cucurbita humida, frigidaq; temperatura est, vtraque qualitate secundi ordinis.

V I R E S.

Diosc. Illita cruda, tumores, & abscessus mitigat. Ramenta eius illinuntur vti liter siacipiti infantibus, contra capitis ardorem, quem syriasim vocant, oculorum inflammationes, podagrasq; refrigerāt. succus è ramentis per se, aut cū rosaceo infusus, aurium doloribus auxiliatur. adustiones cutis in ardenti febre illitu adiuvat. Totius feruentis, & expressæ cremor, cum melle exiguo, & nitro potus, aluū leniter soluit. Vinum in cucurbitam recentem excavatam infusum, si mistum sub diuo teneatur, potum aluū laeuigat. Folia recentia iumentis illita, affricta; muscas abigunt. eadem mammis puerperarum admodum lac siccant. oleum, quod è cucurbitarum floribus paratur, iis in eo diutius insolaris, retum calorem inunctum extinguit, & capitis dolores, præsertim in febribus mulcet: arida cinis ambustia, & pudendorum vlcera sanat. Estur passim æstate in cibis cum iusculis elixa, tum quoque in oleo, aut butyro frisa, farina prius circumlita, & acerba vix succo aspersa.

Matt.



CUCURBITA Indica, Italis, Zucche Indiane, oltra marine.

CUCURBITA INDICA. Ger. *Indianisch Kürbis*

GENERA ET FORMA.



Varia huiusce cucurbitæ *Matt.*

habetur genera, magnitudine, facie, & colore differentia. Referunt tamen omnes melopeponum effigiem, sed aliæ magnæ, imo maxime, vetricosæque, aliæ parvæ, aliæ mediocres, & aliæ oblongæ, aliæ rotundæ, aliæ vario colore spectantur: foliis nostratibus longè maioribus, firmioribusque, asperis vitigineis, & rigenti petiolo adnexis, sarmenta illi crassa, angulosa, aspera, hirsutaque. Ea humi serpunt, longo admodum tractu, atque etiam scandunt, & pergulas, & attegias opacant, flores edit magnos, lilij ferè effigie, aureo colore. Semen in ventre gerunt magnū, albū, in quo nucleus concluditur dulcis, & suavis,

sapor fructibus subdulcis, non ut nostratibus usque adeo insipidus.

LOCVS.

Planta est peregrina ex Indiis, & aliis fortasse longinquis regionibus *Idem* ad nos allata, sed iam diu Italico solo proueniunt.

QUALITATES, ET VIRES.

Cum subdulci sint sapore, crediderim has primo excessu refrigerare, & *Idem* humectare secundo.

CUCUMIS sativus, Græcis, *Σίκκος ὀψος*.] Arabicis, *Chathe*, seu *Chethete*.] Italis, *Cocomero*.] Hetruscis, *Cedruolo*.] Germanis, *Cucumern und Citrullen*.] Hispanis, *Cogombro*.] Gallis, *Cocombre*. *gumochon*

CUCUMIS SATIVVS.

G E N E R A.

Mitt. Duo habentur genera, vnum Citrei mali figura, alterum longum anguium formam referens.

F O R M A.

Idem Planta est sarmentosa, humi repēs, foliis vitigineis, asperis, scabrisq; flagellis pariter scabris, atq; rigentibus, flores edit melinos, fructu sub ipsis extuberante, qui tandē in longum protensus citrei mali modo viridi primum fit colore, & dum maturefcit flauo cortice verrucis scatente.

L O C V S.

Idem Seritur passim ab olitoribus in hortis.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 8 simp. me. Cucumis esculentus, maturus quidem tenuioris est essentia, qui vero immaturus est, crassioris: ambo tamē, abstergēdi facultate participant, superat in eis humida, frigidaque temperies, non tamen magnopere, sed quasi in secundo censetur ordine. Attamen si quis, aut semen, aut radicem arefaciat, haud etiam humidæ fuerint naturæ, sed iam desiccantis, idq; in primo quodammodo ordine, aut in secundo incipiente. est & in istis maior abstergendi facultas, quàm in fructus ipsius carne.

V I R E S.

Diosc. Prodest vesicæ morbis: olfactu deliquio animi affectos reuocat. semen vrinam mouet, & cum lacte, aut passo, vesicæ exulcerationibus subuenit. illita cū vino folia morsus canum sanant, epi-ryctidas cū melle. Veniunt frequenter in

Gal. 2. de alim. fac.

cibis crudi, sed prauos generant succos, nam etsi nonnulli cucumeres rectē concoquant in ventriculo, dum tamen in hoc fusi affatim iis se replent, temporis tractu gelidum, & tuncq; crassum humorem in venis acervant, qui non facile in probum sanguinem conuerteri potest: proinde abstinere ab illis consuluerim: clam enim, sensimq; post longum tempus prauus in venis succus ex ipsis accumulatur, qui vel leuicula putredinis arrepta occasione, febres fixissimas, & mirē contumaces excitabit.

C E N S V R A.

Non est eorum admittenda opinio, qui vulgarem cucumin peponem esse contendunt.



CYCVMIS longus, Italis, Cocomero serpentino.] Hetruscis, Cedruolo longo.

Ger. *unlig lang Cummerns* *od gürdly.*

CYCVMIS LONGVS.

FORMA.


Non differt tota sua facie ab altero, nisi in fructu, qui longus est, & serpētis modo curuus, striis per longitudinem protensis. *Matt.*

LOCVS.

Seritur in hortis, & præsertim in Apulia. *Idem*

QUALITATES,
ET VIRES.

Eædem illi sunt facultates, quæ alteri. *Idem*



PEPON, Græcis, Πέπων.] Mauritanis, *Batecha*, seu *Bathiecha*.] Italis, *Mellone*.] Hetruscis, *Popone*.] Germanis, *Melaon*.] Hispanis, *Melon*.] Gallis, *Melons*.
pfobon, plüger

P E P O N.

F O R M A.

Matt. Serpit Peponum, & Melopeponum planta longis, ac viticulosus sarmentis, cucumeris modo, foliis vitigineis, minoribus tamen incisuris, scabris, hirsutisq; : floribus luteis, fructu grandi, humani capitis instar, & sæpe maiori cortice cartilagineo. Sed non omnibus idem est color. Namq; alij herbaceo sunt colore, alij pallido, nonnulli flauo, quidam albo, plerique cinereo. Sunt etiam qui tota cute textura quadam reticulari magno naturæ artificio proueniant. striati ferè sunt omnes, Toris secundum longitudinem circumquaq; prominentibus. Interna pulpa gustatu suavis est, versicolor tamen, in altero. n. genere rubet, in altero albicat, aut in albo rufescit. Qui præstât (plurimi sunt, qui nulla commendantur gratia) præter odoris iucunditatem, dulces, & suaues sunt: Semen intus ingerunt copiosum, oblongum, nucleo intus dulci, albo contextum putamine.

L O C V S.

Idem Gaudent lato, & aprico solo, ac etiã libertate, qua possint vitro vagari: seruntur in hortis, & agris.

Q U A L I T A T E S.

Cal. 3. Vniuersa Peponū natura frigidior, cum larga humiditate existit, sed habent quoq; quandam abstergendi vim: atqui melopepones minus humidi, quam pepones sunt.

V I R E S.

Diosc. Peponis pulpa in cibis sumpta, vrinam cict, & inflammationes oculorum illita sedat: ramenta eius sincipiti admota syriasin infantium tollit, & oculorum fluxiones auerit. succus cum semine, farina exceptus, & in sole siccatus, cogitur in smegmata, quæ faciem repurgant: radix sicca ex hydromelite poti drachmæ pondere vomitiones mouet. ¶ Gignit pepo in corpore vitiosum humorem, potissimè, quando non probe coctum fuerit, tum verò morbum etiam, qui cholera dicitur inducere consuevit.

C E N S V R A.

Errant toto celo, qui pepones vulgares Cucumeres faciunt.



ANGVRIA, Arabibus, *Dullaba.*] Italis, *Anguria.*] Hetruscis, *Cocomero.*] Germanis, *Gurchen.*] Hispanis, *Cogombro.*] Gallis, *Cocombres.*

ANGVRIA.



FORMA.

Folia promit Colocynthis *Matt.*
dis medicamentosæ ma-
iora, aspera, & per ambi-
tum diuisa. Caules far-
mentosos humi repen-
tes, melopeponis mo-
do. Flores edit aureos:
& fructus mirum in mo-
dum extuberantes, pon-
derosos, subtotūdosq; :
Cortice læui, herbaceo
colore; maculoso tamē:
carne intus humida, a-
quosaq; , in quibusdam
prædulci, in nonnullis
verò subacida, insipi-
dave, sitiq; extingunde
per quā idonea. Semen
concludit latū, cucurbi-
tæ paulò minus, rufo, ni-
grove putamine.

LOCVS.

Seritur in hortis, & virida- *Idem*
riis, ac etiam in agris.

QUALITATES.

Frigida est, & humida or- *Idem*
dine secundo, sitiq; ar-
cendæ idonea.

VIREs.

Succosa eius pulpa confert ardentibus febribus, & linguæ ariditati *Matt.*
quā maximè: acutos humores vincit, & iis præsertim auxiliatur fe- *Serap.*
brientibus: qui humorum prauitate, magis, quàm abundantia sca-
tent, illisq; præsertim conuenit, qui tenuis, & imbecillis, sunt tem-
peramenti, macri, & exangues, cū iis alterantibus magis opus sit,
quàm ducentibus humores.

LACTUCA, Græcis, *Θηράς*.] Arabibus, *Cherbas*, seu *Chas*.] Italis, *Lattuca*.] Germanis, *Lactuck*.] Hispanis, *Lechuga*, seu *Alfalfa*.] Gallis, *Laitue*. *Galat*

LACTUCA.

G E N E R A.

Matt. Plura, ac diuersa sunt lactuæ genera. Est etiam & syluestris. Inter satiuarum genera habetur, quæ à crispis foliis, *Crispa* appellatur: quemadmodum & altera à lato caule, *Laticaulis* dicitur: Est & quæ sessilis vocatur. Nos verò in capitatam, rotundam & crispam, genera diuisimus: Differunt etiam foliorum colore: alia enim saturatè viridis est, alia subuiridis, & quæ cruentis maculis sit respersa.

F O R M A.

Idem Crispa foliis exit crispis, maiori Intybo similibus: Rotunda in orbem spargitur, rotundioribus foliis, tenerioribus, & vnà sese stipatibus. capitata autem parum foliis à rotunda differt, sed in globum folia conglomantur, brassicæ capitæ modo: in quo genere & ea quæ recensetur, quæ vulgo Romana nuncupatur; cæteris in cibis gratior, quod candidior, teneriorque habeatur: caulem edunt omnes albicantem, brachiatum: flosculis melinis: & semine tum albo, tum etiam nigro.

L O C V S.

Idem Seritur passim ab olitoribus, & ab aliis quibuscunque, in hortis.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 6. Humidum, ac frigidum olus lactuca est, non tamen extremè, perinde ac aqua fontana.



V I R E S.

Diosc. Stomacho in cibis grata omnes habentur: somnum conciliant, aluum emolliunt, lac euocant, verum decoctæ magis alunt, stomachicis prosunt, si illotæ edantur: Semen assiduas in somno imaginationes libidinosas compescit, & venerem repellit. Ipsa vero frequentius in cibo sumptæ oculorum claritati officiant: inflammationibus, & ignibus sacris opitulantur. Eaurundem succus fronti, & temporibus illitus, febrientibus tum somnum conciliat, tum capitis dolores mulcet. testiculis illitus nocturnas pollutiones compescit, & seminis profluuium, addito caphuræ momento, sed venerem restinguit: Seminis cremor vrine ardoribus opitulatur: cauendus autem lactucarum vsus suspiriosis, sanguinem excreantibus, pituitosisque: sed iis maximè, qui procreandis liberis dant operam.

Matt.

LACTUCA florescens, Italis, *Lactuca fiorita*.

Ger. *Blumende Lactuca* 30 *Salat*.

LACTUCA FLORESCENS.

FORMA.

Folia, quæ ad terram sunt *Matt.*
exoleta paucioraq; spe-
ctantur, caulis illi bra-
chiatus parvis foliolis,
ipsisque acuminatis re-
fertus: floribus meli-
nis non magnis, qui in
pappos evanescent.

LOCVS.

Scatent ea horti ferè vni- *Matt.*
uersi in fine Æstatis.

QUALITATES,

Amaro percipitur gustu: *Matt.*
quam ob causam ab-
stergendi facultate nō
vacat, & præsertim la-
cteus eius succus.

VIRES.

Lacteus caulium liquor *Matt.*
oculorum argemas, &
maculas delet, & vitia
cutis emendat.



LACTUCA sylvestris, Græcis, *Θριδάξ αγρία.*] Italis, *Lactuca saluatica.*
Gr. wild, earthly & salt.

LACTUCA SYLVESTRIS.

FORMA.

Matt. Sylvestris Lactuca folio exit oblongo, hyeracij maioris modo per ambitum laciniato, candidiore, graciliore, asperioreque quàm domesticæ, quin etiam aculeato, post quâ caulem ediderit, amaro gustu. Caulē mittit florescentis domesticæ quā dantenus similem, & flores pariter similes.

LOCVS.

Idem Nascitur in aruis, & incultis locis.

QUALITATES.

Matt. Abstergit eius lacteus succus, & somnum conciliat, soporiferus etiam est, prouocat, & deicit.

VIRES.

Diosc. Lacteus eius liquor aquam per aluū eiicit, si ex mulso bibatur duorū obolorū pondere: argemas, coliginesq; repurgat, oculis instillatus: illinitur efficacius cum lacte muliebri adustionibus: somnum allicit, doloris leuamentum præstat, menses trahit, & contra scorpionum, & phalangiorum ictus bibitur. semen satiuæ modo libidinum imaginationes in somno amolitur, ac Venerem arcet.

CENSURA.

Non desunt Pharmacopæi, qui è sylvestri lactuca aquas per alembicū parant, quam deinde pro Intybi aqua vendunt, decepti superiorum myropolarum inscitia.



[GINGIDIVM, Græci, Γγγιδιον.] Italis, *Gingidio*.

G I N G I D I V M .



F O R M A .

Est gingidium pastinacæ syl **Diosc.**
vestri haud ab simile, ama- **Matt.**
rius tamen, caule ramoso,
rotundo, sesquipedali, stria-
to, subnigricante, genicula-
toque, umbella in cacumi-
ne alba, minoribus circum-
quaque comantibus foliis:
ipsisque laciniatis. E flori-
bus semen prodit, quo ma-
turecente, umbella in sese
contrahitur, ut in pastina-
cam, & tactu lutingosa per-
cipitur, radicem habet can-
dicantem, spithamæ longi-
tudine, subamaro sapore.

L O C V S .

Copiosum in Syria nascitur, **Matt.**
vnde in Italiam aduectum
semen, iam seritur in hor-
tis.

Q U A L I T A T E S .

Sicuti gustu amaritudinem, **Gal. 6.**
& adstrictionem præfert, **simp.me.**
sic temperamento quoque
ipso caliditatem, & frigidi-
tatem. secundum verò utrâ-
que qualitatem desiccato-
rium est, sed stomacho ami-
cum, ut pote non parvâ ob-
tinens adstrictionem, quâ-
obrem non admodum con-
spicuum caliditatem possi-
det: secundo autem recessu
desiccatur.

V I R E S .

Olus hoc crudum, coctum, conditumque estur magna stomachi utilitate: urinâ citâ. **Diosc.**
Decoctum ex vino haustum vesicæ utilis est. ¶ Perspicuum verò est, quod hæc her. **Gal. 2.**
ba medicamentum potius, quàm alimētum est, quippe quæ adstrictionis, & ama- **de alim.**
ritudinis non obscure, nec exigue particeps est. **facul.**

C E N S V R A .

Eorum sententiæ minime subscribendum est, qui volunt vulgare cerosolium legiti-
mum esse gingidium.

CEROFOLIUM, Græcis, χαιρύφυλλον.] Italis, Cerofooglio.] Germanis, *Koerffel, siue Kerbelkraut.*] Gallis, *Cerfueil.*

CEROFOLIUM.

FORMA.

Matt. Fragilis, ac tenera est planta, senis ab vno pediculo emergentibus foliis, vulgaris petrosilini modo per ambitum incisus. Caulibus sesquipedalibus, pinguibus, subrusescens, geniculatis: Umbellâ in summis caulibus gignit, flosculis albis stipatâ, è quibus tenuia, rectaque exeunt cornicula in racemi ferè modum, ex vno petiolo emergentia, in quibus semen longiusculû concluditur, pullo colore. Radix illi brevis in plures diuaticata fibras.

LOCVS.

Idem. Seritur passim in hortis.

QUALITATES,

ET VIRES.

Mitt. Tota planta dulcis est, & odorata acriusculo quodam accedente sapore, vix ferè sensibili: quo fit vt aliis oleribus addita, ea gustui gratiora reddat. Estur cruda in Acetariis, vnâ cum aliis plantis ad hoc idoneis, ac etiam cocta cum beta aliisque oleribus.

CENSURA.

Qui hanc Myrrhim esse autumant, non diligenter eius notas expendunt.



ISNAGA, Italis, *Visnaga*.

V I S N A G A .



F O R M A .

Facie pastinacam agrestē *Matt.*
eo vsq; refert, vt recte
dici possit, Pastinaca
sylvestris maior. Nam
caulium crassitudine,
longitudineque: quin
etiam umbellæ magni-
tudine, Vulgarem syl-
vestrē Pastinacam su-
perat.

L O C V S .

Nascitur copiosa in Sy- *Idem*
ria: etiam nunc seritur
in hortis in Italia.

Q U A L I T A T E S ,
E T V I R E S .

Eadem omnia potest, quę *Idem*
sylvestris pastinaca.

C E N S V R A .

Non desunt, qui hanc
plantam Gingidiū esse
credunt: Sed procul
dubio falluntur.

PECTEN veneris, Italis, *Pettine di Venere.*] Germanis, *Vuild moren.*

PECTEN VENERIS.

FORMA.

Matt. Radice nititur candida :
cauliculis pedalibus: fo-
liis Anthemidis proxi-
mis, exilibus: floribus
albis : emergentibus,
turmatim ab eodem ca-
pitello cōpluribus acu-
minatis rostellis, inter
se disiunctis, quæ pecti-
nes ferè referūt, quibus
linum mulieres concin-
nant, siue pectunt.

QUALITATES,
ET VIRES.

Matt. Huius radix cum malua
tusa, corpori infixæ extra-
hit; Eadem cum herba,
& floribus calefacta, cū
albo meraco, & butyro,
additis petrosilini foliis
pubiq; adhibita, remo-
rantem vrinam elicit.

CENSURA.

Non recte sentiunt, qui
hanc plantam scandicem esse contendunt.



CAVCALIS, Græcis, Καυκαλῖς.] Italis, Petrosello saluatico.] Gallis,
Persil sauvage. Ger. wild persilg.

CAVCALIS.



FORMA.

Caule exit dodrātali, & sæpe ma
iori, dauci, aut pastinacæ si- Diosc
Matt.
mili, subhirsuto, foliis apio
similibus. sed quæ in caule,
ac ramis sunt, fœniculi modo
per extrema multifidis, hispi-
disque, candida in cacumine
ymbella. Semine odorato;
Radice pastinacæ.

LOCVS.

Prouenit in campestribus, incul Idem
to præsertim solo.

QUALITATES.

Gustu, ac viribus Dauco simi- Ga! 7.
simp. me.
Matt.
lis est: nam excalfacit, vt ille,
& pariter desiccat. ¶ Aperit,
prouocat, abstergit, attenuat-
que.

VIRES.

Cruda, coctave oleris modo e- Diosc.
Matt.
stur. Vrinam cit. ¶ Cordis
affectibus auxiliatur. Epotus
succus calculos, & arenas pel-
lit, & iocinoris, lienis, renum-
que pituitas attenuat: Semen
haustum oculorū aciē acuit,
& menses fœminarum trahit.
Datur viris contra seminis
profluvia ynà cum aspleno, &
viticis semine. Steriles pro-
lificas facit, assidue ex vino
potum: præstat aduersus Tri-
gonis, Draconis, & Scorpio-
nis marini ictus, vulnere illi-

tus. Herba tota ex aceto mansa, & vomitione reddita aluum purgat, appetitum languentem excitat, nausæ fastidia discutit. Melancholicos iuuat, tum herba ipsa in cibis sumpta, tum eius succus epotus, tum semen, tum totius plantæ decoctum: proinde datur vtiliter quartanariis, scabiosis, & gallica lue affectis,

ERVCA, Græcis, *Ῥαπὺν*.] Mauritanis, *Lergir*, seu *Giargir*.] Hetruscis, *Puchetta*.] Cæteris Italis, *Rucola*.] Germanis, *Vueis* *senss.*] Hispanis, *Oruga*, & *Arugua*.] Gallis, *Roquette*.

ERVCA.

G E N E R A.

Matt. Duum est generum, Satiua, & sponte nascens.

F O R M A S A T I V A E.

Satiua foliis exit oblōgis, profunde laciniatis, Sifymbrij aquatici modo: sapore acri, & amariusculo: caule sesquipedali, floribus in cacumine albicantibus: semine in tenuibus corniculis concluso. Radix illi alba, tenuis, & acri, ut herba gustu.

L O C V S.

Idem Seritur passim copiosa in hortis.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 2. de alim. fac. Excalfacit per quàm manifestè, adeò, ut non facilè, atque adiunctis lactucæ foliis edatur, siccat, attenuat, aperit, incidit, flatus pellit, & ex tergit.

V I R E S.

Diosc. Eruca in cibis sumpta, genitale semen auget, &

venerem excitat: concoctioni prodest, aluo per quàm accommodata.

Gal ibi dem. Semen potum muris aranei moribus medetur, ventris tincas necat, lienemque extenuat. Tritum, & ex melle illitum nigras vulnorum cicatrices ad candorem reducit. Cum melle verò vitia cutis in facie emendat, & lentigines emaculat.

Matt.



ERVCA sylvestris, Græcis, ῥαπὸν ἄγριον.] Italis, *Ruchetta gentile*, & *Rucola saluatica*.] Germanis, *Vild vneisz senff*.] Gallis, *petite Roquette*, & *Roquette sauvage*.

ERVCA SYLVESTRIS.



F O R M A .

Foliis provenit sativæ an- *Idem*
gustioribus, ac magis
laciniatis, gustu acriori
sapidiorique: caulibus
numerosis: floribus lu-
teis: corniculis in vni-
versa ferè planta copio-
sis, sursum spectantibus:
semine sinapi simili,
acri, & amariuscule.

L O C V S .

Prouenit spontè locis ari- *Idem*
dis, adeo, vt in muris
quoque nascatur.

Q U A L I T A T E S ,

Magis excalfacit, siccatur, at- *Idem*
tenuat, aperit, incidit,
extrahit, extergit, pro-
uocat, quàm sativa.

V I R E S .

Ea omnia præstare potest *Diosc.*
quæ sativa, valentius *Matt.*
tamen. Cocta, & deuo-

rata infantium tussi medetur, addito saccharo. Tradidere quidam
tria sylvestris crucæ folia, sinistra manu decerpta, illicoque deuora-
ta, auriginosos sanare.

OCIMUM, Græcis, ἀνιμον.] Italis, Basilico.] Mauritanis, Berendaros, & Bedarog.] Germanis, Basilien, & Basilgram.] Hispanis, Albahaca.] Gallis, Basilic.

OCIMUM.

G E N E R A .

Matt. Tria ocimi habentur genera omnibus cognita.

F O R M A .

Matt. Primum quod maius vocant, folia mittit Amarantho longè maiora, lata, oblonga, crassaque, Citreæ mali quod dantenus æmula; flores spicati, albo colore, è quibus semen gignitur subnigricans. Tota planta suauiter spirat.

L O C V S .

Idem Seritur in hortis, & fictilibus.

Q U A L I T A T E S .

Gal.li.8 Excalfacit secundo ordine, *fmp.me.* habet quoque recrementitiam humiditatem, quare esui minime idoneum iudicatur: pellit, aperit, prouocat.

V I R E S .

Diosc. Copiosiore cibo oculorū acie hebetat, aluum emollit, flatu mouet, vrinam pellit, lac euocat, ægre tamen conficitur. Illitum cum hordeæ farinæ polline, ex aceto, & rosaceo, pulmonum inflammationibus auxilio est. Draconis marini, & scorpionum ictibus per sese prodest, & cū vino albo odorato oculorū doloribus. Succus instillatus, caliginem oculorum abstergit. Semen potum datur vtiliter infantibus, ægrè mingentibus, inflatisque. Naribus haustum sternutamenta mouet, sed oculos comprimere oportet cum sternutamentum vrget. ¶ Additur in Antidotis, quæ ad cordis affectus parantur.



Matt.

OCIMUM alterum siue medium, Græcis, ὀκνον ἑτέρον.] Italis, Basilico
mezzano. Ger. Basileisgen dz Andweit gesslerge.

OCIMUM SECVNDVM.

GENERA.

Duum est generum, odo *Idem*
re tantum differen-
tium.

FORMA.

Foliis exeunt maioris si- *Idem*
milibus, sed duplò
minoribus. odore in
altero quidem ple-
bei ocimi, in altero
verò citrei mali, adeo
simili, vt nulla sit odo-
ris differentia. Proin-
de hoc citratum Ara-
bes vocauere.

LOCVS.

Seritur, & hoc in hor- *Idem*
tis, & fictilibus.

QUALITATES,
ET VIRES.

Ea omnia præstare po- *Idem*
test, quæ maior.



Ocimum minus, siue tertium, Græcis, ἀνιμὸν μικρότατος.] Italis, Basilico gentile.

Ἰατρικὴ ὁνομασία τοῦ ὀκίμου

F O R M A.

Scrap. Foliis constat parvis, odore cæteris fragrantiore, quare Mauritanis ocimum Caryophyllatum nuncupatur.

L O C V S.

Matt. Seritur, & hoc in hortis, & fœtilibus.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem Quanto cæteris est odoratius, tantò quoque ad omnia efficacius.

OCIMUM MINUS.



OROBANCHE, Græcis, ὀροβάγχη.] Italis, Orobanche.] Officinis, Cauda leonis.

OROBANCHE.



FORMA.

Cauliculum edit asparagi Diosc. instar, sine foliis, in cacumine hypocistis faciem referentem, subrubeū, hirsutum, mollem, pingue, fistulosum, sesquipedalem. Flos illi subalbicans, hirsutus, è calyculis prodiens: Radix Matt. fungosa, digitali crassitudine, breuiq; .

LOCVS.

Nascitur in segetibus, inter legumina, in campestribus, in pratis: secus itinera, & prope sepes. Idem

QUALITATES.

Est frigide, siccaeque naturæ in primo ordine. Gal.li.8 simp.me.

VIRES.

Estur ut olus asparagi modo, legumentis addita concoctionem accelerare creditur. Hæc plan Matt.

ta à nonnullis herba tora vocatur, quod vaccæ ea deuorata illico taurum admittere soleant.

BARBVLA hirci, Græcis, Τραγοπώγον.] Italis, *Barba di becco*.] Hetruscis, *Sassefrica*.] Germanis, *Bochs bart*.] Hispanis, *Barba de Cabron*.] Gallis, *Barbe de bouc*.

BARBVLA HIRCI.

G E N E R A .

Duum est generum, alterū flore aureo, alterum purpurascente.

F O R M A .

Mat. Primum genus foliis exit Croci latioribus, ac longioribus, floribus aureis, magnis, è calycibus prodeuntibus. Hi sereno cœlo fatiscunt, nubiloso autem contrahuntur, occludunturq; cōcluso calycis vertice. barba dependet incana, proluxa que, inde illi nomen. E floribus papposum oritur caput, in quo semen continetur oblongum. Radice nititur longa, alba, dulci, iucunda que, qua utimur nos in acetariis.

L O C V S .

Idem Prouenit copiosa in pratis ac etiam saxosis locis.

Q V A L I T A T E S .

Idem Radix excalfacit, at etiā primo ordine humectat.



V I R E S .

Idem Glutinat hęc recentia vulnere si foliorum succus vel etiam stillatitia aqua in spleniis admoueatur. Estur quoque in cibis.

ARBVLA hirci altera, Græcis, Τραγοπώγων ἑτερον.] Italis, Barba di
 Beccho porporea. Ger. Wolfblau. Das andre goss.

BARBVLA HIRCI ALTERA.

F O R M A .

Prodit hæc foliis alteri fi- *Matt.*
 milibus, aut paulò la-
 tioribus, & nume-
 rosioribus robustiori-
 busque: caule quo-
 que simili, genicula-
 to, conspicuis propè
 genicula alis, è quibus
 rami prædeunt. Flo-
 res mittit in cacumi-
 ne purpurascens, mi-
 nores tamen quàm in
 altera, radiantibus cir-
 cumquaq; calycis api-
 cibus in stellæ ferè mo-
 dum. Radice quoque
 firmatur grandiore, ro-
 bustioreq; , lacteo suc-
 co referta, non quidẽ
 vt in altera dulci, sed
 adstringenti, & ama-
 riusculo.

Q U A L I T A T E S ,

E T V I R E S .

Radicis lacteus succus *Idem*
 adstringit, cohibet, fir-
 mat, & modicè abster-
 git, esui tamen inido-
 nea est.



SCORZONERA, siue Scorzonera, seu Viperina. Italis, Scorzonera.

FORMA.

SCORZONERA HISPANICA.

Matt. Folia fundit hæc plâta Tra-
gopogono (cuius pcul
dubio species est) lōgè
lâtiora, & quæ solo p-
pinquiora sunt p ambi-
tū sinuata, lōgo, presso
que pediculo, à radice
pdeūtia, humiliq; accu-
bâtia. Caulē edit sesq-
dodrantalē, & sæpe ma-
iorē, teretē, geniculatū
ī quo folia angustiora,
minoraq; spectant. Flo-
res profert aureos, Tra-
gopono adeò æmulos,
vt alterū ab altero vix
cognosci possit. Hi flac-
cescētes in papposum
mutant orbem, in quo
semē cōtinet Tragopo-
gono simile. Radice ni-
tit sesqdodrātali polli-
cari crassitudine, raris
adnatis fibris, vegeta,
tenera, fructu facili, al-
ba intus pulpa, lacteo
succo pgnante, dulci,
& gustatu iucūda. Flo-
ret æstate. I. O C V S.



Idem. Nascitur in sylvis, vliginoso solo, ac etiam alibi.

QUALITATES, ET VIREs.

Matt. Foliorū, radicūve succus dat p̄sentaneo remedio potādus aduersus vi-
perarū, ceterorūq; venenosorū animalīū ictus, quinetiā ad quoscūq;
pestiferos morbos. Radix recēs, sicca, aut saccharo cōdita, quotidie de-
uorata, pestilētiæ cōtagia arcet, & venenis qbuscunq; resistit. Dat ea-
dē, aut eius succus vtiliter quoq; comitialibus, cardiacis, vertigino-
sis, animi deliquio, cordisq; tremore, aut pulsu laborātibus. cōmādu-
cata p se radix, tristitiam discutit. Lacteus radicis succus, oculorum
nubeculas delet. In summa tota planta, magni est ad omnia vsus.

SCORZONERA BOEMICA.

Böhmische Kattunwurzel.

Duas Scorzonerae imagi- *Matt.*
 nes hic appingi cura-
 uimus, quod Hispanica à Boemica differat, cum radice, tum etiam foliorum amplitudine.

ORNITHOGALVM, Græcis, ὀρνιθογάλον.] Italis, Ornithogalo.] Gallis,
Churles.

G E N E R A.

Matt. Duo Ornithogali obseruauimus genera.

F O R M A P R I M I.

Diosc. Primum cauliculus est tener, cādicans, tenuis, sesquipedalis, tribus, aut quatuor in cacumine mollibus agnatis, à quibus flores prodeunt foris herbacei, & cum se pandunt lactei visuntur, perinde ac Lilia, inter quos cachryos modo, dissectum capitulū emicat. Radix illi est bulbosa, albicans.

L O C V S.

Matt. Oritur in aruis inter segetes.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Diosc. Coquitur cum pane, ut melanthium. Radix cruda coctave manditur: est enim dulcis, & suavis.

C E N S V R A.

Matt. Malè sentiunt, qui Ornithogalum inter saxifragas reponunt.

ORNITHOGALVM I.



ORNITHOGALVM alterum, Græcis, ὀρνιθόγαλον ἕτερον.] Italis, Ornithogalo secundo.

ORNITHOGALVM ALTERVM.

F O R M A .


Caulem promit tenuem, *Matt.*
folia croci æmula, quæ
ab imo ad summū cau-
lem circumuestiunt :
Flores in summitate al-
bicantes in quinque di-
uisos apices, qui dum
patescunt, stellæ faciē
referunt. Radice regi-
tur bulbosa, alba, alteri
ferè per omnia similis.

L O C V S .

Prouenit spontè inter se- *Idem*
getes.

Q V A L I T A T E S ,
E T V I R E S .

Ea omnia præstat, quæ al- *Idem*
terū præstare diximus.



TRASI, ita Veronenſibus appellati. Venetis, Dolzolini, & Traſi dicuntur.

F O R M A .

Mat. Foliis exeunt longis, in cacumine mucronatis, Cyperi modo, quem quidem planta tota plurimum æmuletur. Caules enim edit cubitales, & angulosos, in quorum cacumine ſolia exiliora, in ſtellæ modum radiant. Inter quæ flores ſpectantur ſpicati, ſubfulueſcentesque. Radices habet numerosas, è quibus globuli dependent bulbosi, oblongi, ſubruſeſcentes, fabarum magnitudine, ac etiam grãdiores, alba, dulciq̃ue intus medulla caſtanearum ſapore: ſcabro putamine.

L O C V S .

Idem Nuſquam proveniunt ſponte in Italia, niſi in agro Veronenſi.

Q U A L I T A T E S .

Idem Excalfaciunt, & humectant ordine primo, leniunt, læuigant, emolliant.

V I R E S .

Idem Radicum bulbosaſarũ cremor lacteus, pectus, & pulmones expurgat hauſtus, quo fit, ut tuſſientibus opem nõ modicam præſtet. Tunduntur ergo radices, maceranturq̃; carniũ iure, & deinde per linteolum exprimitur cremor, quem etiam recentiorum non nulli venereis potionibus admiſcent. Præſtat idem hauſtus ad vrinæ ardores, & præſertim ſi melopeponum, cucurbitarum, & cucumerum ſemen addatur. Veronenſes, pro bellariis iis radicibus veſcuntur, ſed ſtatus excitant.

T R A S I .



TUBERA, Grecis, *Idra*.] Mauritanis, *Ramech*, *Alchamech*, *Tamer*, & *Ke-*
ma.] Italis, *Tartusi*, & *Tartufole*.] Germanis, *Hirſt* & *Brunſt*.] Hispa-
 nis, *Turmas de tierra*.] Gallis, *Truffes*, ſive *Truffles*.

TUBERA.



GENERA.

Duo in agro Romano reperiuntur gene- *Matt.*
 ra: quorum alteri candida, pulpa, al-
 teri pulla subest. Habentur, & alia
 genera, sed ignobilia, & esui ingrata.

FORMA.

Rotundę radices (si recte radices appel- *Idem*
 lari debent) tubera sunt, sed omni-
 no inæquales, nigro, ac scābro, putā-
 mine, sine foliis, ac sine caule, nullis
 quoque adnatis fibris insipida ius-
 tus pulpa: cum alba (vt prædiximus)
 tum etiam nigra.

LOCVS.

Abundat Tuberibus optimis Hetruria. *Idem*
 Atqui aliis in Italia locis copiosa
 proueniunt sitientibus locis, ac sa-
 bulosis, fruticosisque.

QUALITATES.

Nullam euidentem habent qualitatem, *Gal.li.2.*
 qui ergo iis vtuntur ad excipienda *de alimē.*
 condimenta tanquam materiam ha- *facul.*
 bent, ceu alia qualitatis expertia.

VIRE.

Terrena magis, quam aquea sunt, om- *Auicē.*
 niq̃ue prorsus sapore expertia: Atra-
 biliarios, & crassos gignunt humo-
 res, magis quā cetera ciborum ge-
 nera, quo fit, vt frequenter deuorata
 apoplexiam, aut paralysim excitent.
 Sunt & concoctu contumacia, & ven-
 triculum agrauant. ¶ Expetuntur *Matt.*
 magnatibus in cœnis, bellariorum
 vice: quin etiam iis, qui putant Ve-
 nerem iis deuoratis cum pipere ex-
 citari.

APPENDIX.

Tubera re vera, radices non sunt. Nullas enim fibras, adnatas habent, nec sata vnquam pro-
 ueniunt, nec etiam terræ coherere, itaque terræ callum potius sunt appellanda, & in fungo-
 rum potius, quā radicum genere recensenda.

SMILAX hortensis, Græcis, Σμίλαξ κηπούα.] Mauritanis, *Lubia.*] Italis, *Smilace delli horti*, & *fagiolo Turchesco.*] Germanis, *Uelßch bonen.*] Hispanis, *Feyones.*] Gallis, *Fasolz de Turquie*, & *Faues peintes.*

SMILAX HORTENSIS.

G E N E R A .

Matt. Varia Smilacis hortensis habentur genera (Phascoli hortenses sunt seminum diuersitate differentes siquidem) quidam. n. candidi, alij rubescentes, non nulli melini, plerique diuersis, variisq; maculis infecti, reperiuntur.

F O R M A .

Matt. Horum planta tota ferè facie vulgaribus fagiolis per similes visitur, peculiariter autem differt in siliquarum, & seminum magnitudine, quæ omnia in hortensibus maiora, latioraque spectantur, differunt etiam caule. Hortensium enim planta arborescendit, smilacis asperæ modo, itaque sequaci sarmentorum, clauicularumque reptatu, testudines, atregias, pergulas, & tabernacula conuestit.

L O C V S .

Idem. Seritur passim in hortis, & viridariis.

Q U A L I T A T E S .

Auicenn. Excalfaciunt semina, & humectant ordine primo.


V I R E S .

Matt. Semina in cibum sumpta magis insunt, & ventriculo laborem faciunt, quam vulgares fagioli, copiosiusque semen generant, & venterem stimulant, præsertimque cum longo pipere, galanga, & saccharo asperguntur, quod quidem longè valētius prestant, si ex lacte bubulo pingui elixentur: cornicula dum tenerissima sunt, elixa perbelle in acetariis veniunt, alium emolliunt, & pectus dilatant.



APHACA, Græcis, ἀράκα.] Arabibus, *Aphaki, Apaki, siue Albikia.*] Italis, *Aphaca.*] Germanis, *Uilde Vuicken, & Vogels Vuiken.*] Gallis, *Pesce sauvage.*

APHACA.



FORMA.

Foliis est tenuibus, siliquis Diosc.
lenticulæ maioribus, in
quibus terna, quaternave
semina nigra conti-
nentur.

LOCVS.

Nascitur non solum spon- Max.
te inter segetes, sed etiã
à quibusdam feritur ad
columbarum saginam.

QUALITATES.

Semen viciæ modo amarũ Idem
est, & terrenæ essentia,
ideoq; absterforia est fa-
cultatis, adstringēdi quo-
que vim habet.

VIRE.

Seminis farina vino suba- Diosc.
cta, illinitur vtiliter ad
serpentium, & quadru-
pedum quorumcunque
morsum: melle excepta,
& illita, lentigines, va-

ros, & cetera cutis vitia delet. torrefactum semen, stomachi, aluiq;
fluxiones sistit, si fresum lentis more decoquatur, sed melancolicos
humores gignit.

VICIA Græcis, Βίχιον.] Italis, *Veccia*.] Germanis, *Vuicken*.] Gallis, *Vesce*

V I C I A .

F O R M A .

Mat. Folia mittit aphacæ angustiora, in acutū definentia; corniculis oblongis, teretibus, nigro semine stipatis, Orobi magnitudine: caulem edit bicubitalem, qui clauiculis è ramusculorum summitatibus prodeuntibus, segetibus sese implicat.

L O C V S .


Idem Oritur sponte in aruis inter segetes, & feritur quoque ad columbarum, aliorumq; volucrum saginam.

Q U A L I T A T E S .

Idem Excalfacit, & siccatur, mundat, abstergit, & adstringit.

V I R E S .

Non differt ab Aphaca, peculiariter autem vrinam ciet, & tabidos iuuat, si ex ptisana frequenter sumatur.



PORRVM Gręcis, Πράσον.] Mauritanis, *Curat, seu Kurat.*] Italis, *Porro.*] Germanis, *Lauch.*] Hispanis, *Puerro.*] Gallis, *Porreau.*

Heag. Smith. PORRVM.



G E N E R A .

Duum est generū capitatū, quod *Matt.*
Gręcis, κεφάλιον dicitur, & Se-
ctile.

F O R M A C A P I T A T I .

Capitatum foliis provenit alio *Matt.*
latioribus, longioribusq; , cari-
natis, & in acumen desinenti-
bus. Cernix illi longa, bulbosa-
que, candicans, crassiori capite,
numerosis radicibus, ipsisq; te-
nuib; & capillatis: tunicis quo-
que numerosis conglomerato.
Bimum in caulem prosilit cæ-
pæ modo, longum, cavumque,
floribus in cacumine in orbem
congestis, semine nigro, capa-
ceo simili.

L O C V S .

Scratur in hortis.

Idem.

Q U A L I T A T E S .

Corpus excalfacit, crassos humo- *Gal. 6.*
res extenuat, glutinososque in *de alim.*
cidit. Inflat, noxium succum *facul.*
creat, tumultuosum somnium *DIOSC.*
parit.

V I R E S .

Urīnam ciet, aluum mouet, oculo- *DIOSC.*
rum aciem hebetat, menses pel-
lit, sed lædit exulceratam vesi-
cam, renesque, cum ptisana ve-
rò coctum, esu, pectoris vitia ex-
trahit. Coma in aqua maris, &
aceto cocta, in defectionibus ad
præclusiones, & duritias vulvæ
vulvis est. Semen acius est, &
quādam adstrictoriam vim ha-
bet, qua re cum aceto, & thure,
sanguinis profluua sistit. Vene-
rem stimulat. valet contra om-
nia thoracis vitia: arteriam esu
purgat, sed si assidue estur, vi-
sus obscuritatem inducit, sto-

maco aduersatur, succus cum aceto aut thuris polline, lacte, aut rosaceo vtiliter aurium dolo-
ribus, & sonitui instillatur. Semen veteres sanguinis reiectiones cohibet, duarum drachmarū
pondere cum æquali baccarum myrti quantitate potum. Illinuntur decocta: folia ad tu-
mentes, dolorificasq; hæmorrhoidas. Eadem melle subacta illinuntur ad venenosorum om-
nium ictus. caput cum ceruice ex melle delinctum præstat ad omnia pectoris, & arteriæ vi-
tia. sumitur sub cineribus tostum, ad fungorum venena. Idem crapulam, & ebrietatem
discutit.

Matt.

Matt. PORRVM sectile, Græcis, Πρώτον τριπτόν.] *Ital.* Porro minore.
Sw. *Schnittlauch.*

PORRVM COMMUNE.

F O R M A .


Idem. Non differt à Capitato, nisi
 quod capite sit tenuio-
 re, ac etiam ceruice.

L O C V S .

Idem. Scribitur in hortis.

Q U A L I T A T E S ,
E T V I R E S .

Idem. Ea omnia præstare valet,
 quibus capitatum pol-
 lere diximus.



AMPELOPRASVM, Græcis, ἀπελόπρατον.] Mauritanis, *Nabati.*] Italis, *Porro saluatico, & Porandello.*] Germanis, *Unild lauch*] Hispanis, *Ayos, & Puerros de las uinhas.*] Gallis, *Porree de Chien, siue Porreau sauvage.*

AMPELOPRASVM.

FORMA.

Ampeloprasum porri faciem representat, sed foliis, ceruice, capiteq; longè minoribus, & ad mādendū durius, acriusq; *Matt.*

LOCVS.

Oritur sponte in Vinetis, *Idem* vnde illi nomen, secus sepes, & in agrorum marginibus.


QUALITATES.

Acrius, & siccus satiuo *Gal. li. 6* habetur, attenuat, & *simp. me.* crassa incidit, & obstructions aperit, & prouocat vrinam.

VIRE.

Stomacho magis quàm do *Diosc.* mesticum adueriatur, plus autem excalfacit, & vrinas, & menses vehementius ciet. Estur vtiliter, atque etiam illin-

tur ad serpentium morsus. ¶ Lentos, crassosque humores potentius incidit, valentiusq; infarcta organa obstructione liberat. *Gal. li.*



CAEPA, Græcis, Κρόμμυον.] Arabibus, Basil, seu Basal.] Italis, Cipolla.] Germanis, Zuibel.] Hispanis, Cebolha.] Gallis, Fiboule, & Oignons.

G E N E R A.

Theop. Caparum genera plura, diuersaque habentur (vt Theophrastus est autor.) Atqui nos de quatuor tantū generibus scribemus, nempe vulgari, communiq̃ue, Scetili, Fissili, & Ascalonico.

Matt.

F O R M A V U L G A R I S.

Matt. Cæpæ foliis pueniunt longis, fistulatis, teretibus, & acuminatis. caule verò cubitali, maioriq̃; tubæ faciē præferente, inani, ac fragili, in cuius summitate, flores exeunt in globum sese stipantes, è quibus semen oritur nigrum, porraceo simile. Radice nititur bulbosa, sessili, rapi rotundi instar, & inferiori parte fibrata, sed etiam in his notantur differētiæ. Forma. n. aliæ maiores, aliæ minores, quædā longæ, quædā rotundæ, quædam verò sessiles proueniūt. Sicut colore rubentes, & subrubentes aliæ, quædam virides, & albæ non nullæ. Quin etiam sapore, vel acerrimæ, vel mediocriter acres, aut nihil ferè acedinis habentes.

L O C V S.

Idem Seruntur, trasplantaturq̃; in hortis.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 7. Cæpæ exalfacit ordine quarto: Essentia autem eius potius est crassæ partiū. Porro si succū eius exprimas, & reliquū est, terreæ admodū est substantiæ, eiusq̃; calidæ, at succus aqueæ, aereæq̃; caliditatis.

simp. me.

DIOSC.


¶ Lōga longè acrior est, quàm rotunda, itē flaua, q̃ cādida, & sicca q̃ viridis, & cruda quā cocta, oēs tñ mordent, flatus gignunt, appetentiam inuitant, sitim mouent, extenuant, & expurgant.

V I R E S.

DIOSC. Capa repurgata à putaminibus, &

in oleo coniecta, & pro balano subdita, hæmorrhoidas, reliquosq̃; excretionum exitus reserant. Succus ex melle illitus, oculorū hebetudinibus, argemis, nubeculis, & incipientibus suffusionibus auxiliatur, menses suppressos pellit, Naribus infusus caput purgat, vitilignes sanat, in sole illitus. In auribus sonitum, & grauitatem emendat. In alopeciis illitus, capillos reuocat. Largiore cibo deuorata capa, capitis dolores excitat, cocta vehementius vrinam pellit. Elixæ cum vuis passis, & fico tubercula admota concoquit, & celerrimè rumpit: sub cineribus tosta, belleq̃; macerata, datur vtiliter ex melle, aut saccharo deuoranda anhelosis, asthmaticis, & tussientibus. ¶ Eiusdem squama sub feruenti cinere tosta diuturnum capitis dolorem sedat, vbi frustulum eius calidum in dolentis lateris aurem introducatur superasperso rosaceo, & laurino oleo succidaque addita lana, quæ totam operiat aurem: Succus cum acerrimo aceto mistus, Sanguinem è naribus manantem sistit, iis immissus.


Matt.



CAEPA sectilis, Graecis, Κρεμμυὶν τμητὸν.] Italis, Cipolle settuole. Matt.

CAEPA SECTILIS.

FORMA.



Foliis exit, caule, flori- *Idem*
bus, & semine, vulga-
ris cepæ similibus, sed
longè minoribus, te-
nuioribusque. Bulbis
verò, ac ceruice, ob-
longis, tenuibus, &
minimè capitatis; ob
idq; germinatio tota
in foliis, sæpiusq; re-
tondetur, ut porrum.

LOCVS.

Seritur in hortis ad obso *Idem*
nia, & condimenta pa-
randa.

QUALITATES,
ET VIRES.

Iisdem pollet facultati- *Idem*
bus, quibus vulgaris
cepa dotatur.

CAEPA fissilis, Græcis, Κρόμμινου σχιστόν.] Hetruscis, Cipolle maligne.

CAEPA FISSILIS.

F O R M A.


Matt. Facie tota Ascaloniâ refert, nisi quod omnibus suis partibus maior spectatur. Bulbi plures ab vna tantum radicum coma oriuntur, longa, renuique ceruice nitentes, Ascaloniæ modo, sed acedine differentes.

L O C V S.

Idem Habentur passim in hortis, in Hetruria.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem Ea omnia possunt, quæ, & cetera genera.



AE PA ascalonia, Græcis, Κρόμμνον ἀσκαλωνίον.] Italis, Scalogna. *Ger. Zylang.*
Finikang.

C A E P A A S C A L O N I A .

F O R M A .

Foliis prouenit tenuib⁹, *Matt.*
 longis, teretibus, fistu-
 losis in acutum desin-
 entibus, ceruice pari-
 ter tenui, bulbis nu-
 merosis, ab imo radi-
 cū cespite prodeunti-
 bus, paulò nucis auel-
 lanę maioribus parui
 fici faciem representā-
 tibus, sapore admodū
 acri, haud tamen in-
 grato.

L O C V S .


Seruntur Ascalonię Cæ- *Idem*
 pę in hortis ad ciborū
 condimenta.

Q U A L I T A T E S .

Excalfaciunt, & siccant: *Idem*
 incidunt, aperiunt, p-
 uocant, deiiciunt.

V I R E S .

Nō solum ea omnia præ- *Idem*
 stare possunt, quæ cætera cæparum genera, sed cibi appetentiam fa-
 ciunt, vermes intestinorum necant, & caput non adeo lędunt.



ALLIVM, Græcis, Σκόροδον, Pœnis, Chaum, & Cairin.] Italis, Aglio, & Aio.] Germanis, Knoblauch.] Hispanis, Ajos.] Gallis, Ail, & Aux.

ALLIVM.

G E N E R A .

Matt. Duum est generum, Satium, & Sylvestre. Huius plura sunt genera, nempe Ophioscorodon, Elaphoscorodon: Vrsinum, & Anguinum alterum.

F O R M A .

Diosc. Satium foliis provenit porro similibus, minoribus tamen, ceruice longa, capite bulbofo, quod pluribus coagmentatur nucleis, siue spicis, sapore acris, sed ori non ingrato, quod autem in Ægypto provenit singulari, ut porrum capite constat, candido, ac minus acre. Sylvestre οφιοσκορόδον, Græcis vocatum, singulari capite constat nullis diuisum nucleis, satiuoq; longe minus, sed odore, saporeq; non absimili. foliis angustioribus, gracili caule, in cuius cacumine flos. emicat purpureus, & semen subsequitur nigrum. Huic simile fere est, quod ελαφσκορόδον, Græci vocant, i. ceruinum Allium. De cæteris inferius dicitur.

Matt.

L O C V S .

Matt. Satium in hortis, & campis feritur. Sylvestre verò in collibus, & montibus sponte provenit.

Q U A L I T A T E S .

Diosc. Vis illi acris est, mordet, excernit. digerit, pellit, aperit, incidit, provocat, excoalfacitq; & siccit ordine quarto.

Gal. 7.

simp. me. facul.

V I R E S .

Gal. 12. Aluum turbat, flatu discutit, coli dolores minuit, ubi à flatu provenierint. Sitim gignit, oculorum aciem hebetat. Latas ventris teneas esu abigit, urinam ciet. Prodest, contra viperæ, & peculiariter hæmorrhoids ictum, ita ut non aliud magis, si cum vino assumatur: præstat quoq; contra rabiosorum morsus, tam illitum, quam potum, vocem clarificat, veterem tussim coctum, crudumve lenit: Ex origani decocto potum, pediculos, & lentes necat vitilignes, lichenas, lentigines, manantia capitis vlcera, lepras, & fursures. cum melle, & thure eximit. cum thure, tædaq; decoctum dentium dolorem muicet in ore detentum. Coma feruesfacta, & in defensionibus addita, menses, & secundas extrahit. Hydro-

piceis quoque est utile, & præsertim Timpanite laborantibus.



ALLIVM anguinum. Italis, *Aglio serpentino*.

ALLIVM ANGVINVM.

F O R M A .

Folia profert lilio conual *Mate.*
lio ferè similia, angustiora tamen, & nigris maculis respersa; quin etiam caulis iisdem inficitur notis, Dracunculi maioris modo, quo factū est, vt a nobis allium Anguinū fuerit appellatū: Ceruice nititur longa: radice bulbosa, inuolucris, vt in crocō circūtecta, numerosis inferna parte fibris, vulgaris allij odore, saporeq; prædita.

L O C V S .

Nascitur in Mōribus ex- *Idem*
cellis.

Q V A L I T A T E S ,
E T V I R E S .

Excalfacit, & siccat perin *Idem*
de ac alium agreste, &

suis in facultatibus illi per omnia simile existit.

Plin.lib. ALLIVM vrsinum, Italis, *Agljo de gli Orsi.*] Germanis, *Berr*, &
 19.c.6. *Hundts, Knoblauch.*
 in fine.

ALLIVM VRSINVM.

FORMA.


Matt. Foliis exit latis, minoris
 plâtaginis ferè æqua-
 libus, frequenter stria-
 tis, caulibus angulo-
 sis, in quorū summi-
 tate flores sunt in um-
 bellæ ferè modum se-
 diffundentes: Radice
 nititur bulbosa, spica-
 taque, lilij albi modo,
 dependētibz ima se-
 de capillamentis.

LOCVS.

Idem Nascitur in collibus, in
 syluis, & aliquādo in-
 ter segetes.


QUALITATES,
ET VIRES.

Idem Ea omnia præstare posse
 creditur, quæ ceteris
 agrestium alliorū ge-
 neribus assignantur.



SCORODOPRASVM, Gręcis, Σκοροδόπρατον.] Italis, *Agliporro.*
Germanis, *Aber knoblauch.*] Gallis, *Ail porreau.*

SCORODOPRASVM.



FORMA.

Magnitudine Porrum *æ Diose.*
quat, foliis, ceruice, &
capite quoq; similibus.

LOCVS.

Nascitur sponte in prato- *Matt.*
rum, agrorumque mar-
ginibus, & propter se-
pes.

QUALITATES.

ET VIRES.

Scorodoprasum, sicut gu- *Gal. 7.*
stu, & odore mediam *simp. me.*
allij, & porri qualita-
tē possidet, ita & vires.
¶ Coctum porri modo, *Diose.*
dulcescit, & in olerum
vicem transit.

SINAPI, Græcis *Σίνιπι*.] Hetruscis, *Senape*.] Italis quibusdam, *Senauero*.] Mauritanis, *Cardel*, & *Chardel*.] Germanis, *Seneff*.] Hispanis, *Mostaza*.] Gallis, *Senene*.

G E N E R A.

Matt. Trium est generum, quorum vnum rapitiam frondem exprimit: alterum gracili est folio: tertium verò *Erucæ* folio laciniatur.

F O R M A P R I M I.

Plin. 19. Quod rapi foliis prouenit cæteris maius, domesticum est: caulem mittit vegetum, subhirsutum, à quo ramusculi superiore parte crescunt, in quibus semen subrufum in corniculis prouenit, acerrimo sapore, ac etiam olfactu infestum.

L O C V S.

Matt. Seritur in hortis passim ab olitoribus.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 1. 8. Calefacit, & siccatur ordine quarto.

V I R E S.

Diosc. Ad extenuandum, incidendū, detergendum, extrahendūq; efficax est. Manditur ad eliciendam capitis pituitā, contra veterem, callosamq; arteriæ scabritiem. Succus ex aqua, & melle vtiliter gargarizatur: tritū, & naribus ad motum sternutamenta ciet: fœminas vuluæ strangulatu oppressas excitat; illinitur auxilio magno lethargicis, deraso capite, cum ficis admissum, donec rubescat locus: quinetiam eodem modo ad ischiadicos dolores. Additur in emplastris extrahentibus scabiemq; extenuantibus, magno sanè vſu.

Matt. Seminis farina aceto subacta, illinitur ad serpentium, & scorpionum ictus, pota verò fungorum venenis auxiliatur, illinitur & hydropicis ex impubis pueri vrina, sordities omnes corporis abstergit, cuti natium conciliat nitorem. Datur quoque vtiliter suspiriosis, & asthmaticis.

S I N A P I.



SINAPI alterum, Græcis, Σίνηπι ἐτέρον.] Italis, Senape, siue Senauro saluatico. Ger. *foli Senff*.

SINAPI ALTERVM.



FORMA.

Folia habet tenuiora, plura ex vno ramusculo *Idem* p
deuntia, caulem rectū,
firmum, asperum, sca-
brum, hirsutumque, à
medio ramosum: corni-
culis numerosis, atque
hirsutis.

LOCVS.

Nascitur locis incultis, in *Idem*
campestribus, & inter
rudera.

QUALITATES,
ET VIRES.

Ea omnia præstare potest *Idem*
semen, quæ satiuo sina-
pi assignantur.

SINAPI Tertium. Italica, *Senape bianca, sine Rocchetta.* Gallis; *Moutarde blanche, & douce.*

*Senf hweiss des Drif
gyllof.*

SINAPI TERTIVM.

FORMA.

Mat. Foliis exit siluestri crucæ
similibus, frequenter la-
ciniatis, ramis tenui-
bus, in caulis summita-
te exeuntibus, in qui-
bus vtrinque filiquulæ
spectantur, albo intus
semine, non adeo, ut in
aliis generibus acri.

QUALITATES,
ET VIRE.

Idem. Cum non sit, ut in ceteris
generibus eius, semen
acre, non adeo, ut illa ex-
calfacit, & siccat. Itaque
& si ad omnia utile ha-
beat, ad quæ cetera ge-
nera, imbecillius tamē
est. Atqui semen pecu-
liariter in vinum mu-
stum contactum, diu-
tius eius dulcedinē tue-
tur, atque eam deficere
prohibet.



NASTURTIVM, Græcis *Κάρδαμον*.] Mauritanis, *Norf*, *Alchef*, seu *Narf*.] Italis, *Nasturtio*, & *Agretto*.] Germanis, *Kressen*, & *Garten kress*.] Hispanis, *Nasturtio*, & *Malpica*.] Gallis, *Cresson de iardini*, & *Nasitor*.

NASTURTIVM



FORMA.

Herba est tenuis, foliis parvis, *Matt.*
laciniatis, caule tenui, sesqui-
pedali, flore albo, semine in
rubeum nigricante, follicu-
lis orbiculatis, squamosisque
incluso *Thlaspi* modo, acri
sapore.

LOCVS.

Seritur passim in hortis, & vsur-
patur ad ciborum condimen-
ta, & intinctus, & venit quo-
que aliis cum herbis in ace-
tariis.

Idem

QUALITATES.

Semen adurentis facultatis par-
ticeps est, excalfacit, & siccatur
ordine quarto, folia viridia
multò inferiora semine sunt,
adeo ut mordacitas eorū mo-
derata sit. ¶ Attenuat, munda-
tur, aperit, prouocat, incidit,
urit, & resoluit.

Gal. 7.
simp. me.

Matt.

VIRES.

Stomacho aduersatur, aluum
turbat, ventris tineas excutit,
lienem minuit, partus exanimat.
Illitum cum melle lienem
extenuat, fauos expurgat: sorbitionibus incoctum,
pulmonum vitia extrahit: ser-
pentium venenis potum resi-
stet, atque eas suffitu fugat,

DIOSC.

capillorum defluuia cohibet, coxendicibus cōmodè ex aceto illinitur. ¶ Animum
exacuit. Succus dentium dolores mulcet, si calidus in aure dolentis lateris fuerit
instillatus, semen denariorum decem pondo ex aqua potum, bilem subducit, ca-
pitis vitia purgat, & visum acuit.

Matt.

THLASPI, Græcis, Θλάσπι.] Barbaris, *Nasturtium tectorum.*] Italis, *Thlaspi*] Germanis, *Bissen Kraut.*] Hispanis, *Paniqueso de flor blanco.*] Gallis, *Senene sauvage.*

THLASPI.

G E N E R A .

Matt. Quatuor Tlaspi obseruauimus genera, vt ex eorum imaginibus hic seriatiim appictis patebit.

F O R M A .

Diosc. primū foliis est angustis, digitali longitudine, in terrā versis, subpinguibus, in cacumine diuisis, cauliculo tenui binum dodrantum, non sine adnascentibus ramis, fructu circa ipsum totum, ab extremo in latius se pandente: semine Nasturtij vasis incluso, lenticulæ effigie, nisi q̄ infringitur, vnde nomen accepit. flos illi albicat.

L O C V S .

Matt. Nascitur in semitis, sepibus, & fossis, quin etiā inter rudera, & in vetustis edificiorum muris, & tectis.

Q U A L I T A T E S .

Gal. Semen habet & ipsum facultatē acrem.

Matt. Excalfacit, exiccat, attenuat, vrit, extrahit, prouocat, expurgat, & incidit perinde ac Nasturtij semen.

V I R E S .

Diosc. Semen bilē vtrinque extrahit acetabuli mensura potū: prodest ischiadicis infusum: potū sanguinē educit: internas suppurationes rūpit, menses ciet, sed fructum enecat. ¶ Additur in antidotis, ideoq̄ in theriacale ingreditur.



THLASPI secundum, siue alterum, Græcis, Θλάσι τεύρον.] Italis, Tlassi-
maggiore. Ger. Wiesenkrout dz andou.

THLASPI II. SIVE ALTERVM.

FORMA.

Foliis exit alteri maiori- *Matt.*
bus, latioribusque, pro
pe caulē diuisis, & per
ambitū serratis, caule
firmo, ramosoque, sili-
quis latioribus in cacu-
mine diuisis, pressisq;,
in quibus semen minu-
tum continetur, aureo
colore.

LOCVS.

Nascitur in agrorū mar- *Idem*
ginibus, & inter sege-
tes.

QUALITATES,
ET VIRES.

Semen minus mordet, mi- *Idem*
nusq; longè calefacit,
& siccatur, atque etiā
cætera minus præstat,
quā alterius.



THLASPI tertium, Italis, *Tiaspi della tertia specie*.

Das Dritte Borsengraut.

THLASPI III.

FORMA.

Foliis prouenit a radice
numerosis, oblongis,
subalbicantibusq; mi-
nime gustatu acutis;
caulibus, & ramis te-
nuibus, tenuibusque
folliculis circūqua-
stipatis, in quibus se-
mē Thlaspi simile acer-
rimi gustus.

LOCVS.

Nascitur locis saxosis, &
asperis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Excalfacit, & siccat perin-
de ac alia genera, & cæ-
tera quoque præstat,
sed non adeo vehe-
menter.



THLASPI quartum, Italis, Tlaspi della quarta specie.

Das vierte Thlaspi

THLASPI IIII.

F O R M A.

Folia profert longa, angusta, raraque : caulem ramosum, & foliculos in umbellis congestos, in quibus semen.

L O C V S.

Nascitur in incultis locis, & in collibus.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Semen cum acerrimo habetur sapore pariter calefacit, & siccat, & ea omnia prestare potest, quæ primi generis Thlaspi adscribuntur.



BURSA pastoris, Italis, & Officinis eodem nomine appellatur, quin etiam sanguinaria aliquibus, non nullis herba cancri, & aliis crispula quoque vocatur. Germanis, *Seckel Krant*, & *Tesckel kraut*.] Gallis, *Bourse à Pasteur*.

BURSA PASTORIS.

F O R M A .

Matt. Caules edit teretes, sesquidodrantales, ramis tenuibus in summitate emergentibus, folia eius prima verbenacæ proxima spectantur, sed quæ in caule sunt Thlaspi æmula sunt. radicem habet tenuem, candidamque: flores edit in summis ramulis albosè, quibus pressæ oriuntur siliquæ, cordis ferè imaginem referentes, semine intus paruo, ac minuto.

L O C V S .

Idem Nascitur ferè vbique, præsertimq; secus vias, in antiquis edificiorum parietibus, in hortis, & vineis, & interrudera.

Q U A L I T A T E S .

Idem Est hæc planta ex refrigerantium, & adstringentium genere.

V I R E S .

Idem Prodest attrita, & illita cum inflammationibus, tum etiam sacris ignibus, decoquitur pluuiali aqua cum plantagine, & Armenio luto, bibiturque eius decoctum ad dysenteriam, & cruentas excretaiones, herbæ succus recentia vulnera glutinat, & auribus purulentis infusus medetur. si sit mensium abundantiam, si in eius, & persicariæ decocto insideant mulieres. Esturque ad idem, & contra denique omnes sanguinis fluxiones efficax est, tam deuorata, quam admota. additur in emplastris, quæ ad capitis vulnera parantur in calceos coniecta, & nudis pedibus pressa auriginem tollit.



ARABIS, siue Draba, Græcis, Αραβίς, & Δράκη.] Italis, Draba.] Barbaris, Nasturtium Orientale.

ARABIS, SIVE DRABA.



FORMA.

Ad cubiti altitudinem as-
furgit, tenues spargens
ramos, & ex utroque la-
tere folia, lepidij æmu-
la, sed molliora, & can-
didiora, in cacumine
verò sambuci umbellā
gerit, candidos flores
habentem.

LOCVS.

Nascitur in cāpestribus, *Matt.*
& agrorū marginibus.

QUALITATES.

Insignis est acrimoniæ, & *Serap.*
Nasturtio per omnia si-
milis, itaq; valenter ex-
calfacit, & siccat,

VIRE S.

Herba cū ptisana coqui-
tur ad pituitosa pecto-
ris vitia: semen arithum
pro pipere obsoniis ad-
miscetur.

IRIO Latinis, Græcis verò Ερύσιμον.] Italis, *Erisimo*, & *Irione*.] Germanis, *Hederich*, & *Uilder seneff*.] Hispanis, *Rinchaon*.] Gallis, *Velar*, sine *Törtelle*.

IRIO, SIVE ERISIMVM.

G E N E R A.

Matt. Duo eius habentur genera, foliorum magnitudine differentia.

F O R M A.

Diosc. Foliis exit Eruce sylvestris, cauliculis in lori modū lentis, & obsequiosis: floribus luteis: siliquis in cacumine gracilibus, acuminatisque, in quibus semen recōditur exiguum vrentis gustus.

L O C V S.

Matt. Oritur iuxta vrbes, rudera, atq; hortos, quinetiam in plateis, & ædificiorum areis.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 6: Acrimonia pollet, vt *Nasturtium*, & *Sinapi*.
simp. me.

V I R E S.

Cōtra thoracis effluxiones efficax est, & purulenta extussiētibus auxiliatur, regio morbo, & coxendicibus prodest, bibitur etiam vtiliter contra deleteria pharmaca: illinitur ex aqua, aut melle cæcis carcinomatis, parotidibus, mammarum duritiis, & testium inflammationibus. In totum extenuat, & excalfacit.



VVLGARIS Irio, Italis, *Irio*, o vero *Erisimo commune*.

ein andor wild mustlgewächs.

IRIO ALTER VVLGARIS.



FORMA.

Folia mittit hortēsis E-
rucę, caules lentos, *Matt.*
flexilesque, ramis in
summitatetenuibus:
rotundis, acutis, te-
nuibusq; corniculis
vndique stipatis, sur-
sum spectantibus, in
quibus semen cōclu-
ditur minutum, fla-
uo colore.

LOCVS.

Prouenit, vt alter iuxta *Idem*
Vrbes, rudera, hor-
tosque.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idē præstat eius semen;
quod alteri quoque
adscribitur, peculia-
riter autem sesqui-
drachmę pōdere, ex
ouo sorbili, deuora-
tum tribus cōtinuis
diebus, seminis pro-

fluuium cohibet, & ex vino renum calculos pellit.

PIPER, Græcis, Πέπερι.] Mauritanis, *Fulsel, & Fulful.*] Italis, *Pepe, & Peneiro.*] Germanis, *Pfeffer.*] Hispanis, *Pimienta.*] Gallis, *Poyure.*

PIPER.

G E N E R A .

Matt. Plura Piperis sunt genera, nempe nigrum, album, longum, Æthiopicum, & quod vocât Itali Indicum.

F O R M A .

Idem. Scribitur Piperis planta, quæ repat clematidis alterius modo, prope proceras plantas, super quas repit ad fastigiû usque, foliis raris, citrei mali effigie, sed minoribus, gustu aliquantulum acribus. Fructum profert racemosum, vuarum modo, sed minorem, perpetuo virentem donec siccetur, & plenam maturitatem consequatur, quæ conficitur Januario mense, radice nititur pusilla. Huic nigri piperis plantæ, persimilis omnino est, quæ Piper album gignit.

L O C U S .

Idem. Piperis præventum maximû habetur in Malabar locis maritimis, quæ Concorin ad Canabur usque pertinet: quin etiam in Malache maritima, & in insulis, quæ circa Iauam sunt: unde per mare Erythronæum ad nos comportatur.

Q U A L I T A T E S ,

V I R E S .

Diosc. Excalfacit, & siccit valenter, incidit, attenuat, cōcoquit, prouocat, distrahit, discutit & abstergit, febrium horroribus tam potum, quam illitu subuenit: serpentium moribus auxiliatur, partus extrahit: tussi, omnibusque pectoris vitiiis a pituita exortis, tum in potu tum in eclegmate succurrit: cum melle vtiliter anginis illinitur: tormina discutit, cum recentibus lauri foliis haustum: cum vua passa manducatum pituitam a capite elicit: valetudinem tuetur, dolores finit, appetentiam mouet, concoctionem adiuuat: strumas cum pice discutit, & vitiliginis cum nitro emaculat.

Matt. Inter grana quinque numero quotidie deuorata, iis auxiliatur, qui vetriculi dolore, tum ex flatu, tum cruditatibus exorto, laborant.

Matt.

Matt. Delusi sunt antiqui omnes, quod crediderint ex eadem planta prouenire nigrum Piper, & longum, siquidem alia valde diuersa planta Piper longum mittit, quod in Begala nascitur.

C E N S V R A .



PIPER Æthiopicum, siue nigrorum. Italis, *Pepe d'Ethiopia*.

pfaffor aus Moromlandt.

PIPER AETHIOPICVM

F O R M A .

Prouenit hoc Piperis ge *Matt.*
nus in siliquis nigris
racematim exeūtib⁹,
pisorum, aut phaseo-
lorum similibus, semi-
ne intus, nigri pipe-
ris baccis paulo mino-
re, ac pertinaciter sili-
quis inhærente.

L O C V S .

Nascitur ī Æthiopia, vn- *Idem*
de nomen inuenit a-
pud Arabes.

Q U A L I T A T E S .

Excalfacit, & siccat vehe *Idem*
menter, attenuat, inci-
dit, prouocat, aperit,
digerit, resoluit.

V I R E S .

Vtuntur eo Æthiopes ad
dentium dolores.

C E N S V R A .

Manifestè cęcutiunt, qui Æthiopum Piper Carpesium esse contendūt.

INDICVM PIPER siue Siliquastrum. Italis, *Pepe cornuto*, aut *Pepe d'Indi.*] Germanis, *Indianisch Pfeffer.*] Gallis, *Poyure de Inde*.

PIPER INDICVM

F O R M A.

Matt. Foliis exit hortensis solani maioribus, oblōgiobusque, caule sesquicubitali, viridi, ramis compluribus brachiato, geniculatoque. Floribus candicantibus, è quibus vaginæ oriūtur corniculorum speciem referētes, viridi primū colore, & deinde coraliorum modo rubescēte, pellucido, gustu acerrimo, adeò vt piper omne sua ingenti acridine superet. In his semen cōcluditur minutum, colore subalbicante, eiusdem protinus gustus.

L O C V S.

Idem Serit̃ in hortis, & fictilib⁹.

Q V A L I T A T E S.

Idem Excalfacit, & siccatur excessu quarto. Ideoq; valenter vrit, & exulcerat corpus admotum recens.



V I R E S.


Recentia cornicula tusa, & illita Ischiadicos iuuant, siquidem locum exurunt.

C E N S V R A.

Non desunt doctissimi viri, qui hoc piperis genus Cardamomum faciunt, manifesto tamen errore.

CARYOPHILLVS Græcis, Καρυοφύλλον.] Mauritanis, Persis, Turcis,
Indis, Calafur.] Hetruscis, Garofani.] Italis verò ceteris, Garofoli.]
Germ. Naegel.] Hisp. Clauos de espetia, sine Clanellos.] Gall. Girophles.

CARYOPHILLI.



FORMA.

Arbor, quæ Caryophillos profert, *Mutt.*
lauri faciem refert, foliis tamen
angustioribus salicis, aut persi-
cæ mali similibus, sensim per
ambitum sinuatis, multis prædi-
ta ramis, floribus numerosis in
primis candidis, deinde virescen-
tibus, postremo verò rufescen-
tibus usq; adeo odoratis, ut reli-
quos flores odoris suauitate su-
peret, è quibus caryophilli pro-
ueniunt, qui nil aliud sunt, quàm
rudimentum fructus. Flores. n.
qui quaternis foliolis constant,
huic fructus rudimento insidet,
fibris numerosis refertus, perin-
de serè ac Myrti flores. Proue-
niunt caryophilli in extremis ra-
mulis Myrti modo. Ad hæc pe-
diculi, quibus caryophilli nitun-
tur ij sunt, qui officinis vulgari
idiomate appellantur Fusti. Na-
scitur autem arbor ipsa sponte
ex decidentibus caryophillis.
Adolescit intra octennium, per-
duratq; in ceterum annu usq;.

LOCVS.

Nascitur magno prouentu tantum *Idem*
in Moluccis Insulis. Nam quã-
uis in zeilan, & nonnullis aliis
Indiæ locis proueniat arbor, nus-
quàm tamè fructum edit, præter-
quam in Moluccis. Excutiuntur
ibi flagellis, emundato prius cir-
ca arborem solo.

QUALITATES.

Caryophilli calidi, & sicci sunt or-
dine propemodum tertio, odo-
rati, acres, subamari, nō sine le-
uicula adfriictione. Itaq; robo-
rant, aperiunt, incidunt, atten-
nuant, digeruntque. *Idem*

VIRES.

In cibis deuorati ventriculi, iocinoris, cordis, & capitis affectibus auxiliatur. In puluerem hau-
sti ex vino austro & cydoniorum malorum succo, vomitiones cohibent, cæliacos iuuant,
nauseam remouent, & cibi appetentiam reuocant, roborantq; cum ventriculum, tum etiam
caput. Frigefactum iecur belle excalfaciunt, olfacti auxiliantur animi deliquiis, mōsiq; anhe-
litum commendant. conferunt comitialibus, resolutis, conuulsis, stupidis, & eternosis. cōco-
ctionem adiuuant, alui fluores torrefacti cohibent. Illinuntur quoq; per quàm vtiliter cum
mastice, rhoe, coralliis, & puniceæ arboris floribus, ad ventriculi imbecillitatē. Exacuant præ-
terea oculorū aciē, & caligines tollūt, quinetiā nubeculas, & argemas in tenuissimū puluerē
triti, & oculis inditi. Addūtur in Antidotis, & ī saccis, q vōtriculo, & capiti roborādo parātur. *Idem*

CARYOPHILLI flores domestici, nonnullis *Vetonicum*. Italis, *Garofoni*, & *Garofoli*.] Germ. *Graszblum*, *sive Naiglin bluom*.] Gallis, *Oeilletz*, *sive Girosfloes*.

garofon negalin.

CARYOPHILLI FLORES

DOMESTICI.

GENERA.

Alatt. Varia sunt horum florum genera, colore, & foliorum stipatu differentia. Alij. n. maiores sunt, alij minores, alij coccineo colore rutilant, alij saturata purpura nitēt, alij candido, alij carneo colore gaudent. Sunt, & versicolores nonnulli albo, rubroq; colore mistim respersi, quin etiam spontē nascentes habentur cum rufescentes, tum albicantes.

FORMA.

Idem Planta foliis est *Tragopogoni* modo longis, breuioribus tamen, carnosioribus, pinguioribusque, incuruis, & in acutum desinentibus: Caules edit numerosos, geniculatos, laues, cubitales, tribus, quatuorve in summitate adnatis, in quorum cacumine teres, longiusculusque calyx spectatur superiore parte ferē modo denticulatus, ē quo flos speciosissimus oritur caryophyllorum odore prēditus. Atqui flores in omni genere omnes ferē stipantur numerosa foliorū serie, perinde ac rosa.

LOCVS.

Idem Seruntur à mulieribus, colunturq; in fistilibus, aut capsulis ligneis trāsposti, sepiusq; irrigati, super fenestras, ac etiam in hortos.

QUALITATES.

Calida, siccaq; pollere facultate hosce flores iudicio esse potest odoris fragrantia, & saporis amarulentia quadam.

VIRE S.

Idem Qui purpureo colore nitent pręstāt ad omnes cordis affectus, ad vertiginem, apoplexiam, paralyfim, & conuulsionem, ex *Betonica*, aut amaraci decocto poti.

Asseruantur saccharo, perinde ac rosa, non solum ad prædicta omnia vtile s, sed etiam aduersus venena, venenosorūq; animalium ictus. Dantur contra pestilentiaē contagia. Id quod valentius operatur succus, ex vniuersa planta expressus. Haustus enim quatuor vnciarum pondere, vbi morbus inuasit, liberat.



CARYOPHILLI sylvestres. Italis, *Garofani*, & *Garofoli saluatichi*.]
Germanis, *Donder neglin*.] Gallis, *Armoiries*, & *Oeilletz sauvage*.

CARYOPHILLI FLORES
SYLVESTRES.



FORMA.

Foliis, caulib⁹, floribusq; *Matt.*
exeunt altilibus simili-
bus, sed longè minori-
bus, tenuioribusque,
floribus cum rufescen-
tibus, tum etiam albis,
nullo tamē odore præ-
ditis.

LOCVS.

Proueniunt spontè locis *Idem*
incultis, & aridis, atq;
saxosis.

QUALITATES,
ET VIRE.

Præstant ij quoque ad ea *Idem*
omnia, ad quæ altiles
præstare diximus, verū
longè remissius operan-
tur.

HYDROPIPER Græcis, ὕδροπέπερι.] Italis, *Pepe aquatico*, & *Persicaria*. Germanis, *Unasser Pfeffer*, & *Murchen kraut*.] Hispanis, *Hierua pexguiera*, seu *manchas*.] Gallis, *Curage*. *floribunda*

HYDROPIPER SEV PERSICARIA.

G E N E R A.

Matt. Duum est generum, alterū minus, alterum maius. Item alterū acri admodum sapore. Alterū verò omnis acridinis expers, & aspero tantum stringentiq; gustu præditum.

F O R M A M I N O R I S.

Diosc. Caulem edit geniculatū, solidum alis multis concavum. Folia menthæ maiora, molliora, candidioraque, gustu piperis acri, citra tamen ullam odoris gratiam. Fructū acrē, in surculis parvis, propè folia racematiim coherentem.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 1. 8. Calidum est. sed non tantum, ut Piper. § Incidit, extenuat, aperit, resoluit, exulcerat, discutit, & digerit.

V I R E S.

Diosc. Folia cum semine illita, tumores, veteresq; durities discutiant, suggillata delent, quæ postquam inaruerunt, tusa pro

Matt.

pipere in obsoniis admiscuntur. § Herba recens commode thalami sternitur, pulicibus necandis. Suille carnes salsa, circumducta herba præservantur à tincis, & vermibus. Quare succus instillatus vermiculosis auribus, opem mirificam præstat.



PERSICARIA altera. Italis, *Persicaria magiore*.

Wasserpfeife oder Flöggrauß das andre großste.

PERSICARIA ALTERA

FORMA.

Eadem illi facies est, quæ *Matt.*
alteri, nisi quod folia
maiora sunt, & nigris
maculis infecta, caules
vegetiores humi accu-
bantes, & racemi gran-
diores.

LOCVS.

Nascitur hæc non solum *Idem*
humecto solo, sed etiã
in sicco, in agrorũ mar-
ginib⁹, & secus itinera.

QUALITATES,
ET VIRES.

Cum gustantibus manife *Idem*
stã relinquat adstrictio-
nem: nec vlla sit acre-
dine prædita, excalsa-
cere perinde ac altera
haudquaquam potest,
sed potius refrigerare,
ac siccare.



PTARMICA, siue Sternutamētaria. Græcis, *πάρμικη*.] Italis, *Ptarmica*.
 Ger. *Wiesbäut*. *Wilde pimper*.

PTARMICA.

F O R M A.

Mitt. Surculos habet tenues, sesquidodrantales, rotundos, & circa eos folia oblōga, oleę modo atq; multa: & per ambitum ferrata. Flores mittit in cacumine anthemidis figura, minores tamen & umbilico dilutiore. sapore adeo acri, vt nō desint qui pyrethrum eam faciant.

L O C U S.

Idem Nascitur spontē in montibus, saxosis locis.

Q U A L I T A T E S.

Ptarmicę flores ciēdę sternutationis vim obtinēt, est enim temperies eius calida, & sicca, viridis etiamnum ordine secundo, siccataē tertio.

V I R E S.

Folia cum floribus illita, suggillationes rapiunt. Flores sternutamenta efficacissimē mouent.



PTARMICA ALTERA.

*Lin. andr. inobstant. 23
vulgar. prostratus.*

Sunt qui plantam, cuius
hic imago spectatur,
Dioscoridis Ptarmi-
cam faciunt : sed re-
vera falluntur .

PSEVDOSTRUTHIVM, quidam Theriacariam vocant.

Quinfolium yranum.

PSEVDOSTRUTHIVM.

FORMA.

Matt. Folia profert longa, sub-
pinguia, caules multi-
plices, foliososque, in
quorū summitate spi-
cati prodeunt flores.
Radice nititur candi-
da, longa, digitali cras-
situdine, & raphani
modo acri.

LOCVS.

Idem Nascitur incultis locis,
secus itinera, & in a-
grorum marginibus.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem Radix excalfacit, & siccatur
ordine tertio. Incidit,
attenuat, resoluit, ape-
rit, digerit. Sunt etiā,
qui eam præferant cō-
tra venenosorum ani-
malium ictus, nō mo-
do vulnere admotam,
sed etiam in potu sum-
ptam. Quinetiam aduersus pestilentiae contagia.



CYCLAMINVS, Græcis, Κυκλάμινος.] Mauritanis, Buchomaricn.] Officinis, Cyclamen, Panis porcinus, & Arthanita.] Italis, Pan porcino.] Germanis, Schuueim prot, & Dopffel.] Hispanis, Pan de Puerco.] Gallis, Cyclamen, seu Pain Porcin. *Endopffel*

CYCLAMINVS.



F O R M A .

Folia habet hederæ aduersa parte purpurea, in quibus supra, infraq; albicant maculae, caules nudos palmari longitudine, floribus in eorum summitate purpureis, coronatis prominente quodam è medio apice, odoris iucundi, radice nigra sessili aliquantum lata, rapi ferè effigie.

DIOSC.

Matt.

L O C V S .

Nascitur vmbrosis locis, & maxime sub arboribus, & in fructetis, secus itinera.

DIOSC.

Matt.

Q U A L I T A T E S .

Varias vires obtinet, nam abstergit, incidit, venarum ora aperit, attrahit, digerit, detergit, & prouocat.

Gal. 8.

simp. me.

Matt.

V I R E S .

Radix tam hausta, quàm clistere infusa lentâ pituitâ mirificè detrahit. Coli cruciatus tollit à pituita progenitos, aut ab induratis excrementis. Succus in errhinis additur ad expurgandû cerebrum. Finit enim diuturnos capitis dolores, ac etiam Hemicranios: resolutis opitulatur, ac omnibus cerebri, & nervorum afflictibus, à frigiditate obortis. Aqua è cyclamini radicibus distillata si naribus sursum trahatur, fluentè inde sanguinem mirum in modum sistit. eadem pota sex unciarum pondere, admista sacchari uncia, manantem è pectore, aut ventriculo, aut iocinore sanguinem mirificè cohibet. contusæ radices recentes illinuntur vtiliter scyrrhosis, durisq; tumoribus, & strumis: additur quoq;

Mesues.

DIOSC.

Matt.

succus commodè in vnguentis, quæ ad splenis tumorem duritiemq; parantur. affricta recens radix hæmorrhoidas eiicit, eandem succus auribus instillatus vnâ cum rosaceo, aut vini modico, aurium sonos, & surditatem tollit. Abdomini illitus ventrem subducit, illita radix serpentium ictibus auxiliatur. Eadem excavata, oleo repletur, & addito cere momento, cineri feruenti imponitur. Coquiturq; vnguentum ad perniones vtile.

DRACUNCULVS maior. Græcis, Δρακοντία μεγάλη.] Arabibus, *Luf, si-
ne Alluf.*] Officinis, *Serpentaria maior.*] Italis, *Dragontea, & Serpen-
taria maggiore.*] Germanis, *Natter Vurtz.*] Hispanis, *Taragontia.*] Gal-
lis, *Serpentine*.

DRACUNCULVS MAIOR.

G E N E R A .

Matt. Tria Dracunculi reperiuntur ge-
nera Maior, Minor, Aquati-
cus.

F O R M A M A I O R I S .

Diosc. Maior, caulem habet rectum, bi-
cubitalem, lævem, baculi cras-
situdine, versicoloribus, serpē-
tium maculis, purpureis tamē
pluribus, folia rumicis sibi in-
uicem implicita. Fructum sum-
mo caule facit racemosum co-
loris primū cineracei per ma-
turitatem verò crocei, in pur-
puram vergentis, radicem ha-
bet prægrandem, rotundam,
candidam, tenui cortice obdu-
ctam.

L O C V S .

Diosc. Gignitur in vmbrosis, præsertim
circum septa.

Q U A L I T A T E S .

Gal. 6. Quiddā Aro persimile obtinet,
simp. me. tum radice, tum foliis, verūm
acrius est, & amarius, ac proin-
de magis calfactoriæ, & subtili-
um partium, quin etiam leui-
ter adstringit.

V I R E S .

Diosc. Radix cruda, costave delingi-
tur ex melle vtiliter anhelosis,
asthmaticisq; quin etiam cō-
uulsis, tussientibus & destilla-
tionibus obnoxiiis: ex vino po-
ta venerem stimulat: vlcera,
quæ cacoethe vocantur, & phagædœnica expurgat, præsertim cum bryonia. fiunt
collyria ex ea, & melle ad fistulas, & partus euocandos: illinitur cum melle effica-
citer ad vitilignes: polypus, & carcinomata absumit. succus præstat ad oculorum
nubeculas, albugines, atque caligines. idem ex oleo infusus aurium doloribus
medetur. à vipera feriri non posse affirmant, qui folia, aut radicem manibus af-
fricuerit.



DRACUNCVLVS minor, Græcis, Δρακοντία μικρά.] Italis, *Dragontea*, & *Serpentaria minore*.] Germanis, *Cleymatter vurtz*. Gallis, *Petite Serpentaire*.

DRACUNCVLVS MINOR.



F O R M A .

Folio cōstat hederaceo ma DIOSC.

gno, candidis maculis insignito, caule recto, bicubitali, versicolore, purpureis maculis resperfo, ita vt anguem planè referat, baculi crassitudine.

¶ Fructus summo Matt. caule è vagina quadam externa parte herbacea, interna verò nigricanti purpura infecta, corniculi speciem præ se ferens exoritur, qui tandem fracto corniculo in racemi, vuæve modum emergit, feruēti, ac mordaci gustu, radice nititur rotunda, bulbosa, acri, tenui libro obducta.

L O C V S .

Nascitur in sepibus vm- DIOSC brosis.

Q V A L I T A T E S ,

E T V I R E S .

Iisdem pollet viribus, qui Idem

bus maiorem pollere diximus. Peculiariter autem folia caseum à putredine defendunt, qui iis inuoluitur. Estur radix cruda, coctave placentarum loco in conuiuiis cum multo melle in Balearibus insulis.

DRACUNCVLVS aquaticus . Italis, *Serpentaria aquatica* .] Germanis,
Uaßer natter vurtz.

DRACUNCVLVS AQUATICVS.

F O R M A .

Foliis exit corni arboris
 similibus , radice arū-
 dinacea, geniculata, lō-
 ga, & Ari modo fer-
 uens. insuper ex geni-
 culis ipsis numerosæ
 exeunt fibræ, quibus
 pertinaciter humi in-
 hæret : a radice folia
 prodeunt oblonga, è
 quorū exortu alia exur-
 gunt longis pediculis
 nitentia, sed iis gran-
 diora, tenuioraq̃, ha-
 bentur, è quorum nō
 nullis, quæ conclusa
 sunt, fructus racema-
 tim enascitur. baccis
 per maturitatem rufe-
 scentibus, in quibus
 semen est nigrum, par-
 uum, & oblongum,
 crasso quodam succo
 obductum.

L O C V S .

Nascitur in montanis lo-
 cis, sed humectis, & palustribus.

F A C V L T A T E S , E T V I R E S .

Non differt viribus ab Aro, & aliis Dracunculi generibus, sed facul-
 tate imbecilliore habetur.



DRACUNCVLVS hortensis, Italis, Dragoncello, & Dragone.] Gal-
lis, Targon. Ger. Garten Rastwurz.

DRACUNCVLVS HORTENSIS.

F O R M A .

Caules fundit numerosos, *Matt.*
tenuis, in quibus folia
exeunt longa lini modo,
acri admodum gustu:
radicibus cohaeret hu-
mi repentibus. flori-
bus pusillis, albicanti-
bus, racemosis semine
superuacuo.

L O C V S .

Seritur in hortis ferè om- *Idem*
nibus.

Q U A L I T A T E S ,
E T V I R E S .

Cū insigni acrimonia plā- *Idem*
ta tota sit prędita, haud
verendum est quin va-
lenter excalfaciat, atque
siccet, incidat, digerat,
aperiat, & prouocet:
mansa pituitam ciet:
dentium dolores mul-
cet: concoctionem adiu-
uat, & vrinas mouet,

Estur passim in acetariis vnà cum lactucis, aliisque oleribus.



OPHIOGLOSSVM, Græcis, ὀφίόγλωσσον.] Italis, *Lingua serpentina*, *Argentina*, *sive herba Lucciola*.] Germanis, *Natter Zuonglin*.] Gallis, *Herbe sans chousture*, *sive Langue de serpent*.

OPHIOGLOSSVM.

F O R M A .

Matt. Vno tantum prouenit folio pingui, plantaginis aquaticæ quadantenus simili, nulla per mediū excurrente costa: è cuius inferiore sinu, cauliculus exit, pallidam, serpentis modo, in summitate ligulam gerens, unde illi nomen.

L O C V S .


Idem Nascitur in pratis. sed ocysimè deperit, cum tantū mense Maio perduerit & appareat.

Q U A L I T A T E S .

Idem Exiccat, citra insignem caliditatem.

V I R E S .

Recentia folia vulnera mirifice glutinant, & enterocellas sanant. Maceratur in oleo, quo diutius insolato, vtuntur chirurgici cōmodissimè ad prædicta. Datur potanda ex aqua equiseti ad intrinseca vulnera: auxiliatur sanguinè reiicientibus, pota ex aqua foliorum quercus alba vteri excrementa sistit: decoquitur in vino austero ad collachrymantes oculos. Illinitur recens cum adipe gallinaceo ad vulnerum inflammationes.



RV M Græcis, ἀρον.] Mauritanis, *Iaurus*, *sive Sara*.] Siris, *Lupha*.] Officinis, *Aron sive serpentaria minor*.] Hetruscis, *Gigaro*.] Germanis, *Cleim natter vurtz*.] Hispanis, *Yaro*.] Gallis, *Vit de chien*.

A R V M .

Aron vurtz

G E N E R A .

Duum est generū: maius, & minus. *Matt.*

F O R M A .

Hederaceis provenit foliis, sed magnis, dracunculi maioribus, minime dissectis, maculosis: caule edit dodrantalem, è cuius fastigio erumpit folliculus in acutū desinens, in quo fructus reconditur solidus, pistilli faciem referens, aureo colore: in cuius infima parte crocea quædam veluti semina spectantur: quæ deinde acinosa fiunt & per maturitatem rubescunt, botrūq; circa caulem efficiunt: frumenti Indici modo. Radix subest alba, bulbosa, oblonga acerrimi gustus. *Idem*

Q U A L I T A T E S .

Terrena essentia constat, sed calida, proinde extergēdi vim possidet, verum non valentem, veluti dracantum: est itaq; in exiccando, calefaciendoq; primi ordinis. Abstergit, incidit, attenuat, digerit, & aperit. *Gale. 8. simp. me. Matt.*

V I R E S .

Radix, semen, & folia dracunculi vires habent. Priuatim autem radix ex fimo bubulo podagris vtiliter illinitur. Decocta radix, melleq; excepta, medetur pituitosis pectoris morbis. quare asthmaticos maximè iuvat. Datur elixa, vel feruentibus cineribus tosta ex amygdalino oleo vtiliter tussientibus. Id quod commodius præstat lac, in quo ipsa fuerit incocta. Elixæ subiicitur oleo, & tumentibus hamorrhoidibus vtiliter illinitur. Radicis succus exedentia, & contumacia *Diosc. Matt.*

ulcera sanat: semen drachmæ pondere potum, menses, & secundas pellit.

C E N S V R A .

nescio sanè qua ratione scripserit Galenus, Arum, quo degustato os totum exurit, & acerrimum sentitur, calidum, siccumq; ordine tantum primo haberi.

ARVM minus, Græcis, ἄρον μικρον.] Italis, Gigaro minore.

ἄρον μικρον ὅς ἐστιν ἄρον

ARVM MINVS.

F O R M A.

Matt. Foliis exit sagittæ imaginem præferentibus, caule recto, glabro, drantali, botrum in acumine habenti, rubentibus baccis stipatū, in acutum desinentē: Radices fundit tenues, numerosasque, è quibus bulbosi quidā globuli fabarum magnitudine dependent, gustu per quā acerrimo.

L O C V S.

Idem. Nascitur in montibus.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Excalfacit, & siccat ordine quarto: Ideoque vrit, attenuat, incidit, & abstergit. Sunt qui radicum farina vtantur ad arcendos à suis mensis parasitos, & voraces lurcones; eandem delicatis cibis admiscentes: nā vbi fauces occupauerit, tam vehementi, ac cōtumaci ardore afficit, ne post hac quicquam vorare queant, nisi lacte bubulo diutius gargarizato, aut recenti butyro sensim delincto.



BONVS Henricus, Italis, *Herba infarinata*. Germanis, *Schmerbel*, siue *Guot henrich*.

BONVS HENRICVS.

FORMA.

Planta candicat tota per *Matt.* inde ac si tenuissimo farinę polline conspersa esset: quin etiam tactu, adeò lævis percipitur, vt vngvine aliquo peruncta videatur: Folia habet Ari quadantenus similia, caules plures, foliosos, in quorum fastigiis racemosi emergunt flores; Radicem habet vegetam, crassam, multifidâque: croceò colore, acuti lathi modo: cuius speciem esse censemus.

LOCVS.

Nascitur sponte ferè vbi- *Idem*
que in pagorū plateis.

QUALITATES.

Excalfacit, siccatur, aperit, *Idem*
abstergit, resoluit, & digerit.

VIRES.

refertur ad venenosorum animalium ictus: Radicis succus illitus, *Idem*
scabiem sanat, & cutis maculas extergit, præsertim, si cum aceto misceatur.

ARISARVM Gręcis, *Αρίσαρον*.] Italis, *Arifaro*.

ARISARVM.

F O R M A.

Matt. Foliis prouenit Ari, longè tamen minoribus: cauliculus edittenuem, in cuius summitate vaginula quadam oritur, altera parte diuisa, è qua ligula tenuis, exigui germinis modo se se exerit, pallido colore. Radix illi oliuę instar magna, oblonga, candicās, adnatis pluribus ubiq; emergentibus.

L O C V S.

Idem Nascitur in collibus, & campestribus.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 6. sim. med. Acrius multò Arisarum, quàm Arum est.

V I R E S.

Diosc. Radix illita, nomas sistit: fiunt collyria ex ea ad fistulas efficacia: illitu radice, genitale animalis cuiquēque in perniciem agitur.



ARISARVM alterum : siue Pseudo arifarum. Italis, *Arisaro falso.*

ARISARVM ALTERVM

F O R M A.


Folia mittit longa, angusta, longis pediculis nientia : radicem bulbosam, iuglandis magnitudine, numerosis ubique adnatis fibris, gustu etiam acri. *Matt.*

L O C U S.

Nascitur frequens in agro Romano. *Idem*

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Excalfacit radix, siccatur, inciditur, abstergitur, digeritur, & aperit. *Idem*



HASTVLA regia, Græcis, Ασφόδελος.] Mauritanis, *Cheunce*, *Birnach*, seu *Axeras*.] Italis, *Anfodillo*.] Germanis, *Gold vurtz*, seu *Hendnisch*.] Hispanis, *Gamones*, seu *Gamonites*.] Gallis, *Aprodiles*.

HASTVLA REGIA, SEV ASPHODELVS.

F O R M A .

Matt. Plāta est à radicibus foliosa: foliis porraceis, carinatis, caulē edit cubitalem, & sæpe maiorem, insigniter leuē, flores in cacumine albicantes, & quādoque melinos, numerosos, in stellæ modū; è quibus baccae proueniunt subrotundæ, herbacei coloris: semine intus nigro triquetroque: Radicibus nititur numerosis, nigricantibus, bulbosis, oblongis, virescēte intus pulpa, ima parte vētricosis, & in tenuem caudam desinentibus, succosis: gustu acri, atq; amaro.

L O C V S .

Idem Nasci in montib. pingui solo.

Q U A L I T A T E S .

Gal. 6. simp. me. Radix extergentis, & discutientis est facultatis; vstę autem cinis calidior, & desiccantior, subtiliorq; est, & ad digerendum potentior.

V I R E S .

DIOSC. Radices epotæ vrinās, & menses ducunt: auxiliantur à serpēte demorsis triū drachmarum pondere haustę, sed tota plāta ex vino morsus illinire oportet. valent quoq; ad sordida, & depascentia vlcera; mammarum quoque, & testium inflāmationes, tubercula, forunculosq;e. Radicis

succus per se, prodest ad purulentas aures: in contrariam aurem iufusus, dentium dolorem mitigat: cinis ē radice illitus, pilos, capillosq; in alopeciiis replicat. oleum in excauatis radicibus feruefactū, pernionibus, & ambustis medetur: in auribus distillatum, surditati auxiliatur. Semē in vino potum scolopendrę & scorpionū venenis miram in modum resistit. Illinuntur vtiliter radices in aceto decoctę lichenosis, scabiōsisq;e: crispantur quoq; capilli abrafo capiti affricta sæpe radice, decoctę & illitę parotidas sanant.



BVLBVS vomitorius, Græcis, Βολβὸς ἐμετικὸς.] Mauritanis, Zir.] Ita-
lis, Cipolla canina. Græc. ζινδοβουβλ.

BVLBVS VOMITORIVS.

F O R M A.

Folia habet esculêto bul- Diosc.
bo multò latiora, &
lōgiora, radicem simi-
lem, nigro obductam
inuolucro.

L O C V S.

Nascitur cliuosis locis. *Matt.*

Q U A L I T A T E S.

Calidioris est temperatu *Gale. 8.*
re, quàm bulbus escu- *simp. me.*
lentus.

V I R E S.

Radix mansa, aut deco- Diosc.
ctum eius potum, vesi-
cæ malis medetur. vo-
mitiones mouet.



SCILLA Græcis, Σκίλλα.] Arabibus, *Haspel, Hansel, Aschil, siue Alaschis*.] Italis, *Squilla*.] Germanis, *Meerzwibel*.] Hispanis, *Cebolla albatrana*.] Gallis, *Squille, carpentaire, siue Oignon marin*.

SCILLA

FORMA.

Mitt. Bulbo nititur ingenti, subrubro, radicibus inferna sede numerosis : squamis crassis, lento succo prægnantibus, acri, & amaro, folia mittit aloes similia, caulē sesquicubitalem, lævē, & flores in summitate subpurpureos.

LOCVS.

Idem Nascitur maritimo tractu.

QUALITATES.

Qualitatem admodum incidentem obtinet, non tamen admodum calidam, itaq; secūdi ordinis ex-calfacientium fuerit : præstat autem, aut assam, aut elixam sumere, sic enim virium illius vehementia exoluitur.

VIRES.

DIOSC. Interna scillæ pars in oleo feruefacta, rimis pedum vtiliter admo-uetur. decocta in aceto illinitur ad viperarum morsus : tosta, & odoratis medicamentis admista, haustaq; urinā ciet, hydropicos, stomachicos, auriginosos, tormi-nibus, & tussi vetere laborantes, suspiriosos, & reuomentes iuuat, tribus obolis ex melle sumpta, quin etiam comitialibus & resolutis auxiliatur. sed cauēdus scil-læ vsus his, quorum intestina vlceribus afficiuntur. ¶ Scillinum

*Pithago-
ras.*

quoq; acetum admirabilis est ad multa facultatis, si quis. n. quoti-die parum ebiberit, illi quidem faucium, orisq; partes nunquam male valebunt : os ventriculi bene valebit : facile spiritum ducet : oculi acutissimè cernent : flatus nullus in vētre excitabitur, & bene spirans, beneq; coloratus deg-et hoc aceto qui vtitur cibum

bellè conficiet, etiam si licentiosius edat : nihil supernacui in corpore residebit, non flatus, non bilis, non cruditus, non stercus, non vrina, alius lubrica omnino erit. Morbo comitiali diuturno efficaciter profuit, incipiens verò ac nouum perfectè discutit : ad podagras præte-rea, & ceteros articulares morbos, & ad iecoris, lienisq; duritias efficaciter facit.



CAPPARIS, Græcis, Καππαρίς..] Arabibus, *Cappar*.] Italis, *Capparo*.]
Germanis, *Capren*.] Hispanis, *Alchapparras*.] Gallis, *Cappres*.

CAPPARIS.

FORMA.

Aculeatus est frutex, qui in terra DIOSC.

stratus, magis in orbem eu-
gatur: spinas, ut rubus habet
in hami modum aduncas: folia
mali cotoneæ, rotunda: fructum
oleæ similem, qui cum dehi-
scens panditur, florē candidum
promit: quo excusso, non ni-
hil glandis oblongæ figura
inuenitur, quod apertum gra-
na acinis puniceorum similia
ostēdit, parua, rubicunda. Ra-
dices spargit lignosas, gran-
des, numerosasque.

LOCVS.

Tenui solo, asperisque locis, in Idem
insulis, & iuxta rudera na-
scitur.

QUALITATES.

Radici cortex vincentem habet Gal. 7.
qualitatem amaram, proxi- simp. me.
mam acrem, deinde acerbam: qui-
bus palam est, quod diuersis, &
pugnantibus constet, faculta-
tibus. quippe abstergere, pur-
gare, & incidere potest sua ama-
ritudine, excalfacere verò, in-
cidere, digerere, acrimonia:
porro desiccare, costringere acer-
bitate: radici cortici fructus
virium proportionem respondet,
quin, & folia, & caules, verum
imbecillius operantur.

VIRE.

Fructus drachmis duabus in vi- DIOSC.
no potus quadraginta diebus,

lienem absumit, & urinam pellit: bibitur utilissimè Ischiadicis, resolutis, convulsisque;
menses ciet, & caput purgat: seminis, aut aride radici ex aceto decoctum, colluto ex
eo ore, dentium dolores mulcet. radicum cortex, ulcera vetera omnia, & sordida,
callosaque expurgat: lienosis, cum hordei farina utiliter illinitur: cum aceto trita, al-
bas vitiliginis abstergit: Radix foliaque intrita, strumas, ac duritias discutiunt, folio-
rum succus infusus aurium vermiculos enecat. ¶ Fructus in ciborum usum venit, Matt.
sed parum alit: valet tamen ad excitandam cibi appetentiam, & deradendam, deii-
ciendamque pituitam, quæ ventriculo inhaerit, & ad lienis, & iecoris morbos.



LEPIDIVM, Græcis, *Λεπίδιον*.] Mauritanis, *Saitaregi*, *Hansab*, *Asceita regi*, *sive Scitharegi*.] Ital. *Lepidio*, *seu Iberide*.] German. *Vuilder kresz*.] Hisp. *Nasturtio montesino*.] Gal. *Passerage sauvage*, *sive Nasitort sauvage*.

LEPIDIVM PAVLI, ET PLINII,
VVLGO PIPERITIS.

F O R M A.

DIOSC.
Matt.

Folia gerit nasturtii: vere virentiora, caulem cubitalem, aut minorem, florem album, tenuemque. Semē circum summos tenuesque cauliculos in siliquis, nasturtij æmulis, sed minoribus, minuto intus semine. Radicē albam, acri sapore.

L O C U S.

Democr.

Nascitur locis incultis, saxosis: in tēplorū areis, atque sepulchris, secus itinera, in ruderibus, & agrorū extremitatibus.

Q U A L I T A T E S.

Matt.

Excalfacit, & siccatur, magis quàm nasturtium extrahit, attrahit, incidit, attenuat, aperit, digerit, & vrit.

V I R E S.

DIOSC.
Democr.

Præstat mirū ī modū Ischia dicis, si cū Helenij radice, quarta parte horæ illinatur. Idē præstat contusa radix & cum salsa

axungia illita, quaternis horis. sed deinde in balneum descendere egrum oportet. & locum cum oleo inungere; addita lana. herba lienosis admota prodest. eadem lepras eximit.

C E N S V R A.

Qui Lepidium, & Iberidem duas faciunt plantas, manifestè falluntur.



LEPIDIVM Paulo Æginetæ, & Plinio : posterioribus Græcis, Λεπιδίον.]
 Italis, Piperite, & Peperella.] Gallis, Passerage, sine Poyuree.] Ger-
 manis, Pfeffer Kraut.

LEPIDIVM.



FORMA.

Caulibus cubitalibus fruticat, subalbicantibus : foliis lauri, maioribus tamē, robustis, floribus in cacumine spicatis, tenuibus, ac albicantibus. Radice alba, acerrimi gustus, perinde, ac folia. quæ dentibus attrita os vniuersum accendunt.

LOCVS.

Seritur in hortis, ac etiam *Idem* quibusdam in locis sponte nascitur.

QUALITATES,
ET VIRES.

Excalfacit & siccatur vehementer. ac ea omnia potest, quæ lepidium primum, ceterum longè valentius operatur. *Idem*

RANUNCULVS, Græcis, *Βαρβάχιον*.] Italis, *Ranoncolo*, siue *Pie corbino*.] Germanis, *Hanon fuosz*.] Hispanis, *Yerna belida*.] Gallis, *Grenoilette*, siue *Bassintz*.

RANUNCULVS.

G E N E R A .

Matt. Sex nobis Ranunculi recensentur genera: de quibus inferius dicetur.

F O R M A .

Diosc. Foliis exit coriandri latioribus, pinguibus, subalbidisque: floribus luteis, & interdum purpureis; caule gracili, cubitali: radice alba, exigua, amara, & ellebori modo fibrata.

L O C V S .

Idem Nascitur in limitibus humidis.

Q U A L I T A T E S .

Gal. 6. Omnia facultatem vehementer acrem possident, adeo, ut cum dolore exulcerent. Radix arefacta, sternutatorium est medicamentum, similiter aliis omnibus, quæ vehementer desiccant, & ut semel dicam, calida & sicca valde est, tum radix, tum vniuersa herba, adeo ut sua exiccatione, sicca radix dentes quoque frangat.

V I R E S .

Diosc. Folia, flores, & cauliculi recentes cuiuscunque generis, exulcerant illita, & crustas non sine dolore exciāt: quare scabros vngues eximunt: scabiem detrahunt, & stigmata delent: peniles, & formicantes verrucas, alopeciasque paulisper illita, tollunt, tepente decocto fouentur vtiliter perniones: sicca radix, tritaque sternutamenta ciet, naribus indita.

C E N S V R A .

Qui Ranunculum coronopum esse contendunt: ij sanè delirio agitantur.



RANUNCULVS SECVNDVS. *Jos andr. Baumh.*

F O R M A.



Ranunculus secundus, la- *DIOSC.*
 nuginosior, hirsutior
 quàm primus est, lon-
 gioribus caulibus, &
 pluribus foliorum in-
 cisuris.

L O C V S.

Plurimus in Sardinia na- *Idem*
 scitur: quàm acerri-
 mus: quem sylvestre
 apium appellant.

Q U A L I T A T E S ,
 E T V I R E S.

Apium risus quidam hoc *Matt.*
 ranunculi genus appel-
 lauere, quòd si herbam
 hanc, quispiam in edu-
 liis vorauerit, eius ner-
 ui contrahantur, rictu
 que os diducatur: vt
 grauiissimi testantur au-
 tores. ita vt qui mortē
 appetunt, veluti riden-
 tium facie intereant.


RANUNCULVS TERTIVS.
See Dist. Ranunc. sub.

FORMA.

Minoribus prouenit foliis, floribus melinis :
 sed tota planta grauem
 spirat odorem.



RANUNCULUS QUARTUS.

Dr. Virr. Gammfub.

Non est absimilis tertio. fo- diosc.
 lia tamen magis diuisa *Matt.*
 sunt. florem edit lactei
 candoris: Radices nume-
 rosas, fibrosasque.

RANUNCULVS quintus, Italis, *Pie di Gallo.*] Germanis, *Drüosz vurtz*
 Gallis, *Pie pou.*

RANUNCULVS QUINTVS.

F O R M A.

Matt. Folia mittit secundi ferè si-
 milia, atque etiam hir-
 tiora, radices albas, nu-
 merosas, ellebori mo-
 do, inter quas medium
 occupat locum, tubero-
 sa radix dependens ve-
 luti ex funiculo, nucis
 iuglandis magnitudi-
 ne, albicās rapi modo,
 sed acris, & exulcerās.

L O C V S.

Idem Nascitur locis incultis, &
 secus itinera.

Q V A L I T A T E S,
 E T V I R E S.

Idem Excalfacit, & siccatur ordine
 quarto: vlcerat, extra-
 hit, incidit, digerit. Ra-
 dix recens tusa, & ad-
 mota, vesicas excitat:
 quare ischiadicis vtili-
 ter illinitur.





FORMA.

Folia mittit anemonis pri *Matt.*
mi similia : caules cu-
bitales, striatos, flores
in summitate magnos,
aureo colore : radices
numerosas, fibrosasq;.

LOCVS.

Nascitur in riguis, & hu- *Idem*
mectis locis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Ceteris minus est acris,
qua re minus excalfa-
cit, & siccatur.

Alias Argemone, 3 5 4

*uel Erraticum
papauer.*

N O M I N A .

ANEMONE, Græcis, *Ανεμώνη.*] Italis, *Anemone.*] Arabibus, *انيمون*,
Alnahamen, Sakaik, seu Mamira. *توتة الياض* *Alayyad Rast.*

GENERA.

ANEMONE.

Matt. Plura habet genera, quo-
rum quinque nos ob-
seruauimus.

FORMA PRIMÆ.

DIOSC. Folio prouenit coriandro
Matt. simili, sed frequentio-
ribus incisuris, cauli-
bus lanuginosis, tenui-
bus, striatisque: in q-
bus tenuiora folia per
interualla spectantur:
floribus syluestris pa-
paueris magnitudine,
purpurascens, pro-
minente umbilicote-
nus capillo, nigro co-
lore, nigrisq; capilla-
mentis stipato, perinde
ac in papauere. Radix
illi inest oleæ magni-
tudine, subrotunda, fi-
brataq; ac sapore acri.

LOCVS.

Idem Oritur in aruis, & aliis
cultis locis.

QUALITATES.

Gal. 6. Anemone omnes, acré,
simp. me. extergēdi, attrahendi,
& ora vasorum referā-
di facultatem obtinent.

DIOSC. Succus cū foliorum, tum radicis naribus infusus, caput purgat. cō-
manducata radix pituitam trahit: decocta in passo, & illita, sanat
oculorum inflammationes, cicatrices eorundem, & hebetudines
emendat: sordida vlcera abstergit. Folia, & caules, si cum ptissana
cocti edantur, lactis copiam præbent: & in vellere folia supposita,
menstrua cient, & lepras illita eximunt.



VIREs.

ANEMONE secunda, Italis, *Anemone secondo.*

Is andra Cypselos der Alappos.
Hofm.

ANEMONE SECVNDA.

FORMA.

Foliis prouenit maiori- *Matt.*
bus, frequentius laci-
niatis, cynoctoni aco-
niti modo, caulibus al-
terius similibus, sed a-
liquanto crassioribus,
inanibus, & in rectū
spectantibus, quibus
flores insunt in sum-
mitate dilutior pur-
pura nitescentes: ca-
pitulo circūqua; co-
mato: perinde, ac al-
tera. Radicem habet
breuem, rapunculi se-
rè figura, fibris adna-
tis multis: acri gustu.

LOCVS.

Nascitur locis cultis, & *Idem*
presertim in aruis.

QUALITATES,
ET VIREs.

Nihil suis in facultati- *Idem*
bus à priore differt.



ANEMONE TERTIA.

F O R M A.

Matt. Foliis est ranunculi primi
similibus, caulibus te-
nuibus, sesquipalmari-
bus, rotundis, in quo-
rum cacumine flores
exeunt albi, ac diluta
quadam purpura nite-
scentes, inferiori præ-
sertim sede rosarū ma-
gnitudine, radicem ha-
bet fibratā, ac tenuem.

L O C U S.

Idem Nascitur in collibus.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem Tota plāta ceteris mitior
est, quare minus exal-
facit, & siccat.



ANEMONE QVARTA.



FORMA.

Folia profert frequēter la- *Matt.*
 ciniata, caulē ramosum,
 flores in summitate pur-
 pureos, radicem globo-
 sam, & parvam, fibris
 numerosis stipata.

LOCVS.

Prouenit cultis locis.

Idem

ANEMONE QUINTA.

F O R M A .

Matt. Parùm differt à quarta: minoribus tamē est foliis, tenuioribusque: floribus aureis, radice parua, fabę magnitudine.


L O C V S .

Idem Oritur cultis locis, & in aruis.



PULSATILLA, Italis, Pulsatilla.] Germanis, *Ruchen schell, seu Hocken*
kraut.

PULSATILLA.



FORMA.

Cum primùm erumpit fo *Mate.*
lia mittit incana, & ad
modum hirsuta, minu-
tim laciniata, sapore p
quam acri : flores pro-
deunt anteaquàm folia
emergant purpurei, ni-
gricantes, atq; hirsutis,
caulē rotundū, tenuem
atq; incanum. Radix il-
li subest pedali lōgitu-
dine, exesa chamæleo-
nis albi modo, sapore
potius subdulci, quàm
acri.

LOCVS.

Prouenit locis incultis, *Idem*
aridis, & saxosis.

QUALITATES.

Folia, caules, & flores cū *Idem*
acerrimo sint gustu, ex-
calfaciunt, & siccant or-
dine quarto: incidunt,
attenuāt, attrahunt, di-
gerunt, expurgāt, & e-
xulcerant. Radix verò
cū subdulcis sit, non
lōgè aberit à tēperatis.

VIRES.

Sunt qui radicem maximè præferant contra pestilentiaē contagia, & *Idem*
pota venēna, & virulentorum animalium ictus, si cum vino biba-
tur, drachmarum duarū pondere, quare in antidotis additur. Aqua
è foliis distillata, vulnera sanat, & pota sudorem prouocat.

ANAGALLIS Græcis, *Αναγallis*.] Italis, *Anagallo*.] Officinis, *Mur-*
sus Gallinae.] Germanis, *Gauch heil*.] Hispanis, *Muruges*.] Gallis,
Murgelline, seu *Mouron*. *günnerbiss das mündlein*

ANAGALLIS MASC.

G E N E R A .

Diosc. Duum est generum, Mas al-
 terū, alterum fœmina.

F O R M A M A R I S .

Idem Planta est parua, humi ia-
 cens, foliis in quadran-
 gulo caule pusillis, sub-
 rotundis; floribus phe-
 niceis, & paruo, ac ro-
 tundo semine.

L O C V S .

Matt. Nascitur in hortis, culto,
 ac lato solo.

Q U A L I T A T E S .

Gale. 6. Admodum extergentis est
sim. med. facultatis, habet etiam
 quendam calorem attra-
 ctorium: vis etiam mi-
 tigandi illi inest.

V I R E S .

Inflammationes arcet: ada-
 ctos corpori aculeos ex-
 trahit, nomas cohibet: succus gargarizatus, capitis pituitam pur-
 gat: & naribus infusus, dolorem dentium lenit, si in aduersam na-
 rem iniiciatur: argemas cum melle emendat: prodest contra vi-
 perarum morsus, iocinoris, & renum vitia si ex vino bibatur.



ANAGALLIS foemina, Græcis, ἀναγallis θήλυς.] Italis, *Anagallo foemi.*

Yanffwil 33 gynnwysf du. vriblwm

ANAGALLIS FOEMINA.

FORMA.

Nihil ab altera differt, nisi Diosc.
floris colore, qui in hac
cæruleus, in illa phæni-
ceus spectatur.

LOCVS.

Nascitur cultis, & incul- Matt.
tis locis. Et sepe in hor-
tis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Vt forma similes sunt, ita fa Diosc
cultatibus, & viribus:
peculiariter autem hæc,
procidentem sedem ad-
mota reprimit: altera ve-
rò euocat, ut quidam vo-
lunt.



SVCCISA, Officinis, *Morsus diaboli.*] Italis, *Morso di diauolo.*] Germanis, *Tenffels abißz.*

F O R M A.

Matt. Foliis constat plātagini angustifoliæ similibus, læuioribus tamen, caulibus sesquicubitalibus, in quibus minora sunt folia perambitum denticulata, flores edit scabiosæ similes. Radicem habet pollicarē, sed succisam, & veluti demorsam, à qua complures oriuntur fibræ, ellebori modo.

L O C V S.

Idem Prouenit locis incultis, salibus, ac dumeris.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem Herba trita, & admota, præ sentaneo auxilio, carbunculis pestiferis medetur, aut si vinum bibatur, in quo incocta fuerit. Radix per se, aut vinum in quo efferbuerit potum, non modo vteri dolores mulcet, sed pestilentie contagia superat. Gustu admodum amara est: quare exalfacit, & siccatur.

SVCCISA, SEV MORSVS DIABOLI.



HEDERA, Græcis, Κισσός.] Mauritanis, *Cussus*] Italis, *Hedera*, seu *Lella*.] Germanis, *Mauer*, sine *Epheu*baum, sine *Ebich*.] Hispanis, *Hedera*, seu *Eda*.] Gallis, *Lierre*.

HEDERA.

GENERA.

Hedera differentias multas in genere sortitur: summas autem genere tres, nam altera candida, altera nigra, & tertia, quæ *Helix* appellatur. ¶ Nos autem alteram maiorem, alteram minorem appellamus.

Matt.

FORMA MAIORIS.

Maior, quam arboream vocant, non solum in sylvis excelsas arbores scandit, sed etiam antiqua ædificia, urbium mœnia, sepulchraque adeo occupat, ut tandem suo arctiori complexu, ea omnia diruat, & una cum iis collabatur: foliis, suo exortu provenit oblongis, quæ deinde temporis tractu triquetra evadunt, levia, crassa, robustaque: Florere incipit ad finem Autumni, floribus muscosis, pallescentibus, è quibus racemosi hyeme nascuntur corymbi, baccis ligustrinis maioribus.

Idem

LOCVS.

Nascitur in sylvis, in cæpis, in hortis, & ædificiorum muris.

Idem

QUALITATES.

Ex contrariis composita est facultatibus, habet. n. quiddam adstringentis substantiæ quam terrenam, & frigidam esse constat. habet & nonnihil acris, quam calidam esse, vel gustus comprobatur: nec deest tertia: aqueam namque substantiam quandam tepidam detinet, si viridis sit. in sicca. n. exhalavit.

Gal. 7. simp. me.

VIRE.

Recentia folia ex aceto decocta, aut cruda, cum pane detrita, lienes sanant. Foliorum, & corymborum succus naribus infusus, cum mel-

Matt.

le, pituitam deponit: valet idem contra veteres capitis dolores, si cum aceto, & rosaceo perfundatur: purulentis, aut dolentibus auribus, cum oleo medetur. baccæ quinq; tritæ, & in malicorio, cum rosaceo feruefactæ, si instilletur oleum in contraria aure, dolorem dentium mitigant: corymbi triti, ac subditi, menses mouent. Insti latus succus, putrida radia narium, graucolentiamq; emendat: Lachryma psilothrum est. Illita pediculos necat. ¶ Foliorum succus ex vino austero potus, lienefos sanat: confuta recentia folia, in pilei formam papulosis, exulceratisq; infantium capitibus, vtiliter imponuntur.



HEDERA minor, Græcis, Κισσός ἐλὶξ.] Italis, *Hedera minore*.

HEDERA HELIX, SIVE MINOR.

FORMA.

Matt. Folio exit triquetro, ac maculoso: sarmentis albicantibus, ac lignosis. Hęc humi repit, & saxis hæret: fructu nullo neque flore.

LOCVS.

Idem Prouenit aridis, & saxosis locis, circa sepes, & saxa grandiora.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem Potest ea omnia, quę maior: sed inefficacior tamen est.



HEDERA terrestris; Græcis, Κισσὸς χερσαῖος.] Italis, *Hedera terrestris*. *Βανδακισ*.

HEDERA TERRESTRIS.

FORMA.

Longo hæc reptatu humi serpit, quadrangularibus funiculis, è quibus folia prodeunt rotunda, crispa, subaspera, & per ambitum ferrata, flores edit in purpura albicantes, pusillos: Radicibus tenuibus, è funiculorū geniculis prodeuntibus. Planta tota amara est.

LOCVS.


Nascitur in opacis, circa semitas, vrbium muros, & in hortis.

QUALITATES.

Amaro gustu tota planta est, quare abstergere, extenuare, aperireque faciliè poterit.

VIRES.

Additur in potionibus quæ ad viscerum internorum vulnera parantur: succus cum æruginè mixtus, instillatur vtiliter cuniculosis vlceribus: Fit è foliis recentibus oleum, iis in eo maceratis, diuq; æstate in solatis, admirabilis sanè facultatis ad tormina, & cæteros intestinorum cruciatus, cum potum, tum infusum.



CHELIDONIUM maius, Græcis, Κελιδόνιον μέγα, Kauroch, seu Memi-
ram.] Italis, Celidonia maggiore.] Germanis, Schel Kraut.] Hispanis,
Celiduenā, siue Yerua dellas golundrinas.] Gall. Chelidoine, seu eschlere.

CHELIDONIUM MAIUS.

F O R M A.

Diosc. Caule est gracili, cubitali,
aut altiore, agnatis fo-
lios; folij ranunculi,
mollioribus tamen, &
colore cesis: flore vio-
læ albæ, secundū singu-
la folia prodeunte, suc-
co tota plāta madet cro-
ceo: q̄ mordax, & acris
est, subamarus, & graui-
ter olens. Radix super-
nè singularis, infernè in
multa crocea capillamē-
ta fibratur: siliqua ceu
corniculati papaueris,
tenuis, in metæ figurā
longa, in qua semen re-
cluditur.

L O C V S.

Matt. Prouenit propter sepes, in
scrobium ripis, secus
vias, inter rudera, & in
muris, & parietibus.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 8. Extergentis admodum, &
simp. me. calidę facultatis est, suc-
cus eius, & ad acuen-
dum visum, cōmodus

est: utque in quibus crassum quiddam, quiddam in pupilla colli-
gitur digestionē indigens.

V I R E S.


Diosc. Radix cum aniso, & vino albo pota, medetur regio morbo. & vlceri-
bus, quæ serpunt imposita cum vino. succus oculorū claritatē affert.



[CHELIDONIUM minus, Græcis, Κελιδόνιον μικρόν.] Arabibus, *Memit-*
ten.] Hetruscis, *Fauoscello*, seu *Celidonia minore.*] Germanis, *Feigon*
vartz, *Blanter Kraut*, seu *Pfaffen, hoedlin.*] Hispanis, *Scrofolaria menor.*] Gallis, *Conilos de Prestres*, seu *petite eschlere*.

Ulijmifraut
fring platon
Epis.

CHELIDONIUM MINUS.



gilij Amellum esse contendunt.

APPENDIX.

Chelidonium minus tametsi Dioscoridi, & Galeno adeò sit acre, vt admotum corpori celeriter exulceret, quod facilè de eo credendum est, quod in Græcia prouenit: cùm tamen Italicum nulla sit acredine præditum, calidis, ac siccis qualitatibus penitus destituitur.

FORMA.

Foliis prouenit hederæ minori- DIOSC.
 bus, rotundioribus, teneris ac
 subpinguibus, humi accubā-
 tibus, sine caule: Radices ha-
 bet ex eodem. callo complu-
 res, pusillas, in granorum tri-
 tici modum acruatim con-
 gestas, quarum tres, aut qua-
 tuor in longitudinem exeūt.
 ¶ Flores fundit luteos, tenui- Matt.
 bus pediculis nitentes: Breui
 deperditur tempore: vere. n.
 & nascitur, & arescit.

LOCVS.

Nascitur vliginoso solo, iuxta DIOSC.
 aquas, stagna, & lacus.

QUALITATES.

Cùm acrius sit maiore, illitum Gale. 8.
 celeriter cutem exulcerat, ita- simp. me.
 que hæc herba quarti ordinis
 iam absoluti, tum in calfaciē-
 do, tum in siccando fuerit.

VIRES.

Succus eius per nares purgat, vt Gal.
 pote admodum acer. ¶ Pso- DIOSC.
 ras, & scabros vngues elicit:
 Decoctū eius ex melle garga-
 rizatum, caput purgat. idem
 facit succus è radicibus expres-
 sus; omnia pectoris vitia de-
 coctum extrahit.

CENSURA.

Amentium cuculla digni sunt,
 qui Chelidonium minus, Ver-

AQVILINA, siue aquilegia, Italis, *Aquileia*, *Celidonia maggiore*, seu *Celidonia saluatica*.] Germanis, *Ackelex*.] Gallis, *Ancholies*.

Aquileia

AQVILINA, SEV AQVILEIA.

FORMA.

Matt. Planta est fruticosa, foliis maioris *Chelidonii* quā dātenus similibus, subalbicantibus, per ambitum diuisis: caules edit numerosos, tenues, sesquicubitales. Flores in cacumine emicant purpurei, aut candidi, aut lutei, in stellę modum radiantes, quatuor inferiori sede corniculis, concavis, & sursum reflexis, è quibus capitula suboriuntur melanthii modo, quæ nigrū, pellucidumque concludunt semen.

LOCVS.

Oritur in montibus, syluosis locis, & seritur in hortis.

QUALITATES.

ET VIRES.

Semen drachmæ pondere potum ex Cretico vino, & croci momento icteritiam sanat: sed ægros subinde in lecto sudare oportet.



CARYOPHYLLVS Indicus, Italis, Garofano Indiano.

Indianische Dirbe garofan Vogelrin.

CARYOPHYLLVS INDICVS.

GENERA.

Duo habet genera : Maius, & Minus.

FORMA MAIORIS.

Planta est fruticosa, cau- *Matt.*
lib^o bicubitalibus, &
quandoq; maioribus
striatis, rectis, subrufo
scētibus, è quibus nu-
merosa pdeūt folia, ta-
nacetī emula, sed ma-
iora, & magis diuisa:
flores è calice oblōgo
torosoq; ac longo pe-
diculo nirentes exeūt
aurei, magni, numero-
sis admodū stipatis fo-
liis, odore minus quā
in altero graueolēti,
semine tenui, oblōgo,
nigro : Radix illi est
breuis, multifidaq;.

LOCVS.

Seritur ī hortis, colitur *Idem*
in fictilibus, & arcu-
lis, spectaculi gratia.

QUALITATES, ET VIRES.

Excalfacit, & ficcat, quo fit, vt in medicum vsum venire possit. vbi ab-
stergere, extenuare, digerere, ac reserare sit opus.

CARYOPHILLVS Indicus minor : Italis, Garofano Indiano minore.

officinalis Indiarum Arabiarum

CARYOPHILLVS INDICVS MINOR.

F O R M A.

Matt. Flore tantum à maiore distat, quippe qui in hoc genere minorum spectat bino, ternoq; foliorum stipamento: color illi inest aureus, subnigricansque, & leui quadam purpura adumbratus, aspectu admodum iucundo, adeo quòd ex oloferico, quòd velutum vocamus, à natura facti videantur: sed odore sunt graui, & qui caput feriat.

L O C V S.

Visitur passim super fenestras in fictilibus, atque etià in hortis.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Excalfacit, siccatur, attenuat, incidit, & abstergit, ac aperit valentius, quàm maior.



VRICVLA muris, Græcis, Μυρὸς ὠρίον.] Italis, *Orecchia di topo.*] Germanis, *vuild mangololt nut blaunen bluomen.*] Hispanis, *Oreya de ratton.*] Gallis, *Orelge de ratte.* *Wundbörlin*

AVRICVLA MVRIS.

FORMA.

Planta est caulibus pluribus ab vna radice, aliquatenus ab imo rubentibus, & concavis, foliis angustis, oblongis, dorso acuto, ac eleuato, nigricantibus, per intervalla assidue germinatis, atque in mucronem desinentibus, & tenuibus cauliculis ex alarū sinu prodeuntibus, flosculo, ut anagallidis, cæruleo. Radix digitali crassitudine, multis capillamentis fibrata.

LOCVS.

Oritur in pratis, in campis, & hortis. *Matt.*

QUALITATES.

Desiccat ordine secundo: *Gal. 7.* cæterum nullam eundem caliditatem possidet. *simp. ms.*

VIRIS.

En pōtū aīngos.

Radix illita egilopas sanat.

Diosc.

Isatis domestica, siue *Glastum*, Græcis, *ισάτις ἡμέρος*.] *Ital*is, *Guado domestico*.] *German*is, *Uueid*.] *Hispan*is, *Pastel*.] *Gallis*, *Gueda*, seu *Pastel*.

F O R M A.

Matt. Folia profert plantagini similia, verum pinguiora, nigrioraque: caulis ille est bicubitalis, floribus in summitate numerosis, parvis, tenuibusque, aureo colore.

L O C V S.

Idem. Seritur passim in campis ad lanificia cæruleo colore inficienda.

Q U A L I T A T E S.

Gale 7. simp. me. Facultatis est valèter exiccantis, nondum tamen mordentis: est etiam simul amara, atq; adstringens.

V I R E S.

Diosc. Illita folia tumores omnes discutunt: cruenta vulnera glutinant: sanguinis profluvia sistunt, ignem sacrum, exedentia, putrescentia, ac serpentia vlcera sanant.

ISATIS DOMESTICA.



ISATIS sylvestris, Græcis, ἰσάτις ἀγρία.] Italis, *Guado saluatico.*] Germanis, *Uildt, Uneidt.*] Gallis. *Pastel sauvage.*

ISATIS SYLVESTRIS.



FORMA.

Folia fert maiora, lactucae Diosc. proxima: caules tenuiores, multifidos, quadatenus rubentes, in quorum cacumine folliculi multi dependent, quadam linguarum faciem referētes, in quibus semen: flore luteo, tenui.

LOCVS.

Nascitur in campestribus, *Matt.* incultis locis, & in pascuis.

QUALITATES.

Manifestè iam acre quid- *Gale. 7.* dam tum gustu tum a- *sim.med.* ctione præfert, proinde valentius, quam fascina desiccat. atq; valentius humidis putredinibus resistit.

VIRES.

præstat, potu, & illitu lienosis auxiliatur.

Eadem quæ & supradicta Diosc.

TELEPHIUM, Græcis, τηλεφίον.] Italis, *Faua grassa.*] Gallis, *Reprise*:
loubarbe des vignes.] Germanis, *Wundt kraut.*

F O R M A.

Diosc. Folia promit portulacæ si-
 milia, quin etiâ caules
 non absimiles; alas bi-
 nas in singulis foliorû
 geniculis, annectit. Ra-
 muli à radice seni, se-
 premvè prodeunt, fo-
 liis referti cæruleis, cras-
 sis, lentis, carnosiss, flo-
 re luteo, aut candido.

L O C V S.

Idem. Nasctur in cultis, & ma-
 ximè inter vites. § Quin
 Matt. etiam saxosis locis, in
 tectis, & antiquis pa-
 rietibus.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 8. Telephium exiccantis, ex-
 simp. me. tergenstisq; est faculta-
 tis, non tamen insigni-
 ter calida: verû in hoc
 forsitan quispiâ ipsum
 primi esse ordinis cen-
 seat: deliccat tamen se-
 cundo ordine inteso, aut
 certe principio tertij.

V I R E S.

Diosc. Telephij folia senis horis
 illita, vitiliginem sanant, sed postea locus hordeacea farina illini de-
 bet: peruncta ex aceto in sole, idem quoq; præstant. sed vbi inarue-
 runt, absterguntur.

Fabaria Telephij notas omnes habet. verûm de viribus dubitandû est.

TELEPHIUM SIVE FABARIA.



A P P E N D I X.

AGARICVM, Græcis, *Αγαρίκη*.] Maurit. *Garicum*.] Italis, *Agarico* & *fongo di larice*.] Ger. *Dannen schuam*.] Hisp. *Agarico*.] Gal. *Agaric*.

AGARICVM. *Eruginifera*.



GENERA.

Duo eius habentur genera, Mas alterum, alterum Fœmina.

FORMA.

Fungus est in Larice nasceus, non tamen vna & eadem semper mole proueniens. Qui autem fœmina vocatur rotundior, candidior, friabilior, leuiorq; habetur, quin etiã primo gustu dulcis, mox amarus percipitur. & facie summa rimosus spectatur. Mas verò qui rotundior habetur, cum compactior, durior, villosior, lignosiorq; sit, inutilis putatur.

Diosc.

Matt.

LOCVS.

Nascitur plurimum in Tridentinorum montium syluis, vbi larices arbores crescunt.

Matt.

QUALITATES.

Is primo quidem gustu (vt prædiximus) dulcis, sed paulò post subamarus percipitur, acrimoniæ ac leuiculæ adstrictionis particeps, quin etiam laxa consistentia præditus, quibus omnibus palam est, quòd compositum sit ex aërea, ac terrea substantia à caliditate extenuata. Hac itaq; ratione & digerendi, & calfaciendi, vim habet, & crassitudinem incidendi, tum viscerum infarctus expurgandi.

Gale. 6.

simp. me.

VIREs.

Efficax est contra tormina, & cruditates: prodest contusis, & ab alto deuolutis: ictericis, hydropicis, suppuratis, iocinorosis, nephriticis mirifice auxiliatur: si vrina agrè excernatur, si vuluæ strangulatus vrgeat, si pallor in corpore adsit, drachmæ pondere dari solet. Tabidis ex pallo, lienosis ex oxymelite

Diosc.

utiliter propinatur. Manditur ac postea deuoratur necus vbi ventriculus cibi tenax non sit, & acidus mittat ructus: sanguinis reiectiones sistit tribus obolis ex aqua haustus: menses ciet & vteri inflationibus medetur. Aluum purgat, & utrâque bilem, & pituitam pellit: venenorum antidotum est. Serpantium venenosorum morsibus mirifice auxiliatur, tribus obolis ex vino sumptum. verum agarici proprium est cerebrum, nervos & omnium sensuum organa expurgare, pulmones, & pectus, a lentis, crassisq; & putrescentibus excrementis detergere, atq; contumacem materiam omnem in articulis existentem exoluere. Resolutis, stupidis, comitialibus, vertiginosis, diuturno capitis dolore affectis, omnibusq; quibuscumq; morbis ab infarctu proueniētib; mirum in modum auxiliatur. Recensetur quoq; inter medicamenta, q̄ ad cordis affectus præstare dicuntur.

RHABARBARVM, Italis, Reobarbaro. *Rhabarbora*

R H A B A R B A R V M.

F O R M A .

Caule prouenit à radice breui, sed crasso, è quo circūquaque folia numerosa exeunt, ex angusta origine, in amplum definentia, deorsumq; spectantia; lanugine quadam per ambitum obducta. Hæc dum adolefcunt viridia, adulta vero lutea spectantur. E medio foliorum stipatu cauliculus assurgit, qui summo fastigio flores mittit, cæruleos: odore acuto simul, & graui. Radix pedalem longitudinem superat, colore ex rufo nigricante. Crassitudo radicis non omnibus plantis eadē inest: verum quæ ad summam crassitudinem excreuerunt, humani cruris molem æquare solent: numerosis adnatis vndique fibris. Interna pulpa aureo colore nitet, rubris quam plurimis intercurrentibus venis: succo madet copioso tum croceo, tum purpureo, qui suo lentore manus implicat, & colore inficit.

L O C V S .

Oritur in Traglodytica regione, quæ proprie Barbaria appellatur, vnde illi nomen: quin etiam, in Catai Regno, eminentibus quibusdam montibus & saxosis. sunt qui scribant Rhabarbarum in India oriri.

Q U A L I T A T E S .

Constat tum aqueis, tum terrenis qualitatibus, quæ adstringentem illi facultatem tribuunt, quin etiam aëreis, & igneis.

V I R E S .

Omnis penitus noxa vacat: adeo, vt quouis tempore dari possit non solum pueris ætate tenellis, sed & vtero gerentibus. Sinceri macerati dilutum, vbi abstersione, deiectione, & infarctus liberatione sit opus, mirifice confert. Atqui vbi adstringere, ac roborare oporteat, ipsum quidem in puluerem cōtritum exhiberi debet. Id quod vehementius operatur, quod igni prius fuerit tostum: Deicit Rhabarbarum cum bilem, tum pituitam: ei que propria facultas est abstergerendi, roborandi; cum ventriculum, tum etiam iecur: atq; eorum punctiones amouendi. Sanguinem pellucidum reddit, obstructions aperit, & qui ab his proueniunt morbos, sanat. Idcirco ictericos, hydropicos, lienosos, ac diuturna febre laborantes iuuat. Datur vtiliter ab alto deuolutis drachmæ pondere addito Mumia, & rubia radicis momento ex vino austero. Opitulatur singultientibus, ac dysentericis, præsertim illud, quod igni fuerit tostum.



GENTIANA, Græcis, Γεντιανή.] Arabibus, *Gentiana*, seu *Genthiana*.] Italis, *Gentiana*.] Germanis, *Entian vurtz*, siue *Creutz vurtz*.] Hispanis, *Gentiana*.] Gallis, *Gentianne*.

G E N T I A N A.



G E N E R A.

Trium est generum. Maior. Mi- DIOSC.
nor. Minima.

F O R M A.

Maior foliis prouenit partim p-
ximè radicem plātagini simi-
libus, subrubris, partim à me-
dio caule, & præsertim iuxta
cacumen paulum dissectis :
caule cauo, ac læui, digiti cras-
situdine, geniculato, bicubita-
li: semine in calicibus lato, læ-
ui, glumoso, satis ad sphondy-
lij semen accedente. Radice
longa, crassa, amara, subluteo
colore.

L O C V S.

Nascitur in sublimium montiū DIOSC.
iugis, vmbrosis, & vliginosis *Matt.*
locis. ¶ Ac etiā in eorundem
montiū pratis, ac pascuis.

Q U A L I T A T E S.

Radix efficax est, vbi extenuatio *Gal. 6.*
ne, purgatione, abstersione, ob *simp. m.*
structionis liberatione opus
sit. Nec mirum si hæc possit,
cū impense sit amara. ¶ Ex *Auic.*
calfacit ordine tertio, & siccatur
secundo.

V I R E S.

Radix datur vtiliter drachmarū
duarum pondere cum vino,
pipere, & Ruta à serpente de-
morsis. Eiusdem succi drach-
ma, laterum dolore affectis,

è sublimi deturbatis, ruptis, & conuulsis prodest: Epaticis, & stomachicis ex aqua
pota subuenit. Radix collyrij modo subdita partus eiicit. Imposita, vt Lycium,
vulneraria est, & ad cuniculosa vlcera vtilis. Id quod etiam facit succus. Radix viti
liginem abstergit. Aqua è radicibus distillata febres ab infarctu prouenientes, mi-
rificè pellit. ventris tineas necat, maculas qualescunque in facie delet.

GENTIANA minor, Græcis, Γεντιανή μικρά, sine σαπρόπιτος.] Italis, Gentiana minore.] Officinis, Cruciata.] Germ. Crenutz vurtz, Speren Stich, seu Madelgeer.

FORMA.

Matt. Caule exit rotundo, geniculato, dodrantali, ac etiā maiore, in cacumine rufescente. folia in caule prodeunt è geniculorum alis bina, paribus interuallis distincta, oblōga, subpinguia, vulgaris saponariæ æmula, superioribusq; gentianę foliis similia. Flores, qui purpureo sunt colore, summo caule in orbem exeunt. Radix illi alba, longa, locis pluribus in crucis modū secta, amaro admodum gustu.

LOCVS.

Nascitur secus itinera in montibus & locis non cultis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Radix præstat contra pesti-
lentię contagia in antidotis addita. Eaque omnia potest, quæ Gen-
tiana maior.

GENTIANA MINOR.



GENTIANA minima, Italis, Gentianella, & Pettimborsa.

Subian die Gellins.

GENTIANA MINIMA.



FORMA.

Radicibus, prouenit numerosis, tenuibus, albicantibus, per quam amaris. cauliculis lentis, humi accubantibus. floribus ex cæruleo purpurascētibus: minoris Gentianæ similibus, per inde ac foliis.

LOCVS.

Nascitur in collibus, locis incultis, & in campis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Parum viribus à Gentiana differt. Contusa radix, & vètri adhibita, teretes tineas necat. Exulceratas strumas sanat radicū siccarū puluis inspersus: Cū melle autem illitus,

cutis vitia quęcunque, & maculas abstergit.

ARISTOLOCHIA, Græcis, ἀριστολόχια.] Arabibus, Zeraund, Masmo-
 cra, seu Zaraned.] Germanis, Osterlucei.] Hispanis, Astronomia.]
 Gallis, Sarrafine, siue Aristologie. *vīd. globosus*

ARISTOLOCHIA.

G E N E R A .

Trium est generum Rotunda quæ
 περιλυσ, longa, quæ μακρά, & Ter-
 tia, quæ χλωμαίτης dicitur.

F O R M A R O T V N D Æ .

DIOSC.

Rotunda, quæ fœminæ vocatur, fo-
 liis crescit hederaceis, præstanti
 odore, cum acrimonia quadam,
 mollibus subrotundis: multis ab
 vna radice germinibus, prælo-
 gis-
 que palmitibus. ¶ Floribus subal-
 bicantibus, oblongis, ex paruo ca-
 pitulo in auriculæ modum desin-
 entibus, graueolentibusq; , co-
 lore intus ex atro purpurascente,
 fructu viridi, rotundo, iuglandis
 magnitudine: Radice rotunda, tu-
 berosa, mali quâtitate, vegeta, pô-
 derosa, buxco intus colore, graui
 autem, & amaro sapore.

Matt.

L O C V S .

Nascitur in campestribus, in pratis.
 & in Apulia Monte Gargano.

Q V A L I T A T E S .

Gal. 6.
simp. me.

Omnium generum subtilissima est
 rotunda, & ad omnia efficacior.
 Itaque in quibus crassum humo-
 rem validius extenuare oportet,
 illic vsus est rotunda. ¶ Excalfa-
 cit ordine tertio inchoante, & sic-
 cat secundo.

Mesue.

V I R E S .

DIOSC.

Rotundæ omnibus venenis resistit,
 & venenosorum animalium mor-
 sibus: eadem cum vino, pipere
 & myrrha pota drachmæ ponde-
 re menses, secundas, parius &
 cætera vulnarum onera eiicit:
 idem quoque subdita facit: singul-
 tibus, inspiriis, horroribus, lateri-
 ſu doloribus, lienosis ac conuulsis

Gal. 6.
simp. me.
Mesue

ex aqua pota singulariter auxiliatur. Aculeos, & spicula extrahit, ossiū squamas illitu adimit,
 vlcera putrida exest, sordida expurgat, cana que cum iride, & melle replet: gingiuas, & dentes ex-
 tergit. ¶ Dolores ab infarctu, aut crassitie crudorum humorum, flatuumq; exortos curat: præ-
 stat & ad asthmaticos, eomitiales, podagricosq; . ¶ Radix drachmæ pondere pota, pruritum
 delicit, quare humide iussu, & asthmatici etiam antiquo non solum hausto, sed iussu prodest:
 Ad hoc. n. parantur ex ea pastilli hoc modo. Sumuntur aristolochiæ rotundæ, auripigmenti
 eiusq; partes æquales, & excipiuntur oui vitello, & formantur inde pastilli. E quibus vnus in-
 cenditur. Et fumus per infundibulum per os sumitur.

C E N S V R A .

Errant, qui maiorem Fumariam Aristolochiæ rotundæ vice in vsum trahunt.



ARISTOLOCHIA longa, Græcis, ἀριστολοχία σπογγύλις.] Italis, *Aristologia longa*.

Οφρυλινίη, λάνγη βολιωνίη.

ARISTOLOCHIA LONGA.



FORMA.

Longa, quæ mascula & dactylitis appellatur, folia mittit rotundæ latiora, longioraq; caulibus tenuibus, sæquido drantalibus: Floribus, vt in rotunda auricularem formā referentibus. aliquanto tamen maioribus. è quibus fructus enascuntur virides piri similitudinem referentes: in quibus semen: Radice nititur digiti crassitudine, dodrantis longitudine: buxæo intus colore, & amaro gustu.

LOCVS.

Vera provenit in Italia: sed tantum in Apulia & Calabria.

QUALITATES.

Minus tenuitatis obtinet, quàm rotunda, sed nec ipsa inefficax est, verùm abstergendi, vtque excalfaciendi vim possidet, minus quidem, quàm rotunda abstergit, & digerit, sed nō minus calefacit, imo forsā plus quoque. Itaque in quibus vñus est modicæ absterfionis commodior est longa, nempe in carniū exulcerationibus, & fomentationibus vteri. At in quibus crassum humore validius extenuare oportet, illic rotundæ vñus esse debet.

VIRES.

Ad ea omnia præstat, ad quæ rotunda, peculiariter autem aduersus anguium venenosum morsus, & venena, tum ex vino drachmæ pondere pota, tum quoque exterius illita. Menses, partus, & secundas eiicit, pota cum pipere, & myrrha. Id quod etiam præstat subdita.

DVLCIS radix, Græcis, Γλυκύρριζα.] Mauritanis, *Sus*.] Italis, *Regolitia*.] Officinis, *Liquiritia*.] Germanis, *Leckritz*, *sive Suezbultz*.] Hispanis, *Regaliza*] Gallis, *Reclisse*, *sive Regalisse*, *seu Heculisse*.

DVLCIS RADIX.

F O R M A .

DIOSC. Sarculis fruticat bicubitalibus: foliis lentisci, densis, pinguibus, ac gummosis: floribus hyacinthinis: fructu platani ferè simili, asperiore tamen, qui siliquas lètium modo habet, easq; fulvas & parvas. Radicibus est longis, sarmentosis quæ, buxæo colore, gustu dulci ac subacerbo.

L O C V S .


Matt. Nascitur sponte in monte Gargano Apuliæ, ac etiam in Germania in agro Pambergenfi, & feritur in hortis, & viridariis.

Q U A L I T A T E S .

Gal. 6. *simp. me.* Familiaris est radicis natura nostræ temperaturæ, sed cū adstrictio quædam adiuncta sit, vniuersum eius temperamentum quantum ex caliditate, & adstrictione est, tepidæ potissimum caliditatis fuerit, quàm proximè accedens ad temperamentū. Abstergit, mūdat, læuigat, mulcetque humorum acrimoniam.

V I R E S .

DIOSC. Radicis succus ī arteriæ scabritia efficax est, si linguæ subditus eliquescat: æstuanti stomacho, iocinori, thoraci quæ conuenit. Sanat vesicæ scabiem, & renum dolores, cum passō potus. Idem sitim sedat, vulnera conglutinat illitus. Eiusdem farina pterygiis vtiliter adhibetur. Ardoribus vrinæ mirificè auxiliatur. Mansa radix, præsertim quæ recenter effossa, non solum sitim sedat, sed etiam famem, seruatque vires diebus pluribus. Idem præstat concretus succus in ore contentus. Pectus, & pulmones iuuat, quare datur vtiliter suspensio, phthisicis, pleuriticis, & tussientibus.



CENTAVRIVM magnum, Græcis, Κενταύριον μέγα.] Aphris, Chantaurion kibir, seu Sacurion habre.] Italis, Centaurea maggiore.] Germanis, Reupontic.] Hispanis, Ruipontic.] Gallis, Rhepontico.

CENTAVRIVM MAGNUM.

FORMA.

Folia promit iuglandis, oblonga, viridi brassicarum colore, in ambitu serrata. Caulē ceu rumicis bicubitalē tricubitalēve, multis ab radice adnatis: in quibus capita sunt oblonga, papaveris magnitudine, Cnici figura: è quibus flos exit caeruleus, & semen Cnico simile, papposa lanugine circumstante. Radix est illi crassa, ponderosa, solida, tripedalis, rubeo succo pregnas, cum adstrictione aliqua, & dulcedine acris, & rufescens.

LOCVS.

Plurimum prouenit, idque præstans in Gargano Apulię mōte, quin etiam in Monte Baldo in Veronensi agro, ac etiā in aliis non nullis Italię mōtibus, sed Apulo longè infirmius.

Matt.

QUALITATES.

Radix sicut gustu cōtrarias qualitates, ita in vsu contrarios effectus demonstrat. Gustu itaque acris, simulque adstringens apparet, cum leuicula quadā dulce line. Lenit, trahit, aperit, roborat, adstringit, prouocat, vulnera glutinat.

Gale. 7.
simp. me.

VIRES.

Radix medetur ruptis, conuulsis, pleuriticis, ægre spirantibus, diurnę tussi, sanguinē-

Diosc.

que expuētibus duarum drachmarum pondere in aqua pota, si febris sit: sin autem, in vino. Præstat & ad tormina, & vteri dolore: subdita menses, & partus extrahit. Tusa recens, aut arida ante madefacta vulnera glutinat & coniungit. Carnes in olis coalescunt si tusa simul decoquatur. Datur vtiliter hydropicis Ictericis & Iecinorosis, tum vino macerata, tum in puluerem pota: Eiusdem succus vnciæ pondere haustus, ac etiam vulnere illitus, auxiliatur à serpente demorsis.

Matt.

CENSURA.

Qui putant Centaurij magni radicem legitimum esse Rhaponticum, magno in errore versantur.



CENTAVRIVM minus, Græcis, Κενταύριον μικρόν.] Arabibus, Chantaurion sege, & segir, seu katarion sages.] Italis, Centaurea minore.] Hetruscis, Biondella.] Germanis, Taufent gladen kraut, Fieber kraut, Erdt gall, siue Biber kraut.] Hispanis, Fel de tierra.] Gallis, Repeyeret, siue Centaure poulet .

CENTAVRIVM MINVS.

FORMA.

Diosc. Herba est hyperico, aut Origano similis, caule anguloso, palmū excedente: floribus in umbellę ferē modum comātibus, è puniceo in purpuram vergentibus, foliis oblongis ac parvis: semine tritico simili: radice pusilla læui, & superuacua .

Matt.

LOCVS.

Nascitur in pratis, pascuis, & campestribus.

QUALITATES.

Gale 7.
simp. me. Radix prorsus inefficax est, sed ramuli eius, & potissimū folia, & flores, vtilissima sunt. Vincit in eis qualitas amara, paululum habens adstrictionis, atque ob huiusmodi temperamentum, admodum exiccatorium est medicamen, expers mordacitatis.

VIRES.

Diosc. Herba recens tusa vulnera glutinat, vetera vlcera purgat, & cicatrice obducit: bilem, crassosque humores per aluum ducit, si decocta deuoretur. Ius decti cōuenientissimè ischiadicis infunditur. Succus cum melle mistus caliginem oculorum purgat. In vellere subditus, menses, & partus extrahit, haustus verò neruorū vitiis medetur. Datur foliorum,


Matt.

& florum decoctum vtiliter potandum tertianariis, quòd bilem per inferna deiiciat. Idem, pariterque succus iocinoris, ac lienis, obstructions, & duritias tollit: alui tineas pellit, cum potus ex melle drachmæ pondere, tum umbilico illitus. Herba, comæque decoctum varos, alphas, lentigines, ac cæteras cutis infectiones exterit. Instillatur succus vermiculosis auribus, quin etiam illinitur contra papulas, & manantia capitis vlcera.



CHAMELEON albus, Græcis, Καμαιλέον λευκός.] Mauritanis, Chameleon lente, seu Chamalium.] Italis, Carlina, & Chameleone bianco.] Hispanis, Cardo pinto.] Gallis, Carline, siue Chameleon blanc.

CHAMELEON ALBUS.



F O R M A.

Folia habet sylibo, aut *DIOSC.* scolymo similia, asperiora tamen, acutiora, ac nigro Chameleone validiora. Caulem non promit, verum ex medio spinas Echini marini, aut Cinaræ modo erigit. Flores emittit purpureos veluti papparum lanugines: semen cnico simile: radicē in lētis collibus, crassam, in mōtosis vero graciliorem, in profundo albam, aliquatenus odoratam, dulcē, & odore graui.

L O C V S.

Nascitur in collibus cū in lētis, tum in montosis locis, quin etiam in incultis arido solo.

Matt.

Q U A L I T A T E S.

Excalfacit ordine secundo absoluto, siccatur ve-

Gale. 8. simp. me.

rò tertio:

V I R E S.

Pota radix acetabuli mensura latis interaneorum tineas pellit. Hydro-
pici datur commodissime drachmæ pondere ex vino albo. Eiusdē
decoctum potum vrinæ difficultatibus subuenit. Hausta in vino ser-
pentium venenis resistit. Enecat tamen canes, sues, & mures. § Vul-
gus radicem magnificat contra pestilentiae contagia, si quotidie
drachma deuoretur.

DIOSC. Matt.

CHAMAELEON niger, Græcis, Καμαλέον μέλας.] Arabibus, *Chamæleon melamos.*] Italis, *Chameleone nero.*] Germanis, *Eber vurtz.*] Hispanis, *Cardo pinto.*] Gallis, *Cardonette.*

CHAMAELEON NIGER

F O R M A.

prosc. Foliis exit scolymo minoribus, tenuioribus, & rubro colore distinctis, caule dodrātali, digitali crassitudine, subrubro, & in umbella flores spinosos, tenues, hyacintino colore, versicoloresvè. Radice crassa, nigra, densa, interdum exesa: quæ dissecta flavescit, & comman-
ducata mordet.

L O C V S.


Idem. Prouenit in Campestribus, & in Maritimis, siccis, & cliuosis locis.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 8. simp. me. Radix lethale quiddam obtinet, detergit, digerit, & emollit. siccat ordine tertio, & excalfacit secundo absoluto.

V I R E S.

Trita radix cum chalcanti exiguo, & axungia scabiem abigit: cocta in aceto, addito sulphure, & bitumine impetigines, vitilignesq; sanat. Decoctum in ore detentum, dentium dolorem mitigat, phagedænas tetraq; vlcera illitu sanat.



CHAMAELEON NIGER ALTER.

Chamaeleon niger alter

Nō desunt qui hanc plā *Matt.*
 tam legitimum nigrū
 Chamæleonē esse con-
 tendunt, verūm cūm
 plures in ea (quantū
 video) desiderētur no-
 tæ, ego quidem, eorū
 sententię haud ita fa-
 cilè subscribam.

LABRUM Veneris, Græcis, Δίψανος.] Aphris, Dibsacos.] Italis, Cardo da panni, & Dissaco.] Germanis, *Kartendistel*.] Hispanis, Cardencha, seu Cardo penteador.] Gallis, Cardon, & Carder.

G E N E R A.

Matt. Duum est generum. Satiuum, & sylvestre.

F O R M A.

Diosc. Satiuum caulem habet altum, spinis horridū, foliis lactucæ, spinosis, binis genicula singula cōplectētibz prælongis, bullisq; quibusdā refertis, ipsisq; pariter aculeatis, concauo alarum sinu è foliorū cōnexu, in quo imber, aut ros asseruetur. In cacumine caulium singula furculis capitula insunt oblonga, echinata spinis, quæ arefacta candida spectantur. dissectaq; medullatenus vermiculos ostendunt.

L O C V S.

Matt. Seruntur in campis ab Italis multis in locis ad lanificia. quin etiam & spontè nascuntur, nōnullis in regionibus.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 6. Radix exiccat ordine secūdo, atq; non nihil abstergit.

simp. me.

Tusa radix & vino decocta, vsq; dū sit ceræ crassitudo, sedis rimas & sinus curat: sed enea pyxide recōdenda pēsilibz verrucis, & formicātibz utiliter adhibetur. Capitulorum vermiculi in folliculo collo suspēsi, produnt quartanis febribz remedio esse. Expetūtur piscatoribz, q̄ iis hamis impositis, pisces hac esca mirū in modū alliciant.

LABRUM VENERIS.



V I R E S.

LABRVM Veneris alterum iisdem appellatur nominibus, quibus primum appellari diximus. *Wobrichartus, Hieronymus*

LABRVM VENERIS ALTERVM.

F O R M A .


Facie à priori parum admodū differt, syluestrius tamen est, & spinis longe horridius. Echinata capitula setis quoq; cōpluribus scatēt, aculeis non adeo firmis, atque aduncis, vt in altero genere. *Mate.*

L O C V S .

Nascitur sponte in campis, sribus, in agrorum, & scrobium aggeribus, secus itinera, & propè sepes. *Idem*

Q U A L I T A T E S ,
E T V I R E S .

Non differt suis omnibus in facultatibus ab altero. *Idem*



Matt. VIRGA pastoris, Italis, *Virga di pastore*, & *dissaco minore*.
Ger. Cynanchum pub.

VIRGA PASTORIS.

F O R M A.

Idem. Folii caule echinatis capitulis, ac ceteris suis partibus Veneris labrū æmulatur, sed omnibus gracilioribus minorib⁹, & infirmioribus capitulis adeo parvis ut oliuę magnitudinē vix æquēt, tenuibus capillamentis refertis.

L O C V S.

Idem. Provenit umbrosis, & virginosis locis.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem. Non crediderim ego hanc plantam à Veneris labro admodum distare, imbecillioris tamen esse facultatis haud negaverim.



SPINA alba Græcis, ἀκανθα λευκή.] Arabib. *Bedeguar.*] Ita. *Spina bianca.*

SPINA ALBA.

FORMA.

Folia fert albi Chamæleo- Diosc.
nis, angustiora tamen,
candidiora, aliquātum
hispida, & aculeata, cau-
lem bicubitalem, & ma-
iorem, pollicari, aut am-
pliore crassitudine, al-
bicantem, intus cauū.
In cacumine capitulū
ineſt ſpinoſum, echini
marini emulum, ſed mi-
nus & oblongū: flores
purpurei, ex quibus ſe-
mē gignitur Cnici mo-
do, ſed rotundius.

LOCVS.

Nascitur in montibus, & *Idem*
ſyluoſis.

QUALITATES.

Radix deſiccatoria eſt, & *Gale. 6.*
modicè adſtringens: ſe- *ſimp. me.*
men verò tenuis eſſen-
tiæ, & calidæ facultatis
habetur.

VIRES.

Pota radix celiacis, ſtomachicis, & iis, qui cruenta extuſſiūt, efficax eſt: Diosc.
vrinam cit: tumoribus illinitur: Decoctum eius in ore detentum,
& in collutionibus adhibitum, dentium dolores mulcet. Epotum
ſemen conuulſis infantibus, & à ſerpente demorſis auxiliatur.

CARDVVS, Græcè, Σκόλιμος.] Arabibus, Raxos, Harxos, siue sacolomas.] Italis, Cardo, Carciofo, & Archichiocco.] Germ. Strobildorn.] Hisp. Cardo de comer, seu Caráos.] Gallis, Artechault, siue Carciophe.

CARDVVS NON ACULEATVS.

GENERA.

Aut. Plura habentur genera. sed duū tantū hic meminisse sat fuerit, nēpe satiui & spontē nascētis. satiui duo sunt genera: alterum aculeatum, & alterum sine aculeis.

FORMA.

Idem. Qui aculeis caret, folia promit grādia per ambitū laciniata, auersa parte subalbicātia numerosaūque: caulē edit lōgū, foliosum, capite echinato, sine aculeis tamen. Et quadante-nus pini cono simile.

LOCVS.

Idem. Seritur passim in hortis, & viridariis.

QUALITATES.

Gal. 8. Prop. me. Excalfacit ordine secūdo cōpleto, aut tertio incipiente, & exiccat secundo.

VIREs.

Diosc. Radix contusa, & illita, cū alarū graucolentiā, tū corporis totius emēdat. Eadē decocta in vino bibita copiosam, foetidāq; vrinā ducit. Herba cū recens tenerescit, in olera asparagi modo trāsīt. ¶ Melancholicū succū gignit carduus pro obsonio sumptus. ¶ Nō solū foliorū carinas māgonio elaboratas, albicantes tenerasq; sed etiā caules vorāt Itali cū sale, & pipere secūdis mēsis, sed fructus quoq; tū crudos tū iusculis incoctos.

Gal. li. 2. de alimē. fac.



CARDVVS aculeatus, Græcis, Σκόλιμος ἀκανθώδης.] Italis, *Cardo*, &
Carciofo spinoso. ὀπίθην δὲ παρὰ τὴν ὀρθοῦσαν.

CARDVVS ACULEATUS.

FORMA.

Folia gerit alterius magis *Idem*
 diuisa, magisque laci-
 niata, tenuibus circū-
 data spinis : caulem
 quoque alteri similē,
 striatum subalbican-
 tē in cuius summitate
 echinatum, aculeatūq;
 extuberat caput, flo-
 re hyacinthino: semi-
 ne Cnici minore. Ra-
 di ce nititur crassa, fir-
 ma, non insuaui.

LOCVS.

Colitur in hortis ad men-
 sarum bellaria. *Idem*

VIRES.

Idem præstare potest, *Idem*
 quod alter.



POTERIVM, Græcis, Ποτέριον.] Italis, Poterio.

F O R M A.

Dioc. Largè fruticat, cortice obductum tenui, spinis horridum, lanugine spissa, ramulis longis, tenuibus, tragacanthæ proximis, foliis parvis, rotundis, flore exiguo, cædidi coloris, semine superuacuo, sed gustu acuto, & odorato. Radices mittit binum, ternumve cubitorû, neruosas, & firmas, quæ proximè terram incisæ, succû fundunt gummi similè.

L O C V S.

Idem Nascitur in aquosis, & collibus.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 8. Desiccandi absq; morfu
fimp. me. facultatem possidet, adeo, vt & neruos incisos glutinare credatur. Radices eius potissimum sunt eiusmodi.



V I R E S.

Radices tusæ præcisis neruis, & vulneribus glutinandis illinuntur. Decoctum quoque earum, neruorum affectibus prodest.

ACANTHIVM, Gręcis, ἀκάνθιον.] Italis, *Acanthio*.

ACANTHIVM.

FORMA.


Planta est albę spinę simi- Diosc.
lis, foliis extremo am-
bitu aculeatis, & ara-
neosa lanugine obdu-
ctis, ex qua collecta, &
neta telas bomicinis
similes texunt.

LOCVS.

Nascitur in montibus, & *Matt.*
locis incultis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Folia, & radices ad reme- Diosc.
dia opistotoni vsurpan-
tur in potu.



ACANTHVS; Græcis, ἀκανθος .] Italis, *Acantho*, siue *Branca Orsma*.] Germanis, *Beren Klauu*.] Hispanis, *Yerua giguante*, & *Branqua Urstina*.] Gallis, *Branze Orsine* .

F O R M A .

A C A N T H V S .

Diosc. Folia habet multò lactuca-
ceis latiora, & lōgiora,
erucæ diuisura, nigricā-
tia, pingua, lēuia, caulē
bicubitalē, digitali cras-
situdine, læuē, ppe ver-
ticē ex interuallis circū-
datum foliolis, ceu nu-
camenta quædam oblō-
ga referentibus, spino-
sis, è quibus flos prodit
albus; semen oblongū,
luteū. Caput thyrsi spe-
cie. Radicibus nititur
longis, mucosis, rubris
& glutinosis .

L O C V S .

Idem. Nascitur in hortis, petro-
sis, & riguis .

Q U A L I T A T E S .

Gal. 6. Folia quidē mediocriter
simp. me. digerentē facultatē ob-
tinent. At radix exicca-
toria est, & leuit er inco-
soria, & tenuiū partiū .

V I R E S .

Radices vstis igni, & luxa-
tis artubus illitę subue-
niunt: potę vrinā cient,
sed aluum cohibent: ruptis, conuulsis, tabidis mirē profunt .

A P P E N D I X .

Tam, & si acanthus, qui nostris in hortis seritur folia spinosa non ha-
beat, non tamen ob id sparium id esse fuerit credendum . Siqui-
dem (vt Plinius est autor lib. & cap. 22.) duo Acanthi habentur ge-
nera, alterum crispum, aculeatumque, alterum læue .



ANONIS, siue Ononis, Græcis, ὄνως, siue ἄνως.] Officinis, & Herbariis, *Resta bonis*.] Italis, *Ononide*, & *Bonaga*.] German. *Stallkraut*, seu *Hauhechel*.] Hispan. *Gatillos*, & *Gatthinos*.] Gallis, *Bugrantes*, siue *Burgrundes*.

ANONIS, SIVE ONONIS.



FORMA.

Ramos habet fruticosos, Diosc.
dodrantes, aut maiores, frequentibus geniculis cinctos, cauis alarum multis: foliis lenticulæ, tenuibus, pusillis: ad prætensi loti folia accedentibus, subhirsutis, non iniucundè olentibus. Rami acutioribus spinis, & veluti spiculis firmioribus, horrent. Radicem mittit candidam. ¶ Est *Matt.*
& genus aculeis vacans, flore melino, quâquam in aculeata purpureus flos perpetuo spectetur.

LOCVS.

Nascitur plurima in pratis, Matt.
quin etiam in incultis locis.

QUALITATES.

Radix excalfacit tertio quadantenus ordine: cortex Gale 7.
simp. me.
eius maximè est utilis habens quippiam & absterforium, & incisoriū, proinde non tantum vri-

nas prouocat, sed & lapides confringit.

VIRES.

Radicis cortex ex vino potus, vrinas ciet, calculos cōminuit, & vlcerū Diosc.
margines erodit. Radicis ex posca decoctum collutione dentium dolores mulcet. Decoctū eius potū hæmorrhoidas sanare creditur.

CARDVVS lacteus. Italis, *Scardacio bianco, seu Cardo del latte.*] Germanorum Officinis, *Carduus diuę Marię, & Carduus lactarius.*] Germanis vero ipsis, *Unser frauen distel.*] Gallis, *Cardon de nostre Dame.*

F O R M A.

CARDVVS LACTEVS.

Matt. Folia fundit magna, pingua per ambitum lacinata, ac tenuibus acutisque aculeis circumquaque stipata: albicantibus vbique maculis: caulem profert bicubitalem, & sæpe maiore; spinis horrentē, brachiatū. Echinatis, aculeatisque in summitate capitibus, qui æstate media florent cinaræ modo. Floribus purpureis capillaceis. Semine Cnici minore, papposa lanugine obducta. Radice nititur, valida alte descendente, amaro sapore.

L O C V S.

Matt. Nascitur sponte in campestribus, incultis locis, secus itinera, & agrorum marginibus.

Q U A L I T A T E S.

Idem. Radix excalfacit, abstergit, aperit, prouocat, & attenuat. V I R E S.

Radicis decoctum datur

utiliter potandum ad iocinoris, & vasorum infarctus, & remorantes vrinas, quare confert hydropicis, ictericis, ac nephriticis. Idem menses elicit, tum potum, tum in desessionibus additum: Radicum siccarum puluis: propinatur ex ptissana cum fœniculi semine, & longo pipere ad lac augendum. Stillatitia foliorum aqua vtuntur, quidam ad lateris dolorem, valentiusque id præstare aiunt, si cum feminis drachma propinetur.



TRAGACANTHA, Græcis, Τράγανθα.] Italis, *Tragacantha*.] Arabibus, *Chitira*, *Chatech*, seu *Alchatad*.] Germ. *Dragant*.] Hisp. *Alquetira*.

TRAGACANTHA.



FORMA.

Radice nititur lata, & sum DIOSC.
mo cespite lignosa, unde furculos humiles, frequentes, robustos latissimè fundit, in quib⁹ minuta folia, multa, & tenuia exoriuntur. quæ sub se spinas albas, rectas, & firmas occulunt. Est etiam Tragacantha lachryma, quæ vulnerata radice manat.

LOCVS.

Nascitur in Apulia in mō Matt.
te Gargano: ac etiam in aliis longinquis meridianisq; regionibus, unde ad nos comportatur lachryma.

QUALITATES.

Tragacantę lachryma simi Gale. 6.
lem gūmi vim obtinet simp. me.
emplasticā quādam, quę humorum acrimoniam obtundit, & sanè similiter illi desiccatur.

VIRES.

Lachryma cutis spiracula obstruit: additur in oculorum medicamentis: præstat & contra tussim, exasperatas fauces, retusas voces, & cæteras destillationes, cum melle in delinctu. subdita quoque linguę liquefcit: in passo madefacta drachmę pondere bibitur contra renū dolores, & vesicæ rosiones, misto cornu cerui vsto, & eloto, aut scissi aluminis momento: quæ tosta fuerit dysentericis auxiliatur ex cydoniorum vino hausta. In summa vbi læuigare, obtundere, & reprimere opus est, præstantissimum semper fuerit medicamentum.

ERYNGIVM, Gręcis, ἑρύγγιον.] Italis, *fringo.*] German. *Brachon distel,*
sive Manstreu.] Hispanis, *Cardo corredor.*] Gallis, *Paracault.*

ERYNGIVM.

G E N E R A.

Matt. Tria eius habentur genera. Montanum, siue campestre. Marinum & planum.

F O R M A.

Diosc. Mōtanum folia fert Cardui, lata, per ambitum laciniata, aspera, gustu aromatica, sed vbi adoleuit circa complures caulium eminentias in spinas aculeatur in quorum summitatibus globosa capitula durarū, acutissimarumque spinarum in ambitu stellarim circumuallatur; quorum colos alias virides, alias albus interdum caruleus inuenitur. Radix oblonga, lata, foris nigra, interne candida, pollicis crassitudine, & odorata.

L O C V S.

Diosc. Nascitur in asperis, campestribus: & in fabulosis pratis.
Matt.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 7. Caliditate quidem aut parum aut nihil, quę temperata sunt superat, siccitatem vero in tenui essentia consistētem, non paruam obtinet.
sim. med.

V I R E S.

Diosc. Pota radix mēses, & vrinas pellit, tormina inflationesq; discutit, contra iocinoris vitia, serpentium morsus, & hausta venena, vino pota pdest. Bibitur aduersus plurima cū seminis pastinacę drachma. Appesa illitave tubercula discutere prodit. Pota cum hydromelite opisthotonicis, & comitialibus medetur. Eiusdem decoctum expedit iocinoris & lienis infarctus. valet aduersus rubetas, toxica, & aconica ex rararum comestibilium iure pota, vel ex auferino vbi rana non fuerit ad manus, valet & contra cordis aestus. Pręstat quoque contra stranguriam, obstrusos renes, & vuluarum pręclusiones. Illica ex melle infixa corpori extrahit. Presumpta cropulam arcet, & aluum sistit: Fit è tenellis Eryngi, foliis stillatitia aqua. iis quā maximē vtilis, qui morbi Gallici vlceribus laborant si diutius quotidie ea vtantur in potu.

C E N S V R A.

Magno admodum tenentur errore, qui Eryngium Mauritanorum secacul esse contendunt.



ERYNGIVM marinum. Italis, *fringio marino.*
Min. Em. d. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

ERYNGIVM MARINVM.



FORMA.

Folia edit alterius longè la- *Matt.*
 tiora, circinata, & in am
 bitu aculeata, & cæsis
 respersa colore. Caulem
 carnosiozem, crassiorē,
 atque striatum, capitulis
 cæruleis maioribusque.
 Radices habet prælongas,
 teneras, ac molles digi-
 tali crassitudine.

LOCVS.

Nascitur in maritimis non *Idem*
 longè à litoribus.

QUALITATES,
ET VIRES.

Radix minus siccatur quam
 altera, sed easdem possi-
 det vires.

ERYNGIVM planum, siue læue. Italis, *Iringo liscio*, & *Iringo senza spine*
Sili monstrosi.

ERYNGIVM PLANVM.

FORMA.

Matt. Foliis exit latis, oblongis, minimè laciniatis, in ambitu tamen serratis caulibus complurib⁹, ramosis: parvis in summitate capitulis, ipsiq; subasperis. Radice vegeta ceteris crassiore.

LOCVS.

Prouenit in Austria in Viennensi agro, campestribus locis.

QUALITATES,
ET VIRES.


Radix minus quàm cetera præscripta siccat, minusque ad omnia præstat.



ALÖE, Græcis, Αλόη.] Aphris, *Saber, Taber, siue Subar.*] Italis, *Alöe.*] Germa. *Alepatic, & Bitter Alöes.*] Hisp. *Hierua babosa.*] Gall. *Alöes.*

Alepatic Graui

ALÖE.



FORMA.

Foliis prouenit scille similibus, pin-
guibus, modicè latis, rotundis re-
trorsum pandis, quæ vtrinque ex
obliquo longioribus interuallis
friaur, & in mutilas spinas de-
finunt, caule antherico non dissi-
mili, flore albo, ac purpureo, fru-
ctu hastula regiæ cognato: Tota
planta grauius olet, & gustu est
amarissima. Radice vnica ceu pa-
lo, in terram depacta.

DIOSC.

LOCVS.

Plurima præpinguisq; in India gi-
gnitur. ex qua coactus succus af-
fertur. Nascitur, & in Asia, & A-
rabia in locis quibusdã mari-
timis & Insulis. vt in Andro.

DIOS

QUALITATES.

Est Alöe non simplicis naturæ, sed
vt indicio est gustus, adstringit si-
mul, & amara est: adstringit qui-
dem mediocriter, sed vehemen-
ter est amara: subducit & aluû:
Exiecat quoq; ordine tertio, ex-
calfacit verò aut primo intenso,
aut secundo exoluto. Repellit,
digerit, extergit.

Gale. 6.
simp. me.

VIRE.

Sanguinis reiectiones sistit: regium
morbum purgat drachmæ pon-
dere ex aqua frigida. Deuorata cû
resina, vel melle cocto, aluû sol-
uit. cæteris medicamentis admi-
sta præstat vt minus stomachum
lædant: sicca & inspersa vulnera
glutinat, & vlcera ad cicatricem
perducit cohibetq; Eadem pe-
culiariter pudëdorum vlcibus
medetur. Condylomata, & sedis
rimas ex palio sanat: hæmorrhoi-

DIOSC.

dum abundantiam & sanguinis fluxiones sistit. Priuatim scabras lippitudines, pruriginisq; in
oculorum angulis perinulcet: temporibus, & fronti ex aceto, & rosacco illita, capitis dolorem
sedât: cum vino autem capillum fluentem continet. Vtile stomacho est medicamentum, vt
si quid aliud. Insestissima est his, qui citra vitiatos humores, ex calida, siccaque intemperie
affliguntur: proximam ab his læsionem percipiunt, qui siccam intemperiem habent, etiam cum
frigidityate coniunctâ. Deicit alöe non modo bilem, sed pituitam ipsam: Quotidianus eius
vltus a mortiferis morbis tuetur: sensus omnes, intellectumq; acuit: Tecur ab infarctu purgat:
hæmorrhoidibus, ac cæteris sedis inflammationibus nocet (scilicet pota, nō tamen exterius ad-
mota) ex aceto & felle bubulo vmbilico, ventriq; illita, intestinorum animalia necat.

Gale 6.
simp. me.
& 8. de
com. me.
sec. locos.
Mitt.

ABSINTHIUM Græcis, ἀψίνθιον.] Mauritanis, *Absynthium*.] Italis, *Assenzo*, & *Assentio*.] Germanis, *Uermuot*.] Hispanis, *Assentios* siue *Alofna*.] Gallis, *Aluync*, siue *Absince*.

ABSINTHIUM.

G E N E R A.

Matt. Quatuor Absynthij nominantur genera: vulgare Ponticū, Marinum, siue Seriphium, & Santonicum: Ponticum tamē à vulgari non diuidit Dioscorides.

F O R M A V U L G A R I S.

Matt. Caulis extrimoso, foliis incanis, amaris, multipliciter sectis artemisiæ modo, floribus melinibus paruis, semine rotundo racematim dependente: radice diuulsa, duraque.

L O C V S.

Idem Prouenit ferè vbique: & seritur, & per se quoq; in hortis nascit.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 6. simp. me. Adstrictoriam, amaram, & acrē simul qualitatem possidet, excalfaciens pariter & extergēs, & roborans, & desiccans, ex acrimonia quoq; constat, quod maiori portione calidum sit magis, quàm frigidum. Itaq; calidum fuerit excessu primo, & siccum tertio. Atqui succus lōgè quam herba calidior est.

V I R E S.

Diosc. Bilem expurgat, vrinam cit, crapulam præsumptum arcet: cū fefeli, & Celtica nardo potū, inflationibus ventris, & stomachi doloribus auxiliatur: fastidia discutit & arquatos sanat, epoto quotidie eius diluto, aut decocto: Menses elicit tum haustum, tum ex melle suppositum. Bibitur

utiliter contra fungorum strangulationes ex aceto: ex vino sumptum aduersatur Ixiæ, cicutæ, muris aranei, & marini draconis venenis. illinitur ex melle ad fugilata, & oculorum caligines, quin etiam & ad purulentas aures. Admouetur iocinori præcordiisq; cum cerato ciprino, stomacho quoq; diuturna valetudine laboranti, cum rosaceo: aquæ intercutem cum ficis, loliacea farina. & aceto. subuenis & lienosis. Præstat ad ea omnia vinum, quod ex eo paratur. ¶ Contētam in vētre pituitam oblatum nihil adiuuat, nec eam, quæ in thorace, & pulmone continetur.

Gal.



ASSINTHIVM Ponticum, Græcis, Ἀψίνθιον πόντικον.] Italis, *Assen-*
zo Pontico. *Bonifera immunda.*

ABSINTHIVM PONTICVM.



FORMA.

Foliis, caulibus, floribus, *Matt.*
semine, ac cæteris suis
partibus; prouenit vul-
gari absinthio lōgè mi-
noribus, vt ex appicta
hic imagine constat.

LOCVS.

Nascitur plurimū in Pon *Idem*
to, vnde illi nomen :
quinetiam in Vngaria,
& Bohemia.

QUALITATES.

Quū duplex in omni ab- *Gal.l.ii*
sinthio facultas, & qua *cap. i 6.*
litas sit; vtique in Pon *Metho.*
tico adstringendi qua- *med.*
litas non parua est, in
reliquis omnibus ama-
ra quidem qualitas est
vehemētissima; adstri-
ctio verò, aut planè ob-
scura, aut prorsus nul-
la sentit. Proinde Pon-
ticum ad iocinoris, &
ventriculi inflāmatio-
nes eligi præstat. Id aut
est tū folio tū flore lon-
gè quā cætera absinthia

minore. Odor quoq; illi non modo non insuauis, verum etiam aro-
matū quid pferēs, ac reliquis oībus est fœdus, quare hęc fugere cōue-
niet, & Pontico semper uti.

VIRES.

Fit è recētibus florib⁹, & saccharo simul contusis Antidotū ad hydropē
pstatissimū, cuius lōgo vsu pplures sanatos vidimus. Parādi rō hęc est.
Sumito florū vnc. iij. Sacchari albi librā j. contundantur in mortario
diligenter. Et deinde pyxide vitrea recōdita insolentur per mensem.

ABSINTHIUM marinum, siue Scriphium. Græcis, Ἀψίνθιον θαλάσσιον.]
 Italis, *Ajzenzo marino.*] Aquileiensibus, *Santonio.*

Wunderlich von Venedig
 ABSINTHIUM MARINUM.

F O R M A.

Mett. Foliis exit, quæ ad terram
 sunt, vulgari absinthio
 similibus, sed quæ in cau-
 libus habetur, longè mi-
 noribus, caulibus graci-
 libus, minuto semine re-
 fertis, gustu amaro & o-
 dore graui.

L O C V S.

Idem Nascitur in maritimis.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 6. Specie, & gustu absinthio
sim. med. simile est.

V I R E S.

Diosc. Folia per se, aut cum oriza
 cocta interaneorum ani-
 malia, & teretes tineas
 adiecto melle enecant:
 aluum leuiter læuigant.
 Id quod cum lenticula
 decocta pariter præstât.
 Eius pabulo pecora ma-
 ximè pinguescant.



ABSINTHIUM seriphium Ægyptium. Italis, *Assenzo serifio d'Egitto.*

Egyptian vermouth.

ABSINTHIUM SERIPHIVM ÆGYPTIVM.



FORMA, ET LOCVS.

Pumila est planta, in Ægypto proueniens, foliis minutis abrotani fœminę ferè similibus: surculis compluribus gracilibus, breuibus, ac foliosis, minuto semine, gustu amaro; nō tamen vehementer.

Matt.

QUALITATES,
ET VIRES.

Iis omnibus præditum est facultatibus, quibus & Italicum.

Idem.

SEMEN sanctum. Italis, *Seme santo & semenzina.*

Wormseed

SEMEN SANCTVM.

FORMA.

Planta est admodum fruticosa, caulibus & ramis numerosis referta, semine minuto, oblongo, racematim prodeunte, amariuscule gustu, odoreque non insuavi.

LOCVS.

Affertur ex Alexandria Ægypti, ac aliis meridionalibus locis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Oblinitur passim saccharo à pharmacopæis. daturque utiliter infantibus & pueris ad intestinorum vermes.



ABROTONVM, Græcis, ἀβρότονον.] Mauritanis, *Catsum, Kesum, seu Gaifsum.*] Italis, *Abrotano.*] Germanis, *Stabnuertz, sine Scheszuert, sine Gertuertz.*] Hispanis, *Abrotono, & Hierua Lombriguera.*] Gallis, *Auron, & Garderobe.*

ABROTONVM MAS.



GENERA.

Duum est generum, alterū *Matt.*
mas, alterum fœmina.

FORMA MARIS.

Sarmentosa est planta, cauli *Diosc.*
bus gracilibus veluti ab- *Matt.*
sinthiū. Folia habet te-
nuia numerosa, longius-
culaque, odore graui sed
medicato: Flores mittit
exiguos. semen minutū,
rotundum copiosumq;,
ramulos ferè totos com-
prehendens.

LOCVS.

Nascitur sponte in collibus *Idem*
arido solo, ac etiā passim
in hortis colitur.

QUALITATES.

Calidum, & siccum est ordi- *Gal. 6.*
ne tertio. Digerendi etiā, *simp. me.*
ac incidendi vim quandā
habet, rarefaciēdi, & mor-
dendi: tenuium enim est
partium.

VIREs.

Semen crudum tritum, &
ex aqua feruefactum in
potu auxiliatur ortoph-
noicis, conuulsis, ruptis,

ischiadicis, vrinæ angustis, ac suppressis mensibus. Ex vino autem
potum exitialibus venenis, antidotum est. Horroribus ex oleo illini-
tur. Serpētes cū substratu tū nidore fugat: quin etiā ē eorū ictus po-
tū ex vino prodest: priuatim efficax est contra scorpionū & phalā-
giorū ictus: oculorū inflammationibus cū pane aut cotoneo cocto cō-
modè illinit. Tritū & cū hordeacea farina coctū, tubercula discutit.

VERONICA ita Germanorum Officinis vocata, Italis, *Veronica*.] Germanis, *Erenbreisz*, aut *Gundheyl*.

VERONICA.

G E N E R A.

Matt. Duum est generū : Mas, & fœmina.

F O R M A M A R I S.

Mas caule exit dodranta li, aut minore, rubescēte, lanuginosoque, foliis oblongis, humi ac cubātibus, nigricantibus, hirsutis, & in ambitu serratis : flores edit summis caulibus purpureos, & semē in siliqs loculi faciē referentibus. Radice nititur tenui, quæ in plures diuarcatur fibras.

L O C V S.

Nascitur locis incultis

Q U A L I T A T E S.

Idem— Cū gustu amara adstringensq; manifestè appareat, calidæ & siccæ facultatis omnino fuerit. V I R T U S.

Idem— Medetur cruētis vulneribus, quin etiā diuturnis vlcerib⁹. tumores præterea in vniversum

discutit, præcipueque quæ in ceruice oriuntur. Datur utiliter potā-
dus foliorum pulvis drachmæ pondere cū ad pestilentes febres,
tum ipsa pestilentia affectos cū theriacæ tribus obolis ex vino mera-
co; sed illico affectos sudare oportet. Datur eadem potāda ex sua ip-
sius stillatitia aqua contra tussim, & omnia pectoris, & pulmonum
vitia; quin etiam tabidis, & suppuratis : aperit quoque iocinoris,
& lienis obstructions : vterum, renes, & vesicam expurgat.



VERONICA fœmina, Italis, *Veronica fœmina*.] Germanis, *Erenbreisz*
Unqible.

VERONICA FOEMINA.



FORMA.

Caulem edit lanuginosum, folia rotundiora minime denticulata, subpinguia, flores ex luteo purpurascetes, semen orbiculatis vasculis conclusum: radicem maris similē.

LOCVS.

Nascitur in inculto solo
 & asperis tractibus.

QUALITATES,
ET VIRES.

Non differt à mari, sed
 ad omnia imbecillior
 habetur.

HYSSOPVM, Græcis, ἵσσωπος.] Arabibus, *Cyfe, seu Iabes.*] Italis, *Hissopo.*] Germanis, *Frichlyssop, seu Hester byssop.*] Hispanis, *Hissopo hierna.*] Gallis, *Hissope.*

HYSSOPVM.

GENERA.

Diosc. Duum est generum : Hortense, & Montanum.

FORMA.

Matt. Hortense frutex est surculis numerosis ex vna radice prodeuntibus, lignosis, sesquipedalibus, foliis in vniuerso caule oblongis duriusculis odoratis feruido, & amaro gustu : Flores edit spicatos in summis caulium partibus caruleo colore : Radicem multifidam ac lignosam. ¶ Montanum surculis foliis floribus, & cæteris in vniuersum partibus nihil ab hortensi differt, nisi quod hirsutius syluestriusque apparet, rudioribus foliis & asperioribus & gustu amarioribus, nec usque adeo acribus. mite scit tamen in hortos translatum, fitque hortensi per quam simillimum.

LOCVS.

Matt. Hortense seritur passim in hortis, & viridariis. Montanum sponte in montibus provenit.

QUALITATES.

Gal. 8. Desiccatur, & exsiccatur ordine tertio, sed & tenuium est partium. ¶ *Aperit, digerit, abstergit, incidit, subducit.*
Matt.

VIRES.

Decoctum eius cum ficis, melle, & ruta potum peripneumonicis, diuturna tussi laborantibus, suspiriosis, destillationibus, & ortophnoicis: ventris tineas enecat, cum ficis detritis viridibus deuoratum aluum subducit, sed vehementius addita iridis radice, cardamomo, aut irione: Crassum. n. humorem deiecit, & præsertim decoctum ex oxymelite, colorem in corpore fouet. Illinitur lienosis, & hydropicis cum sicu & nitro: cum feruenti aqua impositum sugillata discutit. Decoctum cum aceto dentium dolorem in collutione mulcet. ¶ Aduersatur serpentium moribus, cum sale & euonio admotum: Ex oleo illitum pediculos necat, & capitis pruriginem tollit: comitiales iuuat quouis modo sumptum. ¶ Discutit eius usus contumaces inflationes, cibi appetentiam inuitat, menses, & vrinas ciet, & febrium horrores excutit, visum acuit. Prestat hæc omnia quoque montanum etiam efficacius.

Matt.
Mesue



GRATIOLA, quibusdam Gratiadei. Italis, *Gratiola*.] Foroiuliensibus,
Stanca canallo.

G R A T I O L A .



F O R M A .

Planta est dodrantalis, cau *Matt.*
 libus quadrangularib⁹,
 foliis hyssopi paulò la-
 tioribus, ac lōgioribus:
 floribus in purpura al-
 bicantibus, amaro ad-
 modum gustu: quadā
 cū obscura adstrictione.

L O C V S .

Nascitur in pratis vligino *Idem*
 sis, & palustribus.

Q V A L I T A T E S .

Excalfacit, siccatur, incidit, *Idem*
 attenuat, aperit, deiecit,
 abstergit, vulnera glu-
 tinat.

V I R E S .

Aluum vehementer pur-
 gat, bilem pituitamque
 deiecit: vulnera celeri-
 ter sanat, si trita super-
 ponatur.

C E N S V R A .

Qui hanc plantam Mesuis Eupatorium esse contendunt, omnino cæ-
 cutiunt.

STECHAS, Græcis, Στόιχας.] Mauritanis, *Astochodos*, *Astuhorados*, siue *Astuchudes*.] Italis, *Stechade*, seu *Steca*.] Officinis, *Stichados*.] Germanis, *Stichas kraut*.] Hispanis, *Cantuesço*.] Gallis, *Stechados*.

STOECHAS.

FORMA.

Matt. Planta est Lauendulæ haud absimilis, foliis oblongis, crassis incanis, acervatim in vniuerso caule exeuntibus, furculis pluribus, ab vno caule fruticatis: lignosis, flores edit in spicatis oblongisque capitulis thymi modo, subcæruleis, in quibus semine oritur melissophylli non absimile. Radix est illi lignosa ac multifida.

LOCVS.

Diosc. Prouenit in stœcadibus insulis, & Massiliæ regione.

QUALITATES.

Gal. 8. simp. me. Stœchadis quidem qualitas amara est. Et mediocriter subadstringens. Cæterum temperies composita, nempe ex terrena essentia frigida exigua, unde sanè adstringit: & ex attenuata altera terrena copiosiore, à qua utique amara est: Ab utriusque verò conuenientiâ, & coitum, referat, extenuat, extergit, roboratque tum viscera omnia tum totius corporis habitum.

VIRES.

Diosc. Foliorum & capitulorum decoctum hyssopi modo ad pectoris vitia efficax est. Antidotis utiliter miscetur. Deiecit tū pituitam, tum atram bilem. Cerebrū, nervos, & sensuum

Matt.

meatus mundat, ac roborat. Datur utiliter contra qualescunque frigidos morbos. Itaque comitialibus conueniens fuerit auxilium, addita scilla, aut eius aceto. Balnea, fomenta, ac Lacnica, quæ ex ipsius decocto, aut vapore fiunt, oclusos narium meatus aperiunt, nervorū, & articulorum cruciatus leniunt, ac interna viscera frigido humore affecta roborant. Abstinentum tamen ab ea biliosis est, præsertim, si eorum ventriculus sit bile repletus.



ORIGANVM; Græcis, ὀρίγανος.] Mauritanis, *Fandenigi*, *sive Fundenigi*, *sive Foudenegi*.] Italis, *Origano*.] Germanis, *Valgemut*.] Hisp. *Oreganos*.] Gallis, *Origan*, seu *Mariolaine bastarde*.

rosary, fumbur not m

ORIGANVM.



GENERA.

Duo eius habentur genera Diosc. *ra*, *Heracleoticum*, & *Onitis*.

FORMA PRIMI.

Foliū habet hyssopo non Diosc. dissimile, umbellam autem non in rotæ speciē orbiculatam, sed veluti multifidam: semine in summis virgis haudquaquam denso, amara ci modo spicato.

LOCVS.

Prouenit in Creta, & Cypro: & aliis Ægei maris insulis. *Matt.*

QUALITATES.

Heracleoticum efficacius est *onitide*, omnes verò incidendi, extenuandi, calefaciendi facultatem possident, hacque tertio excessu, obtinent. *Gal. 8. simp. me.*

VIRES.

Decoctum cum vino potum demorsos à serpente sanat: Qui autem cicutam aut maconium

hauserunt, ii s ex panno: si verò gypsum, aut ephemerū, ex aceto mulso propinatur: ruptis, conuulsis, hydropicis cum ficu esui datur. Aridum acetabuli mensura potum, in aqua mulsa, atros humores per aluum extrahit, menses ciet & tussi cum melle delinctū medetur. ad pruriginē, psoram, regiumque morbum, decocti ius in balneis prodest: herba autem substratu serpentes fugat.

ORIGANVM onitis, Græcis, ὀρίγανος ὀνίτις.] Italis, Origano onite.
quoniam auctor prout dicitur origanum

ORIGANVM ONITIS.

FORMA.

DIOSC. Cádidiore est folio, & hyssopo similis: semen veluti coniunctos corymbos habet.

LOCVS.

Matt. Nascitur in Creta, & aliis nonnullis Ægei maris insulis.

QUALITATES,
ET VIRES.

DIOSC. Vis ei origani Heracleotici, sed ad omnia minus efficax.



ORIGANVM vulgare, Italis, *Origano nostrano.*] Germanis, *Vuelgemuot.* *See German,*

ORIGANVM VVLGARE.

FORMA.

Folia mittit amaraci maio *Matt.*
ra, subhirsutaq; , caules
complures pilosos, flo-
res in summitate purpu-
reos in umbellæ multi-
fidæ modū, radice sum-
ma tellure vagante.

LOCVS.

Nascitur incultō solo se- *Idem*
cus itinera, in collibus,
& apricis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Excalfacit quidem, quod *Idem*
gustu subacris sentiat,
& siccatur quoque simili-
ter, sed haud strenuè.
Aperit, digerit, incidit,
& resoluit, sed lōgè mi-
tius quàm præscripta o-
rigani genera.

CENSURA.

Hanc plantam Pseudo-
origanum magis appellādum censeo quàm sylvestre Origanum, vt
quidam credidere. Huic enim flores candidi sunt, non purpurei.

TRAGORIGANVM, Græcis, τραγορίγανος.] Italis, Tragorigano.

TRAGORIGANVM.

FORMA.

Diosc. Tenuis est frutex folio & ramulis sylvestri serpylllo similis, quanquam in latiori solo latioribus foliis inueniatur, atque glutinosis: Floribus in summis caulibus subpurpureis.

LOCVS.

Idem Prouenit copiosum in Cilicia, in Cieta, in Chio, Cooq; , & apud Smyrnas.

QUALITATES.

Idem Excalfacit, aperit, attenuat, vrinam ciet.

VIRES.

Idem Decoctum potum bilem eiicit. Bibitur ex aceto vtiliter lienosis, & ex vino contra ixiæ venena. Menses trahit peripneumonics, tussientibus, ex melle in eclegmate datur. Grata, ac mitis eius potio est: quare cibum fastidientibus & stomacho acida ructanti imbecilloq; præbetur: item si maritima iactatione nausea, & æstus præcordiorum excitetur. Tumores verò cum hordeacea farina illita discutit.



PVLEGIVM, Græcis, Τηλέκων.] Mauritanis, *Alnam*, *Alnegem*, seu *Alne-*
gen.] Italis, *Puleggio*.] Germanis, *Poley*.] Hispanis, *Poleo*.] Gallis,
Pulege, & *Poulier*.

PVLEGIVM.



FORMA.

Herba est humi repens, serpylli **Diosc.**
 modo : caulibus dodratalibus
 gracilibus, foliis amaraci amu-
 lis, paulò tamē maioribus ob-
 longioribusque : flores in toto
 caule ad summum vsque, per
 intervalla propè foliorum e-
 xortum, verticillatim enascun-
 tur, colore purpureo langue-
 scente. Radix illi gracilis, & ca-
 pillosa summo celsipite vagāte.

LOCVS.

Nascitur humectis, & vliginosis *Matt.*
 locis.

QUALITATES.

Cūm acre, & subamarum sit, val- *Gale. 6.*
 de tum excalfacit, tū extenuat. *simp. me.*
 Porro quod abundè excalfaci-
 at, magnum est signū, quòd
 illitum rubificat, & exulcerat
 quoque, si diutius toleretur.
 Quòd verò extenuet satis in-
 dicat, cum humida crassa, &
 lēta ex thorace & pulmone ex-
 creatu facilia reddat, mensesq;
 moueat.

VIRES.

Potum mēstrua, secundas, ac par-
 tus eiicit, pulmonis vitia ex
 melle, & aloe potum extrahit,
 & conuulsis auxiliatur : Nau-
 seas, stomachi erosiones ex po-
 sca permulcet : atram bilem per
 aluum exigit. Bibitur in vino
 vtilissimè cōtra serpentū mor-

sus, defectos animo recreat cum aceto naribus admotum. Arefacti cinis gingiuas cor-
 roborat. cum cerato varos extinguit. Lienosis cum sale vtiliter illinitur. Decoctū eius
 ablutas prurigines mitigat : conuersas vuluas corrigit ac eiusdem inflationes, duri-
 tiasq; in desellionibus mirificè iuvat. ¶ Decoctum potum vrinas ciet : iētericos, &
 hydropicos curat : capitis, & neruorum affectibus ex frigiditate prognatis succurrit :
 visum acuit.

DICTAMNVM Græcis, Διταμνος.] Arabibus, Mescatremfir, Anegen
araba, siue Bari.] Italis, Dittamo di Candia.] Germanis, Vuildem poley.]
Hispanis, Dittamo.] Gallis, Vitamo Real. *Dictamnus creticus*

DICTAMNVM CRETENSE.

FORMA.

DIOSC.
Theoph.
lib. 9. de
histo. 1.
Vir. l. 12
Aeneid.

Cretensis herba est pule-
gio similis, maioribus
tamen foliis, quæ tomē-
to quodam spissa lanu-
gine pubescunt. Ramu-
lis tenuioribus in quo-
rum summis partibus
flores exeunt purpurei.
Et deinde semen. Rara
hæc herba est.

LOCVS.

Theoph.
ibidem.

Nascitur in Creta Insula
in vno tantum loco, ip-
soq; admodum exiguo.

QUALITATES.

Gal. 6.
simp. me.
DIOSC.

Tenuiore essentia constat,
quàm pulegium. cætera
illi simile. Sed effica-
cius multo.

VIRES.

DIOSC.

Defunctos partus extra-
hit, non modò potum,
sed appositum quoque
aut suffitū: succus per
se illitus aut cum hor-
deacea farina, purgandi
vim habet. Herba im-
pactos pedibus, reli-
quovè corpori aculeos ilitu extrahit: valet ad lienis dolo rem. Radix

eius gustu calefacit, partus accelerat. Succus ex vino potus, auxilia-
tur à serpente demorsis. Tāta herbæ facultas est, vt olfacta abigat fe-
ras, quæ venenato ictu seuiant, appensaq; conceptum examinet: vul-
neribus ferro illatis, & venenatis ictibus infusus succus, præsentia-
neum est auxilium.



DICTAMNVM album, Italis, *Dittamo bianco.*] Germanis, *Gemeiner diptam.*] Gallis, *Diptam bastarde*.

DICTAMNVM ALBVM.



F O R M A .

Planta est insignis, spectatæque *Matt.* pulchritudinis; foliis fraxini adeo similibus, vt à quibusdam chamæmelia: hoc est infima fraxinus appellari soleat. Caulem gerit sesquicubitalem, rotundum, in cuius cacumine flores exeunt purpurei, citrei mali æmulos. Odo- re quadam cum graueolētia, acuto, non tamen iniucundo. Radice nititur diu- ricata & sæpè singulari, albican- te tenui intus matrice, dum recens est hircum olente, flo- res in triquetras siliquas a- beunt, scabro exterius corti- ce, in quibus semen.

L O C V S .

Nascitur in collibus, cliuosis, & *Idem* saxosis.

Q V A L I T A T E S .

Radix cuius est vsus amara est: excalfacit: attenuat, aperit & abstergit.

V I R E S .

Valet radix aduersus venena, & *Idem* venenosorū animalium ictus. Necat interaneorum vermes drachmę pondere hausta: da- tur contra frigidos vteri mor- bos, nam & menses, & secun- das, & emortuum fatum edu- cit, tum supposita, tum cum pulegio suffita, tum ex vino

meraco duarum drachmarum pondere potæ. valet quoq; ad alui torsiones, & ad eii- ciendos renum calculos. Additur quoque vtiliter in potionibus internorum vulne- rum. Datur comitialibus, & in aliis cerebri affectibus. Præstat contra pestilentie cō- tagia, quoquo modo sumatur. In summa ad multa radix utilis est: Siliquæ & flores contactu pruritum faciunt, & in calidioribus regionibus cutem exulcerant.

C E N S V R A .

Qui album Dictamnium Dioscoridis Tragium esse contendun, delirio proculdu- bio afficiuntur.

PSEVDODICTAMNVM, Græcis, *ψευδοδικταμνον*.] Italis, *Dittamo falso.*
falso Dittam.

PSEVDODICTAMNVM.

FORMA.

Mat. Caulibus exit dodrantalibus, lanuginosis albicantibusq; , è quibus folia erumpunt ex intervalis bina, subrotunda, dictamni tomento pubescentia, è quorum omnium exortu flores exeunt purpurei verticillatiq; ut in apiastro, & marrubio: sapore pulegij, sed minus acii.

LOCVS.


Idem Nascitur in Creta exoluto solo acri.

QUALITATES.

Gale. 6. Pseudodictamnnum ad omnia imbecillius dictamno habetur.
simp. me.

VIRES.

Minus dictamno acre gustu sentitur: eosdem tamen effectus præbet, sed inefficacius multo.



SALVIA Gæcis, *Ελελσφακος*.] Mauritanis, *Ælisfacos*, seu *Elisfacos*.] Italis, *Salvia*.] Germanis, *Salbey*.] Hispanis, *Salvia*, & *salua*.] Gal-
lis, *Saulges*.

SALVIA.



G E N E R A.

Duum est generum, Alterum *Theoph. lib. 6. c. 2 de hist. plant.*
quidem urbanum, alterum
sylvestre, quod sphacelus ap-
pellatur.

F O R M A V R B A N Æ.

Frutex est ramosus, longus, vir- *Diosc. Matt.*
gas habens quadrangulas &
canas, folia menthæ, maiora,
longioraque, asperiora, cras-
siora, & quæ sensim attritorum
quasi indumentorum scabri-
tatem referant, hirsuta, subal-
bida, odore per quàm iucun-
do, sed gravi. Flores gignit in
summis caulibus purpureos,
sylvestris homini æmulos,
& semen quoque simile. Radi-
ce nititur lignosa, fibrosa que.

L O C V S.

Colitur passim in hortis, & spō *Diosc. Matt.*
te quoque per se nascitur, ari-
do, & aspero solo.

Q U A L I T A T E S.

Evidenter calefacit, & leuiter *Gal. 6. simp. mo.*
adstringit.

V I R E S.

Menses cit, & viinas, decoctum *Diosc. Matt.*
foliorum, ramorumque potum,
& partus extrahit. Auxiliatur
quoque pastinacæ maris icti-
bus: capillos denigrat: vul-
nerum sanguinem cohibet,
terra ulcera purgat. Foliorum
ramorumque ex vino decoctum

lotu testium pruritus tollit. ¶ Folia ab utero gerentibus deuorata, conceptum robo- *Aëtius.*
rant ac retinent, si eadem fluidæ, laxæque fuerint; succi hemina cum sale pota, prolifi-
cas reddit mulieres, si quarto à secubito die bibatur, & viris deinde se miscantur. Da-
tur succus cyathorum duorum mensura vtiliter potandus sanguinem expuenti-
bus. ¶ Præstat salvia ad omnes capitis pituitosos affectus, omnesque articulorum do-
lores, tam in potionibus, quam in fomentis.

SALVIA minor, Græcis, Σακέλος.] Italis, *Salvia minore*.
Glomeris Salvia

SALVIA MINOR.

FORMA.

Folia habet alterius angustiora, & postrema parte auriculata caules quoque tenuiores, cætera verò similia sunt.

LOCVS.

Nascitur spontè in Hispania, & Gallia Narbonensi, exolutis locis. Et feritur quoq; in hortis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Ea omnia præstare valet, quæ Salvia maior.



MENTHA, Græcis, ἡδύοσμος.] Arabibus, Nāhanaba.] Germanis, *Muntz.*] Hispanis, *Hierua buena, & Ortelana.*] Gallis, *Mente*.

M E N T H A.



G E N E R A.

Duum est generum sativa, & sylvestris. Atqui sativa dū quoque generum est, alterū maius, alterum minus.

F O R M A M A I O R I S.

Planta est odorata, foliis saluic minoribus, per ambitum dē ticularis, caulibus numero- sis, floribus in summitate spi- catis, subpurpureis, pilosisq; viuax admodum est, nanq; in hortis semel tantum sa- ta, tam restibuli fertilitate durat, vt vix in posterum ex- tirpari possit.

L O C V S.

Seritur passim in hortis. *Idem*

Q V A L I T A T E S.

Gustu est acris, calidaq; facul- *Gale. 6.* rate prædita, ex tertio quadā *simp. me.* tenus excalfacientium ordi- ne, sed minus excalfacit quā calamintha. Habet & in se quiddam amarum, & acer- bum: substantia est tenuiū partium. ¶ Adstringit quo *Diosc.* que ac siccat.

V I R E S.

Succus ex aceto potus sangui- nem sistit: teretes ventris ti- neas necat: venerem stimu- lat. Terni rami cum acidi malipunici succo poti, sin- gultus, vomitiones, chole- rasque sedant: Folia cum fa-

rina hordeacea illita, suppurationes discutiunt. Mammas item tenfas, aut lacte tur- gentes compescit. Cum sale canum morsibus illinitur: vuluæ ante coitum admo- ta, conceptionem impedit. Lac coire non patitur in ventriculo, si folia lacti im- mergantur. In summa stomacho utilis est, & in condimentis peculiarem gratiam habet. ¶ Aqua stillatitia, è tota menthæ planta puerperarum mammis cum lin- teolis admota lactis concretionem inhibet, animum olfactu excitat; vlcera ma- nantia in infantium capitibus mirè sanat.

MENTHA altera. Italis, *Menta minore*, siue *Menta gentile*.
Quis audet Menthagoffe

F O R M A.

Matt. Foliis exit brevioribus angustioribusque: caulibus rubentibus, floribus quoque rubentioribus: eximio odore.

L O C U S.

Idem Seritur passim in hortis, & viridariis.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.


Idem Ea omnia potest, quibus alteram præstare diximus.

M E N T H A A L T E R A.



MENTHASTRUM, siue Mentha sylvestris, Græcis, ἡδύοσμος ἀγρία.]
 Italis, *Mentaſtro.*] Germanis, *Uild muntz.*] Gallis, *Mente cheuahne.*

MENTHASTRUM, SIVE MEN-
 THA SYLVESTRIS.



FORMA.

Folia profert menthæ longè maiora, hirsutiora, ac candidiora: caules cubitales, & flores spicatos, colore subpurpureo, tenuibus vndeque pilis: bene quoque olet.

LOCVS.

Nascitur plerunque vliginoso solo: & propè riuos aquarum.

QUALITATES.

Excalfacit, attenuat, adstringit, incidit, & aperit.

VIRE S.

Suffiti vapor scæminas à partu purgat. Datur eius decoctum vtiliter anhelosis, & egrè spirantibus, quin etiam mul-

cendis torminibus qui à flatu oriuntur. Substratum, vel accensum serpentes fugat. Instillatur succus vermiculosis auribus. Item tum potus, tum testibus illitus nocturnas pollutiones prohibet. Auxiliatur potus, regio morbo affectis: strumosos illitus iuuat: ex accio potus ventris animalia pellit: Folia tam pota quàm illita, præstant aduersus venenosorum ictus.

MENTHA Græca, Italis, *Menta Greca*, siue *Salvia Romana*, siue *Herba d^e Santa Maria*: Nonnullis *Lassulata*.] Gallis, Coch. *Verveine* *franche* *M^e*

MENTHA GRÆCA.

F O R M A.

Att. Foliis exit *salvię* longioribus latioribusque betonicę faciem quadantenus referentibus, circūquaque serratis: caulibus cubitalibus: nōnunquā maioribus: in quorum cacumine flores exeunt corymbacei, melino colore. Plāta est in vniuersum amara, non tamen vehementer, subadstringens, & grauiter odorata.

L O C V S.

Idem— Habetur sata copiosa in hortis.

Q U A L I T A T E S.

Excalfacit, siccatur, aperit, roboratur, abstergit, & prouocat.

V I R E S.

Idem— Auxiliatur vterinis affectibus: frigefactum iecur excalfacit, & vasorū obstructions aperit: illinitur ex irino, aut nardino oleo lienosis, & ex vino feruefacta vrinę suppressionibus: Lentigines, alphas, & alias cutis scditates emaculat, illitus noctibus succus: idem Lumbricos enecat: ventriculum roboratur tam haustus, quā illitus, & vomitiones compescit. Tota planta tam substratu, quā suffitu serpentes abigit, & eorum venenis resistit, quin etiam infarctus expedit, & caput roboratur.



CALAMINTHA, Græcis, Καλαμίνθα.] Arabibus, & Officinis, *Calamentum*.] Italis, *Calamento*.] Ethruscis, *Nipotella*.] Germanis, *Uildenpoley*.] Hispanis, *Neueda*.] Gallis, *Poullio sauvage*.

C A L A M I N T H A.



G E N E R A.

Trium est generum : Prima quæ DIOSC. nepetam Latini vocant, Montana altera, & altera mentastro cognata.

F O R M A P R I M A E.

Foliis oritur pulegio maioribus, *Matt.* subrotundis, hirsutis, per ambitū leuiter serratis, caulibus cubitalibus, angulosis, foliosisq; atque pilosis. Flores edit exiguos, purpurascētes, qui à medio caule vsque ad summū, ut in pulegio erūpunt, at in cacumine copiosiores habētur. Radices tenues, multifidasque.

L O C V S.

Nascitur in inculto solo, in apri *Idem* cis, collibus, secus itinera & sepes.

Q U A L I T A T E S.

Essentia est tenui, & calida, sicca *Gale. 7. sim.med.* que temperie, ex tertio quodā modo ordine. Horum manifesta sunt inditia partim gustu apparentia, partim experientia cognita : Gustu siquidem acris, & palam calida est, ac paululum omnino subamari habet. corpori autem exterius admota, primū qdē valde excalfacit, & mordicat, cutēque laniat, postmodò ēt exulcerat.

V I R E S.

Foliorum, florumque decoctum DIOSC.

potum : menses, & vrinas pellit, ruptis, conuulsis, egrē spirantibus, torminibus, horroribusque auxiliatur. Regium morbum expurgat : ex vino præsumpta venenis resistit. Tineas, cæteraque interiorum animalia, cum sale, & melle pota enecat. Elephanticos esitata adiuvat, si postea serum lactis ebibatur. folia detrita, & ex vellere supposita, menses eliciunt : partus enecant : Accensa aut substrata, serpentes fugant : Ex vino cocta, & illita, nigris cicatricibus candorem reddunt : succus vtiliter instillatur vermiculosis auribus.

CALAMINTHA montana, Græcis, Καλαμίνθα ὀρίνη] Italis, Calamento, si-
ue Nipotella montana.] Officinis, Calamentum montanum.

gubius virens polij

CALAMINTHA MONTANA.

FORMA.

Diosc. Folia habet ocimi, incana,
furculos, & caules angu-
losos, & purpureum flo-
rem.

LOCVS.

Diosc. Nascitur in Montibus.

QUALITATES,
ET VIRES.

Diosc. Paribus cum nepeta tum
qualitatibus, tum viri-
bus præstat.



CALAMINTHA aquatica . Italis, *Calamento aquatico.*] Græcis, Καλα-
μίνθα ἑνυδρος .

wasser minz 3 *hofm minz*.

CALAMINTHA AQUATICA .

FORMA .

Métastro cognata est, foliis ^{DIOSC.}
oblongioribus hirsutis-
que, caule, & ramis ma-
ioribus, quam superior .

LOCVS .


Nascitur in campestribus, ^{Idem}
asperis, & aquosis locis .

FACULTATES,
ET VIRES .

Suis in viribus, & facultati-
bus, cæteris inefficacior
est .

CENSURA .

Decipiuntur, qui Gattariã
herbam tertiam calamin-
thæ speciem esse contem-
dunt .



HERBA gattaria. Italis, *Herba gatta.* *Ger. Gattaria*

F O R M A.

Matt. Plāta est vulgaris notitię, folia mittens apiaſtri, aut vrticę æmula, ſed incana, & minora, cau- les edit quadrangulos, bicubitales, ramos nu- meroſos, & pariter in- canos, flores albos cir- ca caules, at qui in ſum- mitatibus exeunt, ſpi- cati ſpectantur: Radi- ces habet multifidas: odor vniuerſę plantę acutus, caput feriens.

L O C V S.

Idem. Nascitur in campeſtribus & in agrorum margi- nibus.

Q V A L I T A T E S.

Fervido quidē guſtu her- ba eſt, cum amaritudi- ne haud obſcura, exal- facit, & ſiccat calamin- thę modo.

V I R E S.

Valet ad omnes capitis, pectoris, ventriculi, ac vteri morbos, à pituita genitos, menſes elicit tam pota, quàm in deſeſſionibus addita. her- bę uſus ſteriles prolificas facit, ut cauſa fuerit ab humida frigidaque intemperie: ſuccus naribus inditus, pituitam valenter itahit, & vi- ſum acuit: In ſumma ubi excaſfacere opus ſit, Gattaria plurimum præſtat.



THYMVM, Græcis, Θύμος.] Mauritanis, *Hafct.*] Italis, *Timo.*] Germanis, *Römischer quendel.*] Hispanis, *Tomilho falso.*] Gallis, *Tim, seu Mariolaine de Angleterre.*

T H Y M V M.

G E N E R A.

Duum est generum: Candidum & Nigrum. *Theoph. li. 6. c. 2. dep lāt. hist.*

F O R M A.

Surculosus est frutex, exilibus foliis, multis, & angustis circūdatus: capitulis in cacumine flore purpurascente refertis. *Diosc.*

L O C V S.

Gracili solo & petroso provenit. *Idem*

Q U A L I T A T E S.

Thymum incidit, & excalfacit manifestè. *Gale. 6. simp. me.*

V I R E S.

Cum sale, & aceto, pituitā per alium detrahit. Decocti ius prodest Orthopnoicis, & anhelatoribus: tinea ventris exigit: menses partus, &

secundas pellit. vrinas ciet. Ex melle delinctum faciles reddit excreationes. Recentes tumores discutit cum aceto illitum: concretum sanguinem dissolvit: peniles verrucas tollit. Ischiadicis illitū cum vino, & polenta subuenit: hebetibus oculis in cibo prodest.

SATVREIA, Græcis, Θύσση. Italis, Coniella, Sauoreggia, seu Saturia.
 Ger. Gummel, Zumbel, Sp. Satvrey

S A T V R E I A.

G E N E R A.

Mutt. Duo eius sunt genera, Alterum quidem thymo cognatum, Alterum vero fruticosius, & maioribus foliis.

F O R M A P R I O R I S.

nosc. Thymo tota ferè facie similis est, minoribus tamè foliis, & caulibus, & tota planta tenerior, spicam defert florum plenam coloris herbacei,
 Mutt. ¶ Aut in purpuram languescens.

L O C U S.

Idem Gignitur in apricis, aspero, & arido solo, & feritur in hortis.

Q U A L I T A T E S.

Paulus. Tymbra sylvestris eadem, quæ thymum præstat: Hortensis autem altera quidem imbecillior est, sed ad ciborum vsum gratior, & accommodatior habetur.

V I R E S.

nosc. Eadem potest, quæ thymum, si modo consimili sumptitur.



SATVREIA altera. Italis, Coniella, seu Sauoreggia maggiore, seu Penevella.

hinc autem Salvag. arist.

SATVREIA ALTERA.



FORMA.

Ramis multis fruticat, *Alate.*
rotundis, atq; ligno-
sis, foliis thymo maio-
ribus, subasperis, quæ
circum furculos plu-
ra simul per interual-
la erumpunt: è quo-
rū exortu spicati qui-
dam processus, folio-
lis quibusdam ceteris
longè minoribus sti-
pati prodeunt, è qui-
bus flores exeūt par-
ui, ac subpurpurei.
Radice nititur mul-
tifida.

LOCVS.

Non solū feritur in hor- *Idem*
tis, sed sponte per se
nascitur in apricis col-
libus, & in torrētium
alueis.

QUALITATES.

Thymo suis in qualita- *Idem*
tibus similis est, proinde excalfacit, attenuat, aperit, incidit, dige-
rit, & aperit.

VIRES.

Viribus ab altera non differt, Thymi enim facultatibus omnibus re- *Idem*
ferta est.

SERPILLVM, Græcis, Ερπιλλός.] Mauri. *Hemen.*] Italis, *Serpillo*, seu *serpollo.*] Germ. *Quendel.*] Hisp. *Serpollio*, seu *serpam.*] Gall. *Serpulet*

SERPYLLVM.

G E N E R A.

Diosc. Duum est generum, Hortense alterum: Alterum sylvestre, & huius quoque duo sunt genera.

F O R M A H O R T E N S I S.

Diosc. Folia & ramulos origani habet, sed candidiores, odores sampsuchi, floribus subpurpureis in spicatis capitulis: gustu admodum acri. ¶ Non serpit humi, sed ad palmi altitudinē. increscit.

Plinius.

L O C V S.

Matt. Seritur in hortis non solū ad coronas, sed ad ciborum quoque vsum.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 6. Vsq; adeo excalfacit, vt & menses, & vrinas moueat: est autem & gustu admodū acre. ¶ Excalfacit, exiccat, digerit, incidit, & aperit.

simp. me.

Matt.



V I R E S.

Menses potu, & vrinam ciet: Torminibus, ruptis, vulsisq; auxiliatur: aduersus serpentes, potu illituvē prodest. Diuturnos capitis dolores mulcet: cum rosaceo, & aceto sincipiti illitū, veterinosos iuuat: succus cruentos vomitus sedat, drachmarum quatuor pondere ex acco potus. Additur bellē in ciborum condimentis.

ERPYLLVM sylvestre, Græcis, Ερπυλλος ἀγρίος.] Italis, Serpollo, seu
Serpillo saluatico. Ger. feld B gromm Lündel

SERPILLVM ALTERVM.

G E N E R A.

Aliud satureiatū, hoc est *Theophr.*
satueiæ odore: aliud *lib. 6. c. 7*
citreatum, quod citrei *de plant.*
mali odorem resipiat. *histo.*

F O R M A.

Ramulos, quod zigis ap- *DIOSC.*
pellatur, edit tenues, *Matt.*
furculosos, foliis refer-
tos longioribus, du-
rioribus, angustis. Flo-
res iucundè olēt. Qd
verò citreum malū resi-
pit, latius prouenit, hu-
mi repens, leuioribus
foliis in girum sese v-
nà cum ramusculis dif-
fundentibus.

L O C V S.

Nascitur in collibus, & *Idem*
montibus apricis.

Q U A L I T A T E S, E T V I R E S.

omnia genera paribus pollent facultatibus, verum tamen sylvestre ad *Idem*
omniavalentius habetur.

AMARACVS, Græcis, Σαμψύρον, ἢ ἀμάρανον.] Italis, & Officinis, *iorana*.] Etruscis, *Perfa*.] Arabibus, *Merzenius*, seu *Morsanga*.] Germ. *Meyeran*.] Hisp. *Maiorana*.] Gall. *Maroue*, siue *Mariolain*.

AMARACVS.

G E N E R A.

Matt. Duum est generū maius, quod vulgò cognitū est: & minus, quod tenuifolium vocatur.

F O R M A M A I O R I S.

Idem Herba est ramosa: caulibus tenuibus obsequiosis, foliis oblongis incanis, pilosisq; , cauliculos circūquaque vestientibus. flores edit in summis caulibus spicatos, herbacei coloris, compactili squamarum congerie, vt in origano: è quibus minutū oritur semē. Radicem habet lignosam, ac multifidam, seritur semine, furculo ac viuiradice.

L O C V S.

Idem Colitur in hortis, & fœtilibus: In Ægypto autem, Cipro, & Cizico spontè prouenit.

Q V A L I T A T E S.

Gal. 6. Tenuium est partium, ac digerentis facultatis. Desiccatur. & exalfacit ordine tertio.
simp. me.
Matt. Planta est odorata tota, & in medicamētis ad plura admodum utilis. Digerit, attenuat, appetit, & roborat.

V I R E S.

Diōsc. Succus decocti potus conuenit hydropicis iam incipiētibus, & iis, quos vrinæ difficultas, & tormina excruciant: folia ex melle illita suggillata dent. Menses trahunt ex pello subdita: illinuntur scorpionum ictibus, additis sale, & aceto. Iuxatis, tumoribusq; cerato excepta imponūtur: prosunt ad oculorū inflammationes cum hordeaceæ farinæ polline illita. ¶ Prestat amaracus ad oēs frigidos capitis, & neruorū affectus, tam illita, quàm pota: foliorum succus naribus infusus pituitam à capite trahit, & cerebrum roborat: valet ad pectoris vitia. Stomacho utilis est, tum pota tum illita herba: iocinorosos, & lienosos inuat: confert ad vteri flatus ac ceteros eiusdem frigidos morbos.



AMARACVS tenuifolia, Græcis, Σάμφυκον, ἢ ἀμάρακον λεπτόφυλλον.]
Italīs, *Maiorana gentile*.] Etruscis, *Perſa gentile*.

Wainron geyflorft

AMARACVS TENVIFOLIA.



FORMA.

Amaracus tenuifolia, fo- *Matt.*
liis, cauliculis, flori-
busque exit tenuiori-
bus, & odore longè
præstantiori.

LOCVS.

Colitur à mulieribus Ita- *Idem*
lis in fictilibus, & in
hortis.

FACULTATES,
ET VIRES.

Ea omnia præstare potest, *Idem*
de quibus in altero di-
ximus genere.

SERTVLA Campana, Græcis, *Μελίλωτος*.] Arabibus, *Alchimelmelueh*.
 Italis, *Meliloto*.] Hispanis, *Corona de Rei*. *Ger. Strin. fl.*

F O R M A.

Diosc. Planta est cubitalis, statim à radice fruticosa, ramis exilibus, folio trifolio proximis, floribus melinis, parvis, siliquis repandis, numerosis, pluribus, è ramusculorum cacuminibus depēdentibus, in quibus semen concluditur minutū, subrufum, odoris non ingrati, cuius est vsus.

L O C V S.

Diosc. Nascitur in Campania circa Nola, quin etiā in Cizico, & Calcedone.

Q V A L I T A T E S.

Gale 6. *Mistæ facultatis est: habet. n. quiddā adstringēs, sed & digerit, & concoquit. Copiosior enim in ea est substantia calida quā frigida.*

V I R E S.

Diosc. Inflammationē oēm emollit, p̄sertim, q̄ ioculis, vtero, sede, & testibus erūpunt, si ex passo cocta illinat, addito oui luteo assato. Recētes meliceridas per se cum aqua & vlcera in capite manātia, illita cum creta chia, vino aut galla sanat: Stomachi dolores, & cruda & cocta cum aliquo ex antedictis leuat: Doloribus aurium mitigandis, cruda ex passo instillatur: In aceto aut rosaceo calefacta capitis dolorem lenit.

C E N S V R A.

Cū verē legitimaque meliloti semen, cuius debet esse vsus, ad nos nō deferatur: nonnullis sylvestris loti flores, quidam cuiusdam aurei Trifolij ipsius vice vsurpāt, sed neuter tamē meliloti vim possidet.



BACCHARIS, Græcis, Βάκχαρις.] Italis, Bacchara.

BACCHARIS.



FORMA.

Folia sunt ei aspera, medio-
dia violæ, & verbasci ma-
gnitudine, caulis angu-
losus, cubiti altitudi-
nem petens, aliquantu-
lum asper, non sine ad-
natis appendicibus: flo-
re purpureo subalbican-
te, odorato: Radicibus
veratro nigro similib⁹,
quibus odor inest cinna-
momo proximus.

LOCVS.

Asperum, squalidumque *Idem*
solum amat.

QUALITATES.

Excalfacit, siccatur, aperit, *Matt.*
prouocat.

VIRE.

Radix in aqua decocta, ru-
ptis vulsis, ex alto deuo-
lutis, spirandi difficulta-
ti salutaris: item diuti-
næ tussis, & vrinam egrè
reddētibus: menses pel-
lit. Datur vtiliter in vi-
no contra serpentium
morsus. Radix recens

apposita, partus extrahit: Puerperis eius decoctum in defessionibus
prodest: In diaphragmata vtiliter inseritur iucundi odoris gratia: Fo-
lia vt pote quæ adstringant, capitis doloribus illitu profunt: oculo-
rum inflammationibus, mammis à partu tumentibus, incipientibus
ægylois, ignibusque sacris auxiliantur. Odor somnum allicit.

CENSURA.

Anticyram profectò nauigant, qui Bacccharem, & Asarum nihil inter
se differre contendunt.

RUTA, Græcis, Πύραρον.] Mauritanis, *Sedeb*, seu *Sedab*.] Italis, *Ruta*.] Germanis, *Raut*, seu *Weimraut*.] Hispanis, *Aruda*.] Gallis, *Rut*.

G E N E R A.

Matt. Sativa altera, altera verò sylvestris, quæ duplex habetur. Mōtana, & quæ peculiariter *Harmola* dicitur.

F O R M A S A T I V A E.

Idem. Planta est perpetuò virens, foliis crassiusculis, subpinguib⁹, ex angusta origine in latitudinē sese pādētib⁹; colore saturate viridi. Ramos mittit copiosos, surculososque, flores in summitate luteos, hyperici emulos, è quibus capitula oriuntur quadruplici apice coronata, in quibus pusillum continetur semen nigro colore.

L O C V S.

Matt. Seritur in hortis, apricis
Plin. gaudet, & siccis, terraque maximè lateritia.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 8. Excalfacit ordine tertio. est
simp. me. aut nō solū gustu acri sed amaro. itaq; digerit, atq; incidit crassos lentosque humores. Est & tenuium partiū.

V I R E S.

Diosc. Urinā ciet: menstrua pellit.

Lethaliū medicamentorū antidotū est, & præsertim semen potū: folia cū iuglāde, & ficu præsumpta, inefficaces venenorū vires reddūt, & pestilētię cōtagia superāt. Cōtra serpētes, eodē modo sumere cōuenit. Sūpta geniturā extinguit, cū anetho sicco decocta tormina sedat: Pota ex oleo seruefacta, vētris tineas excutit: Hydropicis vtiliter cū ficu illinitur: Deuorata visum acuit. Succus in malicorio calefactus aurīū doloribus efficaciter infunditur. Trita, & indica sanguinē è naribus fluentem sistit: Mansa ceparu m & alliorum acrimoniam domat.

R U T A.



MARVUM, Græcis, Μάρων.] Italis, *Maro*.

M A R V M .



F O R M A .

Surculosa est planta: flore
re origani, odoratiore,
foliis multo candidio-
ribus.

L O C V S .

Nascitur in Cizico , & DIOSC.
iuxta Magnesium co- Gal.
piosissima.

Q U A L I T A S .

Herba est parùm acris , Gal. 1.
amara verò plurimū. de Anti.

V I R E S .

Vim habet sisymbrio con- DIOSC.
similē : substringit. n.
& modicè calefacit :
qua de causa illita ser-
pentia vlcera sistit , &
in calidas illitiones ad-
ditur.

ACINVS, Græcis, ἀκινυός.] Italis, *Acino*.

F O R M A.

Diosc. Tenui, siccoque ramulo
herba est, odorata, sed
hirsutior, qua coronæ
Plin. factitantur. ¶ Eadem
erat, quæ ocimum, nisi
hirsutior ramis ac fo-
liis fuisset: ipsa enim
nunquam floret.

L O C U S.

Diosc. A non nullis olitoribus
colitur.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Diosc. Pota herba menses, & al-
uum sistit: illita pa-
nos, & ignem sacrum
sanat.

A P P E N D I X.

Tā etsi hac legitimi acini
figuram non represen-
tet, cū tamen à mul-
tis pro acino vsurpe-
tur: hic eam demonstrare libuit, ut aliorum quoque possit esse iu-
diciū.

A C I N V S.



RUTA sylvestris, Græcis, πύσανον ἄγριον.] Italis, *Ruta saluatica*.

wild rue

RUTA SYLVESTRIS.

FORMA.

Foliis, caulibus, ramis, fo- *Matt.*
liis, floribus & capitulis
hortensi similis est, sed
foliis gracilioribus, cau-
dice verò crassiori, ligno-
so, ac firmo, acriori qui-
dem, & amariori gustu.

LOCVS.

Nascitur in montibus sa- *Idem*
xosis, & apricis.

QUALITATES.

Ex quarto est ordine exal- *Gale. 8.*
facientium. Itaque hor- *simp. me.*
tensi valentius admodum
operatur.

VIRE S.

Si copiosius estur interfi- *Diosc.*
cit: si colligatur dum
florē promit, cutem in-
flat, & rubore cum pru-
ritu vehementi inficit.
Itaque perunctis mani-

bus, & facie, eam colligere oportet. Semen eius potum contra inte-
stina vitia efficax est. In antidota commodè additur. Prodest comi-
tialibus & coxendicum doloribus: menstrua mouet, partus ene-
cat, & ut pote noxia herba cibis abdicatur.



RUTA sylvestris altera, Græcis, Πήγανον ἄγριον, καὶ ἁρμόλα.] Arabibus, Harmel.] Italis, Ruta saluatica seconda. *Ein andrer wilder rüthen*

F O R M A.

Diosc. Frutex est, qui ab radice
Matt. plures emittit caules
foliis multo, quàm al-
terius rutæ longiori-
bus, tenerioribusque,
odore graui, floribus
candidis, è quibus ca-
pitula summis ramis
oriuntur, satiuæ rutæ
maiora, tenuibus qui-
busdā foliolis, ipsisq;
acutis circumquaque
stipata. in quibus triā-
gulum occluditur se-
men; subrufo colore
& amaro gustu.

L O C V S.

Diosc. Prouenit in Cappadocia,
& Galatia Asiæ finiti-
ma, in collibus, & lē-
to solo.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 7. Vis eius tenuium est par-
sim med. tium, & calida tertio

abscessu: Ideo crassos humores secat, & digerit, & vrinam ciet.

V I R E S.

Diosc. Semen cum melle, vino, croco, & fœniculi succo, ac gallinaceo felle, re-
Matt. ritur contra retusam oculorum aciem: cætera cū syluestri ruta paria
habet.



GALEGA, siue Ruta capraria. Ethruscis, *Lauanese*.

GALEGA, SIVE RUTA CAPRARIA.

FORMA.

Caulem mittit sesquicubi *Matt.* talem, ramosum, folia è ramis vtrinq; prodeunt dena vnde nave ab vno pediculo emergentia, oblonga, subpinguiaq; : flores in summitate purpurascentes, è quibus si liquæ oriuntur semen continentes.

LOCVS.

Prouenit passim secus itinera, in scrobium aggregibus, & læto solo.

QUALITATES,
ET VIRES.

Vis illi maxima contra pestilentiam: plurimos. n. huiusce plantæ vsu præseruatos scimus: mirificè quoque valet aduersus lethalia venena omnia, & contra ferarum omnium venenosos ictus, *Idem*

in quem vltim tuccum bibendū iubēt. & herbam ipsam vulnere ad-mouēt. Datur succus ad cochlearis menturam necandis intestinorū vermibus. Datur idē vtiliter in principio pestilentia affectis, aut eius decoctū, ex aceto paratū, addita theriaca, & Armenio bolo. verū à potu sudare egrum oportet. idem præstat ad pestilentes febres in quibus exanthemata, siue maculæ cutaneæ quas pestechias vocāt, emer-serint. Que quidē omnia, sua ipsius speciali dote planta hæc præstat.



MOLY, Græcis, Μῶλυ.] Italis, *Moli*.

FORMA.

DIOSC. Folia habet graminis latiora, humi sparsa: florē albę violę similem, sed minorem, magnitudine violę purpureę æmulum lactei coloris: caulem candidum quaternum cubitorum, in cuius cacumine inest aliquid, quod allij speciē referat: Radix parva bulbosa.

LOCVS.

Plin. Nascitur circa Pheneum, & in Cillene Archadiæ.

QUALITATES,
ET VIRES.

Contraheutis est facultatis. Mirum in modum valet ad vuluę apertiones, si trita cum Irino vnguento in passo subii ciatur.

MOLY.



PANACES Heracleū, Græc. *πάνακες ἡρακλειον*.] Arab. *Steusir, siue Ieusir*.] Italis, *Panace Heraclio*.] Huius lachryma, Græcis, *ὀποπαναξ*.] Latinis, *Opopanax*.] Offic. *Opopanacē*.] Ital. *Opopanaco*.] Hisp. *Opoponaque*.

PANACES HERACLEVM.

F O R M A .

Foliis est asperis ad terram iacētibus, herbacei coloris, multum ad ficulnea accedētibus, in ambitu quinque partito diuisis. caule vt ferulæ altissimo, lanugine quadam canescente. foliis etiam minutioribus refertus : muscariis ceu anethi in cacumine : luteis floribus, & semine subamari gustus.

DIOSC.

L O C V S .

Nascitur in Cyrene Lybiæ, & Idem Macedonia.

Q U A L I T A T E S .

Opopanax ipse ad plurimos est Gal. 8. vsus aptissimus, vt potè excalfaciens, emolliens, digerens : excalfacit ordine tertio, & siccat secundo. Cortex radicis, exiccatoriū simul & excalfactorium est medicamentum, sed minus quàm succus ; quin & nonnullam habet extergendi facultatē : fructus calidus & ipse est, ac mēsis mouendis accommodū.

simp. me.

V I R E S .

Opopanax cōuenit febriū horribus, vulsis, ruptis, laterū doloribus, torminibus, & vrinæ stillicidiis : bibitur ex vino aut aqua mulla cōtra vesicæ scabiem : Menses trahit, vteri inflationes, duritia q̃;

DIOSC.

ex melle dilutus discurtit. Ischiadicis vtiliter illinitur. carbunculos rumpit : canis dentium inditus dolorem mulcet. Illinitur commodissimè vnā cum pice mistum rabidarum bestiarum moribus : concisa radix, subpositaq̃; partus extrahit : Ad vetera vlcera efficax est. Ex melle illita nudata ossa carne circūuestit. Semen cum Absinthio potum menses pellit, cum aristolochia præstat ad venenosorum animalium ictus : & bibitur in vino contra vuluæ strangulatus.

PANACES Asclepiū, Græcis, *πάνακες ἀσκληπίειον*.] Italis, *Panace Asclepio*

PANACES ASCLEPIVM.

FORMA.

prosc. Caulem emittit tenuē, geniculatum, circa quem folia funduntur fœniculo similia, maiora tamē, & hirsutiora, odorata: in cacumine umbella habetur, ubi flores emicāt aurei, acris gustus, & odorati. Radix parua est, tenuis, & amara.

LOCVS.

Matt. Prouenit in montibus apricis.

QUALITATES.

Gale 8. sim. med. Minus est calidum, quàm heracleum.

VIREs.

prosc. Flores & semina ex melle illita, contra vlcera, phagedenas, & tubercula auxiliarem vim habent: bibuntur aduersus serpentium morsus ex vino, & illinūtur ex oleo.



PANAX chironium, Græcis, *πάναξ*, siue *πάναξ χειρῶνιον*.] Italis, *Panace chironio*. Herbariis quibusdam flos solis. *Common Chirony*.

PANAX CHIRONIVM SIVE FLOS SOLIS.



FORMA.

Folium habet amaraco simile. *Diosc.*
flos aureus, radix parva, siue
tenuis, quæ non altè demit-
titur: gustu acri. ¶ Flos autè *Matt.*
solis, quem panacem chiro-
nium nonnulli faciunt, sar-
culos mittit ab radice nume-
rosos, tenues lignososque, in
quibus folia sunt oblonga
hyssopi ferè æmula, conco-
mitantibus minoribus fo-
liolis cumulatim prodeunti-
bus: florem pentaphylli, au-
reum, sed maiorem. Radicē
item lignosam adstringenti
gustu, minimè acri.

LOCVS.

Nascitur flos solis in mōtib, *Matt.*
& collibus apricis. Chiro- *Diosc.*
nium verò panax in Pelio
monte.

FACULTATES.

Panaces chironium, facultatē *Gal. 8.*
A sclepio similem habet. *Simp. me.*

VIRE S.

Pota panacis chironij radix ser *Diosc.*
pentium venenis resistit: il- *Matt.*
lita coma eadē præstat. ¶ So-
laris verò floris vis cōglati-
nandis vulneribus ac tangui-
nis fluxioni cohibendæ ad-
modū efficax est. sanat quo-
que tum oris, tum pudē-
dorum vlcera. Datur quoq;

utiliter ad cruenta sputa, & ad dysenteriam, cum radicibus contritus. In summa,
vbi agglutinare, cohibere, roborare sit opus, ea omnia perinde præstat, ac omnia
symphitorum genera.

CENSURA.

alluntur qui solis florem chironium esse panacem putant, cum autem panacēs chi-
ronium, Asclepij vires habeat, & excalfaciat, & radicem habeat acrem non video
cur iis subscribere queam.

LIGVSTICVM, Græcis, Λιγυστικόν. Italis, Ligustico.

F O R M A .

Diosc. Cauliculum fert anethi geniculatum, tenuem, & in circuitu folia fertulæ campanæ molliora, odorata prope verticem graciliora, & longè magis diuisa: in cacumine muscariû, in quo semen dependet nigrum, solidû, & oblongum, fœniculo proximum, acre, & aroma olens. Radix candida, & odorata, Heracleotici panacis similis.

L O C V S .

Ide m. Gignitur in altissimis, asperisq; montibus, ac umbrosis, maximè circa fluenta.

Q V A L I T A T E S .

Gal. 7. simp. me. Radix & semen ex genere excalfacientium sunt, adeo vt vrinas cieant, menses prouocent, & flatus discutiant.



V I R E S .

Diosc. Radicis, seminisq; vis, excalfactoria est, & concoquens: prodest ad intestinos dolores, & ventriculi inflationes, præstet contra serpentium ictus, vrinas & menses potu trahit. Idè præstat apposita radix.

LIGVSTICVM alterum, Italis, *Ligustico falso*.

LIGVSTICVM ALTERVM.

FORMA.

Caule exit ferulacco, al-
lis frequētib, è qui-
bus rami disparibus
exeunt internallis: fo-
liis quinque ex vno
petiolo prodeūtib, per
ambitum serratis,
Muscariis fœniculi si-
milibus: semine quo-
que simili sed longio-
re, crassioreque: Ra-
dice nititur vegetio-
re, exterius subnigra,
acuto simul, & sub-
amaro gustu, odoris
non iniucundi.

LOCVS.

Gignitur in altis monti- *Idem*
bus: apricis tractibus.

QUALITATE S,
ET VIRES.

Radice & seminis vis *Idem*
excalfactoria est: fla-
tus pellit, frigefacta vi

scera iuuat, & vrinam mirificè ciet.

PASTINACA domestica, Græcis, Σπαρδαίος.] Arab. *tezir*, *Gezar*, seu *Giezar*.] Italis, *Pastinaca domestica*. Germanis, *Pasteneey*, seu *Pastinichen*.] Hispanis, *Canaoria blanca*.] Gallis, *Pastenades*. *gall. Möve*
 PASTINACA DOMESTICA.

G E N E R A .

Duum est generum, alterum domesticum, alterum agreste.

F O R M A .

Matt. Domestica caule exit crasso striato, foliis Elaphobosci maioribus, pluribus vtrinque, ex vno pediculo prodeuntibus, terebinthi modo, subasperis, & per ambitum denticulatis, umbellas magnas in summitate gerit, floribus melinis semine fœniculi maiore, acuto, & amariusculo gustu, odoratoque. Radicem habet crassam, teneram, albam, odoratâque, non sine adnatis.

L O C V S .

Matt. Seritur passim ab olitoribus in hortis, sumiturq; frequenter in cibis.

Q U A L I T A T E S .

Gale. 8. Pastinaca sativa imbecillior, sylvestris ad omnia potentior est; urinas mouet, & menses prouocat, tum herba quidem tota, tum maxime semen, ac radix. Habet porrò etiam abstersorium quippiam.

V I R E S .

Semen potum, vel admotum menstrua mouet, atq; eos iuuat, quos urinae difficultas torquet, aut lateris dolor excruciat, aut si aqua cutem subit.

Prodest, & serpentium moribus. nam id præsumentes serpentium ictu non affici tradunt. Conceptus adiuuat. Radix urinam pellit, Venerem stimulat, partus admodum eiicit. folia trita, & cum melle imposita phagedænas vlcera purgant. Atqui ad hæc omnia sylvestri inefficacior, & in cibo aptior.



PASTINACA sylvestris, Græcis, Σταφυλίνος ἀγρίος.] Italis, Pastinaca
salustica. *viel mören*

PASTINACA SYLVESTRIS.

FORMA.

Folia habet gingidij latiora subamara, caulem rectum, scabrum, umbellam similem anethi, in qua flores insunt candidi, & in medio purpureum quiddam. Radix illi est dodrantalis digiti crassitudine odorata, quæ cocta manditur. Semē habet pilosum, *Matt.* acre, & odoratum.

LOCVS.

Prouenit campestri, ac læto solo, locis præsertim incultis, & in collibus amenis. *Matt.*

QUALITATES.

Ad omnia potentior est quàm sativa, magis enim aperit, & magis abstergit. *Gale. 8. simp. me.*

VIRES.

restat omnia quæ domestica, sed longe quidem valentius operatur. *Diosc.*

CAROTA, Italis, Carota, & Carotola..

gell möv vnd by.

G E N E R A.

Matt. Duum est generum, alterum radice rubra, alterum alba.

F O R M A.

Prosc. Folia caules, rami, umbellae, flores, ac semen, sylvestris Pastinacae per omnia similia sunt. Radix in vno genere purpurea, ac cruenta habetur, in altero alba, napi fere similis, sapore subdulci, odore non insuavi.

L O C V S.

Matt. Seruntur ab olitoribus passim in hortis in ciborum usu.

Q U A L I T A T E S.

Idem Semen, & radices, pares cum domestica pastinaca facultates habent.

V I R E S.

Non valde distant suis in viribus à domestica Pastinaca. In cibis sumpta radix inflat, & concoctu non adeo facilis est. Rubra coquitur in aqua, & deinde tessellatim inciditur, & in acetariis cum pipere estur. Alba verò napi, aut napi modo in carniū iure coquitur.

C E N S V R A.

Malè sentiunt, qui rubram Carotam, Behen rubrum, albam verò albū facere conantur. Quare ij, meo in horto suas Carotas non plantabūt.

C A R O T A.



SESELI Massiliense, Græcis, Σέσελι.] Arabibus, *Sesalios*.] Barbaris, *Sifileos*.] Officinis, *Siler montanum*.] Germanis, *Stenibrech*.] Gallis, *Sermontain*.

SESELI MASSILIENSE.



G E N E R A.

Quatuor Sesele generanu **Diosc.** merantur, Massiliense, Creticum, Æthiopicū, Peloponnense.

FORMA MASSILIENSIS. **Diosc.**

Folia habet fœniculi similia, crassiora tamen, caulem vegetiorem, umbellā anethi, in qua semen prouenit oblongum, angulosum, degustanti statim acre. Radicem gerit longam, iucundi odoris.

L O C V S.

Nascitur in altis mōtibus. *Matt.*

Q U A L I T A T E S.

Radix, atque etiam semen *Gale. 8.* vsque adeo excalfacit, *simp. me.* vt admodum vrinam mouere queat, sed & medicamentum est tenuium partium.

V I R E S.

Semen, & Radix potu strā **Diosc.** gurix, & orthopneæ medetur, suffocationibus mulierum, & comitali

bus profunt, mēses, & partus trahūt; tussim veterē sanant. Semen cū vino potū concoquit, & tormina discutit. Epialis febribus vtile. contra perfriktiones in itineribus cum pipere, & vino bibitur. Datur in potu capris, ac ceteris pecudibus, quo facilius suos fœtus enitantur.

SESELI Æthiopicum, Græcis, Σέσელი αἰθίοπικον.] Italis, *Seseli Ethiopico*.

SESELI AETHIOPICVM.

F O R M A.

Diosc. Folia habet hederæ maiora,
& ad periclymeni modū
oblōga. Frutex nigricat,
palmitibus in bina cubi-
ta extensis, ramis sesqui-
pedalibus, (seu spitamæ
lōgitudine) capitulo anē-
thi, semine tritici modo-
dēso, nigro, amaro, Mas-
siliensi odoratiore, & a-
criore, multum suavi.

L O C V S.

Matt. Nascitur in apricis mon-
tibus.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem Nulla qualitatū, & viriū
cū altero intercedit diffē-
rentia, nisi quòd cūm
Æthiopicum acrius sit,
valētius sua expedit mu-
nia.



SESELI peloponnense, Græcis, Σίσελι πελοποννήσιον.] Italis, *Seseli Peloponese*.

SESELI PELOPONNENSE.

F O R M A.

Folia mittit cicutæ latiora, Diosc.
& crassiora, caulem supra Massiliensis magnitudinem ferulaceum, & latam in cacumine umbellam, in qua semen latius odoratum & carnosius pender.

L O C V S.

Nascitur in asperis, riguis, Diosc.
& collibus, & in Ida monte, & etiamnum in Insulis.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Eadem præstare potest, quæ
& cætera geneta.



ANISVM, Græcis, ἀνισον.] Mauritanis, *Aneisum*, siue *Anexissum*.] Italis, *Aneso*, & *Aniso*.] Germanis, *Anisz*, & *Enisz*.] Hispanis, *Matabalua*, & *Yerua dulce*.] Gallis, *Anis*.

A N I S V M.

F O R M A.

Matt. Caulē edit rotundū, cubitalū, ramosum, umbellam candidā mellis odore, semen oblongū, iucunde odoratū, sapore sanè misto ex dulci, acriq̃ue, ac etiam amariusculo, ad multa vtile.

L O C V S.

Diosc. Seritur in cāpis, hortis, &
Matt. viridariis. ¶ Sed optimū est quod in Creta, & Ægypto nascitur.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 6. simp. me. Semen maximè vtile est, acre, subamarū, vt propè adurentium accedat caliditatē. Est autem in siccandō tertij ordinis, sicut in calefaciendo.
Matt. ¶ Aperit, concoquit, digerit, incidit; prouocat, & flatu pellit.

V I R E S.

Diosc. Oris halitū iucundiorē facit, doloris leuamentū præstat, urinā ciet, discutiēdi vim habet. Hydro picis potū, sitim extinguit. Animalīū venenis aduersatur. Valet, & ad inflationes. Aluū, & alba sceminarum profluvia sistit. Lac ad mammas elicit. Venerem stimulat, capitis dolores leuat, naribus suffitū, cum rosaceo tritum instillatumq̃ue fractis auribus medetur. ¶
Matt. Inspergitur panibus odoris, saporisq̃, gratia; Datur tostum cum mentha ad cœliacos affectus. Singultum sedat, tam haustum, quàm olfactum; somnum conciliat, & calculos pellit.



CARVM, Græcis, Καρός.] Arabibus, Coreuia, Karauia, seu Carui.]
 Italis, Caro, & Caruo.] Germanis, *Matt kumich senm kim.*] Hi-
 spanis, Alcaranea.] Gallis, Carui. *Wismuthum.*

C A R V M.



F O R M A.

Planta est Pastinacæ sylue- *Matt.*
 stris non abfimilis, cau-
 libus ab vna radice plu-
 ribus, quadrangulis, cu-
 bitalibus, umbella flori-
 bus candidis referta; se-
 mine anisi longiore, an-
 guloso, subnigricante, ra-
 dice longa, sapore ama-
 riusculo simul & acri.

L O C V S.

Nascitur in pratis, & præ- *Idem.*
 fertim in montibus, &
 conuallibus.

Q U A L I T A T E S.

Cari semen excalfacit, & sic *Gal. 7.*
 cat tertio quodammodo *simp. me.*
 ordine, moderatè acrem
 qualitatem possidens.

¶ Aperit, incidit, digerit, *Matt.*
 concoquit, prouocat, &
 flatus pellit.

V I R E S.

Vrinam cōcitāt, stomacho *Diosc.*
 vile, os commendat,
 concoctionem adiuuat,
 vtiliter miscetur anthi-
 doris: Radix cocta pasti-

nacæ modo manditur. ¶ Herba pro olere estur. Seminis farina ad- *Matt.*
 miscetur vtiliter cataplasmatīs, quæ ad sugillata parantur.

C E N S V R A.

Ridendus sanè error eorum est, qui rubram carotam, carum legiti-
 mum esse contendunt.

ANETHVM, Græcis, *ἄνηθρον*.] Mauritanis, *Xebet, Iebet, seu Sebet.*] Italis, *Aneto.*] Germanis, *Dillen, seu Hoch kraut.*] Hispanis, *Heneldo.*] Gallis, *Anet.*

ANETHVM.

FORMA.

Matt. Adeo ex omni parte fœniculum emulatur; ut sæpius legentes fallat, nisi gustum consulant. confurgit itaq; caulibus sesquicubitalibus, ramosis, foliis capillorū speciem referentibus, floribus luteis, flore, & umbella fœniculi, Radice neque adeo longa: neq; multis subnixa fibris.


LOCVS.

Idem Seritur in hortis ad ciborum obsonia, & in medicum quoque vsum.

QUALITATES.

Gale. 6. simp. me. Adeo excalfacit, ut habendum sit, aut secundi ordinis intensi, aut tertij remissi; exiccantiū verò ordinis est secundi incipientis, aut primi finientis. ideoque merito in oleo decoctum digerit; dolorem sedat, somnum conciliat, & crudos humores cōcoquit.

Diosc. Aridi comæ, seminisque decoctum potu lac euocat, inflationes, & tormina sedat, aluum, vomitionesque sistit, vrinas ciet, singultum leuat, oculorum aciem hebetat, genituram restringit assidue sumptū; vteri affectibus in defensionibus vtile est. cremati seminis cinis illitus condylomata tollit.



VIRES.

CUMINUM sativum, Græcis, Κόμινον.] Arabibus, *Camium*, seu *Kemum*.]
 Italis, *Comino*, & *Cimino*.] Germanis, *Kimmel*.] Hispanis, *Comino*.]
 Gallis, *Comin*. *verligon* *afimel*.

CUMINUM SATIVUM.

G E N E R A.

Duum est generum, sati- Diosc.
 uum alterum, alterum
 sylvestre.

F O R M A S A T I V I.

Exit caule sceniculaceo, fo Matt.
 liis quoque ferè simili-
 bus, sed rarioribus, se-
 mine in umbella sub fla-
 uo, cum grauedine qua-
 dam odorato, sceniculi
 maiore.

L O C V S.

Seritur passim in Italia in Diosc.
 cāpis, sed sponte quoq;
 ple prouenit in Æthio-
 pia, Ægypto, Galatia,
 Cilicia, & Terentia. Tra-
 ctu gaudet calido, &
 putrescibili. Quare fre-
 quentissimum in mari-
 timis nascitur.

Q U A L I T A T E S.

Semē qualitatis est excalfa- Gale. 7.
simp. me.
 ciētis, perinde ac anisi,
 lignistici, & cari ex ter-
 tio ordine excalfacien-
 tiū.

V I R E S.

Excalfacit, adstringit, exic- Diosc.

cat. Ad tormina, inflationesq; conuenit coctum, & cum oleo indi-
 tum, aut cum hordeacea farina illitum. Orthopnoicis datur in po-
 sca: Demorsis à Serpente in vino. Auxiliatur impositum testium col-
 lectionibus, impositum cum vua passa, aut loliacea farina, ceratove-
 mensium abundantiam inhibet. Contritum in aceto, & naribus ob-
 iectum sanguinis profluvia sistit. colorem bibentium aut peruncto-
 rum mutat in pallorem.



CVMINVM sylvestre, Græcis, Κῦμινον ἀγρίον.] Italis, Comino, seu Cinz
no saluatico. *Wilder Wilder Kümmel*

in: Lagrecia cuminioides

CVMINVM SYLVESTRE.

G E N E R A.

Diosc. Duo sylvestris cumini as-
signantur genera, pri-
mum, & secundum.

F O R M A P R I M I.

Diosc. Frutice assurgit paruo,
caule dodrantali, ac te-
nui, quaternis, aut qui-
nis foliis, tenuibus ve-
luti serratis, & gingi-
dij diuisura. in cacu-
mine capitula quina,
aut sena habet, mollia,
rotunda, in quibus se-
men est acerolum gu-
stu satiuo acriore.

L O C V S.

Diosc. Nasceitur in collibus, in
Lycia, & Galatia Asia,
atque Carthagine Hi-
spanie.

Q U A L I T A T E S.

Matt. Calefacit, exiccat, aperit
digerit, incidit, resol-
uit, & prouocat.

V I R E S.

Diosc. Bibitur semen ex aqua ad-
uersus tormina, infla-
tionesque. Item ex
vino contra venenatas bestias. Singultus ex aceto sedat, stomacho
utile quem humor vexat. Sugillata tollit, si manducatum cum mel-
le, & vna passa illinatur. Idem prestat insidem adiectis ad testum in-
flammationes.



CUMINUM sylvestre alterum, Græcis, κύμινον ἄγριον ἕτερον.] Italis, Ciminio saluatico secondo. *Das ander gschlocht des wilden Culinij hieße.*

CUMINUM SYLVESTRE ALTERUM.

FORMA.

Planta est satiuu non dissimilis, quod à singulis floribus elata promit cornicula, in quib^{us} semen est melanthio simile.

LOCVS.

Nascitur in collibus apri *Matt.* cis.

QUALITATES.

Semen excalfacit, siccatur, *Matt.* aperit, prouocat.

VIRES.

Epotum semen omnium *dirose.* serpentiū moribus præsidio est, calculosis, & iis qui vrinæ stillicidio vexantur, aut concretum sanguinem cū lotio reddūt auxiliatur. Sed apij semen feruefactū postea bibendū est.



CONSOLIDA Regalis, Italis, *Consolida Reale*, seu *sperone du cavalier*.] Germanis, *Käuterhorn*.] Gallis, *Pie d'Alouette*, seu *consolida royale*.

CONSOLIDA REGALIS.

FORMA.

Matt. Caulē gerit vnicū, ramulis multis, tenuib⁹, longis, diuisis, syluestris melāthij modo. Flores edit purpureos corniculatosq̃ue, corniculis ipsis sursum spectantibus, semen fert melanthio simile in paruis corniculis, siliquisvè conclusum.

LOCVS.

Matt. Nascitur plurimum in cāpis inter segetes.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem. Auxiliatur oculorum. Epiphoris, inflammationibusq̃; per se recens admotum, & eorundē tumoribus ex melle. Datur quoq̃; ictericis vtiliter illico à balneo, & ex dulci vino ad vrinæ ardores, calculos eiicit, vulnera recentia glutinat, & vlcera sanat.



AMMI Græcis, *ἀμμή*.] Arabibus, *Hanochach*, *Anāzaue*, *Nacachau*, seu *Nacachaue*.] Officinis, *Ameos*.] Italis, *Ammi*.] Hispanis, *Ammi*.] Germanis, *Amei*.

A M M I.



F O R M A.

Caulem emittit scæniculacæum, *Matt.*
foliis agrestis pastinacæ, se-
mine in umbellis exili, & cu-
mino minutiore, Origanum
resipiente, odoratum, & acu-
tum.

L O C V S.

Nascitur in monte Gargano, *Idem*
quod Italum est; quod vero
peregrinum ex Alexādria ap-
portatur, Arabicum est.

Q U A L I T A T E S.

Maxime est vtile, facultatis est *Gale. 6.*
excalfactoriæ, & desiccatoriæ, *fimp. me.*
tenuium partium, gustu sub-
amaro, & acri. & clarum est,
quod & digerat, & vrinam
moueat, fuerit autē in calefa-
ciendo, desiccandoq; ex ordi-
ne tertio intenso.

V I R E S.

Semen facit ad tormina, vrinæ *Diosc.*
difficultatem, serpentiū ictus,
si cum vino bibatur. Menses
prouocat. Miscetur deroden-
tibus cantharidum medica-
mentis, vt inde exortis vrinæ
difficultatibus resistat. Suggil-
lata cum melle tollit. colo-
rem potu aut illicitu mutat in
pallorem. Suffitu cum vua pas-
sa aut resina vuluas purgat.
Quod ex Alexandria Ægy- *Matt.*
pti ad nos confertur, steriles
prolificas reddit, si à purgato

prius corpore, sumatur tritum in puluere drachmæ pondere diebus aliquot conti-
nuis mane ex vino meraco, aut carniū iure.

C E N S V R A.

Rarò admodum legitimum Ammi in myropoliis habetur.

CORIANDRUM, Græcis, κόριον ἢ κορίαννον.] Mauritanis, Rusbor, Rusler, Kuzbara, seu Kuzibara.] Ita. Coriandro seu Coriandolo.] Germ. Coriander, seu Coleander.] Hisp. Culantro, seu Ciliandro.] Gallis, Coriandre.

CORIANDRUM.

FORMA.

Matt. Tenui prouenit caule, sesquicubitali longitudine, ramis numerosis, foliis inferne parthenio proximis. quæ verò in caulibus habentur & tenuiora sunt, & magis diuisa, flores in caulium summitatibus cædunt, è quibus racematim oritur semen rotundum, ac striatum. Planta virescens grauius spirat foetido cimicum odore. At semen siccum exuta grauecolètia odoratum euadit, & ad multa utile.

LOCVS.

Matt. Nascitur sponte in campis, & inter segetes, feriturque in campis, & hortis.

QUALITATES.

Gale 8. sim. med. Ex contrariis componitur facultatibus, plurimum habens essentia amaræ, quæ tenuium partium est & terrena, nec parum etiam humiditatis aquæ obtinet, quæ tepentis est facultatis. Habet autem & adstrictionis paucillum.

Diosc. ¶ Dioscorides tamen frigida facultatis Coriandrum existimat, cui suffragatur Auicenna, Archigenes, & Rufus.

VIRE S.

Diosc. Illitum cum pane, & polenta, ignibus sacris, & vlceribus, quæ serpūt medetur. Epynictidas cum melle, & vna passa testium inflammationes, carbunculosque sanat cum faba fresa, strumas, & tubercula discutit, sumptum mentem non sine periculo mouet, quare continuo, & copiosiore vsu abstinendum. succus cum cerusa, argentiisque spuma ex rosaceo, & aceto illitus ardentes summæ cutis inflammationes emendat. ¶ Semen datur cochlearij mensura vtiliter ad acidus ructus, stomachum corroborat, & caput. defluxionibus ventris accominodè administratur; concoctionem cibi adiuuat. Tritum recentibusque carnibus aspersum prohibet ne tam cito æstatis tempore putrescant. Ex aqua autem potum celiacos, & disentericos inuat.



HIERACIVM, Gręcis, Ιεράκιον.] Italis, Hieracio.

H I E R A C I V M .



G E N E R A .

Duo Hieracij recensentur *Diosc.*
genera, maius, & mi-
nus.

F O R M A M A I O R I S .

Magnum caulem emittit, *Idem*
asperum, subrubrū, spi-
nosum, cauum, folia ex
interuallis rariusculè di-
uisa per ambitū soncho
similia, luteos flores in
oblōgis capitulis. ¶ *Matt.*
Vni-
ca nititur radice, recta,
lacteō succo pregnante.
in summa herba est la-
etucę sylvestri similis.

L O C V S .

Nascitur in campestribus, *Matt.*
& collibus incultis lo-
cis, & aliquando inter
segetes.

Q U A L I T A T E S .

Vim refrigerandi habet, & *Diosc.*
modicè substringendi.

V I R E S .

Stomacho æstuanti, inflā- *Diosc.*
mationibusq; illitū pro-
dest. Succus epotus ven-
triculi erosiones miti-

gat. Herba cum radice illita vibratis à scorpione ictibus auxiliatur.
¶ Succus cum lacte mulierum sanat omnia oculorū vitia, ad id edo- *Plin.*
ctis ab accipitre medicis. aiunt enim eos herbam pede scalpere, &
emanantem lachrymam in oculos transferre ad nubeculas abstergē-
das. Idem in posca potus aluum citat. In vino vero medetur serpen-
tium ictibus. vrinę difficultatibus succurrit haustus.

HIERACIUM minus, Græcis, *Ιεράνιον*.] Italis, *Hieracio minore*.

FORMA.

Matt. *diosc.* Herba Cichorio ferè similis est, sed asperiora ei folia sunt, cauliculi tenués, virentes, subasperi, in quorum cacumine flores exeunt lutei cichoreæ figura, qui matureicētes in pappos euadunt. Radix illi multifida tenuisque.

LOCVS.

Matt. Nascitur in pratis in campestribus secus itinera, locisque incultis.

QUALITATES.

ET VIRES.

Vim suam ad eadē ad quā superior impendit.

HIERACIUM MINVS.



APIVM Græcis, Σελίνον κητῶνον.] Arabibus, *Charfs*, *Charfi*, seu *Cheres*.]
 Italis, *Petrosemolo*, sed *Thuscis* *Pitrosello*.] Germ. *Petersilen*, seu *Peterlin*.] Hispanis, *Perexil*.] Gallis, *Persil de Jardin*.

APIVM HORTENSE.**FORMA HORTENSIS.**

Notissima planta vulgare nostrū *Matt.*
 Petroselinum est. exit enim fo-
 liis Coriandri amulis complu-
 ribus ex vno ramulo procedun-
 tibus per ambitum frequenter
 laciniatis, sed quæ in caule sunt
 mutata forma, longa angustaq;
 spectantur. Flores habet exi-
 guos candicantes, & semen A-
 niso simile. Radice nititur digi-
 tali, dodrantali longitudine,
 albicante, dura intus matrice,
 raro diuaricata, quæ carniū
 iuribus passim incoquitur.

LOCVS.

Seritur ubiq; ab olitoribus passim *Idem*
 in hortis.

QUALITATES.

Vsq; adeo calidum est, vt urinā, *Gal. 8.*
 & menses cieat. Flatus quoq; *simp. me.*
 discutit, & magis semen quā
 herba ipsa.

VIRE.

Illinitur cum pane, aut hordea- *Diosc.*
 cea farina vtiliter oculorum
 inflammationibus, æstuantem
 stomachum mulcet. Mamma-
 rum duritiam ex lacte concre-
 to contractam reprimit: urinā
 ciet, siue crudum, siue coctum
 edatur. Foliorum, & radicum
 decoctum venenorū noxæ resi-
 stit, cum vomitiones excitet: al-
 uum cohibet. Semen vehemen-

tius urinam pellit. Auxiliatur contra serpentium venena, aut epotam argenti spumā.
 Inflationes discutit. Admiscetur medicamentis quæ dolorum leuamenta præstant.
 Thoracis quoque & tussis remediis. ¶ Folia concisa, & cum vino, & oleo de scorpio-
 nibus in patella feruefacta, pubiq; calida admota remorantem urinam cient.

Matt.

APIUM palustre, Græcis, Ελεοσέλινον.] Mauritanis, *Asaris*.] Italis, *Apio*, & *Apio aquatico*.] Germanis, *Epffech*, seu *Eppich*.] Hispanis, *Pere-xil dagea*, & *Apio*.] Gallis, *Persil de leau*.

APIUM PALUSTRE.

F O R M A .

Matt. Folia gerit hortensis maiora, solidioraque; caulem quoque vegetiorem, odore etiam acutiore, grauiorevè, & qui caput feriat. Radice tamen, floribus, & semine ferè similibus.

L O C U S .

Idem Prouenit palustribus, & vliginosis locis, & feritur quoque in hortis.

F A C U L T A T E S ,
E T V I R E S .


Diosc. Eædem illi sunt vires quæ hortensi inesse diximus.



PETROSELINUM Macedonicum, Græcis, Πετροσέλινον.] Italis, Petrose-
lino Macedonico.] Hetruscis, Pitrosello Macedonico.

Petroselinum aus Macedonia

PETROSELINUM MACEDONICUM.



FORMA.

Planta est ramosa, vulga prosc.
ri petroselino foliis *Matt.*
proxima, caule crasso,
frequentibus alarum
cauitatibus; floribus
albis, semine ammi si-
mile, odoratiore, sapo-
re acri, & amaro, aro-
ma olente.

LOCVS.

Prouenit optimū in Ma- *Gale. 8.*
cedonia in præruptis *simp. me.*
locis. Nascitur & in *& lib. 1.*
Epiro, & Cycladibus *de Anti.*
insulis, serit etiam nunc *Matt.*
in hortis in Italia.

QUALITATES.

Semen maximè vsui est, *Gal. 8.*
cū tota etiā herba, *simp. me.*
vnā cum radice simi-
lem, sed imbecilliorē
facultatem sortiatur.
Est autem vt gustu a-
cre cū amaritudine,
sic & in operibus cali-
dum, vnā cum incidē-
di effectu. Fuerit itaq;
ipsum tertij ordinis

tum calfacientium, tum exiccantium.

VIRE.

Semen vrinam cit, & menstrua. Prodest contra stomachi, & coli in- *DIOSC.*
flationes. Laterum, Renum, & vesicæ doloribus in potu subuenit.
admiscetur antidotis vrinam cientibus & in theriacis.

Leuisticum vulgare, Græcis, *ἵπποσέλινον*.] Italis, *Leuistico*.] Germanis, *Liebstockel*.] Gallis, *Ache*, & *Achelarge*.

LEVISTICVM VVLGARE, SEV
HIPPOSELINVM.

FORMA.

Matt. Caulibus exit crassis bicubitalibus, fruticosisq; ramis multis, multisq; alarum cavitatibus, foliis palustris apij, sed longè maioribus, muscariis in cacumine grandioribus, albis refertis floribus, semine oblongo feniculi maiore, tota planta grauitè olet.

LOCVS.

Idem Seritur in hortis.

QUALITATES.

Idem Excalfacit, & siccatur ordine tertio. quo fit, ut aperire, incidere, digerere, & prouocare valenter possit: perinde ac cetera selinorum genera.

VIRES.

Idem Ea omnia præstare valet, quæ de palustri apio dicta sunt: sed eo imbecillius est.

APPENDIX.

Idem Tametsi vulgare *Leuisticum* *Hipposelinum* legitimum non sit, quod coma, & semine illi non respondeat, cum tamen ceteris selinis grandius sit, & tota facie simile, nemo nobis facessere debet, si hanc plantam *Hipposelinum* appellauimus.



SMYRNIVM, Græcis, Σμύρις.] Latinis, *Olus atrum*.] Arab. *Smirnon*.]
 Italis, *Smirnio*, seu *Macerone*.] Hisp. *Apio Macedonico*.] Gall. *Maceron*.

SMYRNIVM.



FORMA.

Caulem habet, & stolones. Diosc.
 multos; folia latiora, sub
 pingua, robusta, ad terrā
 infracta, odore medicato,
 cū quadā acrimonia iucū
 do. colore in luteū lāgue
 scēte. capitibus caulū or-
 biculatis vt anethi. semine
 brassicę rotūdo, nigro,
 acri, myrrhę sapore, ita vt
 alterum alterius loco ce-
 dat. Radix quoque odo-
 rata, gustu acri, fauces
 mordet, succosa, mollis.
 cortex eius foris niger, in-
 tus viridis, aut subalbi-
 dus. LOCVS.

Nascit̃ i saxosis, & collibus, Idem
 atq; squallidis, & limitib⁹, Matt.
 terrenis. Ac etiā i hortis se-
 ritur. QUALITATES.

Ex eodē genere & ipsum cū
 apio est, & petroselinū: fue Gal. 8.
 ritq; apio calidi⁹, petroseli simp. ms.
 no vero imbecillius; cali-
 dū, siccūque tertio ordine.

VIRE.

Foliis i muria maceratis ad Diosc.

obsonia vtuntur, aluū sistunt. Radix pota præstat aduersus serpentium
 ictus, tusses, & Orthopneas mitigat, vrine difficultati medetur: illita re-
 cens tumores, collectiones duritiasq; discutit. vulnera ad cicatricē per-
 ducit. partus abortu vitiat, si feruesfacta subiiciatur. semen lienis, renū,
 & vesicę vitiis prodest. Menses, & secūdas pellit. Commodè dat Ischia-
 dicis in vino. Inflationes stomachi lenit, sudores ciet, & ructus. Pec-
 liariter datur hydropicis in potu, & contra febrium circuitus.

SMYRNIVM Creticum, Italis, Smyrnio di Candia.

Sem. pinnatifidum

SMYRNIVM CRETICVM.

FORMA.

Matt. Folia fert nostrate Smyr-
nio crassiora, quina
ab vno pediculo exeū-
tia, & per ambitū ser-
rata, præter quàm in
altera parte propè pe-
diculum, quo in lo-
co succisa spectantur.
Longè autem diuersa
habentur, quæ in cau-
le sunt. Ea. n. rotun-
da visuntur, caulibus
per medium transeū-
tibus perfoliatę voca-
tę modo. nullis in am-
bitu denticulis. Cau-
lem edit firmū, stria-
tū, & subter folia ge-
niculatū. Umbellas in
summis caulibus ge-
rit, floribus albicanti-
bus, semine rotūdo,
anguloso, & in acu-
tum desinente, sapo-
re acuto, & amariū-
sculo. Radicem hactē-
nus videre nō licuit.



LOCVS.

Idem Nascitur in Creta Insula, & scribitur nunc in Italia.

QUALITATES, ET VIRES.

Idem Non differt suis in qualitatibus, & viribus ab Italico Smyrnio.

IMPERATORIA, Italis, *Imperatoria*.] Germanis, *Maſter vurtz*.] Officinis Germanorum, *Magiſtrantia*.] Gallis, *Otruche, ſeu Imperatorie*.

IMPERATORIA.



F O R M A.

Foliis exit Sphondylii, minori-
bus tamē, ſolo accubantibus,
robustis, hirsutis, alijsq; :
caule bicubitali, purpureſcē-
te, rotūdo, hirsutoq; , in cu-
jus cacumine umbella flori-
bus candidis ornatur, è qui-
bus poſtea ſemen prodit acu-
tum, ac odoratū. Radix ineſt
ei nō longa, mediocriter craſ-
ſa, rugoſa, dura, quę ſoris ni-
gricat, intus verò viſciſcit, gu-
ſtu admodum acri, mordax,
ſubamara, & odorata.

Matt.

L O C V S.

Nascitur in altis montibus.

Idem

Q U A L I T A T E S.

Excalfacit ordine tertio com-
pleto, aut quarto inchoante.
Incidit, trahit, aperit, dige-
rit, attenuat, prouocat, reſol-
uit, venena diſſipat. Zedo-
arięque facultatibus pollet.

Idem

V I R E S.

Diſcutit mirificè tum intelli-
norum, tum ventriculi fla-
tur. Cit menſes, atque vrinā.
Fouentur eius decocto vtili-
ter in dolore dentes, præſer-
tim ſi in vino aſtero radix
decoquatur. Eadem ex vino
pota vteri ſtrangulationibus
prodeſt, conceptus adiuvat,
quos frigidityas intercipit, cō-
coctionem roborat. Commā

Idem

ducata cerebri pituitam trahit. Pulvis radicis ex ſaluix decocto hauſtus, auxilia-
tur reſolutis, comitialibus veternoſis, conuulſisq; . Oris halitum commendat,
& omnes roborat ſentus, Præſtat ferè ad venena omnia, omniumq; venenoſarū
ferarum morſus, ac ictus. Aſthmaticos, anhelos q; iuuat, obſtructiones aperit.
Hydropicos, ac lienosos curat. In ſumma excalfacit vniuerſas corporis partes,
quas frigus occupat.

ELAPHOBOSCVM, Græcis, ἐλαφύβοσκον.] Italis, *Elaphobosco*.

ELAPHOBOSCVM.

F O R M A.

Diosc. Ferulaceum mittit caulē, aut rorimarino similē, geniculatū, foliis duū digitorum lōgitudine, vt terebinthi, prælongis, aliquantū asperis, circumfractisque. Adnata multa habet feren tia umbellas, anethi similes, & semen eiusdē; florem subluteum. Radiceternum digitorum longitudinis, & crassitudinis vnus, cādida, dulci esui apta.

L O C V S.

Matth. Prouenit in montibus, & collibus.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 6. simp. me. Facultatis est calidæ, & tenuium partium, & proinde exiccat secundo excessu.



V I R E S.

Diosc. Semen datur ex vino contra serpentium ictum. Fama est hoc pabulo ceruos serpentium moribus resistere.

FOENICVLVM, Græcis, *Μάραθρον*.] Arabibus, *Raienigi*.] Italis, *Finocchio*.]
Germanis, *Fénichel*.] Hispanis, *Hinoio*, *sive Funco*.] Gallis, *Fenoil*.

F O E N I C V L V M .

F O R M A .



Caulē edit anethi, sed cras- *Matt.*
siorē, nec p̄riorē, striatū,
geniculatūq; foliis nume-
rosis, capillaceis, cauis ala-
rū multis. Umbellis cacu-
mina occupātibus, anethi
emulis, melinis florib⁹, &
semine oblōgo, gustu acu-
to, quadam cū leuiuscula
amaritudine, odorato. In
quodā verò genere hortis
Italicis familiare, semē dul-
ce p̄cipit, & crassiori quo-
que mole spectat. Radice
nitit lōga, digitali crassitu-
dine, acuto, ac amariuscū-
lo sapore, cum dulcedine
quadā. L O C V S.

Seritur in hortis, vineis, & *Idem*
apricis locis.

Q V A L I T A T E S .

Tā valenter excalfacit, vt ex *Gale. 7.*
tertio excalfacientū ordi- *simp. ms.*
ne censerī possit, desiccatur
verò non equè. Sed ipsum
quispiā in hoc primi esse
ordinis posuerit: sylvestris
verò cū semē, tū radix, valē-
tius calefacit, & siccatur.

V I R E S .

Herba deuorata, aut semē cū Prisāna potū māmas lacte replet. comē de- *Diose.*
coctū in renū doloribus infusum p̄dest. Bibit ex vino 3 serpētū ictus.
Mēses ciēt, p̄trite radices, & cū melle illitē canū morsibus medentur:
Succus cauliū, & foliorū p̄stat instillatū ad excitādā oculorū aciē.
Erratici autē potē stranguriē medentur. Menses suppōsitē ciēt, aluum
sistūt. Radice, aut semine poto calculos cōminuit, regiū morbū expur-
gat, lactis abūdantiā facit. Decoctū foliorū haustū puerperas purgat,

DAUCUM, Græcis, Δαῦκον.] Mauritanis, *Ducu Glezar, sine Gezar.*] Italis, *Dauco.*] Germanis, *Ber vurtz.*] Hispanis, *Dauco.*] Gallis, *Carotte sauvages.*

DAUCUM.

G E N E R A.

DIOSC. Trium est generum, Creticū, Aliud Apio simile, & Tertium Coriandro.

F O R M A C R E T I C I.

DIOSC. Creticum foliis est fœniculo simile, minoribus tamē, & tenuioribus, caule dodrantali, umbella coriandri, flore albo, candido, hirsuto, suauissimi manducando odoris. Radix digitali crassitudine, & dodrantali longitudine adolescit.

Matt.

L O C U S.

DIOSC. In saxosis nascitur, & locis sole illustratis.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 6.
simp. me.

Agrestis quidem domestico minus est esui idoneus. Cæterum in omnibus vehementior. At domesticus comestibilis quidem sed imbecillior. Acrem & calefaciendi facultatem obtinet, ac proinde etiam extenuandi. Certè radix præter iam comprehensa flatuosum quiddam obtinet, ac venereum. Id quod Domestici quoque semen præstare potest.

V I R E S.

DIOSC.

Creticū omnium probatissimum, Semen omniū potū vrinas, & menses, atque partus extrahit. Torminibus liberat, veterem tussim mitigat. Ex vino potum auxiliatur Phalangiorum ictibus, tumores illi discutit, cretici peculiariter radix maximè præstat contra venenatorum ictus ex vino pota.



DAUCUM alterum, Græcis, Δαῦλον ἑτέρον.] Italis, *Dauco d'altra specie.*

Quis anders Bursero

DAUCUM ALTERUM.

FORMA.

Foliis est coriandri, floribus in umbella albis, capite, & semine anethi, muscario pastinacæ, semine oblongo ceu cumini, acri. Radice pastinacæ sylvestris, superiore parte villosa.

LOCVS.

Nascitur in maritimis, *Matt.* promontoriis, & montibus, & collibus.

QUALITATES.
ET VIRES.

Viribus iisdem refertus *Gal.* est, quibus, & creticū, *Diosc.* sed non adeo efficacibus.



SENA, posterioribus Græcis, Σέρα.] Arabibus, *Sene*.] Italīs, *Sena*.] Germanis, *Sene*.] Hisp. *Sen de Alexandria*.] Gallis, *Sene de Levant*.
Sunt *Sen* *Sena*.

F O R M A .

Matt. Foliis est Glycyrrhizæ proximis, crassis, subpinguibus, fabarum recentium sapore, caule cubitali, à quo ramuli exeunt flexiles. Flores ei emicant aurei, veluti brassicæ, purpureis interculsantib⁹ venulis, quibus succedunt folliculi falcati, adeoque sui natura cōpressi, vt superior membrana inferiori cohæreat, in quibus semen cōtinetur subuirescens, vinaceorū nucleis simile. Folliculi è ramusculis prominēt tenni pediculo nitescentes. Planta est frigoris impatiens.

L O C V S .

Idem Seritur in Hetruria in agro præsertim Florentino in cāpis, sed valentior ex Alexandria Ægypti ad nos conuehitur.

Q V A L I T A T E S .

Idem Aperit, aluum citat, digerit, cōcoquit, excalfacit, attenuat.

V I R E S .

Idem Educit bilem tum atram, tum flauam, ac etiā pituitā, quod sanè experientia comprobatur. Mundat cerebrum, iecur, lienem, pulmonem, atq; omnes corporis sensus, viscerū obstructions aperit. Auget iuuentutē, seniumq; retardat, & animum hilarem facit.

Matt. folia in capitis perfusionibus vtiliter decoquuntur, addita præsertim Anthemide. Roborat. n. hoc modo cerebrum, nervos, oculorum aciem, & auditoriam facultatē. Optima demū in vniuersum est Medicina morbis omnibus diuturnis, & melancholicis. Ideoque deliriis, amentia, resolutioni nervorum, phthias, cephalalgia, scabiei, pustulis, pruritu, & Epilepsia. Cor etiā roborat præsertim vbi eis cōmiscetur medicamentis, quæ ad cordis affectus sunt idonea. ¶ Est præterea Sena clemens, & nullius incommodi medicamentum, adeo vt tuto dari possit cum pueris ætate tenellis, tum etiam vtero gerentibus. Fit ex foliis vinum vindemiæ tempore, quod ea omnia præstat potum.



COLLUTEA, Græcis, Κολλουτέα.] Italis, Collutea.

COLLUTEA.

FORMA.

Arbor est magnitudine præ Teoph.
stās, fructum in Siliqua L3...19
ferens magnitudine len-
tis, quo oves mirum im-
modum pinguescunt;
Folium habet non ab-
simile fœnogræco.

LOCVS.

Nascitur plurima sponte Matt.
in Ananensium, & Tri-
dentinorum agro.

QUALITATES,
ET VIRES.

Semen potum vomitiones Idem
ciet, perinde ac genista,
& alium quoque citat,
non sine incommodo ta-
men, quanquam pecu-
dibus nihil tale efficiat.

Pyrethrum, Græcis, Πύρεθρον.] Arabibus, Macharcaraba, seu Hachar-
chiron.] Italis, Piretro.] Germanis, Bertram.] Hispanis, Pelure.]
Gallis, Pyrethre.]

PYRETHRUM VERUM.

FORMA.

Diosc. Folia caulemq; mittit per
inde ac sylvestre daucū
& feniculum, umbellā
anethi circinnatæ rotū-
ditatis. Radicem lon-
gam pollicis crassitudi-
ne, feruidissimo gustu.

LOCVS.


Matt. Prouenit in montibus.

QUALITATES.

Gal. 8. Pyrethri radice potissimè
vrimur, causticam, vren-
temve facultatem obti-
nente, qua utique den-
tium refrigeratorū do-
lores lenit, & ad rigores ante periodos ex
oleo confricatur.

VIRES.

Diosc. Mansa pituitā elicit, ideo
in dentium dolore co-
cta in aceto, & colluto
inde ore auxiliatur. sudores ciet peruncta ex oleo corpori, diutur-
nis horroribus efficax est, stupidis quoque ac resolutis mirifice
confert.



PYRETHRUM alterum, seu Pseudo Pyrethrum. Italis, *Piretro secondo*,
sive Piretro falso. *Lin. undec. prostratum*

PYRETHRUM ALTERUM.

F O R M A.

Folia fert Libanotidis, seu *Matt.*
 Anthemidis crassiora,
 caulem ramosum, folio
 sumque, florem maio-
 ris Bellis grandiore,
 colore intus aureo, &
 per ambitum candido,
 Radicem pollice cras-
 siorem, multifidamq;.

L O C U S.

Nascitur in Boemiæ mon *Idem*
 tibus, ac etiam inibi
 in hortis seritur.

Q U A L I T A T E S.

Radix vrentis est faculta- *Idem*
 tis, quadam cum leui-
 cula amaritudine. Ideo
 que fuerit ex quarto ex
 calfacientium ordine.

V I R E S.

Et si viribus videatur al- *Idem*
 tero infirmioribus, po-
 test tamen eius vicem
 commodè explere.



ROSMARINVM, Græcis, *Λιβανωτός.*] Mauritanis, *Xaier almeriem, Al-pinalfach, seu Cachola.*] Italis, *Rosmarino.*

G E N E R A .

Diosc. Duo eius habentur genera, vnū
fecundum, quod duplex est,
alterum sterile.

F O R M A .

Diosc. Folia habet sceniculi, crassiora,
& latiora in rotæ speciem hu-
mi sparsa, iucundè olentia,
caulē cubitalem aut maiore,
multis concavum alis. In ca-
cumine umbellam in qua se-
men copiosum, candidum,
Sphondylion simile, acre, resi-
naceum, & quod in manden-
do linguam exurit. Radix
Thus redolet, candida, præ-
grandis. Alterū omnino cōfi-
mile. Semen ferens latum ni-
grū, vti Sphondylion, odora-
tū minimè exurēs. Radice so-
ris nigra, intus si frangatur al-
ba. Quod autem Sterile dici-
tur, illorum planè similitudi-
nē refert, sed neq; caulē, neq;
florem neque semen profert.

L O C V S .

Diosc. Nascitur in saxosis, & asperis.

Q U A L I T A T E S .

Gal. 8. Omnes eiusdē sunt facultatis,
emollientis, & digerentis, ab-
stergentis, & incidentis.

V I R E S .

Diosc. Trita omnium herba cōmuniter
hemorrhoidū p̄fluvia sistit.
sedis inflāmationes, & condy-
lomata mitigat. Concoquit
strumas, & abscessus, qui ad
maturationē egrè perducuntur. Siccæ radices cū melle vlcera purgant: cū vino po-
tæ torminibus medētur, & serpentium moribus opē ferunt. Urinas cient, & mēses.
Veteres tumores illitu discutunt. Succus cum herbæ, tum etiam radicis, ex melle
illitus oculos exacuit. Idē præstat epotum semen. Valet ad comitiales, diuturnaq;
pectoris vitia. Datur commodè Ictericis cū vino, & pipere. Sudores mouet ex oleo
perunētum. Illinitur podagris cum aceto, & Loliacea farina, Vitiliginis purgat,
addito quam acerrimo aceto. Semine secundi generis vtendo, nam primi quod
cachrym appellant, sua acrimonia arteriam exasperat.

ROSMARINVM.



ROSMARINVM coronarium, Græcis, *Αιβαντὶς σεφαναμντικὴ*.] Arabi-
bus, *Elkialgeber*.] Italis, *Rosmarino coronario*.] Hetruscis, *Ramerino*.]
Germanis, *Rosmarin*.] Hispanis, *Romero*.] Gallis, *Rosmarin*.

ROSMARINVM CORONARIVM.

FORMA.

Rosmarino, quo coronarij vtū- **DIOSC.**
tur, ramos mittit tenues, &
circa eos folia oblonga, an-
gusta, densa, subter incana,
supernè virentia, & odorata.
¶ Floret bis in anno, vere vi- **Matt.**
delicet, & Autumno, flori-
bus odoratis, in purpura al-
bicantibus.

LOCVS.

Nascitur sponte nōnullis in re **Matt.**
gionibus, vt pote in prouin-
cia Narbonēsi, & seritur pas-
sim in hortis, & viridariis.

QUALITATES.

Excalfacit, attenuat, digerit, re- **Idem**
soluit, aperit, roborat, inci-
dit, abstergit.

VIRES.

Ictericos sanat, si decoctū eius **DIOSC.**
ante exercitationes bibatur.
¶ Prodest ad frigidos ventri- **Matt.**
culi affectus, ad cœliacas pas-
siones, & vomitum cibi, si
cū pane deuoretur, aut sicci
pulis ex vino meraco biba-
tur. Prodest tum lienosis, tū
Iocinerosis, non solum enim
vasorum infarctus expedit,
sed sua adstringenti vi etiam
roborat. Valet ad capitis de-
fluxiones, ac etiam ad eius
frigidos morbos nempe ad
comitiales, stupidos, veterno

fos, resolutosque. Additur vtiliter in capitis lotionibus, & articulorum fomentis.
Cohibet alba vteri profluua diutius sumptum, visum acuit, si eius folia, & flores
cum pane, & sale dum floret quotidie edantur. Mansum oris halitum commēdat.
Sistit gingiuarum, & dentium fluxione, in aceto, & vino austerō feruefactum, vbi
hoc decocto calido os colluatur. Sicci farina inspersa, vulnera glutinat, quę prius
vino, in quo decoctum fuerit, fuerint elota. Parantur è virgis dentiscalpia, & car-
bones ad picturas delineandas. Flores saccharo asseruati valent ad omnia prædi-
cta. Præstat etiam admodum in obsoniorum vsu.

ROSMARINVM sylvestre, Italis, *Rosmarino saluatico*.

ROSMARINVM SYLVESTRE.

FORMA.

Matt. Crescit hæc planta cubitali altitudine, fruticosa, virgis tenuibus, lignosis, rufescentibus, fragili tamen materie. Folia in his erumpunt numerosa, coronarij rorisinariemula. prona parte viridia, supina verò rufescentia, rubroque nitentia pediculo. In furcalorum summitatibus corymbacea coma visitur rubro colore, è qua flores prodeunt sublutei. Radice est infirma, & supervacua, plantata est odorata.

LOCVS.

Idem Nasцитur in Boemia, & Polonia vlginosis locis.

QUALITATES.

Idem Excalfacit, attenuat, aperit, roborat, cōcoquit, resoluit, incidit, & digerit.

VIRES.

Idem Præfertur Boemis contra tineas, & blattas, quæ vestes lacerant, quare iis interponunt. Sed ad ea omnia efficax est ad quæ coronarium Rosmarinum præstare diximus, præterquàm ad ciborum condimenta.



SPHONDYLIVM, Græcis, Σφονδύλιον.] Italis, *Sfondilio*.

SPHONDYLIVM.

FORMA.

Folia quadamtenus platanifolia, & panacis habet, caules fœniculaceos, cubitales, aut maiores, in quorum cacumine semen duplex, seseli simile, sed latius, cãdidius, & magis paleaceũ, grauis odoris, flores eius albi, aut pallentes. Radice Raphani candida.

LOCVS.

Nascitur in palustribus, *Idem* & aquosis.

QUALITATES.

Semen acre est, & siccan- *Gale. 8.* tis facultatis, & radix *sim. med.* nimirum similis est.

VIRES.

Epotum semen pituitam *diosc.* per aluũ extrahit. Medetur iocinoris vitiis, regio morbo, comitialibus, orthopnoicis, vteri strangulationibus,

& verernosos suffitu reuocat. Infunditur commodè cum oleo capitibus lethargicorum. Item capitis doloribus, cum ruta illitum serpentina vlcera cohibet. Radix eadem præstat: peculiariter autem circũrassa & iniecta callos fistularum derodit. Recentium florum succus infunditur purulentis auribus.



FERULA, Græcis, Νάρθηξ.] Ital. *Ferola*.] Hisp. *Cananheia*] Gall. *Ferule*.

F O R M A .

Theoph.
i. 6. c. 2.
de histo.
plant.

Ferula grandis admodum surgit, vnico tantū caule ac geniculato, folia, & cauliculi quidam erumpunt, ac alternatim exeunt folia, quæ grandia, mollia, multifida sunt, adeo vt capillamēti modò ferè spectētur, præsertim, quæ terræ proxima sunt. Flos melinus, semē obscurū, anetho simile sed maius. Finditur cacumine, & in stipes haud magnos disperditur, quibus flos, semenq; insidet. Annuo caule cōstat. Radice altè descēdit, eadēq; singulari innitit. **LOCVS.**

Att. Æstuosis nascit̃ locis, quare Apuliæ solum maximè ferularum est ferax.

Q V A L I T A T E S .

Gale. 8. Ferulę semen excalfacit, & attenuat. At interna eius pars recens adhuc, quā medullā vocāt adstringenti pollet facultate.

DIOSC. E viridi caule medulla pota valet ad cruentas excretiones. Datur ex vino contra viperarum morsus. Erumpentem è naribus sanguinē indita sistit. Semen potū torminosi auxiliatur, sudores ciet vncto ex oleo corpore. Caules si edantur capitis dolores faciūt. ¶ Asinis gratissima sunt in pabulo ferulę, ceteris verò iumētis presentaneo veneno. Murenis infestissima ferula est, tactæ siquidem ea moriuntur.

Plin.

F E R V L A .



V I R E S .

PEVCEDANVM, Græcis, Πευκέδαρος.] Arab. *Herbatum*.] Italis, *Peucedano*.

PEVCEDANVM.

garwang

FORMA.

Caulē emittit tenuē, gracilē, comam habet statim à terra copiosam, spissamque, flore luteo. Radice nigra, crassa, succosa, graui odore.

LOCVS.


Prouenit in montibus. *Matt.*

QUALITATES.

Peucedani radice quidem maximè, sed & succo, & liquore vtimur. Sunt enim hæc oīa eiusdē specie facultatis, sed valentior succus admodum excalfaciēs, & digerēs; incidit quoque, & extenuat. *Gale. 8. simp. me.*

VIRES.

Ex aceto, & rosaceo illitū veteriosis, phreneticis, comitialib⁹, & diuturnis capitis dolorib⁹, resolutis, ischiadicis, conuulsis & oībus in vniuersum neruorū vitiis ex oleo, & aceto illitū pdest, eius olfactu respirāt vuluē strangula-



rus, & veteriosi reuocātur. Incēsum serpentes abigit. Auriū doloribus conuenienter ex rosaceo instillatur. Dentiū dolorē mulcet eorū cauis inditū. contra tussim efficacissimè ex ovo assumitur, suspiriis, torminibus, & inflationibus subuenit. Ventrē leuiter emollit. Lienē absomit, difficiles partus mirè adiuuat. Facit ad vesicę cruciatus, & renū distentiones potum, vuluam aperit. Radix ad eadem vtilis est, sed inefficacior. Farina eius sordida vlcera purgat, & vetera cicatrice obducit, squamas ossium detrahit.

MELANTHIVM, siue Git, Græcis, Μελάνθιον.] Mauritanis, Xamin, Sunis, seu Sunizi.] Italis. Melanthio, seu Niella.] Germanis, Schuuartz roenusch, siue Schuuartz coriander.] Hispanis, Neguilla, & Alipiure. Gallis, Barbue poyurette, siue Nielle.] Officinis, Nigella.

MELANTHIVM SATIVVM

G E N E R A .

Matt. Duum est generum, sativum, & sylvestre, quod duorum pariter generum est.

F O R M A S A T I V I .

Diosc. Surculis exit exilibus, cubitalibus, foliis Senecionis, sed magis diuisis. ¶ Floribus in cacumine ceruleis, & in stellæ modum radiantibus, è quibus capitula oriuntur parua, oblonga, pluribus coronata apicibus in internam partem reflexis, intercurrentibus intus membranis, vt in papaueris capitibus. Semen intus continetur paruum, nigrum, & quandoque subflauum, odore eximio, sapore amariuscule, si mul & acuto.

L O C V S .

Idem. Seritur in hortis.

Q U A L I T A T E S .

Gal. 7. Excalfacit, atq; desiccet ordine tertio, videtur etiam tenuium esse partium, in summa vbi incisione, extersione, desiccatione, & excalfactione est opus præstantissimum id remedium est.

V I R E S .

Diosc. Illitum fronti capitis doloribus subuenit, discutit recētes oculorum suffusiones, tritum, & naribus infusum, cum aceto illitum lepras, lentigines, duritias, tumoresq; vetustos tollit circumscarificatos clauos excutit, cum vetere vrina impositum, teretes ventris tincas expellit, peruncto ex aqua umbilico. Destillatione laborantes adiuuat tritum in linteo, & olfactum, urinā, & menstrua ciet, multis diebus sumptum, & lac extrahit. Ex vino potum aufert spirandi difficultatem. Incensum serpentes fugat, & phalangiorum ictibus auxiliatur.



MELANTHIUM sylvestre, Græcis, Μελάνθιον ἄγριον.] Italis, Melanthio saluatico, & Niella saluatica. *Wied Radm.*

MELANTHIUM SYLVESTRE.

FORMA.

Foliis exit satiuo tenuioribus, multifidis, & capillaceis, caulibus ferè similibus, quemadmodum & floribus, capitula gerit satiuo maiora, sed facie haud longè dissimilia, semine intus nigro, acuto, amariuscule, & odorato.

LOCVS.

Nascitur in campestribus, *Idem* in incultis præsertim agris.

QUALITATES.

Semen excalfacit, incidit, *Idem* aperit, attenuat, extergit.

VIRES.

Ad omnia efficax habetur, *Idem* perinde ac satium.



MELANTHIUM sylvestre alterum, Italis, *Melanthio saluatico secondo.*

fin. ant. v. 13. p. 307

MELANTHIUM SYLVESTRE ALTERUM.

FORMA.

Matt. Nullis prorsus foliorum, caulium, ac florum notis ab altero differt. Solum itaq; capitula disparia sunt. In hoc enim genere longiora sunt, & in quinque sexve diu-ricata cornibus.

LOCVS.

Idem Nascitur in inculto solo, & in agris.

FACULTATES,
ET VIRES.


Idem Præstat eadem, quæ alterum.



PSEUDO Melanthium, Italis, *Melanthio falso*, *Ruosola*, seu *Gittone*.

foli. ladan

PSEUDO MELANTHIUM.



FORMA.

Caulem edit bicubitalem; *Matt.*
pilosum, in quo vtrin-
que per intervalla bina
exeunt folia oblonga, hir-
sutaque. In cacumine flo-
res exeunt purpurei, ro-
sei que. semen in calyci-
bus oblongis concludi-
tur, nigrum, melanthio
simile, sed amarum, nul-
loq; odore præditum.

LOCVS.

Nascitur in aruis inter se- *Idem*
getes.

FACVLTATES.

Excalfacit, attenuat, aperit, *Idem*
abstergit, & resoluit.

VIREs.

Farina eius melle excepta, *Idem*
& illita, lentigines, al-
phos, & ceteras cutis fe-
ditates extergit, lumbrici-
cos pota interimit, vri-
nam ciet, & menses.

VISCUM, Græcis, Ἰξός, Arabibus, Dabach.] Italis, Vischio, seu Pania.
Germanis, Vogellin seu Mistel.] Hispanis, Visco.] Gallis, Guy.

VISCUM.

FORMA.

Matt. Viscum planta est brevis, ramusculis in crucis modum prodeuntibus, foliis binis in ramusculorū summitatibus vtrinque emergentibus, oblongis linguarum instar, crassis, solidisque, colore submelino. Baccas fert copiosas pisorum magnitudine, albicantes, tenui tunica obductas, substantia intus tenaci, glutinosaq; ac molli, in qua semen est paruum.

LOCVS.


Idem Nascitur tantum in arboribus, nēpe quercu, castanea, Ilice, Pino, pyro, maloq; sylvestri pruno, terebintho, ac fortasse aliis in arboribus, iisq; præferrim in quibus maiores turdi stabulantur. Ex eorum enim fimo Viscum gignitur, quòd baccas eius edant, & semen vna cum stercore ibi relinquant.

QUALITATES.

Gale 6. sim. med. Viscum ex plurima aerea, & aquea calida, paucissima terrena substantia constat, nam acrimonia in eo amaritudinem excellit. Itaq; etiam effectus substantiæ respondent, si quidem valenter ex alto humores extrahit, nec tenues tantum, sed crassiores, eosq; diffundit, ac digerit.

VIRES.

Diosc. Emollit, discutit, extrahit, parotidas, tubercula, ceterasq; collectiones ad maturitatē perducit, cum resina, & pari cera mistū, vetera vlcera, abscessusq; quos cacoethes vocant, ex thure mollit. Lienem cum calce, gagate, aut Asio lapide absumit. Cum Sandaraca, aut Auripigmento illitum vngues extrahit. ¶ Lignum verò caudicis eius, quod in quercu nascitur (vt quidam scribunt) si in puluerem contritum potandum exhibeatur maximum est Epilepticis auxilium. Sed in quadragesimum diē vsq; potandum est. Idem collo suspensum, aut brachio ad alligatum cum suo cortice grauidarum conceptum adiuuat.



A P A R I N E.



Ramis multis, & paruis
fruticat, asperis, qua-
drangulis, per interual
la orbiculato foliorum
ambitu, vt in rubia. flos
albus, semen durū, ro-
tundum, concauum, al-
bum, vmbilici figura,
asperitate, vestiū tenaci.

D I O C.

Nascitur plurimum in agris inter lentes, secus itinera, & propè sepes.

Matt.
Theoph.

Modicè tum abstergit, tū
desiccatur, habetq; non
nihil subtilium partiū.

Gale. 6.
simp.me.

Seminis caulium, & foliorum succus ex vino potus, auxiliatur contra viperarum, & phalangiorum morsus. infusus aurium doloribus

DIOSE.

medetur. Herba cum axungia trita strumas discutit, ea pro colo pasto-
res vtuntur ad eximendos ex lacte pilos.

ALYSSVM, Græcis, Αλυσσον.] Italis, *Alisso*.

ALYSSVM.

F O R M A.

Diosc. Exiguus est frutex, vnicaulis, subasper, rotundis foliis, fructu dupliciū scutorū effigie, in quo est semen quadātenus latum.

L O C V S.


Idem. In mōtibus, & asperis locis emicat.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 6. simp. me. Non solū mirificè iuuat demorfos à cane rabido, sed & rabiēti quoque data sēpè in totū sanauit, atque hoc ex totius similitudine substantiæ effecit. Dictūq; prius est talem facultatem ex sola excipi experientia, & planè nulla constare methodo. Qd̄ si quis ad multa experiatur, cognoscet facultatē habere mediocriter siccificam, & digredientem, cum absterforij non nihil.

V I R E S.

Diosc. Eius decoctum singultū sine febre potu discutit. Idem efficit si quis eā teneat, aut odoretur. Cum melle trita, vitia cutis in facie, & lentigines emendat, contusa in edulio rabiei canis mederi putatur. Domibus appensa salutaris esse creditur. & hominibus, atque brutis fascini amuletum.



VINCETOXICVM, Italis, Vincetossico.

Ver. *Schmalblumige*.

VINCETOXICVM.



F O R M A.

Foliis prouenit Laurinis in ca *Matt.*

cumine acutioribus, virgis compluribus fruticat, exilibus, obsequiosisque, circa quas folia per interualla vtrinque bina spectantur. Flores edit tenues, subalbidosque, è quibus acutæ, tenuesq; proueniunt filique, candica intus lanugine, & semine, vt in nerio. Radicibus nititur numerosis, exilibus, longis, albicantibus, & in girum se diffundentibus mansu subdulcibus, sed inodoris.

L O C V S.

Nascitur in incultis locis, secus itinera, in montibus, & collibus, & saxosis tractib⁹. *Idem.*

Q U A L I T A T E S.

Radices excalfaciunt, & sic cāt ordine primo, digerūt, aperiunt, & resoluunt, atque ex totius similitudine substantiæ venenis resistūt. *Idem.*

V I R E S.

Dantur radices ex vino potāde magno auxilio ad venenosorum animalium ictus, demorsis quoq; à serpentibus, & cane rabido vtiliter præbentur. Bibuntur quoque quotidie aduersus pestilentie contagia. Dantur *Idem.*

vtiliter vnà cum citrei mali semine ad omnes cordis affectus. Ex vino meraco potæ tormina mulcēt. Earundem ex vino albo decoctum, selibre pondere haustum diebus pluribus hydropicos iuuat. verum statim à potu sudor prouocandus est, ictericos ad bonum colorē restituunt, vrinam cient, & tussi, & ceteris pectoris vitiis opitulantur. Non desunt qui has radices laudibus efferant ad fractos, & ab alto deuolutos, vbi dentur potandæ ex vino aut maioris symphiti decocto.

ATRACTYLIS, Græcis, Ατράκτυλις.] Ita. Aitratile, & Cartamo saluatico:

ATRACTYLIS.

FORMA.

Diosc. Atractylis, vel Cnicus syl-
uestris, spina est Cni-
co similis, folia lōgio-
ra ferēs in summis vir-
gis, magna parte nu-
da asperaꝓue, qua fœ-
minę profusis vtūtur,
capitula in cacumine
spinis horrent. Flos lu-
teus, quibusdam in lo-
cis purpureus inueni-
tur. Radix tenuis, su-
peruacua.

LOCVS.

Mitt. Prouenit inculto solo in
collibus, & asperis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Diosc. Coma, semen, & folia re-
runtur cum pipere, &
vino vtilissimè contra
scorpionū ictus. Per-
cussos tradunt quàm
diu ea teneantur her-
ba, nullum experiri dolorē, ipsumꝓue deposita statim recrudesce-
re.



CARDVVS benedictus, Ital. *Cardo benedetto*, *Cardo santo*, *sive herba Turca*. *Cardo br*

CARDVVS BENEDICTVS.



FORMA.

Caulibus est rotundis, flexilib², lētis, spinosis, humi accubātib², foliis lōgis, vtrinque laciniatis, hirsutis, & cum adoleuerint per ambitū aculeatis, capitula summis caulibus gerit lōgis, ac pungētib² aculeis rigētib² foliis circūquaque stipatis, è quibus melius flos emicat, papposo intus semine cinare simili, & albicāte. Radice nritur alba multifidaque.

LOCVS.

Colit^r diligēter in hortis. *Idem*

QUALITATES.

Herba est vehemēter amara. Ideoq^{ue} excalfacit, siccāt, aperit, abstergit, & digerit. magni nominis, magnæq^{ue} existimationis planta est apud omnes nationes. *Idem*

VIRE.

Præstat maximè contra pestilentia, itē aduersus venena

lethalia tā interius sumpta, quàm venenosorū animalū morsibus illita. Sa^{ti}atur hac herba quartana, aut aliis febribus laborantes, quarū circūitus cū frigore, & horrore adueniunt. Id. n. præstat aut epoto herbe decocto, aut stillatit^a aqua, aut foliorum pulueris drachma. Præstat eadem ad Epilepticos infantes. Alui tineas necat, & vteri vitiis auxiliatur. Herba ipsa tam recens, quàm sicca pota, & exterius admota, contumacia vlcera sanat, quamobrem decoctis miscetur, quæ è ligno Guaiaco parantur aduersus Gallicam luem.

CLINOPODIUM, Græcis, Κλυννπόδιον.] Italis, Clinopodio.

CLINOPODIUM.

FORMA.

DIOSC. Frutex est foliis serpyllo similis, furculosus duum dodrantum altitudine. Flores marubij modo ex interuallis distincti, speciem lecti pedum præbent.

LOCVS.

DIOSC. Nascitur in petrosis.

QUALITATES.

Gale. 7. Calefaciendi vim obtinet, sed
sim. med. nondum adurendi, est verò essentia tenuium partium. itaq; exiccare, ac excalfacere poterit ordine tertio.

VIRES.

DIOSC. Bibitur herba, & succi eius decoctum ad conuulsa, rupta, strangurias, serpentiū ictus. Menses, & partus pellit, & pēfiles verrucas, quas acrochordonas vocant eiicit, aliquot diebus potum. Alium sistit decoctum ad tertias potūq; si febrim sentiūt ex aqua, alioquin ex vino.

APPENDIX.

Cum Clinopodium adeo tenuium esse partium (vt scribit Galenus) vt ex tertio excalfacientium, siccantiūque

ordine habeatur, atq; operepretium esse, vt quæ in huius censu sunt plantæ, aut gustu acres, aut admodum amaræ percipiantur. Cūque neutra qualitas in clinopodio, cuius hic imaginem dedimus, reperiatur, non ausim ego ipsum legitimum facere Clinopodium. Sed potius alterum statim sequens, cui præter acridinem & odoris fragrantiam: ceteræ astipulantur notæ.



CLINOPODIVM alterum, Italis, Clinopodio.

CLINOPODIVM ALTERVM.

FORMA.

Foliis est serpylli modo ob *Matt.*
longis in cacumine mu-
cronatis, floribus inter
folia subpurpureis ba-
lausti effigie, caulibus
exilibus, angulosis, è
quibus folia per inter-
ualla exeunt vtrinque
bina: sapor illi acutus.

LOCVS.

Nascitur in campestribus *Idem*
inculto solo, & laxosis
locis.

QUALITATES.

ET VIRES.

Cum non dubitem, quin *Idem*
hæc planta legitimi Cli-
nopodij faciem referat,
fateri, ac affirmare co-
gor ea iis viribus esse
præditum, de quibus in
præcedenti capite dixi-
mus, de Clinopodij vi-
ribus.



LEONTOPETALVM, Græcis, λεοντοπέταλον.] Italis, Leontopetalon.

LEONTOPETALVM.

FORMA.

Prosc. Caulem emittit dodran-
talem, aut altiorē, plu-
rimis alis concavum,
& in cacumine semina
parua duo, aut tria in
siliquis ciceris modo.
Flores anemonę simi-
les, punicei coloris, fo-
lia brassicæ, sed papa-
neris diuisura, radici-
bus nigris, rapę simili-
bus, strumosis.

LOCVS.

Idem. Nascitur in aruis, & se-
getibus.

QUALITATES.

Gal. 7. Digerendi facultatem, &
simp. me. exiccandi, calefacien-
diq̃ue in tertio ordine
possidet.

VIRES.

Prosc. Radix auxiliatur serpen-
tium iectibus, ex vino
pota, nec alia res celerius dolorem finit, miscetur & ischiadicorum
clysteribus.



TEVCRIVM, Græcis, Τεύκριον.] Italis, Teucrio.

TEVCRIVM.

FORMA.

Herba est virgæ referens et *DIOSC.*
figiem, trillaginis simi-
litudine; tenui folio, nõ
multũ à cicere alieno.

LOCVS.

Nascitur vbertim in Cili- *DIOSC.*
cia iuxta Gétiadem, aut
Cissadem.

QUALITATES.

Incidentis & tenuium par *Gale. 8.*
tium facultatis est, qua- *sim. med.*
re lienes sanat. Ponatq;
ipsum quispiam in ter-
tio exiccantium, secũdo
verò calefacientium or-
dine.

VIRE.

Recens cum posca, aut ari *DIOSC.*
dorum foliorum deco-
ctum, potu lienem po-
tenter absorbit. Lienosis
cum aceto, & ficis illi-
nitur. Item serpentium
moribus ex aceto solo.



TRISSAGO, Græcis, Χαμέδρυς.] Arabibus, Damederies, Camadrius, siue Kemadrius.] Hetruscis, Querciola, & Chamedrio.] Italis ceteris, Calamandrina.] Germanis, Gamanderle, siue Bathengel.] Hispanis, Chamedreos.] Gallis, Germandree.

F O R M A.

Diosc. Herba est dodrantalis, folia habens exigua, & amara, quercus effigie, & diuisura. Flore

Matt. paruo, penè purpureo. Odo-
ris non ingrati. Carpitur semi-
ne prægnans.

L O C V S.

Diosc. Nascitur in petrosis, & asperis.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 8. Vincentem habet qualitatē ama-
simp. me. rā, & est quodammodo acris.
Ponatque eam quispiam in
tertio ordine excalfacientiū,
& desiccantium, plus tamen
desiccat, quàm calefacit.

V I R E S.

Diosc. Recentis decoctum bibitur in
tussi, in durato lieni, vrinę dif-
ficultate, & incipiente hydro-
pe. Cit mēses, partus extrahit.
Lienem ex aceto pota consu-
mit. Aduersus serpentium ve-
nena ex vino pota, illitaque ef-
ficacissima. Vetera vlcera pur-
gat ex melle illita, cum oleo
illita caliginem oculorum di-
scutit. Præstat quoque ad om-
nes frigidos capitis morbos,
nempe ad comitiales, veterno-
sos, melancholicos, stupidos,
resolutos, conuulsosque, & ad
diurnos capitis dolores. se-
men drachmæ pondere potū
bilem per vrinas ducit. Ideoq;
conuenienter datur potandū

Matt.

ictericis. Instillatur foliorum succus ad vermiculosas aures. Datur idem aduersus
intestinatorum vermes. Id quod etiam præstat vinum bibitum, in quo florescens
herba die ac nocte fuerit macerata. Decoctum aliquot diebus potum mirificè ter-
tianiis febribus medetur.

TRISSAGO, SEV CHAMEDRYS.



CHAMEDRYS altera, Italis, *Calamandrina secunda*, & *Querciola secunda*.

CHAMEDRYS ALTERA.



FORMA.

Foliis exit quercus effigie, *Matt.* sed magis quàm in altera laciniatis, tenuibus, subnigricantibus, copiosioribusque, caules edit quadrangulos, tenues, lignosos, sesquidodrantales, surculosis ramis refertos, in quibus flosculi purpurei inter folia rutilant, & caules ipsos ambiunt, alterius chamedrys modo. Radicem habet multifidam albicantem. est autem planta aspectu iucundo, & eleganti, amara tamen, odore non iniucundo resinam olente.

QUALITATES,

ET VIRES.

Cum adeò amara non sit ut altera, ea quidem minus calida, siccaque fuerit, itaque ad omnia munia imbecillior, non tamen multò.

CENSURA.

Quòd hæc planta (ut credo) resinam resipiat, non desunt scriptores, qui putent eam legitimam esse Dioscoridis Chamepitim: sed hallucinantur.

LYCHNIS, Græcis, Λυχνίς.] Italis, *Lichnide coronaria*.

L Y C H N I S.

F O R M A.

- Diosc.** Coronaria Lychnis flore est albae violae simili, sed purpureo, quo corollæ factitantur. **Matt.** Folis longis, tomentosis, albican-
tibusque, caule lanuginoso, incano cubito maiore, flore inodoro, sed pulchro. **Diosc.** Sylvestris per omnia urbanae similis.

L O C U S.

- Matt.** Seritur in hortis, ac etiam sponte per se provenit, quam sylvestrem appellant.

Q U A L I T A T E S.

- Gal. 7. simp. me.** Semen calidum est secundo quodam modo ordine, aut iam etiã tertio, siccũ sanè eodem quoque modo.

V I R E S.

- Diosc.** Semen duarum drachmarum pōdere potum, bilem per aluũ detrahit. Ictis à Scorpione subuenit. Aiunt huius herbæ appōitu Scorpiones torpescere, & inertes prorsus reddi.

C E N S U R A.

Sunt qui Pseudomelanthium in segetibus nascens sylvestrem Lychnidem faciant. Atqui cum Dioscorides agrestem Lychnidem urbanc per omnia similem esse scribat, eamque sæpius viderim in inculto solo, non possum horum placitis subscribere.



LILIVM, Græcis, *Κρίνον*.] Italis, *Giglio bianco*.] Arabibus, *Sufen*.] Germanis, *Lilgen, seu Gilgen*.] Hispanis, *Azucena, seu Lirio blanco*.] Gal-
lis, *Lis*.

L I L I V M .



F O R M A .

Folia fert longa, nunquam non virē-
tia, lævia, pingua, Pancratio simi-
lia, caulem profert bicubitalem, ro-
tundum, rectum, læuem, pinguem,
firum, minoribus foliis ab imo
ad summum circumuestitum, è cu-
ius cacumine terni, quaternive ra-
muli exeunt, è quibus oblonga pro-
deunt capitula herbaceo colore,
quæ tractu temporis lilia fiunt exi-
mij candoris calathi figura, extrin-
secus striata, resupinis per ambitū
labris, luteis aliquot ligulis ex ca-
lathi fundo (vt in croco) sursum
spectantibus, è quorum medio lō-
gum producit germen, rotundo
in cacumine capitulo, herbacei co-
loris. Radice nititur bulbosa albi-
cante, compactili squamarū serie.

Matt.

L O C V S .

Seritur passim in hortis, & viridariis. Idem

Q U A L I T A T E S .

Lilij flos temperaturam mistam ob-
tinet, partim ex tenui, partim ex
terrena essentia, ex qua utiq; ama-
ritudinem habet, partim ex aquea,
eaq; temperata. Quod aut ex eo cō-
ficitur oleum, citra morsum dige-
rendi, simulque emolliendi facul-
tatem obtinet. Porro Radix foliaq;
desiccant, absterunt, & digerunt
moderate. in radice plus abstergen-
tis facultatis est, quàm in foliis.

Gale. 7.
simp. me.

V I R E S .

Folia herbæ illita auxiliantur contra
serpentium ictus, feruefacta am-
bustis proficiunt. Aceto cōdita vul-
neribus opitulantur. Inasata ra-
dix, & ex rosaceo trita igni ambu-
sta sanat. Vulnam emollit, menses

DIOSC.

eiet. vlcera cicatrice obducit. Cum melle detrita neruis præcis luxatisq; medetur. Vitiligi-
nes, furfures, leprasq; emendat. & vlcera in capite manantia expurgat. Faciem abstergit, &
erugat. teritur in aceto cum hyoscyami foliis, & farina tritici mulcendis testium inflamma-
tionibus. Semen potum aduersatur serpentium moribus, ignibus sacris. Semen, & folia, cū
vino illinuntur. Oleum quod è floribus paratur vteri duritias commodissime emollit: va-
let quoq; ad omnes frigidos neruorum affectus, ad emollienda articulorum impedimenta,
& scyrrhosos tumores. Illinitur vtiliter puerperis in vteri doloribus. Additur in clysmati-
bus emollientibus. Elixir radix ex vetere axungia illita pedum clauos eiicit. Eadem ex adi-
pe, & oleo imposita defluxos pilos replicat.

Matt.

MARTAGVM chymistis, Italis, Martagon, & Giglio saluatico.

vide Lilium, Vol. 1. m. 6.

MARTAGVM.

FORMA.

Matt. Folia promit vulgaris saponarię emula, quę ex intervallis orbiculariter caulem ambiunt, in cuius cacumine flores emicāt tenui pediculo nitentes liliorum effigie, sed minores, quorū folia quoque retroflexa cernuntur, purpureo colore, punctis quibusdam rufescentibus respersa. Ipsiq; flores odorati sunt, & aspectu iucundi. Radicē habet lilio similem, sed luteo colore.

LOCVS.

Idem Prouenit in montibus, & cliuosis locis.


QUALITATES,
ET VIRES.

Radix ad ea omnia commoda est, ad quę Lilij.



BALLOTE, Græcis, Βαλλωτή.] Italis, *Marrobio bastardo*.] Germanis, *Schwarz andorn*.] Hispanis, *Marroio negro*.] Gallis, *Marrubin noir*.

BALLOTE.



FORMA.

Caules edit quadrāgulos, Diosc.
nigros, subhirsutos, cō-
plures ex vna radice, fo-
liis maioribus, quā
marrubij, hispidis, &
per interualla in caule
dispositis, subrotundis,
græcolentibus. Candi-
di flores, verticillato am-
bitu caulem coronant.

LOCVS.

Nascitur in agrorum mar- Matt.
ginibus, & secus vias.

QUALITATES.

Planta est acris, & absterfo Paulus.
rię facultatis.

VIRE.

Vis eius efficax aduersus Diosc.
canis morsus, foliis ex
sale illitis, eadem feruē
ti cinere calefacta quo-
usque flaccescant, illita
condylomata reprimunt, purgant cum melle etiam sordida vlcera.

MARRUBIVM, Græcis, Πρύσιον.] Mauritanis, *Farusio*, siue *Frasium*.] Italis, *Marrobio*.] Germanis, *Andorn*, siue *Lungen kraut*.] Hispanis, *Maroto*.] Gallis, *Marrubin*. *S. Houlgardii hirsut.*
Voss vng.

MARRUBIVM.

F O R M A.

DIOSC. Frutex est ab radice ramosus, candicans, subhirsutus, quadrangulibus ramis, folium pollicē æquat, subrotundum, hispidū, rugosum, amaro gustu, semen in caulibus, & ex interuallis, flores verticillato ambitu, asperi.

L O C V S.

DIOSC. Nascitur propter ædificia, ruinas, & rudera. ¶ Et in areis viarum.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 8. Marrubium vt gustu amarum est ita vt si quis vtatur, consentientem huic saporī actionem reperiet. Iecur, ac lienem obstructione liberans, & thoracem, pulmonemq; expurgans, ac menses prouocans: sed & illitum detergit, ac digerit. excalfacit quidem secundo ordine iam completo, & tertio siccatur.

V I R E S.

DIOSC. Folia sicca cum semine in aqua decocta, aut viridum succus datur cum melle suspiriosis, tussietibus, & ad tabitudinem redactis, crassam è pectore pituitam, cum sicca Irīde eiicit. Mulieribus à partu nō purgatis datur, vt menstrua, & secundas extrahat. Item in difficili partu, & his qui venena hauserūt, aut à serpentibus demorsi sunt. Vesicam, renesq; lædit. Folia ex melle illinuntur sordidis vlcēib⁹ purgandis. Pterygia, nomasq; sistunt. Laterum dolores mitigat. Succus foliis contusis expressus, solēq; coactus, ad eadem pollet. Cum vino, & melle illitus, oculorum claritatem adiuuat. Naribus regium morbum expurgat, & dolentibus auribus instillatur per se, & cum rosacco.

Matt.

¶ Decoquantur marrubij binæ vnciæ vnā cum buglossi, helenij, & eupatorii radicum sesquidrachma, Rhabarbari drachma, & agalloci pari pondere ex vini albi generosi libris iij. ad Ictericam. Nam vbi diebus decem continuis huiusce decocti binas vncias affecti potauerint, præstantissimum reperient medicamentum, vbi tamen morbus ab obstructione prouenerit.



MELISSOPHYLLVM, siue melitena, aut Apiastrum, Græcis, Μελισσόφυλλον .] Arabibus, Bederangie, siue Bederangi, siue Marmacor.] Italis, Melissa, Cedronella, & Aranciata.] Germanis, Melissen.] Hispanis, Torongil, seu Hierua Cidrera.] Gallis, Melisse, & Pomcirade.

*Winterfrucht
Binnenfrucht.*

APIASTRVM, SIVE MELISSOPHYLLVM.

F O R M A .

Cauliculi, & folia essent Ballo- Diosc.
te similia, nisi maiora tenuio-
raque, nec ita hirsuta specta-
rentur. Citreum malum olēt.

L O C V S .

Seritur passim in hortis, ac etiā Matt.
sponte per se nascitur in col-
libus, & montibus.

Q V A L I T A T E S .

Excalfacit, siccātq, ordine se- Auc. lib.
de viri-
bus cor-
dis.
cundo.

V I R E S .

Folia cum vino pota, aut illita Diosc.
profunt cōtra phalangiorū,
& scorpionum ictus, & canis
quoq; morsum. Folia auxi-
liantur fungorum strangula-
tionibus in potu addito ni-
tro. Illita cū sale strumas di-
scutiunt, vlcera purgant, ar-
ticulares dolores illita sedāt.
¶ Melissophylli proprium est Serapio.
animum hilarem reddere, hu-
menti ac frigido ventriculo
auxiliari, concoctionē adiu-
uare, cerebri obstructions
referare, deficientem animū
reuocare, cordis imbecillita-
tem roborare, quinetiam e-
ius pulsum reprimere, animi
solicitudines fugare, ac solli-

citas imaginationes tollere, quæ & ab atra bile, & ab exusta pituita gignuntur. ¶ Vi- Auc. ibi
dem.
res deiectorias possidet, nec adeo imbecilles, quin atrabiliarios vapores à spiritibus,
& à sanguine, qui cordi, & arteriis inest educere queat. quod in ceteris corporis par-
tibus efficere nequit.

MOLVCA, Italis, *Melissa Constantinopolitana*.

Melissa von Constantinopel.

MELISSA MOLVCA, SIVE CON-
STANTINOPOLITANA.

GENERA.


Mult. Duum est generum, altera levis, altera aculeata.

FORMA.

Idem. Viraque folio est melyssophylli quadatenus simili, breuiore tamen, & minus denticulato, sed in altero genere cum quaque aculeato, amaro sapore, nec ullo citrei mali odore. profert calyces quosdam tinnabuli effigie herbaceo colore, in quibus semen oritur.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem. Aperit, attenuat, excalfacit, abstergit, venenis resistit, & animalium venenosorum ictibus mirifice auxiliatur, tum pota, tum quoque illita. Ictericos iuuat, interaneorum animalia necat. Datur utiliter succus pestilentibus febribus affectis.



MELISSA Moldauica, Italis, Cedronella di Moldauica.

MELISSA MOLDAVICA.

Enchysa Wuliffa.

FORMA.

Caules edit bicubitales, *Matt.*
quadrangulos, subru-
fescētes, ramososque.
folia in ramis ipsis vr-
ticę figura, sed longe
minora. Flores in sum-
mitate purpureos, sal-
uie emulos, verticilla-
timq; inter folia emer-
gentes. Tota planta ci-
trei mali odore quàm
belle spirat. Radice ni-
titur vnica, sed fibrata.

LOCVS.

Seritur in hortis, sed ex *Idem*
Muldauia primum ad
nos delata est, vbi spō-
tè per se prouenit.

QUALITATES,

Excalfacit, siccātque or- *Idem*
dine secundo, aperit,
attenuat, & incidit.

VIRES.

Vires habet Apiastro per *Idem*
omnia similes.



STACHYS, Græcis, Σταχύς.] Italis, Stachi..

STACHYS.

F O R M A .

Diosc. Frutex est Marrubio similis, sed longior, folia ferēs numerosa, hirsuta, rara, prædura, cana, odoris iucundi, & complures virgas, ex vna radice exeuntes Marrubio cãdidiore. *Matt.* Flores spicatos, subpurpureosq;.

L O C U S .

Diosc. Nascitur in montibus asperis.

Q U A L I T A T E S .

Gale. 3. Frutex est stachys gustu acri, & amaro, tertij ordinis excalfacientium.
Em. med.

V I R E S .

Diosc. Foliorum decoctum potu pellit menstrua, & secundas.



PSEVDOSTACHYS.



Pseudostachys hanc plantam appellare libuit, quòd & ipsa stachym in multis notis referat.

PHYLLITIS, Græcis, *φυλίτις*.] Italis, *Lingua ceruina*, ac pariter *Fillite*.] Officinis, *Falso*, *Scolopendria*.] Germanis, *Hürtzungen*.] Hispanis, *Lingua ceruina*.] Gallis, *Lang de Cerf*.

F O R M A .

Diosc. Folia promit Rumici similia, longiora, & viridiora, sena, aut septena, quæ parte interiore leuia cernuntur, à tergo autem peniles quasi vermiculos tenues ostendunt, gustu acerbo. Neq; caulem, neq; semen profert.

L O C V S .

Diosc. In umbrosis, & opacis horum locis emicat.

Q U A L I T A T E S .


Gale. 8. Cû qualitatis sit acerbæ, nō absurdè diarrhœas, siue profluvia, & dysenterias pota iuuat.

Diosc. Folia in vino pota serpentium moribus aduersantur, quadrupedibus per os infusa auxilio sunt, & si dysenteria aut resoluta aluius exercet potui datur.

Matt. Expertum quoque est à compluribus valere phyllitim ad splenis affectus. Utuntur quoque quidam stillatitia eius aqua contra singultum, & cordis pulsus, atque in animi deliquij, eandem gargarislandam quoque præbent ad prolapsam columnellam. Siccorum foliorum farina ex earundem aqua excepta, & admota refrigerat ventriculi, & iocinoris ardores.

C E N S V R A .

Aberrant qui phyllitim Asplenium, siue scolopendrium esse censent.



PHALANGIVM, Græcis, φαλάγγιον.] Italis, *Falangio*.

P H A L A N G I V M.



F O R M A.

Ramuli sunt illi duo, aut *Diosc.* tres, pluresvè, in diuersa tendentes. flos candidus, lilio similis multas incisuras habēs, semine nigro (postea enim contrahitur) lato ad lenticulæ dimidiatę figurā, multo tenuiore. Radice parua, tenui, herbacei coloris, dum à terra eruitur. ¶ Folli- *Matt.* culi in quibus semen concluditur phalangij formam referunt, vnde illi nomen.

L O C V S.

Prouenit in collibus. ¶ Et *Diosc.* in montibus. *Matt.*

Q U A L I T A T E S.

Est autē facultatis tenuiū *Gale. &* partium, desiccantis. *simp. mc.*

V I R E S.

Huius folia, semen, flos cum vino pota auxiliantur cōtra scorpionum, *Diosc.* phalangiorumq; ictus, tormina quoq; discutunt. *Gale.*

TRIFOLIUM, Græcis, Τρίφυλλον.] Italis, Trifoglio bituminoso.

G E N E R A.

TRIFOLIUM ASPHALTITE.

Matt. Plura sanè habentur genera, nempe Asphaltite, Pratense, Acerolumque.

F O R M A A S P H A L T I T I S.

Diosc. Frutex est qui supra cubiti altitudinē attollitur, virgas habēs tenues, iūceas, & nigras, vnde ramulares enascūtur appēdiculę, in quibus terna singulis germinationibus exeunt folia, loto arbori similia. iis recenter enatis eruca odor inest, vbi autē adoleuerūt bitumen olēt. Florē edit purpureū, semē quādātenus latū, subhirsutū, ex altera extremitate exer tum antennæ modo corniculum gerens. Radix tenuis, longa, valida.

L O C V S.


Scribo - Nascitur in Sicilia, & in Italia circa Lunæ portum.
ius Lar
gus.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 8. Vis plantæ est calida, & sicca, vt bitumen cui odore est similis, vtrinque tertio ordine.
simp. me.

V I R E S.

Diosc. Semen & folia in aqua pota pleuriticis, vrinę difficultati, comitialibus, & iis qui aquæ intercutem principia sentiunt, scēmineis quoq; vuluę vitiis oportunis, auxiliantur. Menses ciunt. Ternæ drachmę è semine dari debent, è foliis verò quaterna, contra serpentium ictus trita folia ex oximelite pota pręsidio sunt. Quidam terna folia, aut semina in tertianis cum vino potui dedere, & in quartanis quaterna. Radix antidotis inferitur.



TRIFOLIUM Pratense, Italis, Trifoglio.

TRIFOLIUM PRATENSE.

Trifoglio

GENERA.

Trium est generum, foliorum, & florum diuersitate differentium. *Matt.*

FORMA PRIMI.

Primum foliis est subrotundis, maculosis, longo pediculo nitentibus, obsequioso, flexiliq̃ue; floribus in capitulis subpurpureis, aut albicantibus, in cauliculorum summitatibus emicantibus. *Matt.*

LOCVS.

Nascitur in pratis, & herboso solo. *Idem*

FACULTATES,
ET VIRES.

Sunt qui Trifolij pratensis succum miris laudibus efferat ad oculorum nubes, vulnera, & cicatrices. *Idem* Idem tempestates pronunciat, inhor-

rescit enim & folia contra tempestates subrigit. Vniuersae florentis plantae decoctum potum, alba vteri profluvia cohibet. Semen, & flores ex aqua decocti, & ex oleo admoti, duos emolliunt abscessus.



TRIFOLIUM pratense alterum, Italis, *Trifoglio indifferenter dicitur.*

Lin auctor v. m. affl.

TRIFOLIUM PRATENSE ALTERUM.

F O R M A.

Matt. Cauliculis assurgit lentis, obsequiosisque, foliis in vnoquoque pediculo ternis, varia tamen facie perinde ac bituminosum. Namque quedam quæ ad radicem sunt Acetosi trifolij modo quod oxym vocatur trina ex vnico pediculo emergunt, cordis faciem quadamtenus imitatur, cetera verò longa sunt, & in cacumine acuminata, ut in Asphaltite. flores in capitulis sunt illi purpurei in flocci modum.

L O C V S.

Idem Prouenit sponte in pratis, & viridariis, & herbosis locis.

F A C V L T A T E S,
E T V I R E S.

Idem Idem præstare potest, quod alterum.



TRIFOLIUM acetosum, Græcis, Τρίφυλλον ὄξις.] Barbaris, *Alleluia*, sine *Luiola*, sine *Panis cuculus*.] Italis, *Trifoglio acetoso*.

TRIFOLIUM ACETOSVM. *Saint Ogle, Burgenli*

FORMA.



Cauliculis exit ab vna ra- *Matt.*
dice pluribus, exiguis,
rotundis, ac tenuibus,
quorum singulis terna
in summitate sunt folia,
cordis figura, mollia,
acido gustu. flores edit
albos, stellę figura. Radi-
cem habet subrufam, cō-
pactili squamarum serie
obductam.

LOCVS.

Nascitur opacis locis, pro *Idem*
pter sepes, & itinera.

FACULTATES,
ET VIRES.

Tota plāta refrigerat Oxa- *Idem*
lidis modo, proinde de
uorata sitim extinguit,
iecur refrigerat, & cor
corroborat. Stillatitia

eius aqua datur vtiliter potanda acuta pestilentiq̃ue febre laboran-
tibus. atqui longè præstat herbæ succus ex saccharo potus. Illini-
tur idem per se Erysipelatis, & inflammatis locis, colluiturq̃ue ex
eo os vbi lingua, palatum, faucesve calida fluxione laborent. In sum-
ma ad ea omnia censetur utilis Oxys, quibus Oxalis auxiliari va-
leat. ¶ Datur ad stomachum dissolutum. edunt & qui enterocel- *Plin.*
lem habent.

TRINITAS, Italis, *Herba Trinita*.*Herba Trinita*
Trifolium albidum
TRINITAS.

F O R M A.

Matt. Folia fert triquetra, æderæ minoris magnitudine, quæ aduersa parte cyclamini modo subpurpurea sunt, superiore verò parte maculis quibusdam albicantibus resperguntur. Caules habet tenues, in quorum cacumine primo statim vere flos emicat cæruleus in stellæ modum, è quo capitulum oritur echinata quadantenus specie, in quo semen oblongum subceruleumque. Radicibus est numerosis, tenuibus subrubentibusque.

L O C V S.

Idem Prouenit locis opacis, & in frutetis.



F A C V L T A T E S, E T V I R E S.

Vulneraria est herba, tam admota, quàm in potionibus sumpta, quin etiam ad eterocelas mirifice præstat, epota foliorum farina ex vino austero diebus pluribus continuis cochlearij mensura. Decoquitur tota herba ex eodem vino ad columellæ, fauciumque inflammationes.

POLIVM, Græcis, Πόλιον.] Mauritanis, *Cahade, siue Iahade.*] Italis, *Polio.*] Gallis, *Iue muscate*. *Wied. Hostmann*

POLIVM.

G E N E R A.

Duo Polij extant genera, *Matt.*
montanum, & alterum
fruticosius, non vsque
adeo valens odore.

FORMA MONTANI.

Planta est cādicans, foliis *Matt.*
oblongis, & per inter-
ualla caules ab imo ad
summum vestiētibus,
pluribus etiam mino-
ribus inter maiora sub
nascentibus; caules ha-
bet copiosos, rectos, rō-
tundos, lignososque,
albicantes, & qui in ca-
cumine capitula edant
florida, candicātia, thý-
mi figura. tota planta
odorata est, sed non si-
ne odoris grauitate,
acuitateque.

L O C V S.

Prouenit in montibus, *Matt.*
exoluto solo.

Q V A L I T A T E S.

Amarū est gustantibus, & *Gale. 8.*
modicè acre. ¶ Vis quo *simp. me.*
que Polio inest reserant, *Matt.*
di, incidendi, attenuā-

di, & abstergendi.

V I R E S.

Foliorū decoctū potu auxiliatur serpentiū morsibus, hydropicis, mor- *DIOSC.*
bo regio, & lienosis cū aceto. stomachū verò malè habet. caput dolo-
ribus afficit. Aluū, & menses ciet. substratū, suffitūve serpētes abigit.
Illitū vulnera conglutinat. ¶ Omnia viscera obstructione liberat, ari- *Gal ibid.*
dum cum fuerit maligna vlcera sanat, viride verò magna vulnera.
¶ Ad alligatur fronti contra oculorum suffusiones, protinus vbi in- *Matt.*
uentum sit, nec alia herba magis conuenit,



POLIUM alterum, Græcis, Πόλιον ἕτερον.] Italis, Polio secondo.] Herbariis nonnullis, *Iva muscata*. *Willd. Hofmanni 3 m.*

F O R M A.

P O L I U M A L T E R U M.

Matt. Foliis, caulibus, capitulis, ac floribus altero similis est.

L O C U S.

Idem Nascitur in cāpestribus, saxosis, & excultis locis.

F A C U L T A T E S,
E T V I R E S.

Idem Ab altero facultatibus nō differt.

A P P E N D I X.

Idem Tam & si hanc plantam sciam non esse secundum Polij genus à Dioscoride conscriptum, cum tamen omnibus suis partibus, sapore, odoreque montanum polium referat, nō quidem temere factum putavi, eam inter Polij genera fore recēsendam, & præsertim cum omnibus Polij facultatibus sit prædita.



SCORDIVM, siue Trissago palustris, Græcis, Σκόρδιον.] Arabibus, Scor-
deon, siue Scordeum.] Italis, Scordio.] Germanis, *Uuasser batenig*, seu
Konoblechs kraut.] Hispanis, Scordio.] Gallis, *Chamarax*.

SCORDIVM.



FORMA.

DIOSC.

Foliis erumpit trissaginis maio-
ribus, nec sic in ambitu diui-
sis, aliquantum alia redolen-
tibus, gustu amaris, & ad-
stringentibus, caulibus qua-
drangulis, subrubro flore.

LOCVS.

Nascitur in montibus, & palu-
stribus.

Idem

QUALITATES:

Ex multiformibus id tum fa- Gal. 8.
cultatibus, tum saporibus cō simp.me.
stat, nam & amarum quid
obtinet, & acerbum, & acre,
& maxime allio assimilis, ei⁹
est acrimonia. vnde, mea sen-
tentia, nomenclaturam ob-
tinuit. expurgat igitur, simul-
que excafcit vlcera.

VIREs.

Herba vim excafcatoriam ha- DIOSC.
bet, urinam ciet, cocta recēs,
aridave cum vino bibitur ad
venenatos serpentium mor-
sus, ad stomachi quoque ro-
siones, dysenteriam, & urinæ

difficultatem binis drachmis ex aqua mulsa. Crassamen purulentum e pectore ex-
pellit. Aridæ farina facit ad veterem tussim, rupta, conuulsaq; si cum nasturtio,
melle, & resina misceatur in eclegmate. Inflammata modicè præcordia cerato
excepta recreat. Menses imposita mouet, vulnera conglutinat, vetera vlcera purgat,
& ex melle ad cicatricem perducit. Sicca excrementas in carne cohibet. Succus ad
eadem vitia bibitur. ¶ Laterum dolores ab obstructione, & frigore natos sanat Gal. 8.
simp.me.

ALLIARIA, Italis, *Alliaria*.] Germanis, *Knoblanchs kraut*.] Gallis, *Alliaire*.

ALLIARIA.

FORMA.

Adatt. Huius folia cum primùm erumpunt, ferè rotunda spectantur, violariæ similitudine, postquàm verò adoleuerint p̄ ambitum serrata euadunt, vt quadantenus apiastri faciem representent, leuiora tamen sunt, & p̄pe caulem latiora, quę digitis attrita, gustataq; allij odorem, saporemq; reddunt. Caulē profert bicubitalem, rotūdumque, flores albos, & semen nigrum tenuibus filiquis inclusum. Radix, quę longiuscula est, eundem cum foliis odorem retinet.



LOCVS.

Idem Iuxta sepēs, & in agrorum marginibus nascitur.

QUALITATES.

Idem Excalfacit, attenuat, aperit, incidit, digerit, prouocat.

VIRES.

Idem Semen emplastri modo vuluæ admotum, mulieres vteri stranguatu oppressas liberat, & excitat.

TVSSILAGO, Græcis, Βύχιον.] Officinis, Farfara, seu Ungula caballina.]
 Italis, Farfara, seu Farfarella, & Unghia di Cavallo.] Germ. Roß huob,
 sine Brantlattich.] Hisp. Unha de Asno.] Gall. Pas de Asne, sine Taccōnet.

Lyfimigrant
Gneflattich.

TVSSILAGO.

G E N E R A.

Tria Bechij numerantur ge *Matt.*
 nera, quāvis Dioscoridi
 vnum tantum sit genus.

F O R M A P R I M I.

Folia promit maiuscula q̃ *Diosc.*
 hederæ, sex aut septem, à
 radice à terra subalbida,
 superne virentia, in plu-
 res angulos exeūtia. Cau-
 lis dodrantalis, flos lu-
 teus, vere prodit, quo v-
 nà cum caule confestim
 exuitur. Inde nōnulli his
 vacare existimarunt. Ra-
 dix tenuis est.

L O C V S.

Nascitur in amēnis, & ri- *Diosc.*
 guis.

Q U A L I T A T E S.

Modicè est acris.

Gale. 6.
simp. me.

V I R E S.

Folia ex melle trita, igni sa-
 cro, & omnibus inflam- *Diosc.*
 mationibus, illitu medē-
 tur. Arida suffitu ita vt
 fumus per infundibulū
 hianti ore rapiatur, hos
 sanat, qui sicca tussi, atq;

orthopnæa infestantur. Pectoris vomicas rumpunt. Eundem effe-
 ctum præbet suffita radix. Eadem decocta in hydromelite, & pota
 emortuos partus eiicit.

TVSSILAGO maior, Græcis, Βήκιον μέλα.] Italis, *Farfara maggiore*.] Germanis, *Pestilentz vurtz*.

TVSSILAGO MAIOR.

F O R M A .

Matt. Caulē edit anteaquā folia emergant in ipso Veris principio, concavum, dodrantalem, pinguem, purpurascentem, parvis & oblongis circum vestitum foliis. In cuius cacumine flores exeunt spicati, subpurpurei, qui vna cum caule paulo post contabescunt, & in pappos dissoluntur. Eodem fere tempore folia ē terra emergunt, altera parte incana, quæ antequā adoleſcant Tuſſilagini ante scriptę similia spectantur. Verū posthac in tam magnam crescunt amplitudinem, ut Persenatę foliis longe maiora habeantur. Horum singula pediculo nituntur purpureo, alba lanugine obducto. Radicē edit longam, brachij quandoque humani crassitudine, intus candidam, amaram, atq; odoratam.

L O C V S .

Matt. Crescit humectis, & vliginosis locis & præsertim prope riuos aquarum, perinde ac altera.

Q U A L I T A T E S .

Idem Radix exalſfacit, attenuat, incidit, & abstergit, vti cius euidens indicat amaritudo.

V I R E S .

Constat radicē multis experimentis præstare contra pestilentiam, & pestilentes febres, vbi eadem in puluerem contrita duarum drachmarū pondere ex vino propinetur, & deinde sudare cogantur cyri. Quamobrem Germanis Pestilentiæ radix appellatur. Præstat eadem ad vteri præfectiones, & cruciatus, eodem modo sumpta. Propinatur item veterinariis, & pastoribus contra quadrupedum vermes, & equis qui anhelandi difficultate laborant. Reliqua cum Tuſſilagine communia habet.

C E N S V R A .

Qui hanc plantam Petasitem faciunt: (mea quidem sententia) non recte sentiunt.



TUSSILAGO altera, siue Farfugium, aut Farrauum, aut Chameleuce.
Italica, Farfugio.

TUSSILAGO ALTERA, SIVE
FARFUGIVM.

F O R M A .



Foliis exit nigræ populi *Matt.*
amplioribus ad tussi-
laginis faciem inclinā-
tibus, atqui non tot e-
xertis in ambitu angu-
lis, nec à terra tam al-
bicantibus. Caulem e-
dit sesquidodrātalem,
à quo plures egrediū-
tur rami, in quorum
summitate flores e-
xeunt aurei, magni, ro-
sarum figura. Radicē
habet albā, & subama-
ram, floret vere, Aprili
præsertim mense, &
Maio quoque.

L O C V S .

Nascitur circa riuos a- *Idem*
quarum in conualli-
bus, & pratis.

Q U A L I T A T E S ,
E T V I R E S .

Vbi vulgaris, ac vera Tus-
silago nō fuerit ad ma-
nus, Farfugiū eius loco bellè substitui potest. nā iis ferè viribus præstat.

Artemisia
gemma virens gurtel.

ARTEMISIA, Græcis, *Αρτεμισία*.] Italis, *Artemisia*.] Germanis, *Bay-
fuosz*, & *San Johans gurtel*.] Hispanis, *Artemisia*.] Gallis, *Armase*.

FORMA.

ARTEMISIA.

Matt. Artemisia exit caulibus plu-
ribus, rectis, sesquicubi-
talibus, rubentibus, ro-
tundis, striatisque. Folia
gerit absinthio leuiora,
pinguiora, supina parte
albicantia, sed quæ in cau-
le sunt longè minora spe-
ctantur. Flores copiosissi-
mi in caulium ramusculis
racematim exeunt, parui,
pilosi, odorati, albicantes,
e quibus minutum oritur se-
men. Radicem habet ligno-
sam, multifidam minimi di-
giti crassitudine. Tota
planta odore spirat haud
ingrato. LOCUS.

Prosc. Magna ex parte in monti-
Matt. bus nascitur. Imo ferè
vbique locorum.

QUALITATES.

Gale. 6. Excalfacit, & modice desic-
sim. med. cat. quod autem ad cale-
factoriam attinet, excessus
est secundi. quod verò ad
resiccationem, aut primi
intestini, aut secundi incipien-
tis. est quoque & modi-
cè tenuium partium.

Prosc. Conuenienter adiicitur feruescens in muliebres desensus ad detrahen-
dos menses, partus, secundasque. Item ad preclusiones vulvae, & eius-
dem inflammationes. calculos comminuit, remoratam urinam cie-
re. Et menses pubi illita pellit. succus vulvae inditus ex myrrha, eadem
que infessio trahit. Coma tribus drachmis eorundem eiiciendorum
gratia sumitur.



VIRES.

AMBROSIA, Græcis, *Αμβροσία*.] Italis, *Ambrosia*.

A M B R O S I A.



F O R M A.

Puillus est frutex, numero- Diosc.
 rosus trium palmorum
 altitudine, foliis rutæ cir-
 ca imum caulē exiguis,
 cauliculi seminibus, pe-
 rinde quasi racemulis
 grauidi, qui nunquam
 florem pariunt, odore
 vinoso, suauī. Radice
 tenui, sesquipedali.

L O C V S.

Prouenit in montibus, & *Matt.*
 collibus, amēnis locis.

Q U A L I T A T E S.

Cataplasmate imposita vim
 habet adstringentem, &
 repellentem.

V I R E S.

Vis eius reprimere, ac re- *Gal. 6.*
 pellere, & illitæ adstrin- *serp. me.*
 gere humores, qui in a-
 liquam partem incum-
 bunt.

AMBROSIA ALTERA.

Mutt. Hanc plātam Ambrosiam
quoque nobis vocari li-
buit, quòd omnibus fe-
rè notis Ambrosiam re-
ferat.



BOTRYS, Græcis, Βότρυς.] Italis, Botri.] Germanis, *Trubenkraut*, & *krotten kraut*.] Gallis, *Piiment* : *Migraine*, *Millegraine*, seu *Patience*.

BOTRYS.



FORMA.

Foliis prouenit Cichorij, aut quercus modo laciniatis, sinuosisq; ramis numerosis, tenuibus, semine copiosissimo, racemosoque refertis. Plāta tota rufescit, & resinoso quodam succo madet, adeò vt comprehensa manibus hereat, odorem quidem acrem spirat, & qui graucolentia quadam nares afficiat. non tamen sine aliqua suauitate.

Matt.

LOCVS.

Inuenitur in conuallibus, & in torrentium alueis.

Diosc.

QUALITATES.

Excalfacit, & siccit, aperit, incidit, abstergit, & crassa excrementa expectorat.

Matt.

VIRES.

Pota orthopneas mulcet. Præstat eadem ad omnes pectoris, & thoracis affectus pituitosos, quinimo etiam suppuratos adiuuat, quin etiā asthmaticos, & suspiriosos tum herba ipsa ex decocto dulcis radice pota, tum ipsius herbe decoctū pluribus diebus haustum, addito violaceo melle, aut saccharo. Purulenta expuentibus mirifice auxiliatur. Herba ipsa facit quoq; ad vteri cruciatus si in calenti tegula vino irrorata calefiat, & ventri imponatur.

Diosc.

Matt.

mulcet. Concisa, & in patella ex oleo lilino, & ouorum vitellis calefacta, vnà cum parthenij, & anthemidis floribus, adeo vt placentę formam recipiat, & deinde calida ventri illinatur. Suffiuntur eiusdem herbe vapore vtiliter foeminæ ad menses ciendos, & emortuos fetus eiiciendos. Herba ipsa arida vestibis interposita à tineis, & blattis eas tuetur, & odoratas reddit.

GERANIVM, Græcis, Γεράνιον.] Italis, Geranio.] Officinis, Rostrum Ciconia, vel Rostrum gruis, vel Acus muscata.] Germanis, Storcken schnebel.] Hispanis, Pico de cinguenba.] Gallis, Bec de Ciconne.

GERANIVM.

GENERA.

Matt. Sex Geranij genera nobis reperta sunt, ut inferius patebit. Dioscoridi duo tantum habentur, Plinio tria.

FORMA PRIMI.

Matt. Geraniū foliis est anemones, diuisuris longioribus in vnoquoque folio senis. Caulē mittit ab ipsa radice rectum, tenuem, geniculatūq;. Flores è geniculis in caule pdeunt punicei rosarum syluestrium ferè figura, sed longè minores, & quinque tantum foliis referti, è quibus rostellum oriuntur inferna parte lunati. Radice nititur rotunda, nuce pontica maiore, subnigricante, & dulci sapore pedita.

LOCVS.

Idem. Nasct̃ copiosum in Dalmatia incultis locis.



QUALITATES, ET VIRES.

Idem. Radix drachmæ pondere in vino pota vuluæ inflationes discutit. Recipientibus se ab imbecillitate vtilissima est. Bibitur contra phthisim drachma in vini cyathis tribus bis in die. Succus radice auribus medetur, Epystonicis semen drachmis quatuor cum pipere & myrrha potum, auxiliatur.

GERANIVM secundum . Italis, Geranio secondo.

GERANIVM II.

FORMA.

Foliis est malue minoribus, *Matt.*
pediculis tenuibus, lon-
gis, & subrubetibus: cau-
libus gracilibus, flexili-
bus, floribus puniceis, è
quibus acuminati apices
oriuntur, gruinis capitu-
lis similes. Radicem ha-
bet tenuem, dodrantalē,
& fibrosam.

LOCVS.

Nascitur secus itinera, locis *Matt.*
incultis, & in hortis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Additur à Chirurgicis ī po- *Idem*
tionibus intrinsecorum
vulnerum, & fistularum,
quinetiam radicibus, &
foliis ad recentia vulne-
ra, & vlcera sananda, v-
tuntur. Fotu quoque v-
surpantur ad articulo-
rum dolores.



GERANIVM tertium. Italis, *Geranio terzo*.

GERANIVM III.

FORMA.

Aut. Foliis virescentibus, seu Myrrhidis proximis, minus tamen lacinjatis, humi accubantibus, quæ senescentia rubescunt. caules habet breves, rotundos, pilosos, rubentesque: in quorû summitatibus spectantur flores punicei, parvi, stellæ figura, è quibus acuti oriuntur apices gruinis rostris similes, sursum spectantes, capitulis balustij effigie. radice nititur candida tereti, ac dulci.

LOCVS.

Idem Nascitur in ruderibus, circa sepes, secus itinera, & saxoso, & extenuato solo.

QUALITATES,
ET VIRES.

Hisdem cum secundo genere viribus pollet.



GERANIVM quartum. Italis, Geranio quarto.

GERANIVM IIII.



FORMA.

Foliis assurgit ceteris grā *Matt.*
dioribus, ramūculi æ-
mulis, octonis, circun-
qua; diuisuris, nume-
rosis, humi accubanti-
bus, prælongis, ac fir-
mioribus pediculis, ni-
tentibus. caules edit
pinguiusculos, & ar-
ticulatos, ramis copio-
sis, in quorū cacumini-
bus, flores emicāt pur-
purei ceterorum ma-
iores. Quibus flacce-
scentibus gruina (vt in
ceteris) prodeunt capi-
ta, prono in summita-
te rostro, triplici apice
in coronæ modum re-
scisso. Radicem quoq;
ceteris longiorem ha-
bet crassiolem, robu-
stiolemque, colore ru-
fescete, & lignosa in-
tus matrice.

LOCVS.

Prouenit in pratis in Ger *Idem*

mania, & Boemia.

FACULTATES, ET VIRES.

Vulneraria est herba, & præsertim radix tam in potionibus addita,
quàm exterius admota.

GERANIUM quintum. Italis, *Geranio quinto*.

FORMA.

Mat. Folia promit pentaphylli modo diuisa, magis tamen per ambitum serrata. subhirsuta, & præ lōgis pediculis, ipsisq; pilosis nitentia. caules habet dodrantaes, tenues, & lanuginosos. Flores ex purpura rufescētes, e quibus parue, acutæq; oriūtur siliquulæ, hirsutæ, ac subasperæ, in quibus semen concluditur. Radicem habet dodrantalem, sed tenuem.

LOCVS.

Idem Nascitur arido solo.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem Germanorū medici hanc tritam recentemq; peculiariter commendāt ad Erysipelas, ad inflammationes mamillarum, & oris, & pudendorum vlcera.

GERANIUM V.



GERANIUM sextum, Italis, Geranio *sesto*.

GERANIUM VI.



FORMA.

Folia profert Altheę pro- *Matt.*
xima, caules plures,
lętos, geniculatos, hir-
sutos, flores paruos,
rubentes, balauſtij ef-
figie, è quibus roſtrata
prodeunt capitula. Ra-
dix illi eſt ſeſquidodrā
talis, digiti craſſitudi-
ne, quę humotenus ru-
beſcit.

LOCVS.

Nascitur in montibus, *Idem*
& præſertim in Baldo
monte in agro Vero-
nenſi.

QUALITATES,
ET VIRES.

Viribus præſtat vulnera- *Idem*
riis, & iis omnibus,
quibus, & cętera ge-
nera.

GNAPHALIVM, Græcis, Γναφάλιον.] Italis, Gnafalio.

F O R M A .

Matt. Gnaphalium planta est incana tota, tomento-
saque, caulibus com-
pluribus fruticans, cir-
ca quos totos folia in-
sunt crassiuscula, ob-
longa, lanuginosa, ac
mollia : quæ verò in
cauliū summitate spe-
ctantur in rosę modū
orbiculata sunt. Radi-
cem habet multifidā,
ac lignosam.

L O C V S .

Idem Prouenit raris in locis in
Italia, & gaudet apri-
cis, & siticulosis.

Q U A L I T A T E S .

Gale. 6. simp. me. Gnaphalium, ideo sic no-
minatum est, quod fo-
liis eius mollibus, ἀν-
τίγναφάλιον, hoc est p
tomētis vtantur. sunt
autem candida, & me-
diocriter adstringunt,
proindeque sunt, qui
ex vino austero dysen-
tericis propinent.

V I R E S .

Diosc. Bibuntur efficaciter folia ex vino austero ad dysenteriam. ¶ *Quinetiam*
Matt. ad diarrheam, & celiacas passiones. Profunt quoque enterocellis
in puluerem hausta.

G N A P H A L I V M .



TYPHA, Græcis, Τύφη.] Italis, *Mazza sorda.*] Germanis, *Moskolben,*
seu Narenkolben.] Hispanis, *Bohordo, seu Iunco Amacorocado.*] Gallis,
Mache, seu Masse de iunc.

TYPHA.

FORMA.


Folium edit Cyperidi simi *Diosc.*
 le, caulem album, leuē,
 æquabilem, florem in
 cacumine ambientem,
 densum, qui in pappos
 soluitur, quod panicu-
 lam aliqui vocant.

LOCVS.

Gignitur in palustribus, & *Idem*
 aquis stagnantibus.

FACULTATES,
ET VIRES.

Huius herbę flos suillo adi *Idem*
 pe eloto exceptus, am-
 bustis medetur.



FILIPENDULA, Italis, *Filipendula*, *Quibusdam Oenanthe sed falso.*

FILIPENDULA.

F O R M A.


Matt. Foliis est numerosis ab vno pediculo vtrique seriatim dependentibus, pimpinellę siue sanguisorbę modo, magis tamen se se stipantibus, oblongis, & per ambitum denticulatis, caulibus sesquicubitalibus, in quorum fastigiis flores sunt albi, in umbellę ferè speciem coherentes, atque odorati; Radices habet multifidas, funiculi modo exiles, sed globulis numerosis refertas perinde, ac in præonia fœmina, sed longè minoribus, oblongis, & rariusculis.

L O C V S.

Idem Nascitur in pratis, & herbosis locis.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem Radix pota urinę remoratori, eiusq; stillicidio auxiliatur. Item renum, tum calculis, tum doloribus. Eadem stomachi inflationes discutit. Medetur suspiriosis, & ægrè spirantibus, omnibusque in vniuersum morbis, quos pituita excitauerit. Radicum siccarum puluis utiliter inspergitur comitialium cibis.



OENANTHE, Græcis, Ονάνη.] Italis, *Enante*.

OENANTHE I.

FORMA.

Folia habet pastinacæ, Diosc.
flore candidum, cau-
lem crassum, palmi al-
titudine, semen tripli-
cis. Radicem magnam
in multa rotunda capi-
tula extuberantem.

LOCVS.

Nascitur in petris. Diosc.

QUALITATES,
ET VIRE.

Semen, caulis, & folia cū *Idem*
mulso vino pota, secū-
das eiiciunt. Radix ex
vino urinx stillicidio
conuenit.

APPENDIX.

Si huic plantę caules ines-
sent crassi, assererem
profectò legitimum es-
se Oenanthē.

O E N A N T H E secundum. Italis, *Filipendula secunda* .

O E N A N T H E II.

F O R M A .

Matth. Foliis est pyrethri, aut pa-
stinacæ sylvestris non
ab similibus, caule fœ-
niculaceo, qui umbel-
las in summitate ge-
rat, è ramis dependen-
tes. Radicibus per om-
nia filipendulæ simili-
bus.

L O C V S .

Idem Prouenit in collibus, &
locis à Sole illustratis.

Q U A L I T A T E S ,
E T V I R E S .

Idem Creditur iisdem esse vi-
ribus, quibus filipen-
dulâ præstare diximus.



OENANTHE tertium. Italis, *Filipendula terza*.

OENANTHE III.

FORMA.

Folia promit Gingidij, *Blatt.*
caulem fœniculatum,
striatumque, è cuius
ramis umbellæ oriun-
tur cãdidę. Radicibus
numerosis filipendulę
similibus, sed vegetio-
ribus globulis.

LOCVS.

Nascitur in amœnis tra- *Idem.*
ctibus, & in mōtibus.

QUALITATES,
ET VIRES.

Nihil differt suis in viri- *Idem.*
bus à præscriptis.



OENANTHE quartum. Italis, *Filipendola serpeggiante*.

OENANTHE IIII.

FORMA.

Matt. Herba est humi serpens, foliis tertij ferè similibus, exilioribus tamè, & magis laciniatis; caule sinuoso, striatoque. Capitulis in summitate hirsutis, in quibus semen. Radices mittit plures, rapunculi ferè effigie, non solum in ima caulis parte, sed etiam in ramis, qui humi serpètes, radices quoque faciunt.

LOCVS.

Matt. Nasct̃ in incultis locis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem. Et si nihil certi de eius viribus, nobis constet: putamus tamen à ceteris Filipendulis non multum differre.



APPENDIX.

Oenanthe, has plantas, ideo appellare libuit; quòd ita Filipendulam, cuius sunt species, vulgares vocent. Atqui re vera nec oenanthe sunt, nec eius species.

CONYZA, Græcis, Κοῦζα.] Italis, Coniza, seu pulicaria.] Germanis, Geel muntz.] Hispanis, Attadegua.] Gallis, Herbe aux puces.

ἡνὶν

CONYZA.



G E N E R A.

Tria eius habetur genera, *Diosc.*
maius, minus, & mediū.

F O R M A M A I O R I S.

Foliis est oliuæ similibus, *Idem.*
latioribus tamē, & frutice altiori, graui odore, hirsutis, pinguibus, caule binum cubitorū, flore fragili, lutei coloris, q̄ in pappum abit. Radicibus supuacuis.

L O C V S,

Nascit̃ in cāpestrib⁹, ī col- *Matt.*
libus, & amœnis locis.

Q U A L I T A T E S.

Conyza maior, & minor *Gale. 7.*
adsimilis sunt tū tēpe- *simp. me.*
raturę, tū facultatis. Gu-
stui amarę, & acris. Ex-
calfaciūtq̄; admodum
luculenter, adeo vt ter-
tij sint ordinis excalfa-
cientiū, & desiccantiū.

V I R E S.

Frutex totus suffitu, sub- *Diosc.*
stratuq̄; serpētes fugat,
culices abigit & puli-
ces necat. Folia conue-
niēter illinunt̃ serpen-

tium plagis, tuberculis, ac vulneribus. Flores, & folia cū vino ad men-
ses, partusq̄; eiiciendos bibuntur. Item contra vrinæ stillacidia. Ar-
quatum morbum, & tormina, comitiales pota ex aceto adiuuant.
Decoctum in defessionibus vuluæ affectibus medetur, impositus suc-
cus abortum facit. Herba ex oleo efficaciter horroribus oblinitur.

CONYZA minor, Græcis κόνιζα μίκρα.] Italis, Coniza minore.

Glin Durvans

CONYZA MINOR.

FORMA.

Foliis prouenit alterius angustioribus, frutice breuiori, pedali longitudine, & odore quidē præstātiori, cætera verò maiori similia habet.

LOCVS.

Prouenit secus itinera, in campestribus, & in amœnis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Gale. Adsimilis cum maiori est
Diosc. tēperaturæ: quinetiam facultatis.



CONYZA tertia, Græcis, Κόνιζα τρίτος.] Italis, Coniza terza.

Sic Dicitur Dictionarij

CONYZA TERTIA.

FORMA.



Caule est crassiore, & molliore, foliis mediæ inter maiorem, & minorem, amplitudinis, minime pinguis, multo tamē grauioris odoris, & iucundioris.

LOCVS.

Prouenit humectis locis. Diosc.

QUALITATES,
ET VIRES.

Potest omnia quę priores, sed imbecillius operatur. Peculiariter autē auxiliatur siccæ farina dysentericis, si quotidie drachmæ duæ propinentur ex vino rubro austero.

HEMEROCALLIS, Græcis, *Ημερόκαλλis*.] Italis, *Hemerocalle*, & *Ciglio saluatico*.] Germanis, *Heydnisc-Lilien*.] Hispanis, *Lirio amarilho*.] Gallis, *Lis iaune*.

FORMA.

Diosc. Foliū, & caulem habet Lilij, herbacei coloris, vt porrum. Flores in caule per singulos exortus terni, aut quaterni erūpūt lilij diuisura, quoties de hiscere cœperūt, colore perquàm pallido. Radix magna est, atq; bulbosa.

LOCVS.

Matt. Prouenit in segetib⁹, & cāpestribus inter vepres.

QUALITATES.

Gale. 6. simp. me. Hemerocallis radicē habet lilij radici similē, non figura tātum, sed & viribus: prodest non secus atq; illa igni ambustis, quippe quæ leuiter digerētem facultatem habeat, & cum hoc repulso-
sorium quiddam.

VIRES.

Diosc. Pota radix, aut cū melle, & lana in pecto supposita, aquam educit, & sanguinem. Folia trita māmaram inflāmationes a partu contractas, oculorūq; collectiones mitigat. Radix, & folia igni ambustis vtiliter illinuntur.

HEMEROCALLIS.



HEMEROCALLIS altera, Italis, *Giglio saluatico secondo*.

HEMEROCALLIS ALTERA.

F O R M A .

Alteram facie æmulatur, *Matt.*
sed radicem habet, quæ
pluribus, & paruis co-
agmētatur bulbis. quin
etiā flores profert Mar-
tagi modo repandos,
prioris hemerocallis co-
lore, ut eius imago quā
hic adiecimus palā de-
monstrat.

L O C V S .

Prouenit in montibus. *Idem*

Q U A L I T A T E S ,
E T V I R E S .

Eadem præstare possunt,
tum radix, tum folia,
quæ prior.



LILIVM conuallium, Italis, *Lilio conuallio.*] Germanis, *Mey bluom-*
lin.] Gallis, *Muguet.*

LILIVM CONVALLIVM.

F O R M A .

Matt. Folia profert, quadatenus
plâtaginis effigie, sed te-
nuiora, laevia, nervisq;
carentia, cauliculos iū-
ceos, triangulares; te-
nues, ac molles, obse-
quiososque, in quibus
flores exeunt plures ba-
laustij, aut arbuti florū
effigie: odore eximio,
& per quā iucundo, è
quibus baccae enascun-
tur virides, quæ per ma-
turitatem rufescunt. Radi-
ces demittit laxas, lon-
gas, fibris, capillamen-
tisque refertas, nullis
adiacentibus bulbis.

L O C V S .

Idem Nascitur in montibus, &
in eorum conuallibus.

Q V A L I T A T E S .

Idem Flores excalfaciunt, atte-
nuant, digerunt, prouo-
cant.

V I R E S .

Idem Aiunt iuuare cor, atq; ce-
rebrum, ac omnes prin-
cipes facultates. Idcirco
resolutis, comitialibus, cōuulsis, vertiginosis, veternosisque, animi
deliquio laborantibus, & cordis pullatione affectis inhibent. Item
agrè parturientibus stillatitiam florum aquam vtiliter potandam
censent, & oculorum inflammationes eandem sanare putant.

C E N S V R A .

Qui Lilium cōuallium Ephemerū alterum faciūt, iis mēs sana nō est.



LEVCOIVM, Græcis, *Λευκόιον*.] Mauritanis, *Keiri, Cheiri, siue Alcheiri*.] Italis, *Viola bianca, gialla, & pavonazza*.] Germanis, *Golb violen, siue Vniß veil*.] Hispanis, *Violetas amarilhas, & Violetas blanquas*.] Gallis, *Violors rouges, blanch, jaunes, seu Violetz*.

LEVCOIVM ALBUM, ET PURPUREVM.

GENERA.

Tria Leucoij visuntur genera, nempe Album, Purpureum, & Aureum. *Matt.*

FORMA.

Prosiliunt omnia genera cubitali altitudine, ramosa; fruticosaque, caulibus brassicæ exilioribus, sed foliorum facie variant. Nāq; tam & si omnibus folia sunt oblonga, id tñ quod luteis exit floribus, foliis est longioribus, numerosioribus, viridioribus, ac magis in acutū desinentibus. Cetera verò nempe album, & purpureū folia gerunt breviora, latiora, & minime mucronata, quinetiam supernè, inferneque canescentia. *Matt.*

LOCVS.

Seritur in hortis, & scitilibus ad exornandas ediū fenestras. *Idem.*


QUALITATES.

Leucoij frutex vniuersus ex tergentē facultatē possidet, ac tenuium est partium, plus tamen flores, & inter hos q sunt sicciores, magis etiam quā virides: Radices similis quoque sunt facultatis, nisi quatenus crassioris sunt essentiae, & magis terrenæ. *Gale. 7. simp. me.*

VIRES.

Sicci flores oculorū cicatrices crassas extenuant, tum mē-

tes quoq; decoctum eorum mouent, & secundas, foetumq; emortuum elicit, & si bibatur viuum quoq; perimit, & abigens est medicamentum. Est. n. id vt si quod aliud amarū. Sic decoctum eius si non merum fuerit, sed aqua mistū vteri phlegmonas perfusum sanat. potissimum quæ diuturno tēpore ad scirrhi modum induere, sic cum cerato vlcera ægrè ad cicatricē peruenientia curat. Sunt verò etiā qui cū melle ad oris vlcera adhibeant. Semen quoq; iisdē facultatibus pstat. Radices ex aceto illitę lienes induratos sanant. Quinetiam phlegmonas in articulis induratas,



LEVCOIVM aureum, Græcis, *Λευκοίον ὀρεόν.*] Italis, *Viola gialla.*

LEVCOIVM AVREVM.

F O R M A .

Matt. Foliis est longioribus, numerosioribus, viridioribus, & magis in acutum desinentibus. Flores edit luteos, odoratosque.

L O C V S .

Idem. Seritur passim in hortis, & fictilibus.

Q U A L I T A T E S ,
E T V I R E S .

Diosc. Præstat ea omnia, quæ cetera genera, sed longè valentius. Ideoq; præcipui est in medicina usus.



PHYLLVM, Græcis, φύλλον.

PHYLLVM.



GENERA.

Duum est generum θηλυ- **DIOSC.**
γόνον, καὶ ἀρρενογόνον.

FORMA.

Telygonon prouenit mu **DIOSC.**
sci modo, folio oleæ,
sed colore magis her-
baceo, caule tenui, bre-
ui, radice exili, florem
album profert, semen
papaueris maiusculū.
Arrhenogonum verò
cetera huic simile ha-
bet, solo fructu distat,
habet. n. racemosum
quiddam deflorētibus
oleis non dissimile.

LOCVS.

In saxosis nascitur.

Idem

VIRE.

Arrhenogonon pota ma-
sculini sexus partus,
vt telygonum fœminei,
facere proditur.

Del. 1000
TESTICVLVS, Græcis, ὄρχις, & ἀπφορογόρον.] Mauritanis, *Chafi*, *Alchelb.*] Italis, *Testicolo di cane.*] Officinis, *Testiculi vulpis.*] Germanis, *Knabenkraut.*] Hispanis, *Coyon de perro.*] Gallis, *Coullon de Chien.*

G E N E R A .

Duo tantum genera Dioscoridi recēsentur. Sed re vera plura passim spectantur, ut ex iconibus hic seriatim appictis palam fiet.

F O R M A .

Diosc. Is qui Cynosorchi, dicitur foliis exit circa caulem, & ima eius parte ī terra striatis Oleæ molli similibus, lōgioribus, angustioribus, leuibus, caule dodrantali, floribus purpureis, radice oblōga oliuæ modo, angusta, duplici ordine, superiore quæ plenior est, inferiore quæ mollior, & rugosior. Alter verò Serapias appellatus, foliis est porri, latioribus, oblongis, pinguibus ex alarū sinu inflexis, caule palmeo, floribus planè purpureis. Radice testiculis simile.

L O C V S .

Diosc. Nascitur in petrosis, & sabuletis.

Q U A L I T A T E S .

Gale. 8. Cynosorchi vis inest humida, & calida, ac gustantibus dulcior apparet. Cæterum maior radix multam videtur habere humiditatē excrementitiā, & flatuosam. Altera verò, minor videlicet, cōtra admodū elaborata est, ita ut eius tēperamentū ad calidius, & siccus vergat. Orchis verò, quem & Serapida nuncupant, sicciorē facultatem obtinet, quā ut primi ordinis haberi mereatur.

V I R E S .

Diosc. Eduntur Cynosorchis radices coctæ, ut bulbi, ex quibus si maiores edunt viri, mares generare dicuntur, si minores feminae, alterum sexum. Illius verò radix qui Serapias appellatur, illita tumores discutit, vlcera purgat, & serpente eadē nō patitur, abolet fistulas, & illitu inflammationes delet. Arida radices nomas inhibent, sanantque putredines, & oris vlcera cacoethe. Alium sistunt ē vino potæ. De hac eadem, quæ de Cynosorchi produntur.



TESTICULI SPECIES II. ET III.



FORMA.

Secundi, tertiiq̃ue Testi- *Matt.*
culi forma ex duabus
his imaginibus circun-
scribi potest.

LOCVS.

Nascitur in pratis mon- *Idem*
tium, collibus, & her-
bosis pascuis.

VIRE.

Vires cum cæteris vnifor-
mes habet.

F O R M A .

Matt. Ex hac imagine facile quis
piã quarti testiculi for-
mam concipiet.

L O C V S .


Idem Nascitur in montibus, &
præsertim in pratis.

V I R E S .

Idem Vires illi eadem sunt quæ,
& ceteris.



TESTICULI SPECIES V.



FORMA.

Folia gerit plantagini pro- *Matt.*
xima, supernè striata, cau-
lem dodrantalem, gla-
brum, leuèque, flores spi-
catos, tum candidos, tū
quandoque purpureos,
radices (vt ceteri) duas
oleæ magnitudine.

LOCVS.

Prouenit in montibus, her *Idem*
boso solo.

VIRE.

Ea omnia potest, quæ cete- *Idem*
ra genera.

PALMA Christi maior. Italis, *Palma di Christo maggiore*.

PALMA CHRISTI MAIOR.

G E N E R A .

Duum est generum, Alterum maius, Alterum minus.

F O R M A M A I O R I S .

Matt. Maius folia habet alij, latiora, nigris infecta maculis, caulem rotundū, læuē, florem spicatum, varium, in purpura albicantem, odore nō ingrato. Radices duas, quę sanè caninos testiculos referrent, nisi processibus quibusdam, quasi digitis humanam manū exprimere viderent.

L O C V S .

Idem. Nascitur in montibus, potissimū in pratis, & herbosis locis.

Q U A L I T A T E S ,
E T V I R E S .

Idem. Ea omnia præstat, quę canini Testiculi. Peculiariter autem radices potæ crassa corporis excrementa pellunt, faciēq; detergunt. Dantur maniacis magno iuuamento, quin & in neruorum affectibus. Semen drachmę pondere in vino potum comitialibus conuenit. Febrem quoq; quartanam curant radices duarum drachmarum pondere haustę.



PALMA Christi minor. Italis, *Palma di Christo minore*.

PALMA CHRISTI MINOR.



FORMA.

Foliis constat croci, cau- *Matt.*
le dodrantali, iunceo,
leuique, in cuius cacu-
mine flos emicat pur-
pureus amarathi emu-
lus, saturationi tamen
purpura splendēs, qui
recens odorem quā
suauissimum spirat.

LOCVS.

Nascitur in pratis alto- *Idem*
rum montium.

QUALITATES.

ET VIRES.

Florum exiccatorum pul *Idem*
uis datur vtiliter po-
tandum dysentericis,
ex aqua in qua ferrum
extinctum fuerit. Idē
totius plantę stillatitiā
aquam præstare aiunt.

SATYRIVM, Græcis, Σατύριον.] Mauritanis, *Gasi alchaleb, siue Casi alchaleb, siue Tatarich.*] Italis, *Satirio, & Satirione.*

SATYRIVM.

GENERA.

Diosc. Duum est generum, Primum quod Trifoliū : Alterū quod Erythronium vocant.

FORMA PRIMÆ.

Idem Tria fert folia ad terram infracta, rumici aut lilio similia minora tamen, ac rubra, caulem cubitalem, nudum, florem Lilij effigie candidum. Radicem bulbosam, mali magnitudine, fuluam, intus ut ovum candidam, gustati dulcem, & ori non ingratam.



QUALITATES.


Gal. 8. Humidum, & calidū temperatura est, quamobrem gustu quoque apparet dulce, attamen recrementitiam, & flatuosam humiditatem possidet, quo circa venerē incitat. Hæc verò & herbæ ipsius radix præstare potest.

VIRES.

Diosc. Radix ex vino nigro austero pota confert Opisthotono laborantibus. Utendum ea dum concumbendi incessit, cupiditas siquidē ea propiores ad venerem fieri affirmant.

SATYRIUM Erythronium, Græcis, Σατύριον ἐρυθρόνιον.] Italis, Sati-
rione Erithronio.

SATYRIUM ERYTHRONIVM.




FORMA.

Semine prouenit lini si- diosc.
mile, maiore tamen,
duro, leui, splenden-
te, quod fertur nō se-
cus atq; scincus libidi-
nem excitare. Cortice
radicis gracili, rufo, in-
tus autem album in-
cluditur, sapore dulci,
ori non ingrato.

LOCVS.

Prouenit in Syria, vnde *idem*
mihi missum est. ¶ In *Matt.*
montosis & apricis na-
scitur.



VIRE S.

Venerem, vt produnt, si diosc.
omnino manu tenea-
tur, stimulat, eoq;ue
magis si bibatur.

HORMINVM, Græcis, Ορμινόν.] Italis, Horminio.

G E N E R A .

Diosc. Horminum duplex habetur, domesticum & sylvestre.

FORMA DOMESTICI.

Diosc. Planta est foliis marrubio similis, sed maioribus, caule semicubitali, quadrangulo, circa quem eminentiæ siliquis similes prodeunt, quæ ad radicem spectant. Flores edit in caule secundum folia per interval la prodeuntes purpureo colore, in quibus diuersum semen concluditur.

Matt.

L O C V S .

Idem. Seritur in hortis.

Q U A L I T A T E S ,
E T V I R E S .

Diosc. Semen ad Venerē stimulantiam bibi cum vino volunt. Purgat cum melle argemas, aibugines que. Illitum ex aqua tumores discutit, eo etiam aculei ex corpore extrahuntur. Idem effectus est illius herbæ.

H O R M I N V M .



HORMINVM sylvestre, Græcis, Ορμινον ἄγριον .] Italis, *Horminio sal-*
uatico.

HORMINVM SYLVESTRE.



FORMA.

Folio est Saluix ferè simi *Matt.* ;
li, caule sesquipedali,
aspero, quadrangulo,
subhirsuto, striatoque,
flore saluix, purpura-
scente, siliquis nume-
rosis in humum refle-
xis, in quibus semen
rotundū, fusco colore.

LOCVS.

Prouenit in cāpestribus, *Idem*
in pratis, secus itinera,
& herbosis locis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Eadem omnia præstat, *Idem*
quæ de domestico scri-
buntur.

SCLAREA, Italis, *Sclarea*, *Scarleggia*, seu herba di san Giouanni. quibusdam *Matrisalua*.] Germanis, *Schlarlac*.] Gallis, *Orual*, seu *Toutebonne*.

F O R M A.

Matt. Foliis exit hormino quadruplo maioribus, ac latioribus, subasperis, crispis, humi accubantibus, caule sesquipedali, & quandoque maiori, hirsuto, firmo, quadrangulo, à cuius medio plures oriuntur rami. in quibus spicati exeunt flores subpurpurei, odore eximio, & quadam cū grauitate iucūdo, ex his calyculi oriūtur, in quibus habetur semen nigrum pellucidum, ac rotundum. Radice nititur multifida subnigricāte.

L O C V S.

Idem Seritur in hortis, & viridariis.

F A C V L T A T E S.

Idem Excalfacit, attenuat, discutit, aperit, resoluit.

V I R E S.

Idem Folia ex aceto imposita, panos per se, vel cum melle discutit. Item forunculos anteaquam acuminentur. Itale mulieres seminis granum oculis caligantibus intro mittunt, nec inde auferunt nisi caligine soluta.

A P P E N D I X.


Idem Sclarea & si Dioscoridis Horminum non est, ego tamen Horminum maius, aut odoratum appellauerim.

SCLAREA.



SECVRIDACA, Græcis, Ηδύσχηρον.] Vnguentariis, *Pelecinum*.] Italis, *Securidaca*.

SECVRIDACA MAIOR.



G E N E R A .

Duum est generū, Alterum *Matt.* maius, Alterum minus.

F O R M A M A I O R I S .

Foliis exit ciceris, vndecim *Matt.* ex vno processu erumpētib; cauliculos edit tenues, lentosque, floribus diluto colore, purpurascentibus vt in pīso, sed minoribus. Siliquas habet quadātenus falcatas, pressas, adunco cacumine, in quibus rufum concluditur semen ancipitis securis effigie. Vnde illi nomen. amaro sapore. Radice vnica nititur, paucis adnatis fibris.

L O C V S .

Nascitur in segetibus, & *Diosc.* hordeis.

Q U A L I T A T E S .

Hedysari semen colore rufum est, vtrinque anceps, *Gal. 6. simp. me.* vti securis. Amarum, & subacerbum apparet.

V I R E S .

Semen haustum stomacho vtile, cum melle ante coitum subditum cōcipiendi spem adimit. Additur in Antidotis. ¶ Viscerum obstructiones expurgat. Idem præstant totius fruticis ramuli. *Diosc. Gal. ibid.*

SECVRIDACA minor, Græc. ἡδύσαρον μικρόν.] Italis, *Securidaca minore*.

SECVRIDACA MINOR.

FORMA.

Matt. Maiori ferè adsimilis est, folia tamē minora spectantur, numerosiora, & in cacumine retusa. Quin etiam & caules, & rami & ceteræ quot quot sunt partes minores habentur. Flores edit alteri haud absimiles, sed pusillos, è quibus cornicula proueniunt rotunda, incurua, acuminato cacumine, quæ per maturitatem rufescunt. Semen in his contentum alteri simile est, sed minus, ac tenuius.

LOCVS.

Idem. Nascitur & ipsa inter segetes in agris.


QUALITATES,
ET VIRES.

Ea omnia, quæ maiori ascribuntur, ea quoque in minori reperiuntur.



ONOSMA, Græcis, ὄνοσμα.] Italis, Onosma.

O N O S M A.



F O R M A.

Oblonga folia habet, an- diosc.
chusq̃ modo, longitudi-
ne quatuor digitorum,
& vnus latitudine, mol-
lia, in terra iacētia, sine
caule, sine semine, sine
flore. Radice nititur ob-
longa, tenui, infirma,
rubescēte.

L O C V S.

Gignitur in asperis.

Idem

Q U A L I T A T E S.

Onosma ex acri, & amara *Gale. 6.*
constat substantia. *sim. med.*

V I R E S.

Folia ex vino pota partus diosc.
extrahunt. Pręgnans si eam supergradiatur abortum facere dicitur.

NYMPHAEA, Græc. Νυμφαία.] Maur. Nilofar, seu Nilufar.] Barb. Nenufar.]
 It. Nimphea.] Ger. Gälb, Vuchisz sebl Vuornē, & Haaruurtz.] His. Escudetes
 del rio, et Higos del rio.] Gal. Blanc de eau, siue Lunet de eau, siue Lis de stagn.

G E N E R A.

Matt. Tria eius habentur genera,
 duo magna, alterū quidē
 albū, alterū Luteū, & ter
 tiū, qđ parū appellatur.

F O R M A A L B A E.

Diosc. Foliis est fabę Ægyptię,
 minoribus, & lōgiorib⁹,
 aliis ī summa aqua, aliis
 demersis, pluribus ex ea
 dē radice pdeūtib⁹. Flo
 re albo, Lilio simili, & in
 medio crocos habente,
 cū defloruerit, vt rotun
 dū malū, aut papaueris
 caput extuberat, nigro
 semine, dēso, & lato, lēti
 gustus. Caulis est lævis,
 niger, minime crassus,
 Ægyptię fabę cognatus.
 Radix nigra, crassa, sca
 bra, clauę similis:

L O C V S.

Idem. Nascitur in paludibus, &
 stagnantibus aquis.


Q U A L I T A T E S,

Gal. 8. Nymphæ tū radix, tū se
 mē desiccādi vim habet,
 simp. me. citra morsum. Porro nō
 nullā etiam abstergendi
 vim obtinet.

Diosc. Sicca cū vino pota celiacis, dysentericisq; auxiliat⁹, & Lienē absumit.
 Radix stomachi, & vesicę dolorib⁹ illinit⁹, vitilignes ex aqua emēdat,
 imposita cū pice alopeciis medet⁹. Eadē cōtra veneris insomnia bibit⁹.

Matt. ¶ Paratur ē floribus oleū ipsis in eo insolaris, quo vtuntur medici vbi
 refrigerare ac humectare sit opus. Soporiferi. n. quidpiā illi inest, folia
 recentia renibus admota seminis profluvia sistunt..


N Y M P H A E A A L B A.



V I R E S.

NYMΦAEA altera, Græcis, Νυμφαία ἑτέρα.] Italis, *Nimpha gialla*.

galeb Nymphaea
N Y M P H A E A L V T E A .



F O R M A .

Foliis est antedictæ, radi- diose.
ce alba, scabra, flore lu-
teo, nitete rosæ simili.

L O C V S .

Prouenit & hæc in sta- *Matt.*
gnis, lacubus, & pa-
ludibus.

Q U A L I T A T E S .

Deficcandi vim habet tū *Gale. 8.*
femen, tum Radix ci- *simp. me.*
tra omnem morsum,
& non nihil abster-
gunt.

V I R E S .

Huius. semen, & radix *DIOSC.*
contra fœminarū pro-
fluua efficaciter ex vi-
no nigro bibuntur, cæ-
tera cum altera paria
sunt. ¶ Attamen hu- *Gal.*
ius radix ad mulierū
profluua imbecillior.

C E N S V R A .

Qui putant Arabum, & Græcorum Nympheas diuersas esse plantas,
proculdubio hallucinantur.

NYMPHAEA parua, Græcis, Νυμφαία μικρά.] Italis, Nimphea piccola.

ΝΥΜΦΑΕΑ ΠΑΡΥΑ.

FORMA.


Matt. Foliis est aliarum facie similibus, sed brassicæ marinæ paulò maioribus. Flore candido, capitulis exiguis, ut in cappari, semine intus papaueris magnitudine.

LOCVS.

Idem. Nasçitur in Lacubus, & paludibus, circa eorū litora, in aqua tamen, nec alibi eam videre licuit præterquā in Boemia.


QUALITATES,
ET VIRES.

Idem. Imbecillioribus longè viribus est quàm cætera de quibus diximus.



ANDROSACES, Græcis, ἀνδρoσάκες.] Italis, *Androsace*.

A N D R O S A C E S.



F O R M A.

Androsaces herba est ama **Diosc.**
ra, tenues spargens iū-
cos, sine foliis, follicu-
los in capitibus habēs,
in quibus semen conti-
netur.

L O C V S.

Gignitur in Syriae mari- *Idem*
timis.

Q U A L I T A T E S.

Androsaces humida, & *Gal. 6.*
acris herba est. *simp. me.*

V I R E S.

Ea drachmis duabus ex **Diosc.**
vino pota hydropicis
copiosam vrinam ciet:
eundem effectum præ-
stat, & semen potum,
& herbę decoctum: po-
dagris vtiliter illinitur.

ANDROSACES ALTERA.


Matt. Sunt qui putent hanc plā-
tam Androsacem legi-
timam esse, quod è Sy-
riæ maritimis allatam
sciant. Verùm cum fo-
lia in summitate gerat,
non possum ego facile
eorum subscribere pla-
citis, eam tamen hic
excudi curauimus, vt
aliorum quoq; sit iu-
diciū.



ASPLENVUM, quod Scolopendriū aliqui vocāt, Græcis, Ασπλην.] Mauritanis, Scolofendrion, siue Sculufendrium.] Offici. Cetrach.] Ital. Aspleno, & Cetrach, seu herba indorata.] Hisp. Doradilha.] Gallis, Cetrach.

ASPLENVUM.

FORMA.



Foliis est multis scolopendracæ animalis similibus, ab radice vna prodeuntibus; nec caulē, nec florē, nec semen habet. Folia polypodij modo diuiduntur, subterflauescētia, hirsutaque, supernè viridia. Diosc.

Nascitur in parietibus, saxisque siliceis (oppidorum meniis) & opacis. Diosc. Matt.

QUALITATES.

Asplenū tenuium quidem *Gale. 6.* partiū, nō tamen calida *sim. med.* herba est, hac vtique ratione, & lapides frangit, & lienes liquat.

VIRES.

Folia in aceto feruefacta, Diosc. & per dies quadraginta pota, lienem absumunt. quibus etiam contritis lienem ex vino illini oportet, strāguriæ, & regio morbo prodest, singultum sedat. Calculos in vesica cōminuit, conceptum adimere creditur.

tur per se aut cum Muli liene appensa. Tradunt nocte silente Luna huius rei gratia effodienda. ¶ Ponitur in decoctis, quæ ad melancholicos parantur morbos.

HEMIONITIS, Græcis, *Ημιωνίτις*.] Italis, *Hemionite*.

HEMIONITIS.

F O R M A.

prosc. Foliū emittit dracunculi,
lunatum, radicibus co-
heret multis, tenuibus,
nunquam florem, neq;
semen, neque caulē gi-
gnit, austero tota plāta
sapore.

L O C V S.


prosc. Nascitur in petrosis. Itaq;
Romæ nasci eum scri-
bunt prope magnū am-
phiteatrum, quibusdā
in ruderibus, aut ædifi-
ciorum ruinis.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 6. Adstrictionem simul & a-
simp.me. maritudinem possidet.

V I R E S.

Ex aceto pota lienem ab-
sumit.



Italica, Sferra cavallo, ita appellatur, quòd equis calceos ferreos calcata extrahat, Chymistis Lunaria minor. Quibusdam securidaca etiam nuncupatur.

S F E R R A C A V A L L O .



F O R M A .

Foliis exit minori Securidacæ proximis, pusillis, cordisq; faciē referentibus, incurva secundum longitudinē excurrente linea, pluribus vtrinq; è lōgo pediculo emergētibus siliquis oblongis, pressis, numerosis, altera parte sinuatis incisuris diuisis, foraminū rotundorum speciem referentibus, prominēte vtrinq; orificio. Caules habet angulosos, striatosque ramulis numerosis refertos, semen è siliquis prodit lunatim, bicornē. Vnde apud chymistas Lunarię nomen adinuenit.

Matt.

L O C V S .

Oritur in altis mōtibus. *Idem*

Q V A L I T A T E S .

E T V I R E S .

Nullum quod sciam ha- *Idem*

bet in medicina vsum, quāuis non desint herbarij, qui eam in potionibus vulnerum addant. Chymistæ hac tantum ex argento viuo argentum purum fieri fabulantur.

supprimere vino
hinc / hinc / hinc

LVNARIA minor, siue Lunaria Botrytis. Italis, Lunaria del grappolo.

F O R M A.

LVNARIA MINOR.

Matt. Caule constat simplici, do-
drantali, rotundo, lēto,
gracili, e cuius medio
in latus ramusculus e-
xit costæ effigie, cui fo-
lia insunt vtrinque se-
ptem, aut plura, luna-
ta, crassâ, firmaque bras-
sicæ marinæ modo. flo-
res profert in summi-
tate caulis oxalidis mi-
noris modo, semine ru-
fo, rotūdo, ī vix modū
racematim coherente.

L O C V S.

Idem. Nasçitur in altis monti-
bus herbofo loco.


Q V A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem. Vulneraria est planta, effi-
caxque vulneribus re-
centibus glutinandis.

sanat pota intrinsecas

corporis fracturas, &

extrinsecas quoque illita, quare miris celebratur laudibus ad pue-
rorum enterocellas. Datur utiliter, cōmodeque dysentericis, planta
tota in puluerem contrita ex vino austero pota. Albas vteri fluxio-
nes supprimit, quemadmodum, & rubentes.



2 Mamm die Lindlar hat
eximiam, vixit, fuit, hinc
hinc / hinc / hinc
soll' quāt' / hinc.

CHAMAEMELON, Græcis, *Ανθεμίσ*.] Italis, *Camamilla*.] Germanis, *Camillen*.] Hispanis, *Manzanilla*.] Gallis, *Camenima*, & *Camomille*.

ANTHEMIS SIVE CHAMÆMILLA.



FORMA.

Rami sunt illi dodrātales, Diosc. & sæpe maiores, fruticosi, alis multis, cōcaui, tenuibus foliolis, paruis, numerosis, rotundis capitulis, floribus in medio aureis, forinsecus orbiculato ambitu candidis, & odoratis.

LOCVS.

Prouenit iuxta semitas in diosc. aruis, inter segetes & in pratis.

QUALITATES.

Chamæmelū tenuitate qui Gal. li. 4. de rosa per simile est, calore verò ad olei facultates magis accedens, animalium familiares, tū temperatas, quapropter lassitudinibus, si quid aliud confert, doloresq; sedat, mitigatque. Præterea tēsa remittit, & laxat quæque mediocriter dura sunt, emollit, quæque constipata rarefacit, excalfacit, & desiccatur ordine primo.

VIRES.

Potu, & infusione mēstrua pellit, partus, urinā, calculosque aduersus inflationes, & ilei tormina bibitur. Bilē suffusam expurgat, iocinoris vitia sanat. Eius decocto vesicę fouētur, & renes in calculi dolore, urinā ciet, Ægilopi illita medetur, cōmāducata vlcerū eruptiones in ore sanat. In summa omnibus ferè humani corporis morbis medetur.

ADONIS.


Matt. Sunt qui hanc plantam, quam quidam Virgilij Adonidem vocant, eam chamemeli speciē faciant, quæ flore purpureo prouenire asserit Dioscorides. Sed proculdubio fallūtur, quòd ipsiusmodi Anthemidis flores in medio aureo sint colore, & per ambitum, vt in Amello.



PARTHENIVM, Græcis, παρθένιον.] Officinis, *Matricaria*.] Ital. *Matricaria*, seu *Amarella*.] Germ. *Muoter kraut*, siue *Mettram*.] Gal. *Matricaire*. *Brosim graut*

PARTHENIVM.

FORMA.



Foliis exit coriandri, tenuibus, flore per ambitū albo, intus melino, odore subuiroso, sapore amaro.

LOCVS.

Seritur in hortis, ac etiam *Matt.* sponte nascitur.

QUALITATES.

Excalfacit, siccatur, aperit, ab *Idem* sterget, prouocat, resoluit, flatus pellit.

VIRE.

Siccaturum cum aceto multo, aut sale potum, non secus atq; epithymū bibilem, & pituitam detrahit, suspiriosis prodest, & melancholicis. herba sine floribus pota calculosus, & anhelatores iuuat. Valet decoctū ad insedendum in duritia uuluarum, & inflammationibus. Illinitur sacro igni & in collectionibus cū flore. § Epotus succus *Matt.* drachmæ pondere cū saccharo ventris tinea perimit. illitus impetigines, alphas, & lentigines e-

maculat. Peculiariter autem auxiliatur omnibus vteri affectibus, quos flatus, aut pituitosus humor excitauerit. menses ciet, & secundas. calescit recens super tegula: & irrorata vino ventri illinitur contra vteri dolores.

TANACETVM, siue Athanana, Italis, *Tanaceto siue Daneda.*

Tanacetum
TANACETVM.

F O R M A.

Matt. Folia gerit maioris millefolij æmulis, aliquanto tamen maioribus, amaro sapore, & odore graui, caulibus bicubitalibus, floribus melinis, aureis globulis similibus, umbellatim quadantenus micantibus. Radice nititur vnica compluribus adnatis fibris.

L O C V S.

Idem. Prouenit in hortis, ac etiã alibi sponte per se nascitur.

Q U A L I T A T E S.

Idem. Excalfacit, exiccat, abstergit, aperit, flatus pellit.

V I R E S.

Idem. Alui, vetriculi, & vteri flatus discutit. Lumbricos pellit, urinã ciet, & menses, calculos eiicit, obstructions viscerum aperit.



BUPHTHALMUM, Græcis, Βούφαλμον.] Latinis, *Oculus bovis*.] Italis, *Buphthalmo*, sine *Occhio di bue*.] Arabibus, *Bihar*.] Germanis, *Rinds aug*.] Gallis, *Oiel de Beuf*.

BUPHTHALMUM.



FORMA.

Caules emitit tenues, mol **DIOSC.**
lesque, folia fœniculi,
luteum florem, anthe-
mide maiorem, oculi
similitudine, unde no-
men traxit.

LOCVS.

Circa oppida nascitur, & *Idem*
in campestribus.

QUALITATES.

Flores anthemidis flori- *Gal. 6.*
bus simillimi sunt, sed *simp. me.*
multo illis tum maio-
res, tum acriores, pro-
inde & vehementius di-
scutiunt.

VIRESS.

Flores cum cerato triti tu **DIOSC.**
mores, duritiasque di-
scutiunt. Aiunt epotâ
herbam post exitum à
balneis, Regio morbo
correptis colorem tra-
ctu temporis reddere.

BELLIS maior, Italis, *Primo fiore maggiore, seu Fiore di prima vera, nonnullis primula veris maior.*

G E N E R A.

Matt. Complura Bellidis habentur genera.

F O R M A M A I O R I S.

Matt. Folia gerit propè radicē, quercus modo serrata humi accubantia, crassiuscula, robustaque, sed quæ in caule sunt angustiora, ac longiuscula spectantur senecionis quodatenus æmula, cōplures ab vna radice emittit caules, cubitales, teretes, robustos, è quorū summis partibus flores exeunt anthemidis, aut parthenij maiores, qui æstate ferè tota perdurant, colore intus aureo, & p ambitū cādido. Radix illi est multifida, haud valde descendens.

L O C V S.

Idem Nascitur in pascuis, pratis, secus itinera, & in agrorum marginibus.

Q U A L I T A T E S,

E T V I R E S.

Idem Præstāt flores ad strumas

& caluariæ fracturas, qui etiam ad thoracis vlcera, quæ in eius cauitatem penetrarunt in quē vsum Bellim in potionibus addunt. Sunt qui omnia genera cōmendent ad Ischiadicos, & resolutos, commāsa folia sanāt cū oris, tū linguę exulceratas pustulas. Eadem tusa genitaliū inflāmationes extinguunt ac etiā resoluunt. Herba ipsa recens ex oleo, & aceto deuorata, aluū adstrictam lenit. Id quod etiam præstat ex iure pinguium carniū decocta, & vnā cum iure sumpta.



BELLIS minor, Italis, *Primo fiore minore, fior di primavera.*] Germanis, *Maszk lieben.*] Gallis, *Marguerites, seu Pasquette*.

BELLIS MINOR.



F O R M A.

Foliis prouenit alterius *Matt.* minoribus, minime sinuatis, humi accubantibus, cauliculos edit tenues, obsequiosos, rotundos, dodrante minores. Radicem alteri longè minorem multifidamque.

L O C V S.

Nascitur in pratis, & pa- *Idem* scuis.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Præstat omnia quæ ma- *Idem* ior.

BELLIS minima, Italis, *Margarite*, & *fiori di primavera gentili*.

BELLIDIS TRES SPECIES.

G E N E R A .

Matt. Pluribus spectantur generibus, quæ florum varietate dignoscuntur.

F O R M A .

Idem Folia tam & si in omni genere habeantur longiuscula, & crassiuscula, solo procumbentia, atque per ambitum sensim serrata, flores tamen coloribus, & foliorum stipatu inter se variant. Siquidem in vno genere centro tenuis aurei, & per ambitum rubentes cernuntur, in altero verò ex candido rufescentes, aut versicolores. Sunt etiam qui intus rubeſcant, & in ambitu albi cent, quin etiam in quodam genere flores habentur exilibus admodum foliolis ipsisque versicoloribus adeo ubique stipati, ut sericinos floccos penè referant.



L O C U S .

Idem Seruntur in hortis, & fictilibus ad coronamenta.

Q U A L I T A T E S , E T V I R E S .

Omnia genera paribus viribus pollent.

PAEONIA, Græcis, Γλυκυσίδη, seu παωνία.] Arabibus, Feonia.] Italis, Peonia.] Germanis, Peonien.] Hispanis, Rosa del monte, seu Rosa albardeira.] Gallis, Pivoine, seu Pynoine.

P A E O N I A M A S .

G E N E R A .

Duum est generum, Mas, *DIOSC.*
& Fœmina.

F O R M A M A R I S .

Mas. folia iuglandis ha- *Idem*
bet. Radix ei inest digi-
tali crassitudine, & pal-
mi longitudine, alba,
gustu adstringens: Flô-
res & fructus fœminæ
similes.

L O C V S .

Prouenit in altissimis mō *Idem*
tibus, & præruptis.

Q U A L I T A T E S ,
E T V I R E S .

lis tum qualitatibus, tum *Matt.*
viribus præstat, quarū
& fœmina, de qua sta-
tim dicetur.



PÆONIA fœmina, Græcis, Γλυκυσίδη, *sive* Παιονία τήληα.] Italis, *Pœonia fœmina*.

PÆONIA FOEMINA.

F O R M A .

Diosc. Folia Smyrni more diuiduntur. flores mittit summo caule grandes, è quibus siliquæ oriuntur amygdalis similes, in quibus cum dehiscunt multa grana exigua, rubra, acinis puniceorum similia, inveniuntur. Radices habet ceuglandes circiter septem, aut octo, ut in hastula regia.

L O C V S .

Idem Nascitur in altis montibus, saxosis, & præruptis locis.

Q U A L I T A T E S .

Gal. 6. simp. me. Radicem habet leuiter adstringentem, quadam cum dulcedine, & si plusculum dentibus mandas, acrimoniam item quampiam subamarâ subesse percipies. Expurgat porrò etiam iecur obstructum, & renes, præsertim quæ acrimonia & subamara est. Est autem facultate omnino resiccatoria vehementer, haud tam insigniter calida, sed aut asymmetrum, aut paulò calidius temperamentum attingens est.

V I R E S .

Diosc. Sicca radix fœminis, à partu non purgatis datur, ceteris menses, amygdalæ magnitudine pota, ventris doloribus cum vino hausta auxiliatur, valet contra regium morbum, & renum, & vesicæ dolores decocta in vino aluum sistit. Rubra grana, rubentes menses sistunt decem, aut duodecim pota ex vino austero, stomachicis, & erosionibus ea esse prodest. a pueris pota initia calculorum eximant, grana nigra auxiliantur nocturnis suppressionibus, Vulvæ strangulationibus, atque doloribus. xv. numero pota in aqua mulsâ, aut vino. ¶ Præstat collo suspensa Radix comitialibus pueris, & pota capitis affectibus auxiliatur, & idem facit semen.

Gal. 6. simp. me.



LITHOSPERMUM, Græcis, Λιθόσπερμον.] Mauritanis, *Kulb, Culb, Calt,*
seu Calab.] Italis, *Lithospermo.*] Germanis, *Meerhirs, seu Stain so-*
men.] Gallis, *Gremil, seu Herbe aux perles.*

LITHOSPERMUM MAIUS.

G E N E R A.

Duo eius habentur gene- *Matt.*
ra, Maius, & minus.

F O R M A M A I O R I S.

Foliis est oleæ lōgioribus, *diosc.*
& latioribus, molliori- *Matt.*
busq; humi iacētibus,
quæ ab radice exiliunt.
ramulis rectis, tenui-
bus, firmis, crassitudi-
ne acuti iunci, humi re-
pentis, lignosis, in quo
rū cacumine bifidi exor-
tus cauliculorum speciē
exhibent, foliis lōgis, in-
ter quæ paruum semen
erui magnitudine lapi-
dea durtia.

L O C V S.

Prouenit exoluto solo, & *Matt.*
propè sepes.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Semen cum vino albo po- *diosc.*
tandum diebus pluribus sesquidrachmę pondere, addito Asplenis *Matt.*
semidrachma, & succini scrupulis duobus ex succo plantaginis, aut
portulacæ, aut lactucę ad gonorrhœam cohibendam.



LITHOSPERMUM minus, Officinis, *Milium solis*.] Græcis, Λιθόσπερμον μικρόν.] Italis, *Lithospermo minore*, *Miglio saluatico*, seu *Milium solis*.] Germanis, *Klein men hirsch*, seu *Stein somen*.

LITHOSPERMUM MINUS.

FORMA.

Matt. Planta est fruticosa, caulibus pluribus referta, sesquipedalib⁹, lignosis, firmis, in quibus folia insunt oleæ minora, & semē circa foliorū exortū, albū, milij simillimum, pellucidumque, sed lapidea ferè duritie. Radices habet tenues, numerosasq;.

LOCVS.

Idem Nascitur arido, & sabuloso solo.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem Non minus ad ea omnia est vtile, quàm maius, peculiariter autem iuuat scæminas egrè parturientes, si seminis drachmæ duæ in puluerem contriti ex humano lacte propinentur.



PHALARIS, Græcis, Φάλαρις.] Italis, Falari.

PHALARIS.

FORMA.



Cauliculos emittit zę cul DIOSC.
mis similes, minutis, ac
nullius vsus radicibus:
multis, duñ palmorũ,
geniculatos, gracilio-
res, validiores, ac dul-
ces, semen candidum,
in spicatis capitulis, ob-
longum, milij magni-
tudine.

LOCVS.

Seritur in Italia, spectacu- Matt.
li gratia.

QUALITATES,
ET VIRES.

Tunditur, & in aqua, aut
vino succus, & ad vesi-
cæ cruciatus valissimè
bibitur: Semen cochlea-
ris mensura potum ad
eadem efficax est.

RUBIA sativa, siue Domestica, Græcis, Ερυθρόδανον.] Arabibus, *Paue*, seu *Fue*, *Alfabagin*.] Italis, *Robbia*.] Germanis, *Ferberroet*.] Hispanis, *Ruia*.] Gallis, *Garence*.

G E N E R A.

RUBIA SATIVA.

Diosc. Duo eius sunt genera, vna sponte prouenit, altera serit.

F O R M A SATIVÆ.

Idem Caules illi sunt asperi, & quadrânguli, longi, aparinę nō dissimiles, robustiores, & multo prorsus maiores, foliis per interualla circū articulos stellatim decussatis. semē rotūdū, inter initia viride, mox rubrū, postea cū maturuerit nigrū. Radix tenuis, lōga, rubra.


L O C V S.

Matt. Seritur quibusdā in locis in cāpis. in Ethruria tamē domestica ēt sponte nascitur secus itinera, sepes, & fruteta. Q U A L I T A T E S.

Gale. 6. Radix acerba gustu est, & amara. Itaq; Iecur, & lienē expurgat, vrinā trahit crassam, & sanguinolentā, & menses, ac mediocriter abstergit. V I R E S.

Diosc. Radix vrinā ciet, qua de causa regio morbo opitulat̃, ex aqua mulsa pota. Item Ichiadicis, & resolutis,

crassam, copiosamque vrinā pellit, nōnunquā & sanguinē. bibētes tamē quotidie lauare oportet, & excrementorū quę reddūtur differētiā spectare. Ramuli cū foliis ex vino poti, pręstāt aduersus serpētiū morsus, semē ex aceto potū lienē absūmit. Imposita radix trahit menses, & secundas. Illita ex aceto albæ vitiligini medetur.



RUBIA sylvestris, Græcis, Ερυθρόδανον άγρίον.] Italis, Robbia saluatica.
wild rubia

RUBIA SYLVESTRIS.



F O R M A.

Caules, & folia minora *Matt.*
 longè spectatur quàm do-
 mestica, & minus quo-
 que aspera. Radix etiã
 illi est nō adeo rufa, mul-
 tifida, tenuisque.

L O C V S.

Prouenit sylvestris locis, *Idem*
 secus itinera, in frutetis
 & propter sepes.

Eius vires longè imbecil- *Idem*
 liores sunt quàm dome-
 stica.

LONCHITIS aspera; Græcis, Λογχίτις τραχεία.] Italis, *Lonchite aspera*.

LONCHITIS. ASPERA. MAIOR.

G E N E R A.

Matt. Duo eius reperiuntur genera, Maius, & minus, quâvis Dioscorides vni-
us tantū meminerit.

F O R M A.

Matt. Foliis est Scolopēdrij p-
ximis, longioribus ta-
men, ac magis diuisis,
& ad polypodij faciē
potius accedentibus,
spiramæ longitudine,
vtrinque disparib⁹ in-
cisuris dissectis, tenui-
bus, aculeatisque den-
ticulis circūferratis, ac
vbique asperis, vnde il-
li nomē. caulē nō pro-
fert, nec flores, neque
semē, perinde ac poly-
podium, & asplenum,
quorū imaginē refert.
Radice nititur multifi-
da, tenui Phyllitis, mo-
do. L O C V S.


Idem. Nascitur in vmbrosis, opa-
cis, & humectis locis.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 71 Folia ad glutinanda vul-
simp. me. nera vtilia sunt, cum sunt adhuc viridia, sicca tamen. ex aceto pota-
lienes induratos sanant.

V I R E S.

Diosc. Vulneribus mirum in modum prodest, in eisq̃ inflammationes ex-
citari non patitur. ex aceto pota lienem assumit.



LONCHITIS aspera minor. Italis, *Lonchite aspra minore*.

LONCHITIS ASPERA MINOR.

FORMA.

Mitiora, tenuiora, angustioraq; folia promit, & magis Polypodio similia, hirsuta, & aspera.

at.

LOCVS.


Nascitur in opacis, & frutetis, vliginoso solo.

Idem

QUALITATES,
ET VIRES.


Herba est, & ipsa vulneribus glutinandis, lienibusque absumēdis idonea, perinde ac altera.

Idem



PSEVDOLONCHITIS, Italis, *Lonchite aspra* falsa.

PSEVDOLONCHITIS ASPERA.



ALTHEA, Græcis, Ἀλθαία, & Εἰσιρκος.] Italis, *Maluanischio*.] Mauritanis, *Chitini*, *Chatini*, *sive Chatmiæ*, *sive Rosa zaveni*.] Germ. *Ibischis* & *Heyluurtz*.] Hisp. *Hierua Cannamera*, *sive Marmaie*.] Gall. *Guymanne*.

Lybiff

ALTHEA.



FORMA.

Althea quam alij Ibiscum vo- DIOSC.
cant, in maluarū sylvestrium
genere est, cui folia vt Cyclo-
mino rotūda sunt, lanugine
canescunt, flore rosaceo, cau-
le bicubitali, tricubitalive.
Radice lenta, intus alba.

LOCVS.

Nascitur in campestribus, hu- Matt.
meo solo.

QUALITATES.

Facultatem habet digerendi, la Gal. 6.
xandi, phlegmone leuandi, simp.me.
mitigandi, concoquendi. Ra-
dix porro eius, & semen cete-
ra quidem similiter agunt, vt
herba viridis, sed tenuiarum
partiū, magisq; exiccatoria.
ad hæc magis abstersoriam
quàm illa facultatem osten-
dunt.

VIRES.

In vino aut aqua mulsâ deco- DIOSC.
cta, & per se cum imponitur
tusa efficax est contra vulne-
ra. Præstat itē ad strumas, pa-
roridas, abscessus, māmārū
inflāmationes. Siquidem di-
scutit, excoquit, rūpit, & ad
cicatricē perducit. Cocta (vt
dictum est) suillo aut anseri-
no adipe adiecto terebinthi-
næve, vt malagmatis lentor
fiat, facit ad vuluæ inflāma-
tiones, præclusionesq; in pes-

sis subdita. Decoctum eodem fungitur munere, onera vuluæ reliquiasq; a partu ex-
trahit. Decoctæ radicis succus ex vino potus succurrit vrinæ difficultati, calculosorū
cruditatibus, dysenterici, ischiadicis, tremulisque. Dentium dolorem mulcet cū ace-
to decocta, colluto inde ore. Viride semen, siccūq; tritum vitilignes, sub Sole perun-
ctum emendat. Eodem cum oleo, & aceto peruncti à venenatis non feriuntur. Valent
contra dysenteriam, sanguinis reiectiones, aluiq; profluuiū. Bibitur in posca, aut vino
contra omnes vesparum, apum, similiūq; aculeatorum ictus.

ALTHEA altera, quibusdam Abutilon vocatur. Italis, *Maluanischio* bastardo.

F O R M A.

Matt. Folia habet cucurbitę, minora, tactu lævia, sed tenuissima obducta lanugine. caulem edit sesquicubitalem, & aliquādo maiorem. flores in toto caule aureos, è quibus semen oritur nigrum. Radice nititur. lōga fibrosa q̃.

L O C V S.

Idem. Nascitur in cāpestribus, ac etiam sponte in hortis.

Q U A L I T A T E S.

E T V I R E S.

Idem. Semen epotum sesquidrachmę pondere ex vino, calculos, & arenam pellit, urinā ciet, & eius cruciatus mitigat.

ALTHEA ALTERA, SIVE ABUTILON.



ALCEA, Græcis, ἀλκέα.] Barbaris, *Bis malua*.] Italis, *Maluanisco saluatico*.] Germanis, *Sigmar kraut*.] Hispanis, *Malua montesina*.] Gallis, *Bimaue* ..

ALCEA ..

FORMA ..

Herba est caule, floribus, *Matt.*
& semine sylvestri malue per quàm similis, sed foliis euidentioribus, incisuris laciniatis, ranunculi modo. caules edit tres, aut quatuor, cannabinò cortice vestitos. flores maluæ, tum facie, tum colore similes, paulòque maiores, quemadmodum & semen. Radicem longam, latam, albam, ac multifidam maluæ similem, sed lignosa intus matrice ..

LOCVS ..

Nascitur in incultis, campestribus, & agrorum, scrobiumque marginibus iuxta sepes, vias, ac semitas ..

QUALITATES,
ET VIRES.

Alcea sylvestris maluæ genus est, in vino pota dysenteriae, & erosionibus medetur, & potissimum eius radix .. *Gal.*
Diosc.



CANNABIS, Græcis, Κάναβις.] Arab. Scehedenegi, & Canab.] Italis, Canape.] German. Zamer hanff.] Hispan. Canambo.] Gall. Chanure.

CANNABIS.

G E N E R A .

Diosc. Tria Cannabis numerantur genera, Mas, Fœmina, & Sylvestris.
Matt.

F O R M A .

Matt. Mas plures è caule fundit ramos, arbusculæ speciẽ referens. adeo ut ex eius stipite carbones fiant ad bombardarum pulverem parandum. Fœmina caules edit longè tenuiores, nullis ramis brachiatos, nulloq; semine proliferat. Folia utriusque fraxini, sed minora, & graciliora, sensimque serrata, quæ quidem in mari maiora, nigrioraque spectantur, quina senave ex vno pediculo prodeũtia. Radice nititur multifida, fibrosa que. Semen tantum in mari gignitur rotundum, cinereo colore, cuius medulla dulcis est, & alba.

Diosc. Sylvestris virgas fert althææ similes, minores, nigriores, & asperiores, cubitalesque, foliis satius nigrioribus, & asperioribus, flore Lychnidis, subrubro, semine, & radice althææ.

Q U A L I T A T E S .

Gale. 7. Semen flatus discutit, adeoque desiccatur, ut si plusculum edatur, genituram exiccet. Multum quoque calefacit. Ideoque sumptum paulò largius, caput ferit, vaporem sursum ad ipsum mittens, calidum simul, ac medicamentosum.

sim. me.
& lib. 1.
de alim.
Jac.



V I R E S .

Diosc. Semen aduersatur iis, qui procreandæ soboli dant operam: namq; longiore cibo sumptum, genituram extinguit. foliorum recentium succus conuenienter aurium doloribus instillatur. Sylvestris radix decocta, & illita inflammationes mulcet, tumores discutit, & tofos articularum. Succus satius instillatur auribus vtiliter ad vermes necandos: quinetiam intestinorum tineas excutit. Equorum quoque tineas, quæ intro sedem hærent, succus, aut decoctum infusum eiicit. Radix recens illinitur vtiliter ambustis, sed sæpius amouenda, & iterum admouenda recens, ne exiccet.

Matt.

ANAGYRIS, Græcis, ἀνάγυρις.] Italis, *Anagiri*, & *faua inuersa*.

ANAGYRIS.



G E N E R A.

Duum est generū; Maius, *Matt.*
& Minus.

F O R M A M A I O R I S.

Frutex est arboris instar, p ^{DIOSC.}
quàm graui odore, foliis viticis, virgisque, flore brassicæ, racemoso, semen in corniculis nō breuibus gignit, subrotundum, firmum, versicolori facie, simile renibus, quod durescit vva maturescence. ¶ Usque *Matt.*
adeo duro, vt aqua macerato, in sua tamen pertinaci duritie consistat.

Q U A L I T A T E S.

Frutex est grauiter olens, *Gal. 6.*
& acris, digerentis exal *simp. me.*
facientisque facultatis. virētia folia propter humiditatis admistionem, minus sunt acria, sicca verò incidentis. & siccatissunt facultatis. similem quòque facultatem habet radicis cortex.

V I R E S.

Tenera folia trita tumores illita reprimunt. Si partus hæreat, si secundæ, mensesq; morentur, bibuntur drachmæ pondere in passo. Sic & suspiriosis dantur, & contra capitis dolores in vino. difficulter parietibus adalligantur ita vt à partu statim auferantur. Radicis cortex concoquendis, discutiendisque adhibetur. Semen commanducatum vomitiones vehementer ciet.

DIOSC

ANAGYRIS altera, siue minor, Græcis, ἀράγυρις ἐτέρα.] Italis, *Angiri minore.*] Ananiensibus, in agro Tridentino, *Eghelo.*

ANAGYRIS ALTERA.

F O R M A.

Matt. Folia prodeunt ex vno pediculo terna, oblonga, in cacumine mucronata, viridia, læuiaque, trifolij latiora. aureis micat floribus, vt in altero racematim dependentibus, odore tamen ingrato. Hinc cornicula prodeunt Genistæ emula, in quibus semen continetur eiusdem genistæ magnitudine, sed oblongū, phaseli modo, colore subnigro. Materies ligni durissima, quæ Guaiaci modo exterius lutea est, medullitus verò nigra. Incorrupta diu durat, proinde rura palos ad vites sustinendas ex ea parât. Quin etiam sagittarij validissimos perficiunt arcus.

L O C V S.

Idem. Oritur in syluis montium, & copiosum habetur in Ananiæ vallis syluis.

Q U A L I T A T E S, E T V I R E S.

Idem. Omnia potest, ac præstat, quæ maius præstare diximus.

C E N S V R A.

Qui putant Anagyrim alteram esse Laburnum (mea quidem sententia) aberrant.



СЕРÆΑ, Græcis, Κηπαία.] Italis, Cepea.

СЕРÆΑ.

FORMA.

Cepæa portulacę similis *Diosc.*
est, sed nigriora habet
folia, & radicem te-
nuem.

LOCVS.

Nascitur in incultis locis. *Matt.*

QUALITATES,
ET VIRES.

Folia in vino pota, vrinę *Diosc.*
stillicidio, & vesicę sca-
bie laborantibus opitu-
latur. maximè id præ-
stat, si cum decocto ra-
dicum asparagi, quem
myacanthon, hoc est
corrudam vocant, bi-
batur.



ALISMA, seu Damafonium, Græcis, ἄλισμα.] Italis, *Alisma*.

A L I S M A.

F O R M A.

Diosc. Folia insunt ei plantaginis, sed angustiora, connexa quæ in terram, caule simplici, tenui, cubito altiore, capitibus thyrsi, flore tenui, candido, pallescere, radicibus tenuibus, ut veratri nigri, acris, odoratis, modice pinguibus.

L O C U S.

Idem. Aquosos amat tractus.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 6. Absterforia est facultatis.
simp. me.

V I R E S.

Diosc. Radicis drachma una, aut altera pota his convenit, qui leporem marinum, aut opium hauserunt, aut à rubetis demorfi sunt. Datur dysentericis per se, aut cum dauci semine. convulsis, & contra vitia vulvæ prodest. Herba sistit album, menstrua pellit, tumores illita mitigat.



HYPERICVM, Gręcis, ὑπερίκον.] Mauritanis, *Reiofricon, seu Reiofaricon.*] Italis, *Hiperico, Perforata, seu Herba di S. Giouanni.*] Germanis, *Sant Ioans kraut.*] Hisp. *Coraioncillo.*] Gallis, *Mille pertuys, siue Trucheran.*

HYPERICVM.

FORMA.

Frutice est surculaceo, do- DIOSC.
dratali, rubescente, folio Matt.
rutæ, punctim pforato; flo-
re luteo, leucoio simili, q
digitis attritus sanguineū
succū remittit, subhirsu-
ta siliqua, & in rotundo
oblōga hordei magnitu-
dine, semine intus nigro,
resinosi odoris.

LOCVS.

Gignitur in cultis locis, & Idem
asperis. DIOSC.

QUALITATES.

Calefacit, & desiccatur, te- Gal.li.8.
nuisq; substatię est, adeo sim.med.
ut, & mēses, & vrinas p-
uocet. ¶ Aperit, resoluit,
agglutinat, atque etiam
cohibet.

VIRE.

Vrinā cit, Menstrua pellit DIOSC.
appositū. Tertianis, Quar-
tanisque liberat. Semen
quadraginta diebus hau-
stum Ischiadicis medet.
Folia cū semine illita, am-
busta sanant. ¶ Semen ex Matt.
vino potū calculos eijcit,

& venenis aduersatur. Quin etiam venenosorū moribus resistit, tum
idem potū, tum herba ipsa deuorata, haustave, tum vulneri illita. Aqua
stillatitia florentis herbe bibitur vtiliter comitialibus, & resolutis.
Datur seminis farina commodè ex polygoni succo sanguinem expuen-
tibus. Idem aluum exonerat. Inest floribus, ac semini mira facultas ad
vulnera recentia sananda, præter ea quæ capiti infliguntur.



ASCYRVM, Græcis, ἀσχυρον.] Italis, Asciro. Ger. Garbfeld.

ASCYRVM.

FORMA.

Diosc. Hyperici genus est, magnitudine distans, fruticosius, maiores habens ramos, furculosiores, rubētesq; , folia tenuia, flores luteos, & fructum resinofum, hyperico non absimilem, cuius attritu digiti ferè cruentantur.

LOCVS.


Matt. Nascitur in cultis, & quandoque in vliginosis locis.

QUALITATES.

Gale. 6. sim. med. Semen purgatorium est, foliorum verò facultas modicè extergens, & desiccans, ut & ambusta sanare credantur. Ceterum in vino austero decocta vinū ipsum magnorum vulnorum glutinatoriū efficiūt.

VIRES.

Diosc. Vfus seminis ad Ischiadicos valet, potum in hydromelitis sextario. nam biliosa recrementa detrahit, sed assidue dare oportet, donec sanitati restituantur, illinuntur & ambustis efficaciter.



ANDROSÆMVM, Græcis, Ανδρόσαιμον.] Italis, *Androsemo*.

ANDROSÆMVM.

FORMA.



Androsæmum ab hyperico, Diosc.
& ascyro differt, qđ fruticet, ramulis furculosis, ac tenuibus, rubentibus virgis, foliis rutæ, triplo, quadruplove maioribus, quæ trita vinoso succo manant. complures in cacumine alas habet, utrinque expāsas pinnatasq; , circa quas flores pusilli, lutei, & in calyculis semen papaueris nigri.

LOCVS.

Prouenit in montosis, & *Matt.* collibus.

QUALITATES.

Semen aluum purgat, atqui *Gal. 6.* folia extergūt, & desiccāt. *simp. me.*

VIREs.

Semē tritū duarū drachmarum pondere potum Diosc. biliosa alui excrementa pel-

lit. Ischiadicis maximè medetur, sed à purgatione aquam exorbere oportet. Herba ambustis illita medetur, & sanguinem cohibet.

CORIS, Græcis, Κόρις.] Italis, Cori.

F O R M A.

C O R I S.

prosc. Frutex est folio *Ericæ*, ru-
Matt. bro, pinguiore, ac mi-
nore, non altior dodrā-
te, suavis, odoratus, a-
cris. ¶ Flores habet hy-
perici emulos, luteo co-
lore, sed minores.

L O C V S.

Idem Nascitur arido solo in col-
libus, atque montibus.

Q U A L I T A T E S,

Idem Aperit, excalfacit, exte-
nuat, digerit, expurgat.

V I R E S.

prosc. Potum semen menses tra-
hit, & vrinas. Contra
phalangiorum morsus,
Ischiadicos, & opistho-
tonicos ex vino pota au-
xilium est. horroribus ex-
pipere, sed opisthotoni-
cis ex oleo aptissimè il-
linitur.



AIUGA, siue Camæpitys. Græcis, καμαπίτυς.] Mauritanis, *Hamestheos*, seu *Camisthius*.] Italis, *Camepitio*, & *Iua*.] Germanis, *Yclenger*, seu *Yelyeber*.] Hispanis, *Pinilho*, & *Iua artetica*.] Gallis, *Yuemuscate*, siue *artétique*.

C A M Æ P I T Y S .



G E N E R A .

Trium est generum.

F O R M A P R I M I .

Prima herba est in terra repens, subcurua, foliis minoris sedi multo tenuioribus, circū ramos, frequētib⁹, odore pinus. Flore tenui, luteo, vel cādido. Radicibus cicorij Alterū exit cubitalibus ramulis in anchoræ speciem incuruatis, prætenuibus, coma supradictæ, flore candido. Semine nigro, ac etiā pinū redolet. Tertia Mas nominatur paruula, foliis exilibus, albis, scabris, caule aspero, candido, luteis flosculis, semine iuxta alas; resipit & hæc pinum.

D I O S C .

L O C V S .

Nascūtur in campis tum cultis, tum etiam incultis, & præsertim exoluto solo.

M a t t .

Q U A L I T A T E S .

Camæpitys gustu quidē amarū saporē, acū validiorē obtinet. Effectu verò expurgat, abstergitq; viscera, plus quàm calefacit. Est. n. in desiccādo ordinis tertij, in calefaciendo verò secundi.

V I R E S .

Primi generis Aiuga septē diebus in vino pota regio morbo medetur, & quadraginta diebus ex oxymelite Ischiadicos sanat. Datur peculiari-

G a l . 8 .

s i m p . m e .

ter vrinæ difficultatibus. Prodest, & renum vitiis, & torminosis. Bibitur conueniēter foliorum decoctum contra aconitum. Trita in farina, & cum fico in pilulis sumpta aluum emollit. apposita ex melle vuluæ vitia extrahit, mammarum duritias discutit. Vulnera glutinat, & vlcera, quæ serpunt ex melle illita cohibet. Vrinam ciet.

CHAMÆPITYS, siue Aiuga altera. Italis, *Iua saluatica*.

A I V G A A L T E R A .



Libri Tertij, Finis.

BETONICA, Græcis, Κέσπον, ἢ ψυχόρεον.] Arabibus, Chāstra.] Itā-
lis, Betonica, seu Brettonica.] Germanis, Betonien.] Hispanis, Breto- *Brain Betonien*
nica.] Gallis, Betoefne, seu Botoine.

BETONICA.



FORMA.

Caulem fert tenuem, cubiti alti- *Diosc.*
tudine, aut maiorē, quadra-
tum, folia quercus, mollia,
longa, in ambitu diuisa, odo-
rata, propè radicem maiora.
¶ Florem in summis caulibus *Matt.*
fert spicatum, & rubrum. Ra-
dicem fibrosam, & vt veratri
tenuem.

LOCVS.

Nascitur in pratis, & montibus, *Idem*
& in pascuis.

QUALITATES.

Vim habet incidendi: ipsa enim *Gale. 7.*
herba amarior est, & subacris, *simp. me.*
id quod & particulatim edita
actio ostendit.

VIRES.

Radix ex aqua mulsa pota, pi- *Diosc.*
tuitam vomitione euocat. Fo-
lia dari debēt mulieribus vul-
uæ malo opportunis, & ad ar-
cendos eiusdem strāgulatus,
ex eadem mulsa denarij pon-
dere: tres eorundē drachmæ
bibuntur ex vini sextario cō-
tra scorpionum morsus, qui-
bus & herba illita medetur:
eiusdē drachma bibitur vtili-
ter cū vino ad ebibita vene-
na: quin etiā præsumpta eo-
rundem vires abolet: vrinam
ciet, aluum subducit: ex aqua
pota medetur comitialibus,
& insanis, & iocinoris, lie-

nisq; vitiis ex oxymelite: propinatur acida ructantibus, stomachicis quoq; proderit,
si mansē succum deglutuerint, & deinde dilutum vinum hauserint: valet sanguinē
reiicientibus ex vino diluto sumpta: datur vtiliter ischiadicis, & in renum, & vesicæ
doloribus. regio morbo laborantes recreat, mēses pellit, drachmę pōdere cū vino po-
ta: aluū purgant quatuor drachmę cū oxymelitis decē cyathis. ¶ Consistentes in re- *Matt.*
nibus calculos frangit, & pulmonem, iecur, & thoracem expurgat.

SERRATVLA, Italis, *Serratola*.

F O R M A.

Matt. Caule constat purpurascēte, tenui, ramosoquē: folia gerit antea quā caulescat betonicę cognata, toto ambitu tenuiter serrata, sed vbi adoleuerit faciem mutant, nam exortis profundioribus incisuris, maioris plu quadantenus similia spectantur. Flores edit in summis ramusculis purpureos, & radicem multifidam.

L O C V S.

Idem. Nascitur syluosis locis.

Q V A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem. Datur vtiliter potanda ex albo meraco ruptis, & ab alto deuolutis: in vino decocta, ac deinde illita, vlcera mirificē mundat, carne replet, & cicatrice obducit: hæmorrhoidum quoque dolores mulcet fotu adhibita: folia, & radix simul contusa & imposita, enterocellas sanare creduntur.

SERRATVLA.



BISTORTA, seu Colubrina, Italis, *Bistorta*.] Germanis, *Nater wurtz*.

BISTORTA.



F O R M A .

Foliis erumpit primo statim e- *Matt.*
xortu in acutum desinenti-
bus colore subrufo, quæ vbi
adoleuerint, rumicis folia
referunt, læuia tamen sunt,
& inferna parte subpurpu-
rea, & per ambitum sinuata:
caulem edit rotundum, te-
nuem, cubitalem, in quo fo-
lia longè minora spectantur;
flos in caulis summitate pro-
dit spicatus, ruber, siue sub-
purpureus, è quo semen gi-
gnitur oxalidis proximum:
radice nititur quadatenus a-
rundinacea, sed succosa, &
serpentis modo cōtorta. cor-
tice exterius subnigro, sed ru-
bra intus carne, adstringen-
tis gustus.

L O C V S .

Oritur in altis montibus, & *Idem*
pascuis.

Q V A L I T A T E S ,

E T V I R E S .

Refrigerat, exiccat, cohibet, ro- *Idem*
borat. Bibita radix abortum
reprimit: ventri, pubi, reni-
busq; ex aceto illita vrinæ
incontinentiā supprimit. cū
succo plantaginis pota, san-
guinem è vulnere manantē
cohibet, superasperso tamen
eiusdem puluere. Idem ex
punicorum malorum vino

potus, biliosas vomitiones supprimit. præstat potus contra letalia venena, aduersus
pestilentiā, & pestilentes febres, in quibus exanthematum notæ emergunt. valet ad
puerorū vermes necādos, tum idē radicū puluis, tū earū decoctū potū: Eadē radix co-
hibet tū cēteras alui fluxiones, tum dysenteriā. additur cōmodē in potionibus, quæ
ad intrinseca parantur vulnera. datur trita ad cruenta expuentibus. cauis dentiū in-
dita, cum aluminis & pyrethri momento, non modo dolorem mulcet, sed fluxiones
eo decurrentes sistit, valet itē ad omnes venenosorū serpentiū ictus, ex vino sumpta.

TORMENTILLA, Italis, *Tormentilla*.] Græcis, *Επάουλλον*.] Germanis, *Tormentill*.] Gallis, *Tormentille*.

F O R M A .

Matt. Folia promit pentaphylli minora, septenis incisuris diuisa, radicem breuem, nodosam, compactam, rubro intus colore, sapore adstringenti: cauliculos tenues, subrubētes: flores melinos pentaphylli æmulos.

L O C V S .

Idem Nascitur in montibus.

Q U A L I T A T E S ,
E T V I R E S .

Idem Viribus omnibus insignitur, quibus Bistorta prædita est.

T O R M E N T I L L A .



LYSIMACHIA, Græcis, Λυσιμάχιον.] Italis, *Lisimachia*.] Germanis, *Vuey deurich*.

LYSIMACHIA.



FORMA.

Caulis emittit cubitales, *diosc.*
altioresve, hirsutos, te-
nues, prodeuntibus ge-
niculatim foliis, tenui-
bus, salicis figura, gu-
stu adstringentibus. flo-
re rufo, aut aureo.

LOCVS.

Gignitur in aquosis. *Idem*

QUALITATES.

Superantem habet quali- *Gale. 7.*
tatem adstrictoriã, per *sim.med.*
quã vulnera glutinat.

VIRES.

Foliorum succus, sangui- *diosc.*
nis reiectiones suppri-
mit, dysentericis auxi-
liatur, tum potus, tum
quoque infusus. men-
sium abundatiam sistit
in pello: vulnerũ cruo-
rem cohibet: acerrimũ
nidorẽ suffita redolet.

qua de causa serpentes fugat, & muscas interficit. ¶ Vis eius tanta
est, vt iumentis discordantibus iugo imposita eorum asperitatem
cohibeat.

LYSIMACHIA altera, Italis, *Lisimachia seconda*.

Sic andr. vindicib

LYSIMACHIA ALTERA.

FORMA.

Matt. Caule prouenit recto, qua-
drágulari, bicubitali q; ,
foliis salicis, flore spica-
to rufescente.

LOCVS.

Idem Nascitur prope fluētes a-
quarum riuos, & vligi-
nolis locis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem Adstringit, refrigerat, co-
hibet, & omnia potest
quæ & altera.



POLYGONUM, Græcis, Πολύγονον.] Aphris, *Basialragi*.] Ital. *Poligono*,
seu Correggiola.] Germ. *Vuegrasz*.] Hisp. *Corriola*.] Gal. *Correggiole*.

POLYGONUM MAS.

G E N E R A.

Trium est generum. Mas, *Matt.*
 Fœmina, Minus.

F O R M A M A R I S.

Caules mittit teneros ob- *diosc.*
 sequiosos, rotundos, ge *Matt.*
 niculatos, humi grami-
 nis modo repentes : fo-
 lia oblonga, ligularum
 modo. semine sub foliis
 turgescēte : Flos verò
 ei candidus, & exiguus.

L O C V S.

In campis, edificiorū areis, *Idem*
 hortis, publicis viis, ac
 ferè vbique crescit.

Q U A L I T A T E S.

Polygonum uti adstrictio- *Gale. 8.*
 nem quandam obtinet, *sim. me.*
 ita sanè vincit in eo a-
 queum frigidum, ut vi-
 delicet secundi sit ordi-
 nis refrigerantium, aut
 etiam quodammodo in
 initio tertij: Est & exic-
 catorū: Est quoque mas
 ad omnia validior, quā
 fœmina.

V I R E S.

Succus epotus spissat, ac *diosc.*

refrigerat. Prodest cruenta excreantibus, cholerae, alui fluxionibus,
 & urinæ stillicidio. Auxiliatur ex vino potus, serpentium moribus.
 Fœminarū profluvia in potu sistit. Instillatur utiliter purulentis, do-
 lorosisque auribus. Ex vino, & melle decoctus, facit eximie ad pu-
 dendorū ulcera. illita folia stomachi feruores extinguunt, sanguinis
 reiectiones sistunt, & ulcera serpentia, sacros ignes: collectiones, tu-
 mores, & recentia vulnera sanant.



POLYGONVM fœmina, Græcis, Πολύγονον θήλη.] Italis, Poligono, & Correggiola femina.] Germanis, Kantenkraut.] Gallis, Pin aquatic.

POLYGONVM FOEMINA.

FORMA.


Diosc. Vno tantum caule fruticat, arundini teneræ simili, densis geniculis, & in se tubarum modo factis: articulos in orbem cingunt apices, foliolis piceæ similes: radicis nullus vsus.

LOCVS.

Matt. In aquosis, & humentibus locis prouenit.

QUALITATES,
ET VIRES.

Diosc. Refrigerat, siccatur, inspissatur, & ad ea quoque præstat, ad quæ mas, sed inefficior est.



POLYGONVM minus, Græcis, Πολύγονον μικρόν.] Nonnullis mille grana, quibusdam herniola. Italis, Correggiola minore.

POLYGONVM MINVS.



FORMA.

Ramos edit exiles, humi *Matt.* repentes, geniculatos-
que: foliis pusillis, lō-
giusculis, semine pumi-
lo, rotundo, minuto, al-
bicāte racemoso. adeo-
que copioso, vt vniuer-
sa planta semine præ-
gnare conspiciatur.

LOCVS.

Nascitur arido solo, & in *Idem*
siccis torrētium alueis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Vis illi est conglutinandi, *Idem*
siccandi, refrigerandi,
proinde semē potui da-
tum diebus pluribus,
commodissimè præstat
ad enterocellas, vni-
uersæ plantę puluis ex
vino haustus, non solū
vrinā cit, sed calculos
frangit, vbi diutius su-
matur.

Wiburnum
 POLYGONATUM, Græcis, Πολυγόνατον.] Italis, Frassinella, seu Ginocchietto.] Germanis, Vuerzortz.] Gallis, Geniiculiere.

F O R M A.

P O L Y G O N A T U M.

Matt. Caule est cubitali, rotundo, ac leui, circa quem folia exeunt lauri effigie, sed latiora, striis cōpluribus secundum longitudinem protensis, firma, dispari exortu prodeuntia, sapore quadantenus adstringente. flores edit candidos, à quacunque foliorum cauitate: baccas pisi magnitudine, rubētes, & quādoque purpureas. Radice nititur candida, arundinacea, tenera, frequenter geniculata, digiti crassitudine, summa tellure vagante, sed odore quadantenus graui.

L O C V S.

Idem Nascitur in collibus, & montibus.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 8. simp. me. Mistam habet tum facultatē, tū qualitatem, habet enim adstrictionis, pariter & acrimoniæ, & amaritudinis quippiā, & indicibilis cuiusdam insuauitatis.

V I R E S.

Diosc. Radix vulneribus efficaciter illinitur, quin etiā maculas in facie delet.

Matt. Qua de re mulieres è radicibus aquā stillatitiā parant, qua ad faciei nitore utuntur. sunt & quæ saccharo radices ipsas cōdiant, ad sistēda alba vteri pfluuia.

C E N S V R A.

Manifesto errore ducuntur, q̄ polygonatū, Arabū secacul esse cōtendunt.



CLEMATIS, Græcis, Κληματὶς δαφνοειδὴς.] Nonnullis, vinca peruinca..
 Italis, Prouenca, & Prouencola.] Germanis, Singrien.] Hispanis, Per-
 uinqua.] Gallis, Lyserum.

Singrien

C L E M A T I S.

F O R M A.

Vitículas spargit tenues, *Matt.*
 læues, humi iacentes, è
 quibus folia exeunt p-
 interualla, pari vtrin-
 que exortu, robusta, o-
 liuæ modo oblōga, lau-
 ri minora, virentia, è
 quorū origine, primo
 statim vere flores emi-
 cant cærulei. Radices
 fundit numerosas, albi-
 cātes, summa tellure re-
 pentes. Herba est per-
 petuò virens.

L O C V S.

Nascitur in terrenis, & p- *diosc.*
 pe sepes, atque in scro- *Matt.*
 bium ripis.

Q U A L I T A T E S.

Refrigerat, siccāt, robo- *Matt.*
 rat, cohibet.

V I R E S.

Folia cum caulibus ex vi- *diosc.*
 no pota, alui profluuiā,
 & dysenterias sedant.
 subdita in pello, cū la-
 cte, aut rosaceo, crucia-
 tibus vuluæ medētur:

dolores dentium commanducata finiunt: imposita, serpentiū mor-
 bus leuamentum præstant. ¶ Fœmoribus adalligata viridia folia, mē *Matt.*
 sum abundantiam cohibent. & conceptus adiuuant. Capiti adalli-
 gata, & collo, gulæve circumducta, sanguinem è naribus manantem
 sistūt. Addūtur quoq; vtiliter vulnerariis emplastris, & potionibus.



CLEMATIS altera, Græcis, κλήματις ἑτέρα.] Italis, Vitalba porporea.

C L E M A T I S A L T E R A .

G E N E R A .

Matt. Duum est generum, Alterum flore purpureo, Alterum candido.

F O R M A P R I M Æ .

Diosc. Viticulosos fundit caules, rubescentes, lentos: folia hederæ modo diuisa, gustu admodum acri, ac exulcerantia. *Matt.* Flores purpureos crucis in modum diuisos. repitque per arbores, ut Smilax.

L O C U S .

Matt. Oritur in syluis, & in frutetis, dumetisque.

Q U A L I T A T E S .

Gal. 6. Folia acrem, adurentem, siue causticam facultatem habent, adeo, ut lepras exorient: fuerit itaque hæc planta, in quarti ordinis excalfacientium initio.



V I R E S .

Diosc. Semen tritum, pituitam, bilemque detrahit, in aqua, aut hydromelite potum: folia eius illita lepras purgant: cum lepidio conditur ad cibos.

CLEMATIS tertia. Italica, Vitalba.

CLEMATIS TERTIA.



FORMA.

Viticulis repit prælongis, *Matt.* obsequiosisque, foliis præscriptæ quadantenus similibus, acri gustu, ac exulcerandi facultate præditis: floribus racemosis, cædendis, odoratis, & myrti adeo similibus, ut differentia ferè nihil intersit. Hos deinde capillacea, incanaq; sequitur coma, quæ tandem vento excussa, nudum relinquit fructum, angulosum, simulque compactum: subnigro colore, atque acerrimum.

LOCVS.

Nascitur passim in sepibus, & in sylvis arboribus se circumvoluens, & per eas repens. *Idem*

QUALITATES,
ET VIRE.

Viribus iisdem præstat, *Idem* quibus & superior.

FLAMMVLA, nonnullis Flammula Iouis. Italis, *Flammola*.

FLAMMVLA.

FORMA.

Matt. Foliis, floribus, fructuq;
adeo tertiam clemati-
dem emulatur, vt nihil
prorsus differentiae in-
tercedat: differt ab ea,
quod caules edat re-
ctos, haud vnquam re-
pêtes, sesquicubitales.
Folia, & flores acerri-
mo sunt gustu, ac ad-
modum feruenti.

LOCVS.

Idem. Nascitur in campis, colli-
bus, & frutetis.

QUALITATES.

Idem. Excalfacit, & siccatur exces-
su quarto.

VIRE.

Idem. Cutem, carnēque semicō-
russa illita, exulcerat. I-
schiadicos iuuat impo-
sita. Idem præstat oleū,
in quo folia sub calēte
sole diu fuerint macera-
ta, sed rosaceum oleum
ad hoc requiritur. Idē
non modo inunctum,
sed etiam infusum, opi-
tatur articulorum iliorūque doloribus, ac etiam nephriticis. Stil-
latitia foliorum, & florum aqua, eadem ferè acrimonia pollet. Hanc
non desunt, qui propinent quarta febre laborantibus, parū ante
accessionem.



SYMPHYTVM petrēū, Gręcis, Σύμφυτον πετρεῖον.] Ital. *Symphito petreo.*

SYMPHYTVM PETRÆVM.



FORMA.

Ramis exit tenuibus, par- diosc.
uis, origano similibus,
capitulis, & foliis thy-
mi: lignosum totum,
odoratum, gustu dulce,
ac adstringens: radice
longa, subrufa, seu sub-
purpurea, digitali cras-
situdine.

LOCVS.

Nascitur in petris, & pe- diosc.
trosis montibus. Matt.

QUALITATES.

Ex contrariis constat viri- Gal. 8.
bus. Habet enim incidē simp. me.
di vim quāpiā, qua col-
lectū in pectore, & pul-
mone pus expurgare po-
test. habet etiam quan-
dam contrahendi vim,
quā reiectionibus san-
guinis auxiliatur. & ter-
tia ad eas inest humidi-
tas quędam non immo-
dicē calida, per quā gu-
stātibus dulce apparet,
& odoratu iucundum.

VIRE S.

Decoctum eius ex aqua mullā paratū, potū, pulmonis vitia purgat: san- diosc.
guinem reiicientibus, & renum malis ex aqua datur ad dysenterīā,
rubraque fœminarum profluvia, in vino decoctum: vulnera recen-
tia, enterocellāsque glutinat, & illitu cohibet. carnes cum eo deco-
ctæ coalescunt.

SYMPHYTVM maius, Græcis, Συμφύτον ἐτέρον.] Italis, *Consolida maggiore*.] Germanis, *Uual vurtz*, seu *schuortz vurtz*.] Hispanis, *Suelda maiore*, *sive Consuelda maior*.] Gallis, *Oreille de Asne*.

F O R M A.

Diosc. Caulem emittit cubitalem, aut
Matt. maiorem, crassum, angulosum, inanem : circa quæ breui interuacante spatio, folia exeunt oblonga, lataque, buglossio proxima hirsutaque. ¶ Caule secundum angulos quosdam striato, ramis tenuibus ex alarum sinu prodeuntibus, in quibus flores lutei, quandoque verò purpurei, nonnunquam verò albi, diuersis in plantis spectantur. Tam caulibus, quam foliis aspera lanugine horrent, tactuque pruritus concitant. Radicem fundit crassam, multifidamque, nigro exterius cortice, interna verò pulpa candida, glutinosoque succo madet.

L O C U S.

Matt. Nasçitur frequens in pratis.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 8. Similem petreo vim habet. non
sim. med. tamen gustantibus dulces est, nec olfacientibus odoratum. Cæterum quatenus viscositatem quandam, & mordacitatem obtinet scillæ simile est. eoque vtuntur ad omnia, ad quæ iam dicto.

V I R E S.

Diosc. Tritæ radices & potæ, cruentis

Matt.

excreationibus, ruptisque proficiunt : recentia vulnera illitæ conglutinant : inflammationibus, præsertim sedis, cum senectutis foliis, vtiliter illinuntur. Coa-
 luntur etiam carnes cum iis coctæ. ¶ Ossium fracturas sanant, si contritæ imponantur, & stricta fascia ligentur.



CONSOLIDA media, Hetruscis, *Morandola*, seu ut alijs, *Consolida mezzana*, siue herba *Laurentina*.

C O N S O L I D A M E D I A.

F O R M A.



Folia profert minoris solidaginis, latiora, mollioraq; : aduersa parte subpurpurea, caulem pedali longitudine, pilosum, quadrágulum, inanem : flores caruleos, qui partim inter folia, quæ caulem ambient, partim in cacumine spicata congerie prodeunt. Radix illi est multifida, haud altè descendens. *Matt.*

L O C V S.

Nascitur in hortis, & vineis, alijsq; locis. *Idem*

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Datur vtiliter foliorū succus ab alto deuolutis, item ruptis confractisque, quin etiam ad intestina vulnera, & illinitur ad externa. sanguinis grumos, vbiq; unt, dissoluit. folia in collutionibus addita faciunt ad oris, & gingiuarum vlcera. Idem quoque præstant ad vlcera pudendorum vtriusque sexus. *Idem*

nis grumos, vbiq; unt, dissoluit. folia in collutionibus addita faciunt ad oris, & gingiuarum vlcera. Idem quoque præstant ad vlcera pudendorum vtriusque sexus.

CONSOLIDA minor. Italis, *Consolida minor*.] Germanis, *Brunellen*.

F O R M A.

CONSOLIDA MINOR.

Matt. Caulibus exit quadrangulis hirsutis, spithamæ longitudine, foliis menthæ proximis, sed subasperis. Flores gerit in ramusculorum fastigiis, spicatos, purpurascens, & quandoque candidos. Radicem multifidam, ac tenuem.

L O C V S.

Idem Prouenit in montibus, collibus, & ferè vbique.

Q V A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem Additur in medicamentis, quæ parantur ad linguæ, faucium, & gutturis inflammationes, & vlcera. & in omnium morborum vsum venit, in quorum affectibus præstat solida-go media, nâque suas vires illi cõformes habet.



DENTARIA minor, siue Sannicula quinque folia. Italis, *Dentaria minore*.] Germanis, *Bers Sanichel*.

D E N T A R I A M I N O R .



F O R M A .

Exit hæc foliis pētaphyl- *Matte.*
li, sed lōgè maioribus:
radice candida. tā mi-
ro naturę ordine, no-
dulis, ac laciniis qui-
busdam elaborata, vt
nō parūm admirētur,
qui tantum naturæ o-
pus diligenter intuen-
tur atque examinant.

L O C V S .

Nascitur in montibus, *Idem*
syluosis locis.

Q U A L I T A T E S ,
E T V I R E S .

Radix glutinat, cohibet, *Idem*
roborat. Eadem datur
utiliter potanda ad en-
terocellas, quotidie
drachmæ pondere, ex
vino austero diebus
quadraginta cōtinuis.
præstat quoque ad in-
terna vulnera, cū tho-
racis, tum etiam inte-

stinorum, ex aqua equiseti eodem pondere sumpta.

DENTARIA maior, Græcis, Αφύλλος, quòd sine foliis proueniat.

DENTARIA MAIOR.

F O R M A .

Matt. Germinat primo statim vere: caules profert drantales, teneros, fragiles, succosos, orobanche quadatenus æmulos. In quibus à medio ad summum flores exeūt subpurpurei, hirsuti que, è quibus calyculi oriuntur, exiguo intus semine. Radice consistit albicante magna, succosa, fragili, cōpactili squamarū congerie, miro sanè naturæ artificio, acerbo gustu ac subamariusculo.

L O C U S .

Idem Prouenit in opacis syluis, & aliis vmbrosis locis.


F A C U L T A T E S ,
E T V I R E S .

Idem Adstringit, refrigerat, & abstergit; deuorata verò soporem facit.



AVRICVLA vrsi, siue Sannicula altera. Italis, Orecchia de Orso. *Philos. Medicinal.*
oder Forst Paderingen. Dieser ist der sehr seltene kostliche Cammischel.
 AVRICVLA VRSI.

F O R M A.



Folia fert plantaginis, sed *Matt.*
 carnosiora, sensim p am
 bitū sinuata subflanis
 circunquaque oris: cau
 lem edit, & flores pri
 mulæ veris vocatæ per
 omnia similes, odoris
 eximij: Radice nititur
 multifida, albicante, El
 lebori modo fibrata.

L O C V S.

Nascitur in altis, & saxosis *Idem*
 montibus, inter ingen
 tia saxa.

F A C V L T A T E S,
E T V I R E S.

Refrigerat, siccatur, glutinat, *Idem*
 cohibet: Pota herba cū
 radicibus enterocellis
 vtiliter medetur: ac
 etiam intrinsecis qui
 buscunque vulneribus
 tum herba ipsa deuora
 ta, tum in potionibus

addita. Folia recentia vnà cum radice tusa, atque supposita nō solum
 mensum abundantiam cohibent, sed vuluam mirum in modum
 concludunt.

Holostivum, siue Holestium, Græcis, Ολέστιον, καὶ ὀλέστιον.] Italis, *Holostio*.

FORMA.

HOLOSTIVUM.

Diosc. Quadrantalibus herba est, pusilla, tribus, quatuorve digitis supereminens extra terram: foliis, viticulisque coronopo, aut gramine proximis, gustu adstringentibus. Radice alba prætenui, usque in capillamenti specie, longitudine quatuor digitorum.

LOCVS.

Idem Nascitur in collibus terrenis.

QUALITATES.

Gale. 7. sim. med. Desiccandi vim habet, cum adstrictione.

VIRE.

Vsus eius adrupta efficax est in vino pota. Nam & carnes coguntur, quæ cum ea conferbuerint.



PILOSELLA, Italis, *Pelosella*.] Germanis, *Meuszhobr*.] Gallis, *Piloselle*,
sen Oreille de Rat.

PILOSELLA.



FORMA.

Plāta est humi decūbens, *Matt.*
 radiantibus circunqua-
 que foliis, oblongis, in-
 canis, euidenter pilosis,
 cauliculos repētes mit-
 tit funiculi faciem refe-
 rentes, hirsuta canitie
 obductos: flores aureos
 stipatos, qui maturescē-
 tes in papposam lanugi-
 nē euolant. Radicibus
 nitit̃ numerosis tenui-
 bus, humi pertinaciter
 inhærentibus. Lacteum
 succū fundit amaro sa-
 pore.

LOCVS.

Nascitur extenuato, & ari *Idem*
 do solo, in collibus, &
 incultis locis.

QUALITATES.

Lacteus eius succus ama- *Idem*
 ro est sapore, id quod
 extenuantis facultatis,
 atque etiam abstergen-
 tis inditiū prębet. Her-
 ba gustu est adstringen-
 ti, glutinat, cohibet, re-
 frigerat, siccatur.

VIREs.

Dysenterias, & vteri profluvia sistit: ex vino austero pota, vulnera tam *Idem*
 intrinseca, quàm extrinseca sanat: auxiliatur celiacis, & biliosa vo-
 mentibus, quin etiā enterocellis, sanguinem reiicientibus, & omni-
 bus in vniuersum fracturis. Additur vtiliter in vulnerariis empla-
 stris, & vnguentis. Foliorū succus nō solū recentia vulnera sanat,
 sed etiā vulnera quoq; contumacia, & pręsertim oris, & pudēdorū.

SCABIOSA, Italis, *Scabbiosa*.] Germanis, *Apostemenkraut*.] Gallis, *Scabiense*.

SCABIOSA.

G E N E R A.

Matt. Duum est generum, Maior, & Minor.

F O R M A M A I O R I S.

Idem— Primo statim exortu folia profert oblonga, minimè laciniata: cæterùm, quæ his succedūt, plu maioris mō incisa spectātur: quæ verò in caule, & ramis sunt, longè minora, ac magis dissecta visuntur: capitula summis caulibus profert in acutū desinētia, cōpactili squamarum ordine obducta, Cyani modo, è quibus flores prodeūt etiam similes, sed ex purpura subrubētes. Radicem habet pollicari crassitudine, & sæpe maiorem brachiata-que, sapore subdulci, pastinacæ proximo.

L O C V S.

Idem— Nascitur inter fruges, & in campis nō cultis argillaceo solo.



Q U A L I T A T E S.

Idem— Excalfacit, extenuat, aperit, digerit, abstergit.

V I R E S.

Idem— Radix valet peculiari quadam dote mirificè ad lichenosos, etiā si morbus à Gallica lue prouenerit, si eius decoctum morboſi bibant quotidie in quadragesimū diē vsque, sex vnciarum pondere. Idē præstat eiusdem radice pulvis quotidie drachmæ pondere ex sero haustus.

SCABIOSA minor, Græ. Ψόρα.] Ita. *Scabiosa minore.*] Ger. *Apoſtemē kraut.*

SCABIOSA MINOR.

FORMA.



Foliis crescit inferioribus *Matt.*

p ambitū dēticulātis, humi accubātibus, subalbicatibus, oblongis, & subhirsutis. verūm quę ī caule sunt, tenuiora, & magis diuisa spectātur. Caulē mittit tenuē, teretē, rectū, ramosum: flores cæruleos, stipatos, aut pallidos, ē quibus capitula oriuntur colore subuiridi, speciosis obducta ocellis. Radix est illi palmaris, multifida, subcandicansque. LOCVS.

Nascit̃ in agris non cultis, *Idem* secus itinera, & in collib⁹ terrenis. QUALITATES.

Sapōre est amaro: quare ex *Idem* calfacit, extenuat, abstergit, aperit, & crassa, lentaque expectorat.

VIRE S.

Herba ipsa in puluerē po- *Idem* ta, aut succus ex melle delinctus, pectus, & pulmones abstergit, crassaq; , ac glutinosa p os eiicit. Idē

prestat eius decoctū potū. scabiem sanat. Id quod & succus facit in vnguētis additus. Folia cruda contusa, & pestiferis carbūculis admota, mirificē eorū perniciē coercēt: Datur vtiliter earundē succus, quatuor vnciarū pōdere, cū theriacę drachma pestilētia affectis, prima statim die, verū à potione egros sudare oportet: & iterū, atque iterū medicamentū repetere. Dat̃ itē cōtra serpentū venenosorum morsus, herba verò exteriùs imponitur. Illitus scabiosę succus, cū chrysocolla, & caphurę momento, lentigines, alphas, impetigines, & cæteras cutis infectiones abstergit, oculorumque per se, & cum succo fœniculi, albugines delet.

CLYMENTUM, Græcis, κλύμενον.] Italis, Climeno.

CLYMENTUM.

FORMA.

Diosc. Caulem fert fabæ, quadra-
tum, folia plantaginis,
folliculis supra caulem
in sese inflexis, ut in po-
lyporum cirrhis.

LOCVS.

Mat.: Nascitur incultis locis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Diosc. Succus è tota planta ex-
pressus efficax est ad
sanguinis reiectiones,
& ad celiacos affectus,
fœminarum profluvia
cohibet: sanguinem è
naribus erumpentē si-
stir: trita folia, aut sili-
quæ, recentibus vulne-
ribus illitæ, ea ad cica-
tricem perducunt.

CENSURA.

Errant qui saponariã, vul-
go dictam clymentum

faciunt. ceterùm tamen, ego minimè compertum habeam, quæ nã
planta legitimum sit clymentũ, volui tamẽ hanc imaginem hic osten-
dere, ut de ea aliorum quoque sit iudicium.



PERICLYMENVM, Græcis, Περικλύμενον.] Italis, *Matrifelua*, seu *Vincibosco*.] Germanis, *Geiszblatt*.] Hispanis, *Madre sylua*.] Gallis, *Vincibosse*.

PERICLYMENVM.

FORMA.

Simplex fruticat, ex inter- Diosc.
uallis parua folia habēs,
ipsum amplectentia, sub
cādida, hederaceaq;: in-
ter folia surculi exeunt,
in quibus bacca hædere
similes: flos fabæ candi-
dus, aliquantulum rotū-
dus, & quasi in folium
procumbens: semen du-
rū, quod non facilè eue-
latur, radice rotunda,
crassa.

LOCVS.

Nascitur in aruis, ac sepi- Idem
bus conuoluens se ad mi-
niculis propè emergen-
tibus.

QUALITATES.

Tum fructus, tum folia vti *Gale. 8.*
lia sunt, adeò vehe- simp. me.
menter incidentis, simul
& exalfacientis faculta-
tis, vt si plusculum bibā-
tur, urinā sanguinolentā
cieant: semen quoq; de-
siccatur. VIRES.

Maturum semen in vmbra Diosc.

siccātū, si drachmæ pondere detur in vino quadragenis diebus, lie-
nē absumit, lassitudinē discutit, sed urinā ciet statim à sexto die crue-
iā: Orthopneæ, & singultui prodest, partū accelerat. Folia sunt iisdē
viribus prædita, quæ tricenis septenis diebus pota, sterilitatem facere
produntur. Eadem ex oleo peruncta, febriū algores abigunt. ¶ Folia *Matt.*
& earum succus, veniunt vtiliter in vnguenta, quæ ad capitis vulne-
ra parantur, & ad vlcera quæ in cruribus eueniunt.



TRIBVLVS, Græcis, Τρίβυλος.] Italis, Tribolo.] Arabibus, *Hafach.*] Germanis, *Qualtek letlin.*] Gallis, *Saligotz terrestres.*

TRIBVLVS.

G E N E R A.

Diosc. Duum est generum. Terris, & aquaticus.

F O R M A T E R R E S T R I S .

Idem Foliis exit portulacæ proximis, tenuioribus tamē: viticulis longis, in terra stratis: spinis secundū folia, rigidis, præduris.

L O C V S .

Idem Iuxta amnes, & rudera nascitur.

Q U A L I T A T E S .

Gale. 7. sm. me. In terrestri superat terreū frigidum, quod & adstringēs fuerit. Fructus tenuium est partiū, quare calculos in renibus comminuit.

V I R E S .

Diosc. Drachma terrestris tribuli pota, illitave ictos à vipera recreat, contra venena, cum vino aptissimè bibitur. Decoctū eius sparsum pulices necat. Cætera cum aquatico communia habet.



TRIBVLVS Aquaticus, Græcis, Τρέβλος ἐνὶ ὕδατι.] Italis, *Tubolo aquati-*
co.] Germanis, *Vuasser außz.*] Hispanis, *Abroyos, seu Abrollos.*] Gal-

lis, *Castaignes d'Eau.*

TRIBVLVS AQUATICVS.



FORMA.

Foliis prouenit latis, sub- *Matt.*
 rotundis, crassis, & ad-
 uerla parte maculosis,
 neruosis, & per ambitū
 ferratis, prelōgis, & cras-
 sis pediculis nitētibus.
 Caulem edit crassum,
 pinguem, sed in summi-
 tate longè vegetiorem.
 Fructū profert nigrū, ca-
 staneę magnitudine, tri-
 plici armatū mucrone,
 putamine membranoso,
 alba intus medulla,
 castaneę sapore. Radix
 illi prelōga, comātibus
 spicatis capillamentis.

LOCVS.

Nascitur in fluminibus, la *Idem*
 cubus, & in mari.

QUALITATES.

Ex humida essentia modi *Gale. 7.*
 cè frigida, & sicca non *sim. me.*
 mediocriter, & ipsa fri-
 gida componitur.

VIRES.

Inflānationes omnes ca- *Diosc.*
 taplasmate iuuat: vlce-

ra oris, gingiuas, tonillasque persanat. Thraces Strimonę amnis ac-
 colę, eius pabulo equos saginant, è fructu verò esculentum faciunt
 panem.

SAXIFRAGA, Græcis, Σαφίραγον.] Italis, *Sassifragia*.] Germanis, *Steinbrech*.] Gallis, *Perce pierre*.

SAXIFRAGA.

G E N E R A.

Atatt. Plura, diuersaq; reperiuntur genera, quorū nos quinque describemus.

F O R M A P R I M Æ.

Diosc. Frutex est surculosus, thymo similis.

L O C V S.

Idem. In petris, & asperis locis nascitur.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem. In vino coctus, mox potus, febricitatibus opitulatur. Stragurię prodest, singultū sedat, calculos vesicę frangit, & urinam ciet.



SAXIFRAGA secunda. Italis, *Sassifragia secunda.*

in andr. Steinburch

SAXIFRAGA SECUNDA.



FORMA.

Folia in cauliculis per in- *Matt.*
terualla gerit parua,
angusta, ac longiuscu-
la, cunilæ æmula, con-
comitantibus aliis lō-
gè minoribus, in cacu-
mine tamen copiosio-
ra sunt: & breuiori-
bus interuallis distin-
cta. flores edit in sum-
mis caulibus purpu-
reos, odoris non in-
iucundi.

LOCVS.

Prouenit in saxis, & saxo- *Idem*
sis locis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Cit vrinam, calculos in *Idem*
renibus frangit, & eii-
cit, visum acuit, si eda-
tur.

SAXIFRAGIA tertia. Italis, *Saffisfragia terza.*

Ger. Drua Stimbriach
SAXIFRAGIA TERTIA.

F O R M A.

Matt. Folia mittit capillacea, fœniculi emula, sed lōgiōra, tenuiora, rarioraque. caulem pariter fœniculaceū, sed tenuem, ac pumilū, umbellam in summitate, semine petrosilini vulgaris simile, sed lōgiusculo, & odorato. Radicem albicantem, pastinacæ sapore.

L O C V S.

Idem Nascitur in magnis faxis, & sicco ac extenuato solo.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem Excalfacit, attenuat, aperit, prouocat, abstergit. Totā planta subacris est, & subdulcis. Radix vrinā ciet, & menses quouis modo sumpra: visum acuit, & obstructions icceris referat.



SAXIFRAGIA quarta. Italis, *Sassifragia quarta*.

SAXIFRAGIA QVARTA.

Der viret Strinberg



FORMA.

Foliis est terrestris hede- *Matt.*

ra, minoribus tamen, circūferratis, humi accubantibus. Caule tenui, rotūdo, recto, piloso, dodrātali, à quo rari oriuntur ramuli, in quibus flores panduntur cādidi, ocimoidis modo, è quibus nullū oritur semē. Radix illi multifida, tenuisque, in cuius fibris grana quædam rotūda, albicātia ac subpurpurea coriādri seminis magnitudine spectantur, quæ eius esse semē quidam affirmant. Mira sanè plantæ natura, q̃ semē in radicibus gerat.

LOCVS.

Nascitur locis nō cultis, *Idem* sterili solo, ac pariter inter saxa.

QUALITATES.

Grana, quæ radicibus hæ *Idem* rēt amara sunt. Ideoq; excalfaciūt, attenuāt,

abstergunt, aperiunt.

VIRE S.

Herbæ, & radicis decoctū ex albo meraco paratum, renū calculos fran- *Idem* git, & educit. vesicā mundat, & vrinā prouocat, efficacius tamē, si ex eodē decocto granorū radicū farina drachmæ pōdere propinetur. Cæterū lōgè feliciter curatio succedit, si bibatur medicamentum, dum affecti balneo se fouent.

SAXIFRAGIA magna. Italis, *Sassifragia maggiore*.

groß Steingrös.

SAXIFRAGIA MAGNA.

FORMA.

Matt. Caule est lignoso, contorto, digiti crassitudine, duris, dēnsq; furculis, ipsisq; tenuibus, stipato: folia fert exigua, oblōga, in acutum desinētia, flosculos albos, & calyculos exiguos, ocimoidis modo, ore circūquaque serrato, in coronæ modū, in quibus semen continetur rubrum admodū exiguum. Radix in petris adeo pertinaciter concluditur, ut inde auelli non possit nisi mucronatis ferramentis.

LOCVS.

Idem Prouenit in saxis, & antiquis urbium mœniis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem Mirificè tota planta culculos cōminuit, & expellit.



LIMONIVM, Græcis, Αερώριον.] Italis, Limonio.] Officinis falso Behen rubrum.

LIMONIVM.



FORMA.

Folia habet beta, tenuiora, & longiora, decem, & sæpe plura, caulem tenuem rectum, seminibus rubris scatentē, adstringēti gustu. ¶ Ra *Matt.* dix est illi vegeta, rubraque.

LOCVS.

Nascitur in pratis, & palustribus.

QUALITATES.

Semen utpote austerum *Gale. 7.* auxiliatur, ubi adstrictione sit opus. *simp. me.*

VIRES.

Semen tritum, & ex vino acetabuli mensura potum, dysentericos ac coeliacos iuuat: quin etiam rubra foeminarū profluvia sistit, & sanguinē expuētibus subuertit.

CENSURA.

Explodenda est seplasia- *Gal.* riorum opinio, qui Limonij radicem, Behen

rubri vice in medicamentis supponunt. Ceterum longè melius facerent, si bistortę radice vterentur.

LIMONIUM ALTERVM.

Non desunt rei plantariæ
scriptores : qui plantā,
cuius hic imago specta-
tur, limonium faciunt.
De qua poterit esse e-
iam aliorum iudiciū.



PYROLA, Italis, *Pirola*.] Germanis, *Vuintergrien*: *oder die in Waldmaiflor.*

PYROLA.

F O R M A.

Foliis est pyri, minoribus *Matt.*
ramen, ac perpetuo vire
scentibus, caule dodran
tali, tenui, tereti, in quo
per intervalla flores spe
ctantur candidi, stellæ
figura, capillamentis è
medio emergentibus :
Radix & illi subalbicās.

L O C V S.

Nascitur in montibus vni *Idem*
brofis, & in sylvis.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Desiccat, adstringit, gluti- *Idem*
nat: Foliorum succus il
litus recētia vulnera sa
nat. Idem præstant & fo
lia. Eorundum quoque
decoctum ex vino para
tum, sanat potum inte
stina vulnera, quare ad
ditur cōmodissimè vul
nerariis potionibus.



LAGOPVS, siue pes Leporinus, Græcis, Λαγόπους.] Italis, Lagopo, seu
Pic di Lepre. Græc. *Gasimfio*.

F O R M A.

Diosc. Herbula est caule tenui,
 hirsuto, rotundo, ra-
 moso, foliis trifolio p-
 ximis, sed minoribus.

Matt. ¶ Paniculis in summi-
 tate villosis, & tactu
 mollibus, perinde ac
 leporini pedes.

L O C V S.

Diosc. Nascitur in campis inter
 segetes.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 7. Qualitatis est, exiccantis,
 Simp. me. adeò, vt fluxus alui p-
 bè exiccet.

V I R E S.

Diosc. Adalligatur tota planta
 inguinibus contra co-
 rum inflammationes.

Matt. ¶ Folia, & paniculę dā-
 tur utiliter ex vino au-
 stero, aut ex succo pu-
 nici mali contra dysen-
 teriam. vniuersę plantę decoctum, additis maluæ foliis è dulci vino
 paratum, datur commodè ad vesicæ morbos, & urinæ ardores: semē
 auxiliatur sanguinem reiicientibus. Peculiariter cinis illitus hēmor-
 rhoidas fluentes sistit. Sunt qui paniculis vtantur ad extergendam
 dysentericorum sedem.

L A G O P V S.



CARYOPHYLLATA, Italis, Garofanata.] Germanis, *Bēdicten vurtz*.]
 Gallis, *Benoïste, Galliot, seu Ressize*. *Gaidnips Windkraut*.
 CARYOPHYLLATA.



G E N E R A .

Duum est Generum, Cam-
 pestris, & Montana.

F O R M A C A M P E S T R I S .

Folia fundit subaspera, hir *Matt.*
 suta, tripartita : duobus
 etiam longè minoribus
 auricularū instar in po-
 steriorem parte adnatis, at
 que omnibus per ambi-
 tum laciniatis: caule est
 ramoso, rotundo, haud
 crasso, sesquicubitali, ge-
 niculato, subasperoque:
 floribus aureis, penta-
 phylli æmulis, villosis:
 succedentibus inde ca-
 pitulis, in quibus semē
 continetur. Radicibus
 nititur copiosis, tenui-
 bus, subruvis, caryophyl-
 lorū odorē spirantibus.

L O C U S .

Nascitur secus vias, propè *Idem*
 hortorum, & agrorum
 sepimenta, locis potius
 opacis, quàm apricis.

Q U A L I T A T E S .

Radix, cuius est vsus, ex- *Idem*

calfacit, & siccit, aperit, & roborat.

V I R E S .

Radices præstant ad sananda vulnera, & vlcera, & præsertim ad intrin- *Idem*
 seca vulnera, si in potionibus addantur. Earundem succus cum æru-
 gine infusus, præstat ad cuniculosa vlcera. Eadem olfactæ vitales spi-
 ritus recreant, & frigidum iuuant cerebrum. Earundem pulvis epo-
 tus, prodest caliacis, dysentericis, & sanguinem expuentibus.

CARYOPHYLLATA montana. Italis, *Garofanata saluatica*.

CARYOPHYLLATA MONTANA.

F O R M A.

Matt.

Folia gerit alterius crassiora, crispiora, hirsutioraque, plura ab vna radice prodeuntia, longisque pediculis inhaerentia. tactu subaspera, & circumquaque lacinata, humique procumbentia. Caules tenues, nullis adnatis ramis, in quibus pusilla, sed rara folia spectantur. In caulium summitatibus vnicus tantum flos emicat aureus, petiophylli similis. sed maior paulò, qui flaccescens, pinnatum efficit orbem, non paruo naturae opificio: Radice nititur dodrantali, diuina crassitudine, subrufa: caryophyllorum odore.

L O C V S.

Idem

Nascitur in Boemiae montibus, è quibus Albis fluius oritur.



Q U A L I T A T E S.

Idem

Radix non solum excalfacit, & siccat, sed etiam cohibet, ac roborat.

V I R E S.

Idem

Iisdem cum altera pollet viribus, sed praestantioribus.

CORTUSA, Italis, Cortusa.

CORTUSA.



F O R M A .

Foliis prouenit ferè viti- *Matt.*
gineis, sed lōgè mino-
ribus, subrotundis, at
que subasperis, adstrin-
genti quadantenus sa-
pore, caules edit te-
nues, rectos, glabros-
que. in quorum cacu-
mine flores exeunt ex-
terius purpurei, inte-
rius verò aurei, stami-
nib⁹ pariter aureis re-
ferti: Radices fundit
numerosas, tenues: ac
longas. Est etiam quæ
violaceos, & quæ can-
didos flores gerat. sed
prima frequentior ha-
betur.

L O C V S .

Nascitur locis vmbrosis, *Idem*
cretaceo, & albicante
solo.

Q U A L I T A T E S .

Tota planta dum recens *Idem*
est, gratissimo fragrat
odore, mellei faui ferè
simili, sed longè admo-

dum gratiori: in sicca verò odor enanescit: subtilium est partium,
qua re excalfacit magis recens, quàm sicca; primo tantum excessu.

V I R E S .

Mulcet neruorum, & articulorum dolores; à quauis causa oriantur. *Idem*

Ad hoc autem macerantur flores recentes in oleo dulcium amygda-
larum, & rosaceo, quod completum vocant, diuq; insolantur. Oleū
egelidum deinde illini præstat, repetitiis illitionibus.

MEDIVM, Græcis, Μήδιον.] Italis, Medio, nonnullis Viola marianna.

M E D I V M .

F O R M A .

Diosc. Folia habet intubi, caulē tricubitalem, & in eo florem grandem, purpureum, rotundum, semine Cnici simile, minuro: Radicem dodrantalem: crassitudine baculi, gustu acerbō.

L O C V S .

Idem In saxosis, & opacis nascitur.

Q U A L I T A T E S .

Gal.li.7. sum.med. Medij radicem contra atque semen ipsum temperatum esse cōtingit: nam illa quidem austera est, & fluxiones cohibet, cū alias, tum profluvium muliebre. At semen tantum abest, ut tale quid efficiat, ut etiam menses cieat, ut pote quod tenuium partium, & incidentis est facultatis.

V I R E S .

Idem Radicis farina, ex melle cocta, rubros sceminarum menses cohibet, eclegmate per aliquot dies sumpto, semen verò in vino potum eosdem pellit.

A N N O T A T I O .

Mitt. Medium foliis iridis provenire deprauatus Dioscoridis codex legit: At Oribasius, qui ab eo trāscribit, non irides, sed seridis foliis ipsum provenire ait, quòd in suo Dioscoridis exemplari legerit, σέριδι, non autem, ἰρίδι, cui & nos astipulamur.



GLADIOLVS, Græcis, Σιφίον.] Italis, Gladiolo.] Senensibus, Monacuc-
cie.] Mauritanis, Kasifton.] Germ. Schuertel.] Gallis, Glais, siue Glaitel.

GLADIOLVS.

FORMA.

Folia ei sunt iridis, breuio *Matt.*
ra tamen, & angustiora,
striata, & in mucronem
desinentia. Caulis cubi-
talis, læuis, succosus, in
quo flores exeunt pur-
purei paribus spatiis
vtrinque distantes, Iri-
dis æmuli, sed longè mi-
nores: colore verò pu-
niceo diluto, è quibus
rotundum prouenit se-
men: Radicibus cohæ-
ret geminis, bulbosis,
rotundis, pressis verti-
cillari specie, altera, al-
teri insidente. Hæ capil-
laceo conteguntur inuo-
lucro, subrufoque.

LOCVS.

Nascitur in aruis, & inter *Idem*
segetes.

QUALITATES.

Radix quæ superior est, at *Gal. 8.*
trahentem, digerentem, *simp. me.*
& exiccantem faculta-
tem habet.

VIRÆS.

Superior radix cum thu- *Diosc.*

re illita, admisto vino, spicula, & aculeos è corpore eximit: panos cū
Lolij farina, & hydromelite discutit. menses supposita trahit. Eadē
ex vino pota venerē stimulat. Contrā vero inferior, quippe quæ steri-
litate faciat. Datur superior vtiliter cum aqua potanda ad puerorū
enterocellas.

ANNOTATIO.

Tametsi scripserit Dioscorides superiorem gladioli radicem inferiore
magnitudine superare, plerunque tamen contrarium visitur.



SPARGANIVM, Græcis, Σπαργάνιον.] Italis, Sparganio.] Mauritanis, Safarheramon.

SPARGANIVM.

FORMA.

Diosc. Folia habet gladioli, sed artiora, & in terram magis procumbentia, in summo caule veluti pilulæ prominent, in quibus semen.

LOCVS.

Matt. Nascitur ad montium radices, humecto solo, & circa scrobes.

FACULTATES.

Gale. 8. sim. med. Et ipsum desiccantis est facultatis.

VIREs.

Diosc. Datur radix ex vino contra serpentium venena.


CENSURA.

Quâquam ferè omnes, qui de materia medica scripserunt, hâc plantâ sparganium faciunt, nos tamen non parum dubitamus, an rectè senserint, quùm hæc folia gladioli latiora gerat, non angustiora, sursum spectantia, non humi procumbentia.



XYRIS, Græcis, *Ξυρίς*.] Italis, & vulgo, *Spatola fetida*.] Germanis, *Uandt leusz*.] Hispanis, *Lirio spadanal*.] Gallis, *Glaicul*.

XYRIS.



FORMA.

Folia habet Iridis latiora, *Diosc.* & in cacumine mucronata, è quorum medio caulis erumpit satis crassus, cubitalis, ex quo siliquæ triangulares dependent, in quibus purpureus flos, & in medio puniceus, semen in folliculis simile fabis, rotundum, rubrum, acre. Radix longa, geniculata, rufa.

LOCVS.

Nascitur in aquosis, & humectis locis. *Matt.*

QUALITATES.

Tenuium est partium, attractoriæ, digerendi, ac *Gale. 7. sim. me.* nimirum etiam desiccandi est facultatis, cum radix, tum multò etià magis eius fructus.

VIRE S.

Valet ad capitis vulnera, fractaq; efficax est: aculeos, & spicula omnia, citra molestiam extrahit,

adiecta floris æris tertia parte, & radice centaurii, & mellis quinta: tumoribus, & collectionibus illita cum aceto medetur. Radix bibitur ex passo ad conuulsa, rupta, coxendicum dolores. strangurias, & alui profluvia. semen tribus obolis potum, vrinam vehementer impellit, & cū aceto lienem absorbit.

ANCHUSA, Græcis, *Αγχουσα*.] Italis, *Anchusa*.] Germanis, *Rodt ocse-
zungen*.] Hispanis, *Sagem*.] Gallis, *Orchanette*.

A N C H U S A.

G E N E R A.

prosc. Trium est generum, ma-
gnitudine, & exilitate
foliorum, & caulium
differentium.

F O R M A P R I M Æ.

Idem Folia habet lactuæ, in a-
cumen fastigiata, hirsu-
ta, aspera, nigra, multa,
ab radice quoquo ver-
sum humi sparsa, spinis
horrida. Radici crassitu-
do digitalis, quæ æstate
prouenit, & manus in-
ficit sanguineo colore.

L O C V S.

prosc. Nasctur lato solo, & lo-
Adatt. cis incultis.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 6. Radicem habet admodū
simp. me. refrigerantē, & desiccā-
tem, tū adstringentē, &
subamarā, tum quæ suf-
ficiat extenuādis, & ex-
tergendis humoribus,
corporibusq; condēsan-
dis. Folia radice quicū-
que sunt imbecilliora, cete-
rū adstringūt & ipsa, &
desiccant.



V I R E S.

prosc. Radix adstringit: ex oleo, & cera, efficax est ad ambusta, & vetera vlcera.
Medetur igni sacro, cū polenta illita. Illinitur quoq; ex aceto, lepris,
& vitiliginibus: partus supposita extrahit. Datur eius decoctum v-
tiliter potandum calculosis, lienosis, & bile suffusis, & si febris sit
ex aqua mulsa. Folia ex vino pota aluum sistunt.

ANCHUSA altera, Græcis, *Αγχουσα ἐρέπα.*] Italis, *Anchusa secunda.*

A N C H U S A A L T E R A .



F O R M A .

Minoribus hæc exit foliis , *DIOSC.* quàm prima, similiter tamen asperis: ramulis exilibus , in quibus flos purpureus in puniceū vergens conspicitur. Radices habet rubras, prælongas, quæ messibus sanguineum succū fundūt.

L O C U S .

In sabulosis nascitur.

Idem.

Q U A L I T A T E S .

Calidior altera est, & magis medicata: nam plusculum habet & gustu ipso protinus acrimoniæ. *Gale. 6. sim. med.*

V I R E S .

Vires foliis , radicibusque *DIOSC.* insunt, quæ, cōtra virus, cū reliquorum serpentium, tum maximè viperarum auxiliantur, siue cibo, siue potu, siue alli-

gatu , illinitivè : nam si quispiam mandens, in serpentis os inspuat, eum necabit.

ANCHUSA tertia, Græcis, ἑτέρα ἀγχουσα.] Italis, Anchusa terza.

A N C H U S A T E R T I A.

F O R M A.

Diosc. Est & hæc alteri non dissimilis, sed puniceo, ac minori semine.

L O C U S.

Matt. Nascitur arido, ac sabuloso solo.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 6. sim. med. Parua hæc, etiam altera, calidior est, quæ, & amarior, & magis etiam medicata.

V I R E S.

Diosc. Commanducatum semen, si in serpentis fauces expuatur, eum interficiet. Radix acetabuli mensura, cum hyssopo, & nasturtio pota, latus ventris tineas excutit.



ECHIVM, Græcis, *Εχίον*.] Italis, *Echio*, & *Englossa saluatica*.] Germanis, *Wild offenzungen*.] Hispanis, *Yerna della binora*.] Gallis, *Buglossa sauvage*.

E C H I V M.



F O R M A.

Folia habet prælonga, aspe- DIOSC.
ra, aliquantum tenuia, an-
chusæ proxima, minora
tamen, subruba, & pin-
guia, spinulis tenuibus
horridula: cauliculos e-
xiles, numerosos, minu-
taq; utroque latere folia,
expansa pinnataque, ni-
gra, in summo caule pro-
portione minora. Flores
secundum folia purpu-
reos, in quibus semina ca-
piti viperarum similia in-
sunt. Radix nigricat digi-
to tenuior.

L O C V S.

Nascitur secus itinera, in a- Matt.
grorum marginibus, &
sicco, inculto, & exoluto
solo.

Q U A L I T A T E S ,
E T V I R E S.

Radix non modo percussis DIOSC.

à serpente ex vino prodest, sed eos, qui antea biberint feriri non pati-
tur. Idem præstant munus, folia, & semen. Lumborum dolores sedat in
vino, aut sorbitione sumpta. Lac extrahit.

OCIMOIDES, siue Ocimastrum, Græcis, *Οκιμοειδής*.] Italis, *Basilico saluatico, siue Ocimoide*.] Hispanis, *Alba haqua montesna*.] Gallis, *Basilic saunage*.

F O R M A .

prosc. Foliis exit ferè satiuo Oci-
Matt.

mo similibus, ramulis hirsutis, quadrangulis, cubitali longitudine, in quorū summo flores emicant candidi, & nonnunquā purpurei, è quibus calyces erūpūt hyoscyami figura, capaci vētre, arctis faucibus per ambitum dēticulatis, in quibus semē includitur nigrum, melanthio ferè simile.

L O C V S .

Matt. Nascitur passim inter segetes, propè septa, & agrorum marginibus.

Q U A L I T A T E S .

Gal. 8. Radix superuacanea est: at
simp. me. semen tenuium partiū,
& desiccātis citra mordacitatem facultatis est.

V I R E S .

men in vino potum, tum viperarum, tum ceterarum morsibus medetur. Datur Ischiadicis cū vino, melle, myrrha, & pipere.

O C I M O I D E S .



ERINVS, Gręcis, *Ephros.*] Italis, *Erino.*] Hispanis, *Basilho delhagoa.*

ERINVS.

FORMA.

Folia mittit Ocimi, mino- Diosc.
ra tamę, superna parte
diuisis, furculis quinis,
senisvę dodratalibus :
flore cādido, semine ni-
gro, & acerbo. Folia, &
caules lacteo succo tur-
gent.

LOCVS.

Nascitur apud fontes, & *Idem*
fluuios.


QUALITATES.

Semę acerbū est, ac proin Gale. 6.
de repellentis, & exic- simp. me.
catorię est facultatis .
vtuntur eo ad oculo-
rum, & narium fluxio-
nes.

VIRES.

Semen drachmis duabus Diosc.
in quatuor mellis cya-
this oblitum, oculorū

fluxiones cohibet. succus cum sulphure, & nitro instillatus, aurium
dolores sedat.



GRAMEN, Græcis, *Αγρωστός*.] Arabibus, *Vagem, Negen, seu Nagen. Thelkel, & Negil.*] Italis, *Gramigna.*] Hispanis, *Grana.*] Gallis, *Den de chien.* Gr. *gras.*

G E N E R A.

Matt. Complura graminis visuntur Genera, de quorum nonnullis dicetur.

F O R M A P R I M I.

Diosc. Geniculatis serpit ramulis, à quibus radices sparguntur dulces, articulis præcinctas. Folia acuminata, dura, & vt arundinis parua lata, eaq; iumenta, & boues pascunt.

L O C V S.

Matt. Prouenit in campis, & incultis locis.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 6. simp. m. Radix mediocriter frigida est, & sicca; mordacitatē quandam exiguā, & partium tenuitatē obtinēs: herba verò primo quidē excessu refrigerat: in humiditate, & siccitate moderata. Semen imbecillū est. Radix esculenta est viridis. Dulcis enim est, instar aque, sed acre quidam exiguū, & subacribum obtinentem.



V I R E S.

Diosc. Trita radix illitu vulnera glutinat. Decoctum eius in potu torminibus medetur, atque vrine difficultatibus: calculosa etiam vesicę excrementa comminuit. *Matt.* Idem potum interaneorum vermes necat.

GRAMEN manne, Italis, Sanguinella, siue herba Capriola .

Ger. Wal. 3 Simlisa

GRAMEN MANNÆ.



FORMA .

Foliis , ac radicibus exit *Matt.*
 alterius tenuioribus ;
 caule geniculato, præ-
 longo, spicis numero-
 sis in cacumine refer-
 to, ipsisq; sensim acu-
 leatis, adeò vt naribus
 inditis, manuque agi-
 tatis , sanguinem eli-
 ciant . Semen iis inest
 minutum albicans, pa-
 nico longè minus ori-
 zæ ferè sapore, quod à
 Germanis estur in pin-
 gui iure decoctum, &
 per quàm bellè pla-
 ceat. Qua de re hoc se-
 men Mannam appel-
 lant .

LOCVS .

Seritur in Germania, & *Idem*
 diligèter colitur in cā-
 pis: quin etiam spon-
 te per se nascitur in in-
 cultis locis .

QUALITATES .

Semen orizæ qualitates *Idem*
 habet, quare medio-

criter ventrem adstringit .

VIRES .

Semen ex pingui iure decoctum , & illitum mammarum durities re-
 soluit. In cibis mediocriter alit .

CENSURA .

Errant profectò qui hanc plantam coronopum faciunt .

Est & Alterũ, quod floridũ appellari potest, foliis & caulibus cæteris similibus; floribus in summitatibus stellarum instar radiantibus, candidisque: Radice tenui minimè geniculata.



GRAMEN Parnasi, Græcis, ἄγρωσις παρνασίου.] Italis, Gramigna de Parnaso.

GRAMEN PARNASI.



FORMA.

Densus hoc fruticat, foliis hederaceis, flore odorato, candido, semine paruo, non inuili: radicibus quinis, aut senis, digitali crassitudine, candidis, mollibus, & admodum dulcibus.

LOCVS.

Prouenit in monte Parnaso. *Idem*

QUALITATES.

Semen desiccatorium, te Gal. 6. nuium partiū, & sub-*simp. me.* acerbum est.

VIRES.

Succus cum pari melle, & myrrhæ dimidio decoctum, adiectis piperis, & thuris tertiis portionibus, probatissimum erit oculorum medicamentum: præsertim si in ænea pyxide recondatur. Decoctum radicis idem, quod herba præstat. Semen vehementius vrinam impellit, aluum vomitionesque sistit.

CRAMEN aculeatum, Italis, *Gramigna spinosa*.] Græcis, ἄγροσις ἀκανθώδης.

CRAMEN ACULEATUM.

FORMA.

Matt. Folia, caules, radices primi graminis mō profert. In caulibus tamē singulis è foliis, aculei peculiariter exeunt, triplici apice constantes, ac suis nixi pediculis, tribulorum terrestrium instar.

LOCVS.

Idem Prouenit inter rudera, & in muris vetustate collapsis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem Vires easdem habet, quibus pollet primū graminis genus.



SIDERITIS, Græcis, Σιδερίτις.] Arabibus, Sidrichis.] Italis, Siderite.

SIDERITIS.



GENERA.

Tria Dioscoridi recensentur genera. *Matt.*

FORMA FRIMÆ.

Folia habet Marrubij, sed *Diosc.* longiora, satis ad frondem quercus, aut saluie accedentia, minora tamen, & aspera. caules edit quadratos, dodrantes, aut etiã maiores, non iniucundi gustus, aliquantum substringentis, in quibus per interstitia orbiculatę vertebrę, vt in marrubio spectantur, & semen in eis nigrum.

LOCVS.

Nascitur in petrosis locis. *Idem*

QUALITATES.

Habet quidem etiã abster- *Gale. 8.*
gendi quandam facultate, *sim. med.* sed plurima eius pars humida est, & mediocriter frigida, paucula verò inest adstrictio, quare flegmonem sedat, & glutinat.

VIRES.

Illita folia, suapte vi vulnera sine inflammationis periculo iungunt. *Diosc.*

ANNOTATIO.

Cùm hæc planta humectis, vt plurimum, nascatur locis, non ausim eãdem affirmare, legitimam esse primi generis sideritim, & si cæterę cor respondeant notę. Quo factum est vt sequentem deinde legitimam crediderim, esse primi generis sideritim.

SIDERITIS altera⁷, Græcis, Σιδερίτις ἑτέρα.] Italis, *Siderite seconda*.

F O R M A.

Matt. Exit hæc caule quadrato, dodrantali, aut maiori, ramosoque, foliis marrubio lōgioribus, ad saluix faciem accedentibus, crispis, albicantibus, & per ambitū laciniatis, sapore hand ingrato : foliis verticillatim in caule & ramis prodeūtibz marrubij modo.

L O C U S.

Idem— Nascitur aridis locis.

F A C U L T A T E S,
E T V I R E S.

Idem— Eadem illi sunt vires, quas primo syderitis generi tribuit Dioscorides, & Galenus.

S I D E R I T I S I I.



SIDERITIS tertia, Græcis, Σιδερίτις τρίτη.] Italis, *Siderite tertia*.

S I D E R I T I S I I I .



F O R M A .

Ramulis, & caule prouenit bicubitalibus, exilibus, foliis felicis, numerosis, vtrinque per oras diuisis, pediculo lōgo, prodeūtib; è summo alarum sinu furculis lōgis, tenuibus, capitulo in cacumine orbiculato, aspero, in quo semē continetur, quān betæ rotundius aliquāto ac durius.

L O C V S .

Nascitur in campestribus *Idem* saxosis locis.

Q V A L I T A T E S ,
E T V I R E S .

Seminis, & foliorum vis, *Diosc.* ad vulnera præcipua est.

A N N O T A T I O .

Hæc Dioscoridi, secundo generi assignatur.

SIDERITIS quarta, Italis, *Siderite minore*.

SIDERITE QVARTA.

F O R M A.


Prosc. Foliis exit ab vna radice multis, coriandro simili bus, circa cauliculos do drantales, læues, tene- ros, subcandidos, atque subrubicundos, flore pu- niceo, paruo, gustauti amaro.

L O C V S.

Idem Nascitur in maceriis, & vi-
neis,

Q V A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem Huius ea vis est, vt quam-
uis recenti vulnere im-
posita, sanguinem sup-
primat.



VIRGA aurea. Italis, *Virga aurea*, quibusdam herba *Judaica*, siue *Pagana*.

VIRGA AVREA.



FORMA.

Caulem edit bicubitalē, *Niatt.*
subrufum, læuem : fo-
lia oliuæ latiora, circū
minutissimè serrata, flo-
rens in cauliū fastigiis
aureos, ac spicatos, qui
flavescentes in pappos
dissiliunt.

LOCVS.

Nascitur in collibus, in *Idem*
agrorum marginibus,
& vineis.

QUALITATES.

Subamara est, absterforiæ *Idem*
facultatis, ac glutinato-
riæ.

VIRES.

Additur vtiliter tota plan- *Idem*
ta in vulnerum intrin-
secorum potionibus :
vulnera quæcūque glu-
tinat: calculos commi-

nuit, & vrinam ciet. Pota aut infusa alui fluxiones cohibet: eius de-
cocto sanantur foru oris vlcera.

ACHILLEA, Græcis, *Αχιλλεῖος*.] Arabibus, *Sichritis*, seu *Egilos*. Succus
verò *Damalo chotten*.] Italis, *Achillea*.

A C H I L L E A.

F O R M A.

Prosc. Scapos gerit dodrâtales,
aut maiores, fusorum
effigie, minutulis so-
liis circûdatos, ex obli-
quo crebras incisuras
habentibus, Coriâdri
similitudine, subflauo
colore, lentis, odore
nō insuauis, verum me-
dicato, umbella in ca-
cumine rotunda, flo-
ribus candidis, purpu-
reis, & aurum æmulâ-
tibus.

L O C V S.

Idem Prouenit læto solo.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 8. sim. med. Viribus est Sideritis non
dissimilibus, cæterum
adstrictione exuperat.
quare ad sanguinis e-
ruptiones, dysente-
rias, & muliebri pro-
fluuium conuenit.

V I R E S.

Prosc. Trita coma sanguinolenta
glutinat, & ab inflā-
mationū periculo tue-
tur.

Erumpentem sanguinem inhibet, & ex vellere subdita, cruenta
vulvæ profluvia: bibitur ad dysenteriam vniuersæ plantæ decoctū,
in quo etiam insident fœminæ vteri profluuiio laborantes.



RUBUS, Græcis, Βέτος.] Mauritanis, *Buleich*, seu *Haleich*.] Italis, *Rouo*.] Germanis, *Bramen*, seu *Cratz*.] Hispanis, *Carza*.] Gallis, *Ronce Fructus*.] Latinis, *Mora Rubi*.] Græcis, Βατίνα ἢ Βατιλία.] Italis, *More di Rouo*.] Germanis, *Brambeer*, & *kratz beer*.

RUBUS.

GENERA.

Plura rubi reperiuntur genera, *Theoph. lib. 3. de p. h.* aliud. n. exit arboris instar. Aliud sepibus fructetisq; implicatur. Aliud humi serpit, radicitusq; graminis modo. Aliud denique aliis modis in montibus, & sylvis vagatur. Ceterum nobis duorum tantum generum meminisse sat fuerit, nēpe vulgaris & Idei.

FORMA.

Qui passim in sepibus, & fructetis nascitur, virgas edit quadrangulas subrubētes obsequiosas, aduncis vbiq; aculeis referta. E ramulis pediculi exeunt aculeati è quibus terna proueniunt folia fragarix herbe emula, sed aspera, & in acutū desinētia, dorso auersa parte aculeato. Flores profert racemosos, albicantes, e quibus mora oriuntur. Radix illi est graminis modo repens.

LOCVS.

Nascitur in sepibus, dumetis, fructetisque. *Idem*

QUALITATES.

Folia, germina, flos, fructus, & radix qualitate adstringēte participant, eaq; nō obscura. Atqui folia recenter nata plurimum in se habēt substantiæ aque, parū verò adstrictionis. eadē ratione, & germina. Fructus immaturus acerbus est, *Gal. 6. simp. me.*

VIRE.

& valdē exiccatorius: maturus verò nō parū habet calidi temperati. Flos viribus est immaturi fructus. Radix cū adstrictione tenuium est partiū, quare renū calculos cōminuit.

Ramorum decoctū potū, aluū stringit, & fœminarū profluuia: capillos tingit, folia cōmāducata gingiuis, & oris vitiis medētur. Serpentina vlcera cohibent, & quę in capite manāt. Illinūtur quoq; cōdylomatis, & hēmorrhoidibus. Eadem trita cardiacis, & stomachi doloribus vtiliter admoventur. Flores ex vino poti aluum sistunt.



RUBUS Idæus, Græcis, *βάρος ἰδαία*.] Italis, *Roumontano*.

RUBUS IDÆVS.

FORMA.

Matt. Est altero longè clementior. Folia p̄fert latiora, mollioraq̄; , virgas rotundas, fragiles, spinis nullis, aut omnino raris. Flores albos, alterius æmulos. Fructus rubi mora per omnia referūt: ceterūm differunt quòd hi teneiores, mollioresque habeantur: sapore, cū dulcedine quadā insipida, adstringente, nō tamen iniucundo, rubicundo perpetuò colore. Tridentina rura, hac mora vocāt Ampomele, & fragorū vice iis vescuntur.

LOCVS.

Idem. Provenit copiosus ī Mōtib.

QUALITATES,
ET VIRES.

nosce. Eadem præstat, quæ supra dictus. Illinitur flos cum melle oculorum collectionibus. Ignem sacrum extinguit: stomachicisq̄; ex aqua bibendus datur.

HELXINE cissampelos, Græcis, Ελξίνι κισσαμπελός.] Italis, *Vilucchio minore*.] Arabibus, *Acfin*.] Germanis, *Mitel vuinal*.] Hispanis, *Campanela yerua*.

HELXINE CISSAMPELOS.



FORMA.

Foliis est hederæ minori- **DIOSC.**
bus, ramulis exilibus, *Matt.*
longis, quibus comple-
ctitur quodcūque conti-
gerit ad miniculū. ¶ Flo-
res edit albos, leui tamē
purpura perfusos, cala-
thi figura, è quibus semē
oritur nigrum.

LOCVS.

Nascitur in sepibus, vineis, *Idem*
ac segetibus.

QUALITATES,

Digerendi facultatem ha- *Gale. 6.*
bet. *sim. med.*

VIRES.

Foliorum succus potus al- **DIOSC.**
uum deiicit.

ELATINE, Græcis, *Ελατίνη*.] Arabibus, *Arhim*.] Italis, *Elatina*.

F O R M A.

DIOSC. Folia habet Helxine similia, minora tamen, rotundiora, pilosa, tenuibus & dodrācalibus ramulis, quinis, senisvè, a radice, foliosis, gustu adstringentibus.

L O C U S.

Idem Nascitur in segetibus, & cultis.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 6. fin. med. Modicè tum refrigerat, tum adstringit.

V I R E S.

DIOSC. Oculorum fluxionibus, inflammationibusq; auxiliatur folia cum polenta trita. Eadem cocta, sorbitionis usu, dysenteriam sistunt.

E L A T I N E.




NUMVLARIA, siue Lunaria minor. Italis, *Lunaria minore*.

NUMVLARIA.

plumig. frans.

FORMA.



Serpit hæc humi, iunceis *Matt.*
cauliculis, cubito lōgio
ribus, in quibus à radi-
ce ad summum, breui-
bus interstitiis vtrin-
que folia exeunt, cras-
siuscula, rotūda paruo-
rum nūmorum instar,
vnde illi nomen: flores
fæt aureos, ac specio-
sos.

LOCVS.

Nascitur in scrobium ri- *Idem*
pis, & vliginosis agge-
ribus secus vias.

QUALITATES.

Glutinādi, cohibendique *Idem*
facultate prædita est.

VIRES.

Herba ipsa illita, recentia *Idem*
vulnera glutinat. Idem
præstat eorum succus.
Præcipua autem vis e-
ius est, ad puerorū enterocellas, cū illita, tum in puluerē hausta.

EUPATORIUM, Græcis, Ευπάτοριον.] Officinis, & Italis, *Agrimonia*.] Arabibus, *Casat*, *Cifit*, seu *Gafet*.] Germanis, *Odermeng*.] Hispanis, *Agramonia*.] Gallis, *Agremaine*.

F O R M A.

EUPATORIUM.

Diosc. Fruticosa est herba, vnicū efferēs caulē, lignosum, nigricatē, rectū, tenuem, hirsutū, cubitalē, interdū ampliorē, foliis per interval- la quinquifolij, aut cānabis similibus, quinque partito, aut amplius diuisis, nigricatibus, & per ambitum serratis. Semē medio caule erumpit, pilosum, deorsum spectās, quod sic catum vestibus inhæret.

Matt. Flores gerit spicatos, aureos, radicē lignosam, sub rubrā pentaphylli modo.

L O C V S.

Idem. Nascitur secus sepes, itineraque, in agrorū marginibus, & incultis locis.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 6. Tenuium est partiū, incidēdi, extergēdiq; facultatē, citra manifestā caliditatem obtinet, quo circa obstructions hepatis expurgat: inest ei & adstrictio modica, propter quam robur visceri additur.



V I R E S.

Diosc. Folia contrita & cum suillo adipe imposita, vlceribus cōtumacibus medentur. Herba, aut semen in vino potum, dysenteria, iecinorriis vitiis, & serpentium ictibus liberat. Iocinorosos iuuat decoctū potum. Idē ex vino albo paratū, cum saccaro sex vnciarum pondere tribus diebus potum, mirificē stranguriā sanat, & vrinas impellit. Additur herba in potionibus, quę ad intrinseca parātur vulnera.

Matt.

EUPATORIUM vulgare, Officinis, *Eupatorium Auicennæ.*] Italis, *Eupatorio.*] Germanis, *Kunigundt kraut.*

EUPATORIUM VULGARE.



F O R M A.

Caulē edit tricubitalē, *Mitt.* subrubrum, rotundū, folia cannabis, sed maiora, albiātia, hirsuta, amaro gustu, odore medicato, nō infuauī. Flores exeunt in summitatibus, in umbellis subpurpurascētes, qui flaccescentes in pappos abeunt. Radix multifida illi est, sed superuacua.

L O C U S.

Nascitur vliginosis locis, *Idem* & in scrobium aggeribus.

Q U A L I T A T E S.

Excalfacit, siccāt, abstergit, incidit, aperit, & subtilium est partium. *Idem*

V I R E S.

Præstat foliorum decoctū *Idem* iocinoris doloribus, ac cæteris eiusdem affectibus ab obstructione puenientibus: quin etiā lienis tumoribus, & obstructionibus. Da-

tur idē diutina febre laborātibus. vrinas, & menses pellit, scabiē, & pruritū sanat, præsertim cū sumaria, & caprino sēro, sed succus fortior est. Is itaque potus incipiēti elephātiæ medetur. Flores illiti vulnera recentia, & vlcera sanant: succus drachmarū duarum pondere in catapotiiis sumptus, intestinorum vermes necat: Dantur folia vtiliter pecoribus tussientibus, & anhelosis equis.

Königshand. Gren singe.] Gallis, Agrimoine sauvage. hail all Malt.
Prunellina. Banfwich.

POTENTILLA, quibusdam Anserina . Italis, *Potentilla.* Germanisi,

POTENTILLA.

F O R M A .

Matt. Foliiis exit agrimonie proximis , hirsutioribus , prona parte virentibus, supina verò albicantibus. cauliculos fundit humi repentes , è quibus aurei prodeunt flores: Radice cōstat exterius sub rufa, interius verò candicans, austero gustu, & adstringenti.

L O C V S .

Idem Nascitur humecto solo .

Q U A L I T A T E S .

Idem Refrigerat, siccatur, adstringit, repellit, roborat .

V I R E S .

Idem Fœminarum profluuia, & dysinterias cohibet, ac ceteras alui fluxiones . Datur vtiliter sanguinè reiicientibus. Herbæ decoctum ex vino paratum, præstat potum ad intestinorum tormina, & dorsi dolores. siccæ farina ex sua ipsius aqua stillatitia pota, alvi fluxiones cohibet, sed valentius, addito corallio, & ebore. iur ad enterocellas, & bubonocellas . vulnera recentia, & oris, dendorumque vlcera sanat : ex aceto decocta . colluitur vtiliter commotos dentes : & laxas gingivas, dentiumque dolores mulc & prolapsam columnellam restituit, addito aluminis momento



QVINQVEFOLIVM, Græcis, Πεντάφυλλον .] Italis, Cinquefoglio .] Germanis, *Vucis funf*, seu *Finger krant*.] Hispanis, *Cinco en rama*.] Gal-
lis, *Quinte fucille* .

QVINQVEFOLIVM.



G E N E R A .

Palchra quinquefolij extant genera, colore, ac magnitudine differentia . *Matt.*

F O R M A P R I M I .

Ramulos fert festucarum similitudine, tenues, dodrantaes, in quibus semen : folia menthae, quina singulis pediculis, in ambitu serrata : florem ex candido pallescentem, auriculatum, subrubram habet radicem, oblongamque, nigro veratro crassiorē . *Diosc.*

L O C V S .

Nascitur in riguis & aquariis ductibus . *Idem*

Q U A L I T A T E S .

Radix vehementer desiccatur : nimirum verò acris est, & cum sit tenuium partium, citra morsum desiccatur . Radix enim desiccatur ordine quodammodo tertio, minimum habens evidentis caliditatis . *Gal. 8. Simp. me.*

V I R E S .

Radicum decoctum, collutione, dentium dolores sedat, & ulcera putrida sistit, arteriae scabritias gargarizatu laeuigat . Dysenterias, & ceteras alui fluxiones cohibet; quin etiam articulorum coxendicumque cruciatus potu tollit . Coctæ in aceto, & illitæ, serpentia ulcera reprimunt . Strumas, tumores, duritias, abscessus, & collectiones discutiant . Ignis sacros, & condylomata sanant . Teneræ radice succus, iocinoris, & pulmonum vitiis medetur . pollet etiam aduersus venena : folia tricenis diebus pota, comitiales iuuant . Eorundem succus tribus cyathis diebus aliquot potus, celerrimè regio morbo medetur . Ex melle, saleque illita, vulneribus, & fistulis auxiliatur . Medetur etiam enterocellis . Tota planta, & potu, & illitu, sanguinem manantem sistit . *Diosc.*

res, duritias, abscessus, & collectiones discutiant . Ignis sacros, & condylomata sanant . Teneræ radice succus, iocinoris, & pulmonum vitiis medetur . pollet etiam aduersus venena : folia tricenis diebus pota, comitiales iuuant . Eorundem succus tribus cyathis diebus aliquot potus, celerrimè regio morbo medetur . Ex melle, saleque illita, vulneribus, & fistulis auxiliatur . Medetur etiam enterocellis . Tota planta, & potu, & illitu, sanguinem manantem sistit .

QVINQUEFOLIUM album, Græcis, Πεντάφυλλον λευκόν.] Italis, Cinque-
foglio bianco. *Wies fünffinger kraut*

QVINQUEFOLIUM ALBUM.

F O R M A.

Matt. Foliis est incanis, hirsutis, per ambitum sensim denticulatis, quinis ex vno quoque pediculo dependētib; cauliculis mollibus, obsequiosisque, flore candido, radice squamosa, agnatis ex obliquo prodeuntibus.

L O C U S.

Idem Nascitur in saxis ingentibus, & saxosis locis.

Q U A L I T A T E S.

Idem Adstringit, siccatur, roborat, repellit: Radix subtilium est partiū.

V I R E S.

Idem Ea omnia præstare potest, quæ alterū, quo tamen adstringentior est.



DIAPENSIA, siue Sannicula. Italis, Cinquesfoglio maggiore.

DIAPENSIA.

Sannicula.

FORMA.

Folia profert quinque; folij *Matt.* maiora, vitiginea specie, cauliculis rotundis, gracilibus, obsequiosis, in quorum summitate, & adnatorum fastigiis capitula prodeunt subalbida, fragorum figura: Radicibus constat numerosis, gracilibusque.

LOCVS.

Nascitur in montibus, & *Idem* syluosis collibus.

QUALITATES.

Refrigerat, & siccat, cohibet, reprimit, glutinat, & roborat. *Idem*

VIRES.

Vniuersæ plantæ decoctum, *Idem* datur potandum ad intrinseca vulnera sananda, fistulas, & enterocellulas. *Idem* quoque præstat foliorum, & radicum farina.



FRAGARIA, Italis, *Fragolaria* : Fraga verò, Italis, *Fragole*, & *Fraghe*.]
Germanis, *Erdtben*.

FRAGARIA.

FORMA.

Matt. Planta est humi repens, foliis pentaphylli maioribus, ternis ex vno pediculo prodeuntibus, & per ambitum ferratis: floribus candidis, rubi æmulis, è quibus fraga oriuntur; cauliculos habet tenues, hirsutos, obsequiososq; : radices habet numerosas, & tenues adstringentis gustus.

LOCVS.

Idem Proueniunt in montibus, collibus, syluis, secus itinera, & prope sepes.

QUALITATES.

Idem Refrigerat excessu primo, & siccatur secundo.

VIRE.

Idem Folia, & radix vulnera, & ulcera sanant, muliebres fluxiones, & dysenterias cohibent. urinam cient, & lieni conferunt. Eorundem decoctum potum præstat ad iocinoris inflammationes, & ad renum vesicæque sordes. Idem in ore contentum gingiuas roborat, commotos dentes stabilit, & destillationes sistit: At fraga, præter id quod estate deuorata maximè placent, biliosis, æstuantibusque ventriculis profunt, siticulosisque opem ferunt. Vinum quod ex eis elicitur, vlcusculis faciei mirificè medetur, illitum. quin & varos, & oculorum fluxiones calidas impositum tollit.



EVFRAGIA, Italis, *Eufragia*.] Germanis, *Augentroft*.] Gallis, *Eufraise*.

EVFRAGIA.

FORMA.

Tenuis est planta ad spi- *Matt.*
thamæ altitudinem as-
furgēs, foliis minutis,
crispis, & per ambitū
crenatis, gustu adstrin-
gentibus, & subama-
ris. caule tenui, ruben-
tiq̃ue: flore inter pur-
puram, & aurum al-
bicante, quem mit-
tit in fine æstatis.

LOCVS.

Nascitur in pratis, & in
syluis.

QUALITATES.

Excalfacit parum, siccatur
magis, abstergit, & co-
hibet.

VIRE.

Præstat tam in cibis, quā
in medicamentis sum-
pta, cū recens, tum
sicca, ad omnia oculo-

rum impedimenta, & præsertim cū in cibis, aut potu sumitur diu-
tius. Vinum ex ea paratum idem præstat potum. Eius enim vsu senū
oculi reuiuiscunt. visus mirificè acuitur. & cæcutientes ad lucem re-
deunt, & præcipuè in pinguibus, & pituitosis corporibus, hæc om-
nia præstat.



PHOENIX, Græcis, *Φολιξ*.] Quibusdam lolium murinum: Italis, *Giolio saluatico*.] Germanis, *Waldt trohor*, seu *Bintzenhel mer.*] Gallis, *Yuraye sauvage*.

F O R M A .

DIOSC. Folia habet hordei sed breviora, & angustiora, spicam lolio similem, calamos senum digitorum, radici aduolutos, septenas, octonasve spicas.

L O C U S .

DIOSC. Nascitur in aruis, tectis, recenter illitis, & secus itinera.
Matt.

Q U A L I T A T E S ,
E T V I R E S .

Ex vino austero pota alui profluuium, & mensiū abundantiam sistit: vrinæ impetus cohibet, in puniceo vellere adalligata: collo suspensa (ut aiunt) sanguinem manentem sistit.

P H O E N I X .



RHODIA radix, Græcis, Ροδία ρίζα.] Italis, Radice rodia.] Germanis, *Rosen vurtz.*

RHODIA RADIX.



FORMA.

Caules mittit teretes, cubi- *Matt.*
tales, foliis vbique stipa-
tos, longiusculis, in acutū
desinētibus, portulacę, seu
minoris sedi instar pingui-
bus, minutim per ambitū
ferratis. Umbella in cacu-
mine viridi tithymali cy-
parissię modo. Radix ei in-
ęqualis, strumosa, crassa,
leui cortice obducta, splen-
descēs. substātia intus sub-
rufa, rosarū odore. Radix
est omniū viuacissima. Sic-
cis. n. locis mensibus plu-
ribus asseruata, & deinde
sata, statim repululat.

LOCVS.

Nascitur in altissimorū mō *Idem*
tium rupibus, saxosis, ac
pręruptis locis.

QUALITATES.

Tenuium est partium, & di *Gal. 8.*
scutientis facultatis, in ca- *simp. me.*
lesaciēdo verò, secūdi re-
cessus cēsenda est, aut cer-
tē tertij incipientis.

VIRE S.

Vtilissima est, capitis dolo- *Diosc.*
ribus, si madefacta fronti ac temporibus, cum rosacei momento impo-
natur. Vbi aut dolor à calida prouenerit causa, tusa, & rosacea aqua *Matt.*
madefacta imponi debet. vbi verò à frigida, ex amaraci aqua illini
pręstabit.

EQUISETVM, Græcis, ἵππουρις.] Arabibus, Dhenben alcail, Dhemb alchi, siue Daneb alchail.] Italis, Coda di Cauallo.] Officinis, Cauda equina.] Germanis, *Rosßz schuuantz.*] Hispanis, Goda de mula, siue Rabo de mula.] Gallis, *Queue de Cheual*, siue Praela.

G E N E R A.

Quatuor nobis sunt gña.

F O R M A P R I M I.

Matt. Profert cū primū è terra erūpit quoddā tenerriū germen oblongū, iuglandiū iulo nō ab simile, sub nigricāti colore. & deinde caules inanes, geniculati, subrubescētes, leniter scabri. iūcea circa eos coma, aspera, exilis, setarū instar. adeo vt equorū instar caudæ, appareat. Radicem lignosā, duram.

L O C V S.

Idem Nascitur aquosis, & humidis locis, in riguis, & scrobibus.


Q U A L I T A T E S.

Gal. 6. simp. me. Adstringētē cū amaritudine facultatē possidet, ac proinde valēter simulque citra mordacitatē exiccātē. itaque vulnera maxima imposita cōglutinat, etiam si præsectos neruos esse contingat.

V I R E S.

Prosc. Herbe succus sanguinem è naribus erūpentē sistit: prodest dysentericis ex vino potus: vrinam ciet. Trita folia, & illita sanguinolēta vulnera glutinant. Radix cū sua herba tuſſim, ortopnēā, ruptaque adiuuat. Foliis in aqua potis, dissectiones vesicę, & intestinorum, enterocellāsque in vnum coalescere, cogique ferunt.

EQUISETVM.



EQUISETVM alterum, Græcis, ἵππουρις ἑτέρα.] Italis, Coda di Canallo
 minore. *Schaffner.*

EQUISETVM SECVNDVM.

F O R M A.

Caulis est rectus, cubito DIOSC.
 maior, inanis: comis
 per intervalla breuiori-
 bus, candidioribus, &
 mollioribus.

L O C V S.

Prouenit humectis locis, *Matt.*
 & viginosis pratis.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Valet ad omnia, ad quæ DIOSC.
 nus alterum.



EQVISETVM Tertium, Græcis , ἰπποῦρις τρίτη.] Italis, Coda di Cavallo.
 Græc. ἰπποῦρις τρίτη

EQVISETVM TERTIVM.

F O R M A.

Matt. Caulem edit geniculatū ,
 striatūque, inanem, fra-
 gilem, à quo complures
 oriuntur rami. Et ipsi
 quoque geniculati, ac
 asperi, nulla circūstante
 coma.

L O C V S.

Idem Prouenit & hoc palustri
 solo.

V I R E S.

Idem Iisdem cum aliis pollet vi-
 ribus.



EQUISETVM quartum, Græcis, ἵππουρις τέτταρον.] Italis, Coda di Canallo.

De Vinea Scissifolia.
EQUISETVM QVARTVM.

F O R M A .


Recto prouenit caule, fir- *Matt.*
miore, minusque ge-
niculato, à quo rami
procedūt, iūceis qua-
si processibus stipati,
iisque asperis, genicu-
latis, tenuibus.

L O C V S .

Prouenit iisdem in locis. *Matt.*

V I R E S .

Easde habet vires, quas *Idem*
cetera genera habere
diximus.



Coccum infectarium, Græcis, Κόκκος βαφικὸς.] Arabibus, Charmens, seu kermes.] Italis, Grana da tingere.] Germanis, *Scarlach beer.*] Hispanis, Grana per atennir, seu grana in grano.] Gallis, Vermillon.

COCCUM INFECTORIUM.

F O R M A.

Matt. Frutex est surculosus, foliis oblongis per ambitū aculeatis aquifolij modo, sed lōgè minoribus, baccis rotundis, inanibus, puniceo colore. L O C V S.

Diosc. Gignitur in Galatia, Armenia, Asia, Cilicia, Hispania. Nascitur et in Cilicia è quercu. ¶ Quin etiā in Polonia, & Boemia, è quercubus legitur.

F A C U L T A T E S.

Gale. 7. Adstringentem, simulque amaram facultatem possidet: vtraque sine morfu desiccatur.

V I R E S.

Diosc. Vulneribus nervisque præcis conuenienter ex accotritum illinitur. Baccharum puluere feliciter vuntur Italę mulieres ad fœtum roborandum, & abortum prohibendum ipsum ex ouo sorbili pregnantibus propinantes, addito thuris, aut mastice momento.


C E N S V R A.

Non rectè sentiunt, qui Coccum infectarium, & Chermesinum idem faciunt.



PIMPINELLA, seu Saxifragia hircina, Italis, *Sassifragia di becco.*] Germanis, *Dibernel.*

PIMPINELLA SAXIFRAGIA.



G E N E R A.

Duo eius habentur genera, *Matt.*
Maius, & minus.

F O R M A.

Maior radice nititur lōga, *Idem*
foliis, quę ad radicē sunt,
humis accubātibus, pluri-
bus ex vno pediculo v-
trinque emergētibus, &
per ambitū serratis: caule
quadrangulo, floribus in
umbella cādids. Radix il-
li lōga digitali crassitudi-
ne hircū quadātenus re-
dolēs, acris sapore. minor
caule exit rubēti. foliis mi-
noribus, ac tenuiore ēt ra-
dice odoris ac saporis e-
iusdem. L O C V S.

Nascūtur in mōtibus, colli *Idem*
bus, & incultis locis.

Q V A L I T A T E S.

Radix, in qua vis tota cōsi- *Idem*
stit, excalfacit, siccātque
ordine secūdo completo,
aut tertio incipiēte, ape-
rit, prouocat, attenuat, di-
gerit, incidit. Sed maior
acrior est atque valētior.

V I R E S.

Vtriusque radix pręstat ad *Idem*
renū, & vesicę incōmoda: calculos enim in renibus genitos frāgit, &
eiicit: vrinas pellit. succus radicis ex meraco haustus, pręstat cōtra de-
leteria medicamenta, & virulentorum animalium ictus. Quare non de-
sunt, qui radices etiam contra pestilentiam miris laudibus efferant.

PIMPINELLA Sanguisorba. *Italica, Pimpinella, seu Sorbastrella.*] Germanis, *Hergotts bertlin.*] Gallis, *Pimpenelle*.

PIMPINELLA SANGVISORBA.

G E N E R A.

Matt. Duum est generū: Maius, & minus.

F O R M A M I N O R I S.

Idem Foliis provenit ab vna radice numerosis, cōpluribus ab vno tenui pediculo vtrinque prodeūtibz, subrotūdis, pusillis, vbique ī ambitu crenatis, firmis, humi in orbē accubātibus, adstringēti gustu: cauliculos edit plures, tenues, subrubētes, rotūdos dodrātiles, atq; maiores, in quorū summitatibus capitula exeūt squarosa, subpunico colore. in quibus semē. Radice nitē lignosa subrufescēte, adstringētis gustus. L O C V S.

Idem Nasctur in agris nō cultis, in collib⁹, & serit in hortis. Q U A L I T A T E S.

Idem Degustata adstringit, sed mansa lētoris copiā fundit, glutinat, siccāt, resoluit & cohibet.



V I R E S.

Idem Sistit pota rubra, albaq; scēminarū profluvia, dysenteria, & cēteras alui fluxiones: biliosas vomitiones cohibet, sanguinis reiectiones sistit: vulnera, & vlcera sanat: vnguētis quoque vtiliter miscetur, quē tū ad capitis vulnera, tū ad carcinomata parātur. Natat sepe in poculis vino repletis, quod gratiā quādam, iucunditatēq; potātibus asserat.

PIMPINELLA, seu Sanguisorba maior. Italis, *Pimpinella*, seu *Sorbastrella* *Matt.*
maggiore. *Wibronell*.

SANGVISORBA, SEV PIMPI-
 NELLA MAIOR.

FORMA.

Facie ab altera non dif- *Idem*
 fert, nisi quòd maior
 sit omnibus suis par-
 tibus, & folia longio-
 ra, latioraque profe-
 rat: caules procerio-
 res, & capitula crassio-
 ra, oblongioraque.

LOCVS.

Prouenit in pratis, pa- *Idem*
 scuis, & inculto solo.

QUALITATES,
 ET VIRES.

Viribus iisdem prædita *Idem*
 est, quibus & minor.



TRAGV M, Græcis, Τράγος ἢ σκορπίος.] Italis, Trago.

F O R M A .

T R A G V M .

Diosc. Planta est dodrantalis, aut amplior, fruticosa, humilis, oblonga sine foliis, pusillis circa ramos acinis, rufis, multis, tritici magnitudine, acuto cacumine, gustu admodum adstringente.

L O C V S .

Idem Nascitur maximè in maritimis.


F A C V L T A T E S ,
E T V I R E S .

Idem Baccæ gustu sunt admodum adstringenti. Racemorum baccæ decem, ex vino potæ, celiacis, & fæminis fluxione vulvæ laborantibus auxiliantur.



IVNCVS, Græcis, Σκοῖνος.] Italis, Giunco.] Germanis, Bint zen schme-
len.] Hispanis, Iunco.] Gallis, Ionc.

I V N C V S.



G E N E R A.

Duum est generum, Alte- ^{Diosc.} riorum
 rum læue, Alterum acu-
 tū; cuius etiā duo extant
 genera, vnū sterile, al-
 terum fertile: Est & al-
 terū ὀλόχερος vocatum,
 seu Æthiopicum.

F O R M A.

Caulis est levis, viridis, in
 cacumine aculeatus, al-
 ba intus medulla: Semē
 gerit in superiore cau-
 lis parte, è latere pro-
 diens racemosum, sub-
 rubrum, adstringentis
 gustus. Alter confimilis
 est, sed sine semine pro-
 uenit. & tenuioribus ca-
 lamis.

^{Diosc.}
Matt.

L O C V S.

Nascuntur omnia genera *Matt.*
 cū in mari, tum in flu-
 minibus, lacubus, palu-
 dibus, ac ceteris aquo-
 sis locis.

Q U A L I T A T E S.

Cōpositā eorū tēperies est,
 ex terrena videlicet ef-

Gale. 8
sim. mei

sentia, leuiter frigida, & aquea leuiter calida, vt & inferna desiccare
 possint, & sensim frigidos ad caput vapores submittere, quibus som-
 nolentos efficiant.

V I R E S.

Semen tostum ex vino potum, aluum sistit, & rubra sceminarum pro-
 fluuia: vrinam ciet, capitis dolores facit: Quæ proxima sunt radici
 folia tenera, conuenienter illinuntur aduersus Phalangiorum mor-
 sus. ¶ Semen potum somnum conciliat.

^{Diosc.}

IVNCVS floridus. Italis, *Giunco florido*.

Blende Winzoy.

IVNCVS FLORIDVS.

F O R M A.

Matt. Foliis exit ab vno cespite
numerosis cyperi simi-
libus, sursum spectan-
tibus, caulibus pluri-
bus, leuibus, iunci mo-
do glabris, in quorū
cacumine flores emi-
cant speciosi, subpur-
purei, è quibus semen
gignitur.

L O C V S.

Idem Prouenit in fluuiorum li-
toribus.

Q V A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem Creditur ea omnia præ-
stare posse, quæ cetera
præstant genera.



LICHEN, Græcis, Λειχήν.] Officinis, *Epatica*.] Arabibus, *Arzez alla-*
cher.] Italis, *Lichene*, seu *Epatica*.] Germanis, *Steinleberkraut*.] Hi-

spanis, *Epatica*, seu *Figadella*.] Gallis, *Epatique*, seu *Porcorau*.

LICHEN.

FORMA.



Foliis est latis, robustis, as- *Matt.*
 peris, nullis adnexis pe-
 diculis in cacumine tri-
 partitis, asperginosis la-
 pidibus pertinaciter in-
 hærentibus, radicibus
 numerosis perquam exi-
 guis aduersa foliorum
 parte emergentibus: flo-
 ribus parvis, stellarum
 figura.

LOCVS.

Prouenit in asperginosis *Idem*
 faxis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Adstringit, refrigerat, ab- *diosc.*
 stergit: illita folia san-
 guinis profluvia sistunt:
 inflammationes arcet.

Impetigini medentur. Iuuant regio morbo laborantes, cum melle
 illita oris, & linguæ defluxiones inhibent. Præfertur maximè hæc *Matt.*
 planta ad iocinorosos affectus.

PVLMONARIA, Italis, *Pulmonaria*.] Germanis, *Lungenkraut*.] Gallis,
Herbe aux pulmons.

PVLMONARIA.

G E N E R A.

Matt. Duo eius habentur genera, Arboreum alterum, Alterū terrestre.

F O R M A A R B O R E Æ.

Idem Similis est Licheni, sed maiora, latioraq; fundit folia, variis modis per ambitum lacinia-
 ta, ac si à vermibus erosa fuerint, arescen-
 tia, prona parte viri-
 dia, supina verò palle-
 scentia, ac subalbican-
 tibus maculis resper-
 sa. L O C V S.


Idem Prouenit in densis, opa-
 cisque syluis, in anno-
 sarum arborum cau-
 dicibus.

Q U A L I T A T E S.

Idem Adstringit, siccatur, abster-
 git: vulnera glutinat.

V I R E S.

Idem Præstat, (vt scribunt) ad
 tabē, pectoris, & pul-
 monis vlcera, & cruē-
 ta sputa, quin etiam
 ad vulnera, & pudē-
 dorum vlcera, & ad vtrunque muliebre profluuium, dysenteriam,
 & biliosos vomitus: Sunt qui ea vtantur ad suspiriosos, & asthma-
 ticos, cum dulcis radicis succo, hyssopo, helenio, & scillino oxyme-
 lite: Datur quoque vtiliter à pastoribus tussientibus pecudibus,
 cum sale.



PVLMONARIA altera, Italis, Polmonaria.] Germanis, Lungen kraut. *mis andrue*
 Gallis, Herne aux pulmons.

PVLMONARIA ALTERA.

FORMA.

Foliis assurgit borraginis *Matt.*
 quadantenus emulis,
 non tamen crispis, nec
 hispidis, oblongis, aspe-
 ris, hirsutis, albis macu-
 lis superna parte resper-
 sis, boraginis sapore:
 caulem gerit angulo-
 sum, atque tenerum: in
 cuius adnatorum cacu-
 minibus flores erum-
 punt, cynoglossi vulga-
 ris modo.

LOCVS.

Nascitur opacis locis, pro *Idem*
 pe vliginosas sepes.

QUALITATES,
ET VIRES.

Cohibet, cōsolidat, siccatur, *Idem*
 abstergit: Præfertur ad
 pulmonis cūm vlcera,
 tum cæteras infectio-
 nes, & ad sanguinis re-
 iectiones: Datur totius

plantæ decoctum ad suprascripta, magno auxilio, cum saccharo plu-
 ribus diebus: Idem cum maiori quoque successu præstat foliorum
 succus potus.



PARONYCHIA, Græcis, Παρωνυχία.] Italis, Paronicchia.

PARONYCHIA.

F O R M A.

Diosc. Exiguus est frutex, in petris nascens; peplo similis, minor longitudine, sed maioribus foliis.

L O C V S.

Idem Nascitur in pratis.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 8. sim. med. Vis eius est tenuium partium, & exiccatoria, morfu vacās. Talia enim sint oportet, quæ paronychia sanant: excalfacit ordine tertio. & siccatur pariter.

V I R E S.

Diosc. Illita paronychiis, atque fauis, remedio est.

A P P E N D I X.

Matt. Quamquam non desunt, qui hanc plantam vnà mecū paronychiā faciunt, quū tamen sint, qui reclamēt, ne dissensio vltius protrahatur, non Dioscoridis, sed nostram paronychiam eam esse volumus. Scimus. n. non solūm paronychiis ipsam mederi, sed ad ciendas vrinas, & renū calculos frangendos pellendosque, præstantissimam esse.

C E N S V R A.

Maximè cæcutiunt, qui paronychiam hanc nostram album Theophrasti adiantum faciunt.



PARONYCHIA altera.

PARONYCHIA ALTERA.



FORMA.

Folia profert pepli, longiora, flores paruos, copiosos, racematim cohærentes. albo colore, sed qui paronychiam florere scribat hætenus nõ legimus: quin etiam mihi incõpertum est, an in saxis oriatur. Quo fit vt ne hanc quoque legitimã paronychiã facere auserim.

Matt.

HELICHRYSVM, Græcis, Ελίχρυσον.] Italis, *Helichriso*.

HELICHRYSVM.

F O R M A.

DIOSC. Ramulum habet candidū, virentē, rectū, firmum, folia, intercedētibz spatiis, angusta, abrotano similia, comā aureæ lucis in orbem : umbellæ rotunda veluti siccis corymbis dependentibus : radice tenui.

L O C V S.

Idem Nascitur in asperis, & torrentium locis.


Q V A L I T A T E S.

Gale. 6. Facultatis est incidentis, *fmp. me.* & extenuantis.

V I R E S.

DIOSC. Coma ex vino pota, menses ciet: auxiliat quoque serpentium ictibus, coxendicum doloribus, & urinæ stoliditiis. sanguinem in

venrriculo, aut vesica concretum absomit, destillationes sistit, cum mulso à ieiunis pota triobolari pondere : vestibis interposita, eas à tinea tuetur.



HELICHRYSUM ITALICVM.



Helichrysum Italicum
 hanc plantam appel-
 lare libuit, quòd plu-
 rimum in Italia pro-
 ueniat, & iisdem sit fa-
 cultatibus præditum,
 quibus & præcedens.

HELICHRYSVM creticum. Italis, *Helichriso di Candia*.

F O R M A.

Matt. Planta est exilis, foliis longis, angustis, hirsutis, striatisque, caulibus angulosis, umbella in summitate aurea, divulsaque: radice tenui, ac superuacua.

L O C V S.

Idem. Nascitur in Creta Insula.

F A C U L T A T E S,
E T V I R E S.

Idem. Ea omnia hoc quoque, quæ supra scripta præstare posse creditur.

HELICHRYSVM CRETICVM.



STOECHAS citrina. Italis, *Amaranto giallo.*

Stoechas.

STOECHAS CITRINA.



FORMA.

Folia profert albicātia, hir *Matt.* futa, longa, caules dor-
drantales, aut maiores,
lanuginosos, incanos,
in quorum summitati-
bus flores sunt aurei,
globosi, odorati, in um-
bellæ diuulsæ modum
se se pendentes. Radi-
ce breui subnigricāte.

LOCVS.

Nascitur locis incultis, & *Idem*
in pascuis.

QUALITATES.

Excalfacit, siccāt, aperit, *Idem*
& abstergit, vt amariu-
sculus indicat sapor,
nec adstringenti facul-
tate vacat.

VIREs.

Decocta comā, aut ex vi- *Idem*
no macerata, iocinoris
obstructiones aperit,

proinde datur commodè eius decoctum, dilutumve regio morbo af-
fectis. Idem potum interaneorum vermes necat.

AMARANTHVS, Græcis, *Αμάρανθος*.] Italis, *Amaranto*, seu *fior velluto*.] Germanis, *Samat bluom*.] Gallis, *Passe velours*.

Fleur amaranth

F O R M A.

Matt. Folia profert ocimi, maiora, caulem crassum, pinguem subrubentē, striatū: florem spicatū, admodū purpureum; qui etsi quā diu siccatum asseruetur, haud quāquam tamen colorem deperdit.

Q U A L I T A T E S.

Idem— Refrigerat, siccatur, repellit, cohibet.

V I R E S.

Idem— Flos epotus cœliacos, & dysentericos iuuat, mēsum abundantia sistit, & albas vteri fluxiones. prodest quoque sanguinem excreantibus.

A M A R A N T H V S.



CHRYSANTHEMUM, Græcis, Κρισάνθεμον.] Italis, *Chrysanthemo*.

CHRYSANTHEMUM.

FORMA.

Herba est tenera, frutico- Diosc.
sa, lęues proferens cau-
les, & multifida folia :
flores luteos admodũ
splendentes.

LOCVS.

Propter oppida nascitur. *Idem*

QUALITATES,
ET VIRES.

Flores cũ cerato triti, stea- *Idem*
tomata discutere pro-
duntur. Ictericos breui
ad bonum colorem re-
stituunt, si sequente lō-
go balnei vsu, post exitũ
ebibantur. caules man-
duntur olerum modo.



AGERATVM, Græcis, Αγράτωρ.] Officinis, *Eupatorium Mesue*.]
 Italis, *herba Giulia*.

A G E R A T V M.

F O R M A.

Diosc. Fruticosa est herba, binum
 dodrantum longitudine
 assurgens, simplex, humi-
 lis, origano maximè si-
 milis : umbellâ gerit, in
 qua flos bullis aureis si-
 milis, helichryso minor.
 Nomē ei inditū est, qm̃
 diutissimè flos in sua co-
 loris specie cōseruetur.

L O C V S.

Matt. Nascitur in inculto solo, &
 in pascuis.

Q V A L I T A T E S.

Gale. 6. Digerit, & inflammationes
sim. me. quodāmodo resoluit.

V I R E S.

Diosc. Vis decocti feruens, herbæ
Matt. vstę nidor urinā ciet, & vl-
Mesue uę duritias emollit. ¶ Flo-
 rum dilutū ex albo me-
 raco paratū, puerorū ver-
 mes necat duarū vncia-
 rū pōdere potū. ¶ Excalfa-
 cit ordine primo, & sic-
 cat secūdo. Bilē, & pitui-
 tā facilè purgat, tenuat,
 incidit, terget, expurgat,
 putredinē prohibet : resoluit sine attractione, obstructions rese-
 rat, & earum affectus sanat, diuturnis febribus mirificè medetur.
 Adstringit, quare ventriculū, iecur, & cętera viscera roborat : cum se-
 ro lactis efficacius purgat.

Adstringit, quare ventriculū, iecur, & cętera viscera roborat : cum se-
 ro lactis efficacius purgat.

C E N S V R A.

Medicam materiam non assequuntur qui negant Eupatorium Mesuis
 non esse Dioscoridis Ageratum.



VERBENACA, Græcis, Περιέρεων, ἢ ἱερὰ βοτάνη.] Latinis, *Verbenaca supina.*] Italis, *Verminacola, Berbena, & Berbenaca.*] Germanis, *Eisenkraut.*] Gallis, *Vervaine masse.*

VERBENACA.



FORMA.

Ramulos emittit cubitales Diosc. aut maiusculos, angulosos, in quibus ex intervallis folia exeunt quercus, sed minora, & angustiora, eiusdem in ambitu diuisuris, colore aliquatenus cæsius. Radix longa, tenuis. Flores purpurei, graciles.

LOCVS.

Nascitur secus vias in ciuitatibus, & oppidis, & in plateis. Matt.

QUALITATES.

Vim habet adeo desiccantem, vt vulnera glutinet.

Gal. 8. simp. me.

¶ Insigniter est amara: quare excalfacit: & siccant, abstergit, aperit. Matt.

VIRE.

Folia cū radice in vino posita, illitave, serpentium ictibus auxiliantur. Folia bibuntur commodè ex vino vetere quadragenis diebus ad icteritiam: veteres tumores, & inflam-

Diosc.

mationes mitigant: sordida vlcera purgant. tota in vino decocta, tonsillarum crustas abrumpit: oris nomas gargarizatu cohibet: Datur potandū in tertianis febribus, tertium à terra geniculum, cum foliis circumdantibus: quartanis quartum. Sacram vocant herbam, quoniam multum ad amuleta, expiationesque commendetur.

HYACINTHVS, Gręcis, *ῥάκινθος*.] Italis, *Hiacintho*.] Germanis, *Mertzen bluomen*.] Hispanis, *Maios flores*.] Gallis, *Vaccet*.

HYACINTHVS.

G E N E R A .

Matt. Nobis duo obseruata sunt genera, vulgare alterū t alterum Orientale, quo, duplex est.

F O R M A V U L G A R I S .

Diosc. Folia habet bulbi : caulem dodrantalem, minimo digito tenuiorē, herbacei coloris: comam procumbentem, florum purpureorum plenam, incuruamque: radicem quoq; bulbaceam.

L O C V S .

Matt. Nascitur in campestribus, ferē ubiq; inter segetes.

Q U A L I T A T E S .

Gal. 8. Bulbosa radix exiccat ordine primo, & refrigerat secundo cōpleto, aut tertio incipiente. semen leuiter extergit, & adstringit. Exiccat autem quadā tenus ordine tertio. Ceterū in medio consistens caliditatis, & frigiditatis.



V I R E S .

Diosc. Pota radix aluum sistit, & vrinas propellit: phalangiorū moribus medetur. Semen adstringentius est, theriacis expetitur. cum vino potum ictericos iuuat.

HYACINTHVS orientalis, Italis, *Hiacintho orientale*.

HYACINTHVS ORIENTALIS.

F O R M A.

Foliis exit lilij, minori- *Matt.*
bus, angustioribus, sur-
sum spectantibus, pin-
guioribus, & in acutū
desinētibus: caule cras-
so, in quo flores exeūt
cærulei, lilij figura,
sed parui. Radix illi
bulbosa, squamosa q̃.

L O C V S.

Seritur in hortis, & coli- *Idem*
tur in fictilibus vasis.



HYACINTHVS ORIENTALIS ALTER.

FORMA.

Foliis est alterius latioribus, pinguioribus, & in summitate retusis. cetera cæteris perquã similia sunt.



PAPAVER erraticum, Græcis, Μήκων ποικίλος.] Italis, *Papauero saluatico.*] Germanis, *Klapper rosen.*] Hispan. *Amapollis, seu Papoulla.*] Gallis, *Paiot sauvage, sine confanons.*

PAPAVER ERRATICVM.

FORMA.

Folia habet eruce, diuisa, sca. Diosc.
bra: caulem iunceum, re-
ctum, cubitalem, asperū.
Florem syluestris anemo-
nes puniceum, interdum
albū: capite oblongo. sed
anemones minori, in quo
rufum semen. Radix est
longa, subalbida, minoris
digiti crassitudine, gustu
amara.

LOCVS.

Nascitur plurimum in ar- *Matt.*
uis inter segetes.

QUALITATES.

Refrigerandi, ac soporem in *Gale. 6.*
ducendi illi potestas est. *sim. med.*

VIRES.

Capita quinque, aut sex in Diosc.
vini cyathis tribus ad di-
midias decocta, potuiq;
data, soporem faciunt: se-
men acetabuli mensura.

ex aqua mulsa pota, aluum leniter emollit: folia cum calycibus illi-
ta inflammationes sanant: allicitur etiam somnus, eorundem perfu-
sione, & fotu. ¶ Flores in puluerem triti, & ex aqua dulci poti, *Matt.*
pleuritidi commodè medentur.



PAPAVER sativum, Græcis, Μήκον ἡμερος.] Arabibus, Th.rythay, seu Caschas.] Italis, Papauero domestico.] Germanis, *Mog somen.*] Hispanis, Dormidera.] Gallis, *Pauot blanc*, seu *Pauot priue*.

PAPAVER SATIVUM.

G E N E R A .

Diosc. Tria eius habentur genera. Hortense, cui candidum inest semen: & sylvestre, cuius duo sunt genera, quæ etiam seruntur: His accedunt corniculatum, & spumeum.

F O R M A .

Idem. Hortense capitulum habet oblongum, & semen candidum, sylvestre verò caput habet infidens, demissumque, & semine nigrum. Tertium magis sylvestre, multò his longius est, & productiore capitulo.

L O C V S .

Matt. Hortense in hortis, cætera in campis seruntur.

Q U A L I T A T E S .

Gale. 6. sim. me. Omnium facultas refrigeratoria est. satiui autem semen mediocriter somnum conciliat, visu candidum. Cætera genera longè magis soporifera sunt.


V I R E S .

Diosc. Omnium in commune natura refrigeratrix: foliorum, capitumque decoctum ex aqua paratum, somnum conciliat: calyces cum farina hordeacea triti, & cataplasmati admitti, igoibus sacris, & inflammationibus medetur. coquuntur quoque capita per se ad dimidias. coquiturque decoctum cum melle, quouique eclegmatis modo crassescant. Hoc itaque modo paratur medicamentum ad tussim, arterie fluxiones, & celiacos affectus, efficacius tamen redditur, addito hypocistidis succo, & acacia: Ceterum nigri papaveris semen tritum cum vino bibitur contra citam aluum, & faminarum profluvia, & fronti quoque in peruigiliis illinitur ex aqua. Opium autem, quod è papaverum nigriorum capitibus paratur, magis refrigerat, inspissat, siccaturque.



PAPAVER corniculatum, Græcis, Μήκων Κερατίτις.] Arabibus, *Almacharam.*] Italis, *Papauero cornuto.*] Germanis, *Gelbol magen.*] Hispanis, *Dormidera marina.*] Gallis, *Pauot Cornu.*

PAPAVER CORNICVLATVM.



FORMA.

Folia habet candida, hirsuta, verbasco similia. in ambitu syluestris papaueris modo ferrata: caule non dissimili: flore pallido (& quandoque puniceo) calyculo in corniculorum modum inflexo: semine papaueris, pusillo, nigroque: Radice per summa cespitum nigra, crassaque.

LOCVS.

Nascitur in maritimis, & asperis. Ceterum quod flore est puniceo nascitur copiosum in campis, in Morauia, & Boemia.

QUALITATES.

Vim habet incidendi, & abstergendi.

VIRES.

Radicis decoctum, ad di-
midias paratum, coxendicum & iocinoris affectus potu sanat: prodest his, qui crassa quedam, & araneosa cum lotio reddunt. Semen in aqua potum acetabuli mensura aluum leniter purgat. Illita folia, & flores, crustas emarginant, & iumentorum argemas, & nubeculas abstergunt.

HYPECOVM, Gręcis, ὕπεκοον.] Italis, Hippocoo.

HYPECOVM.

FORMA.

Matt. Foliis prouenit rutę paulò maioribus, si singulatim expendantur, caulibus exilibus, mollibus, hirsutis, in quibus flores sunt pallidi, & propè calycem subpurpurei: floribus succedunt capitula, tenui inuolucro contexta, in quibus semē reconditur nigrū, tactu asperum, pseudomelanthio proximum.

LOCVS.

Idem Nascitur in agris inter segetes, & legumina.

QUALITATES.

Gale. 8. sim. med. Refrigerandi vim habet, ex tertio ferè refrigerantium ordine, adeò, ut
Diosc. parū absit à papauere.

VIRES.

Natura eadem, quæ papaueris succo.



APPENDIX.

Nullam hætenus plantam mihi videre licuit, quę magis hypecoum referat: tametsi etiam mihi per omnia non satisfacit.

HYOSCYAMVS, siue Apollinaris herba, Græcis, *ῥοσκόμος*.] Arabi-
bus, *Bengi*.] Italis, *Iusquiamo*.] Germanis, *Bilsomen*.] Hispan. *Ue-*
lenho.] Gallis, *Iusquame*, seu *Hanabene*. *Bilsomgrau*

HYOSCYAMVS.

G E N E R A.

Tria sunt eius genera. Ni- Diosc.
grum, Albū, & Flauū.

F O R M A.

Flauī folia lata sunt, & ob- Diosc.
longa, diuisa, nigra, hir-
suta. Flores è latere cau-
lis ordine prodeunt, tā-
quam punicorum cyti-
ni, scutulis septi, seminū
plenis, vt papaueris. Flo-
res ei sunt lutei, & se-
men subflauū, & sili-
quæ minores. In nigro
autem flores spectātur
purpurei, & cytini præ-
duri ac spinosi : radice
alba digitali crassitudi-
ne.

L O C V S.

Proueniunt secus itinera, *Matt.*
& in agrorū margini-
bus.

Q U A L I T A T E S.

Cui semen atrum est, in- Gale. 8.
saniam, ac soporem af- sim. med.
fert. Huic propinquam
habet facultatem, cui
semen mediocriter est

flauum. verū vtrique fugiendi sunt, vt inutiles, & venenosi.

V I R E S.

Flauī semen, vbi album non adsit, eius loco supponi potest, sed maiori Diosc.
cum cautela vti eo præstat.



HYOSCYAMVS albus, Græcis, Ὑοσκύαμος λεῖκη.] Italis, *Jusquiamo bianco*.

F O R M A.

Matt. Foliis crescit alterius nō dissimilibus, sed subrotundis, pinguiorib⁹, mollioribus, hirsutioribus, rarioribus, albicantibus. Flores illi candidi, aut subpallidi, è quib⁹ eodē ordine, quo in ceteris, cytini oriūtur, sed rariores, & clementiores, in quibus albū cōcluditur semen. L O C V S.

Idem Nascitur spontē, & seritur in hortis.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 8. simp. me. Ad sanationes is vel maximè idoneus est, ex tertio quodāmodo ordine refrigeratiū. V I R E S.

Diosc. Semen collyriis, quæ dolorū sensum auferūt, cōmodissimè inseritur: cōtra acutas, calidasque fluxiones, aurium dolores, atque vuluæ mala profunt: cum farina autē hordeacea oculorū, pedūque, ac ceterarum partium inflamationes placat. Idē tussi, destillationibus, & oculorū doloribus efficax est. Cōtra mensium abundantiam, & erumpentem aliunde sanguinem oboli pondere, cū papaueris semine, & aqua multā bibitur. Podagris subuenit, testibus inflatis, māmisque à partu tumētibus, tritum ex vino illinitur. Folia omnibus medicamentis dolorem sedantibus, tum per se, tū cum hordeacea farina vtiliter imponuntur: recentia ad mitigādos omne genus dolores oblinuntur. Radix in aceto decocta, dentiū dolores mulcet.

H Y O S C Y A M V S A L B V S.



HYOSCYAMVS tertius, seu potius quartus. *Italica, Insquiamo nuovo, seu Insquiamo maggiore.*

HYOSCYAMVS TERTIVS.

F O R M A.

Planta est insignis, caules *Matt.* edit sesquicubitales, rotundos, tenui obductos lanugine, ramososque: foliis amplis, pinguibus, tenui pilo pubescentibus, molli- bus, solani soporiferi speciẽ quadãtenus re- ferentibus, graui etiã odore. Flores edit pal- lidos, hyoscyami emu- los, è quibus capitula subrotunda oriuntur, quæ nõnullã hyoscia- mi cognationem præ- ferunt: similibus e- nim ferè scutulis con- cluduntur, coronato cir- cūquaque cacumine, & semine intus subfla- uo: Radice est alba spi- thamæ longitudine.

L O C V S.

Seritur in hortis.

Idem

F A C V L T A T E S , E T V I R E S.

Refrigerat ordine tertio completo: soporem inducit, adeo vt ea sit ei *Idem* nat ura, quæ cæteris Hyoscyamis.

PSYLLIVM, Græcis, Ψύλλιον.] Arabibus, Bazarachat bona, seu Bezer cothume.] Italis, Psillio.] Germanis, Psillien krant.] Hispanis, Zargatona.] Gallis, Herbe à puce.

G E N E R A.

Matt. Duum est generū, foliorū, capitulorūque differentium.

F O R M A P R I M I.

Matt. Foliis est incanis, lōgis, hirsutis, coronopo æmulis, non tamē corniculatis. Ramis numerosis, dodrantalibus, rotundis, gracilibus, & foliosis, humi potius, quā in altum sese diffundentibus, in quorū cacuminibus capitula oriūtur, scabiosę vocatę modo: flosculos edit pusillos, prætenues, lanuginosos, pilorum speciē referentes, albo colore, plātaginis angustifolię modo, semen pusillum nigrum, pellucidum, pulicum effigie.

L O C V S.

Diosc. In arvis, & incultis nascitur.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 8. Semen admodū vtile est, ex secūdo refrigerantium ordine, in desiccando verò, & humectando, medium quodāmodo est, & symmetrum.

V I R E S.

Diosc. Vis ei ad refrigerandum, inspissandum, & emolliendum cōueniēs: articulorum morbis, parotidibus, tuberculis, tumoribus, luxatis, illitum auxiliatur. Imponitur in dolore capitis, cū rosaceo, aqua, aut aceto. Enterocellis infantiū, & prominenti vmbilico, illitum ex aceto medetur. Seminis mucago ex aqua parata, vehementer refrigerat: contra sacros ignes efficax est: cum adipe tusum sordida vlcera, & quę cocoethe vocantur, expurgat: succus vermiculosis auribus, aut fluxione laborantibus, ex melle infusus prodest.



PSYLLIVM alterum, Græcis, Ψύλλιον ἑτέρον.] Italis, *Psillio*.

PSYLLIVM ALTERVM.



FORMA.

Longè sarmētosius est, *Matt.*
 & numerosiorib⁹ re-
 fertū foliis, longiori-
 bus, angustiorib⁹, de
 floribusq[;], pilosis pa-
 riter, atq; incanis. ca-
 pitula sunt illi alteri
 similia, sed minora
 paulò, & numerosio-
 ra, in quibus semen
 progignitur alteri si-
 mile. Radicem habet
 multifidā, numero-
 sis vbiq^{ue} fibris.

LOCVS.

Nascitur in campestri- *Idem*
 bus, sed in maritimis
 copiosius.

QUALITATES,
ET VIRES.

Eadem illi sunt vires, *Idem*
 quæ primo generi as-
 signantur.

SOLANVM hortense, Græcis, Στεφύχνος κηπάδος.] Arabibus, *Hamebalthanaleb*, seu *Hameb alchachaich*, seu *Hanabalthaleb*.] Italis, *Solutro*, seu *Herba morella*.] Germ. *Nacht Schadt*.] Hisp. *Yerua mora*.] Gal. *Morelle*.

S O L A N V M H O R T E N S E.

F O R M A.

Matt. Foliis exit ocimo maioribus, sed amplioribus, nigrioribus, mollioribus. Plures circūquaque fundit ramos, non sine alarum cavitatibus, floribus albis, & in medio luteis; stellę figura, baccas edit rotundas, racematim dependentes, vinoso succo prægnantes, orobi quantitate, in quibus semen continetur album, minutūque: variat in baccis color: nāque in hac planta nigræ, in illa luteę, in altera subvirides spectātur.

L O C V S.

Idem Nascitur in hortis, plateis, secus itinera, & ferè vbique.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 8. simp. me. Vfus eius est ad omnia ea, quę refrigerari, & adstringi postulāt, potest enim hæc duo ordine secundo.

V I R E S.

DIOSC. Folia conuenienter illinuntur, cum hordeaceę farinę polline ignibus sacris, & vlceribus, quę serpunt: egilopia, capitisque dolores, trita, & imposita per se sanant: æstuanti stomacho auxiliantur: parotidas cum sale detrita, illita discutunt, foliorū succus, cū rosaceo perfusus, valet contra infantium syriasm: instillatur vtiliter aurium doloribus: in vellere subditus, mensum abundantiam sistit.

Matt.

Fuluo gallinarum fimo subactus, & appositus, ægilopis presentaneo est remedio. Phrenitico iuuat ex aceto, & rosaceoincipiti illitus. Illinitur fronti contra calidas oculorum fluxiones. Gargarizatur quoque cum aceto, ad faucium, & columnellę inflammationes, & additur conuenienter in vnguentis, & emplastris, quorum ad vlcera contumacia est vſus. cibus idoneus est.



SOLANVM Halicacabum, Græcis, Σπύχνος ἀλικάκαβος.] Mauritanis, Kekengi, seu Alkekengi.] Italis, Alcachengi, & Halicacabo.] German. *Iudem kirschen.*] Hispanis, Besiga de perro.] Gallis, Buguenandes.

SOLANVM HALICACABVM.

FORMA.

Folia mittit hortensis simili- *Matt.*
lia, sed latiora, firmiora, &
subaspera, nec adeo, ut in
illo nigricantia: caulibus
lētis: floribus candidis, è
quibus vesicæ oriūtur tur-
binate, iuglandiū magni-
tudine, angulosaque, quæ
per maturitatē rufescūt, in
quibus singulis singulæ cō-
cluduntur baccæ, vinoso
succo refertæ, ipsæque ru-
bētes rusci baccis persimi-
les, sapore austero, simul &
amaro. numeroso minu-
toque intus semine.

LOCVS.

Nascitur propter vliginosas *Idem*
sepes, & locis vmbrosis.

QUALITATES.

In foliorū facultate hortēsi *Gale. 8.*
solano simile est, multis *sim. med.*
admiscetur compositis,
quæ ad iecur, vesicam, &
renes accōmodantur.

VIRES.

Vim, vsusque hortensis so- *diosc.*
lani habet: verum in cibis *Matt.*
nunquā expetitur, regium

morbū purgat: semē potū vrinā pellit. ¶ Baccarū vis habetur nō solum
præstantissima ad renū vitia, & ciendā vrinā, sed ad eius quoque acre-
dinē retūdēdā: bibitur nāque earū succus ad ea omnia vtiliter cū papa-
ueris albi cremore, aut seminū melopeponū, aut cucurbitæ, cucume-
risve. Aspidibus aut adeo aduersissimū est Halicacabū, ut admota pro-
pius eius radice, sopore inexpugnabili necentur.

VESICARIA, siue Halicacabum repens. Italis, *Vilucchio forestiero*.

VESICARIA, SIVE HALICACAB. REPENS.

FORMA.

Matt. Foliis constat oblongis, per ambitum lacinia-
tis, floribus pallidis,
aut cādidis, è quibus
vesicæ prodeunt viri-
des, subrotundæ, senis
secundum longitudi-
nē futuris : semine in-
tus pullo, erui magni-
tudine, aut paulò ma-
iore, in cuius latere hu-
mani cordis nota visi-
tur albo colore.

LOCVS.

Idem Seritur in hortis, & ficti-
libus, ad topiaria.

QUALITATES.

Idem Creditur valere semē ad
omnes cordis affectus,
ob notam qua idem
insignitur.



SOLANVM somniferum, Græcis, Σπυγνος ὑπνωτικός.] Italis, solatro
sonnifero.

SOLANVM SOMNIFERVM.



FORMA.

Numerosis fruticat ramis, Diosc.
densis, caudicosis, fra-
ctu cōtumacibus : foliis
multis, pinguibus, coro-
næ mali haud absimili-
bus, plenis, flore grādi,
rubro: fructu in follicu-
lis crocato: radice gran-
di, subrubro cortice ve-
stita.

LOCVS.

Nascitur in saxosis, nō pro- Idem
cul à mari.

QUALITATES.

Radicis cortex opio quidē Gal. 8.
persimilis est, sed imbe- simp. me.
cillior, adeò vt tertiū re-
frigerantium ordinē nō
excedat : cūm opium sit
quarti. Idem desiccat se-
cundo ordine comple-
to, at tertio incipiente.

VIREs.

Radicis cortex ex vino Diosc.
drachmæ pondere po-
tus, somnificam vim ha-
bet, opio tamen mitio-
rem : Semen vehemen-

ter vrinam cit, corymbi duodecim hydropicis dantur. plures verò
mentis alienationem faciunt. Remedio est aqua copiosa potui data:
inserirur pastillis, & medicamentis, quæ doloris leuamentū præstant.
Vinum in quo idem decoctum fuerit in ore contentum, dentium
dolorem mulcet. Radicis succus ex melle illitus, oculorum hebetu-
dines tollit.

SOLANVM somniferum alterum. Italis, *Solatro Somnifero minore*.

F O R M A.

Matt. Foliis est angustioribus, venosis, in humum spectantibus : caule anguloso : Floribus tintinnabuli figura, subpurpureis, per ambitum crenatis. ex quibus baccæ proueniunt nigrae, vinosæ, minuto intus semine, viridi quodam calyculo ad medium usque contactæ, in coronæ modum denticulato. Radicem habet grandem, strumofam, albicantem.

L O C V S.

Idem Nascitur in montibus inter saxa.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem Vires alteri similes habet ; sed proculdubio imbecilliores.

SOLANVM SOMNIFERVM ALTERVM.



SOLANVM maius. Italis, *Solatro maggiore, siue Herba bella donna.*

SOLANVM MAIVS.

FORMA.



Foliis prouenit hortensis *Mitt.*
solani maioribus. caule
bicubitali, tricubitali-
que, atque maiore, ra-
mis numerosis, alis
multis, floribus oblon-
gis, tintinnabuli instar
cōcauis, subpurpureis,
capillaceis intus stami-
nibus. His baccae subo-
riuntur singulatim de-
pendentes, & breui ca-
lyculo superiori parte
comprehensæ, quæ ma-
turescences nigricant.
acini vix magnitudine,
pellucida exterius cute
vinoso succo prægan-
tes, ac minuto numero
soque semine. Radicē
fundit lōgā, crassam, al-
bicantē, & succi plenā.

LOCVS.

Nascitur in montibus sa- *Idem*
xosis, & feritur ī hortis.

FACVLTATES.

Refrigerat ordine tertio, *Idem*
& siccatur secundo, estq;
somniafico solano viri-

bus simile.

VIRES.

Baccae quatuor, aut sex deuorate, sumentes deliros faciunt, atque furē-
tes, plures verò veterinosos efficiunt. Aqua è tota planta distillata,
(vt quidā fatentur) duorum, aut ad summū triū cochleariorū mensu-
ra, internas viscerū inflānationes extinguit, nullo omnino incōmo-
do: sed à copiosiore potu abstinendum. Eadem exterius admota, ery-
sipelas, sacros ignes, & alios calidos affectus iuuat: cōtusa folia, & il-
lita oculorum, palpebrarumque flegmonas mitigant.

MANDRAGORAS, Græcis, *Μανδραγόρας*.] Arabibus, *ʔabora*, seu *ʔabro-bac*.] Italis, *Mandragola*.] Germanis, *Alraun*.] Hispanis, *Mandracola*.] Gallis, *Mandragore*, siue *Mandegloire*.

M A N D R A G O R A S.

G E N E R A.

Diosc. Daum est generum nigra, quæ fœmina, & Alba, quæ mas dicitur.

F O R M A F O E M I N Æ.

Idem. Foliis prouenit lactucæ minoribus, angustioribusque, virosis, ac graueolentibus, humisparsis. Mala gerit sorbis similia, pallida, odorata. in quibus semen veluti pirorum: Radicibus cohæret magnis, binis ternisve inter se conuolutis, nigris foris intus albis, crasso cortice vestitis: caulem nullum fert.

L O C V S.

Matt. Nascitur copiosa in Gargano Apuliæ, & aliis in montibus quoque habetur.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 7. Vincentem habet facultatem refrigeratorem, adeo, vt tertij sit ordinis refrigerantium, verum, & caliditatis cuiusdam particeps est, & in primis humiditatis, proinde soporis conciliandi vim habet. Radicis cortex cum sit valentissimus, non tantum refrigerat, sed etiam desiccatur: reliquum, quod intus est, imbecillum existit.

V I R E S.

Diosc. Succus è radicibus duobus obolis ex mulso potus, vomitione bilem atram, pituitamque extrahit: potu verò largiore interimit. Admiscetur medicamentis ocularibus, & his, quæ dolores finiunt, semiboli pondere inditus. partus per se, & menses expellit. Folia recentia conuenienter oculorum inflammationibus, & collectionibus, quas vlcera excitarunt, cum farina hordeacea imponuntur: suppurationes, Strumas, & tubercula discutiunt: stigmata delent, si quinis, senisve diebus sensim perfricentur. trita radix ex melle, aut oleo illita, serpentium moribus medetur. Mala olfactu soporem afferunt. ac etiam si mandantur: Semen eorundem potum, vulvas purgat. Radix ebur emollire fertur, quæ senis horis, cum eo decocta sit & ad accipiendam, quam effingere optaueris formam, ipsum facile præstat.



MANDRAGORAS mas, Græcis, *Μανδραγόρας ἄρρενος*.] Italis, *Mandragola maschio*.

Belvair's Mincing

MANDRAGORAS MAS.



FORMA.

Folia habet magna, alba, DIOSC.
lata, lævia, ut betæ: ma-
laque alterius duplo
maiora, colore in cro-
cum inclinante, iucun-
dè, cum grauitate qua-
dam olentia, quorum
pomorum cibo aliquā-
tùm opiliones soporā-
tur. Radix alterius est
similis, maior tamen,
& candidior, orbata
& hæc caule.

LOCVS.

Nascitur & hæc in mon- *Matt.*
tibus.

QUALITATES, ET VIRES.

Iisdem est insignita facul- DIOSC.
tatibus, quibus & fœ-
mina.

CENSURA.

Qui credunt, mandrago-
ras, quæ ab impostoribus circumferuntur, humana forma, esse le-
gitimas, manifesto hallucinantur. Factitiæ enim sunt.

MELONGENA, seu mala insana, Italis, Pettranciani, seu Melanzane.

MELONGENA.

FORMA.

Matt. Folia gerit stramonię cognata, aut maioris solani subaspera tñ, & subhirsuta, & per ambitū sinuata, caule vnico, do drātali, aut maiore, tereti, firmo, subpurpureo, & hirsuto: flores edit albicantes, aut subpurpureos in stellę modum, è quibus oblongi oriuntur fructus, cucumeris magnitudine, purpurascētes, virentesve, leui cortice, succosa albicāteque intus pulpa: semine numeroso, paruo, siliqua stri gemulo: radice nititur multifida.

LOCVS.

Idem Seritur in hortis, & vasis fictilibus.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem Manduntur in cibis fru-


Avicen.

ctus. Sunt è nostratibus, qui horū esu venerē cōcitari putent: quod forsā ideo præstant, quòd flatus gignant. § Cæterum, frequenter manducati, cū biliosos, tū atrabiliarios generant humores, viscerū obstructions, carcinomata, elephautiasm, tristitiam, capitis dolores, & iocinoris, & lienis obstructions. Quo fit vt postea diurnę oriantur febres, & habitus malus.



ACONITVM Pardalianches, Græcis, ἀκόνιτον παρδάλιαγχε, ἢ θαλύφρονον.]
 Italis, *Aconito pardalianche*.

ACONITVM PARDALIANCHES.



G E N E R A .

Quatuor nos obseruauimus genera. Primum, quod Dioscoridis, secundum, quod Plinij, tertium quod Theophrasti esse censesmus, & quartum, quod Doronicum errore magno vocatur.

F O R M A P R I M I .

Planta est admodum rara, *Matt.* foliis cucumeri proximis, sed maioribus, ad summum quatuor, sub

hirsutis. caulem edit dodrantalem, floribus chrysanthemi similibus, sed minoribus. Radicem alabastri modo splendentem, digitali crassitudine, in acutum desinentem, incuruam, geniculatam, & tota facie scorpionis eandam æmulantem.

L O C V S .

in nudis, & arduis montium summitatibus, cautibusque prouenit, *Diosc.* umbrosis tantum locis.

Q U A L I T A T E S .

putrefaciendi facultatem obtinet, & lethale est, itaque cibo, potuque, *Gale. 6.* *sim. me.* giendum: attamen ad putrefaciendum extremas corporis partes, aut circa sedem, idoneum est: Herbæ verò radix ad hæc utilis est.

V I R E S .

oculorum medicamentis leuandi doloris gratia adiicitur: Enecat pantheras, fures, lupos, & feras omnes in carnibus obiectum: torpescunt, (vt fama est) scorpiones, admota radice, stupentque, sed statim elebori contactu excitantur.

ACONITVM pardalianches Plinij. Italis, *Aconito Pardalianche secondo.*

ACONITVM PARDALIAN. PLINII.

F O R M A.

Matt. Foliis crescit prioris simili-
libus, sed paulo rotun-
dioribus. & minus hir-
sutis: radice fere simi-
li sed brachiata, alba,
splendente, genicula-
ta, ima parte scorpio-
nis caudam referente,
minime tamen incur-
ua: caulem, & florem
gerit, præscripti omni-
no similes.

L O C V S.

Idem Nascitur in altissimis mō-
tium præruptis, & ferè
inaccessibilibus locis.


Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem Pares sunt ei qualitates,
& vires cum præscri-
pto.



ACONITVM Pardalianches Theophrasti. Italis, *Aconito Pardalianche* terzo.

ACONITVM PARDALIANCHES,
THEOPHRASTI.



FORMA.

Folia profert cyclamini *Matt.* haud dissimilia, radicem scorpionem integrum præferentiẽ. cui fibræ insunt geniculatæ, graminis modo, & eiusdem quoque modo se se propaginâtes, & alios quoque scorpiones effingentes, è quibus germina, & folia erûpunt. Atqui caules, & flores à ceteris minimè differunt.

LOCVS.

Nascitur in altissimis mō *Idem* tibus, præscriptis locis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Ea omnia potest, quæ de *Idem* cæteris scripta sunt.

ACONITVM pardalianches minus, Officinis, *falsò Doronicum.*] Italis,
Doronico.

ACONITVM PARDAL. MINVS.

F O R M A.

Matt. Folia, caules, & flores gerit ceterorum generũ similes, radicẽ quẽ graminis modo serpit, & q̃ hincinde numerosa edit, tubercula scorpiõnum effigiem præferentia, candida, tenera ac dulcia.

L O C V S.

Idem. Nascitur & hoc in altissimis montibus, vbi syluestres capreae inhabitant.

Q U A L I T A T E S ,
E T V I R E S.

Idem. Radix canes, vulpes, & lupos necat cum carnibus duarum drachmarum pondere propinata: Est. n. lethalis, & deleteriae facultatis.

C E N S V R A.

Supplicio damnandi sunt qui vulgare Doronicũ medicamentis adiciunt, qui intus in corpus fumant.



PSEUDOACONITUM PARDAL.



Plantā, cuius hic imago spectatur, nos Pseudo aconitū Pardalianchē appellamus, quod nō defint, qui eandem aconitum præscriptum legitimum faciant aberrantes. Duo tantum hæc plāta habet folia, rotunda, firma, & per ambitum crenata, flores melinos in cauliū summitate, radices numerosas, asphodeli modo, sed quān lōgè minores, gustu acerrimo ac lechiteræ.

ACONITUM II.

Flores habet purpureos.

LOCVS.

Matt. Nascitur hoc, cum cæteris infra scriptis generibus, in altis montibus, & præsertim in monte Baldo in Veronensi agro.



ACONITVM III.



Flores habet purpureos.

ACONITVM IIII.

Flores mittit aureos,
magnos.



ACONITVM V.

Flores illi insunt pur
purei.



ACONITUM VI.

Floribus splendet pur-
pureis.



ACONITUM VII.



Flores mittit purpureos.

ACONITUM VIII.

Floribus nitet pur-
purascens .



ACONITVM IX.



Aureos gerit flores.

HERBA paris, quibusdam vva versa, siue vva lupina. Italis, *Herba Paris.*] Germanis, *Uuolffs beer, seu Stern kraut.*] Gallis, *Raisin de Renard.*

HERBA PARIS.

F O R M A.

Matt. Vno tantum constat caule, rotundo, duorū do-
drantum longitudine,
è cuius medio quatuor
erumpunt folia, eodem
ambitu crucis instar pa-
tentia: sanguineæ virgæ
similia: vnicam in sum-
mitate buccā gerit, pur-
puream, acino vvæ si-
milem, atq; vinoso suc-
co prægnantem: nume-
roso intus semine, al-
bo, minutoq; halicaca-
bi modo: radiantibus
quatuor subtus folio-
lis, oblongis, & acutis:
Radix illi sub est re-
nuis, ac multifida.

L O C V S.

Idem Prouenit in montibus: in
conuallibus, & frute-
tis.

Q V A L I T A T E S.

Idem Herba vnà cū baccis re-
frigerat, & siccatur.



V I R E S.

Idem Semen quod è baccis eximitur (vt quidam asserūt) semidrachmę pon-
dere potū, eos maximè iuuat, qui aut ex morborū diuturnitate, aut
veneficiis, amentia tenentur. Baccæ antidotis admiscuntur, quæ con-
tra deleteria pharmaca parantur: Herba recens tusa, & illita, geni-
talium tumores, & inflammationes sanat, ac pariter oculorū phleg-
monas: paronychiis quoque medetur.

C E N S V R A.

Errant, atque maximè hallucinantur, qui hanc plantam Aconitum par-
dalianchem faciunt.

NAPELLVS, Italis, *Napello.*] Chymistis, *Herba tora.*

N A P E L L V S .



F O R M A .

Foliis exit quinis ex vno *Matt.*
pediculo pdeūtibus ,
circumquaq; diuisis ,
supina parte albican-
tibus ; caulem edit bi-
cubitalem, subrufescē-
tem , striatumque : in
cuius fastigio flores
exeunt spicati, purpu-
reo colore, hormini syl-
uestris modo: Hos se-
quūtur corniculatę sili-
quæ, sursum spectan-
tes , ternę ex vno quo-
que pediculo prodeun-
tes , in quibus semen
concluditur nigrū , ac
minutum. Radice niti-
tur turbinata, subnigri-
cante , à qua numero-
sę oriuntur fibrę, in re-
tis modū complicatę .

L O C V S .

Nascitur in montibus, & *Idem*
in conuallibus .

Q U A L I T A T E S .

Excalfacit , & siccāt ordine quarto .

Anicen.

V I R E S .

Venenum est perniciosum . Linitum tamen vitilignes tollit , eius an- *Idem*
tidotum est Diamoschos .

ANTORA, siue Amitora. Italis, *Antora*.

ANTORA.

FORMA.

Matt. Caulem edit sesquidodrantalem, rotundum, firmum, in quo multifida, ac tenuia, disparibus interualllis oriuntur folia, numerosa, in latus, sese diffundentia. Flores edit summo caule numerosos, purpureos, Napelli emulos, sed minores: radices duas solidas, oblongas, turbinatas, oliuæ crassitudine, subnigricantes, sed alba intus carne, nardi montanæ modo.

LOCVS.

Idem Prouenit in Galliæ Cisalpinae, & Liguriæ montibus.

QUALITATES

ET VIRES.

Præstant radices ad epotum napellum, & ad cetera quæcûq; venena: quin etiam ad viperarum & cæterorum serpentium ictus. Vermes intesti-

norum necant. Propinantur quoque commodissime ad tormina, & cæteros intestinorum cruciatus: & contra pestilentiam: auxiliantur omnibus cordis affectibus. Dantur magno auxilio pestilenti febre: cum exanthematibus laborantibus: & cum legitimo Doronico creamus, eius loco per quam bellè supponi possunt.

APPENDIX.

Antoræ radices, ego quidem Auicennæ Zedoariam esse censeo, quod una cum napello proueniant.



CICUTA, Græcis, *Κάμνη*.] Arabibus, *Sucaram*.] Germ. *Ziger kraut*,
Schirling, seu *Vueteric*.] Hisp. *Ceguda*.] Gal. *Cigue*, *Segue*, sine *Cocue*.

CICUTA.

FORMA.

Caulem edit geniculatū, *Diosc.*
 ut fœniculi, grandem, fo-
 lia ferulæ, angustiora ta-
 men, odore graui: Ra-
 mi, mox umbellæ ī sum-
 mo prodeūt, flores quo-
 que albicantes, & semē
 aniso candidius: radice
 non alta, concaua.

LOCVS.

Nascitur passim propè vr- *Matt.*
 bium, & oppidorū mæ-
 nia, & secus itinera.

QUALITATES.

Facultatis est extremè re- *Gale. 8.*
 frigerantis. *simp. me.*

VIRES.

Leihale venenum est: sua *Diosc.*
 enim vi refrigeratoria
 necat: Herba cū coma
 trita, & testibus circum-
 lita, libidinum imagina-
 tiones, in somno com-

pescit, sed genitale resoluit. Lac puerperarum extinguit mammis ap-
 posita: In virginibus mammas coercet, & increescere nō patitur.
 Ab Asinis deuorata, tam improbum iis soporem inducit, vt mor- *Matt.*
 tui videantur.



TAXVS, Græcis, Σμίλαξ.] Italis, *Tasso*, seu *Nasso*.] Germanis, *Eibenbaum*.] Hispanis, *Texo*.] Gallis, *Yf*.

FORMA.

Diosc. Arbor est Abietis magnitudine, & foliorū eiusdem figura. ¶ **Matt.** Baccas fert rubentes, atque vinosas: Ligni materies rufa, venosa, robusta, ac ferè incorrupta: è qua hastæ, arcus, & tela fiūt.

LOCVS.

Matt. Prouenit in montibus saxosis locis.

QUALITATES.


Gal. 8. Facultatis est venenosæ.
simp. me.

VIRE.

Diosc. Baccæ ab hominibus de uorata, alui profluuiū excitant: Lēduntur maxime, qui in Narbonensi agro sub taxi vmbra obdormierint: imo sæpius moriuntur. ¶ **Matt.** Boues foliorum pastu necantur.

Diosc. ¶ Quare de taxo hæc traduntur, vt ab ea caueamus.

TAXVS.



ΑΡΟCYNVM, Gręcis, Από κυμων.] Italis, *Apocimo, siue periploca.*

ΑΡΟCYNVM.

F O R M A.

Frutex est longis viticulis *diosc.* constans, malè olentibus, lentis, vitiliūque modo obsequiosis: fractu ferè inuictis: folio hederę, molliore tamē, & per extremū acutiore, odore graui. Id luteo succo turgēt: siliquę ceu fabarum: folliculari specie; digiti lōgitudine protēdūtur: semine intus duro, paruo, nigro.

L O C V S.

Prouenit in Syria, & *A-Matt.* pulia.

Q U A L I T A T E S.

Est autem hominibus ve *Gal. 6.* nenū. Herba multum *simp.me.* grauiter olens: proinde omnino calida est non instrenue: non tamen proportionē de-

ficcat. Itaque illita, admodum digerentis est facultatis.

V I R E S.

Folia cum adipe in panes coacta, canes, lupos, vulpes, & pantheras *e-diosc.* necant in cibo data, & protinus eorum coxendices resoluta.

APOCYNVM repens. Italis, *Apocino serpeggiante*.

F O R M A.

Matt. Folia promit alterius longiora, caules, seu potius viticulas obsequiofas, & fractu cōtumaces, lentasque: quibus nō solūm humi repit, sed arbores quantūvis proceras scandit. tota planta lacteo succo thymali modo scatet: sed non vt in altera luteo. Est & in filiquis differentia. nāq; in hac planta binæ ex vno pediculo in origine cōiunctę prodeunt, & in sese inuicem inflexæ, nerij filiquis perquā similes.

L O C V S.

Idem. Prouenit hæc planta copiosa in Apulia, & Calabria.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem. Creditur iisdem pollere viribus, quibus & alterū.



NERIVM, seu Rhododendrum, Græcis, Νήριον, ἢ ῥοδόδενδρον.] Italis, Oleandro.] Germanis, Oleander.] Hispanis, Adelfa, siue Eloendro.] Gallis, Oleandre, Rosage, seu Rosagine.

NERIVM SEV RHODODENDRVM.



FORMA.

Arbor est vulgaris notitiæ, Diosc. longioribus, quàm amygdala foliis, crassioribusque: flore in rosam conformato: fructum fert cornu similē, qui patefactus, quandā lanosam naturā ostēdit: spinosarū plantarū pappis similē: Radice longa, acuta, lignosa: gustati salsa.

LOCVS.

Nascitur in amœnis, mari- Idem timis, & secus amnes.

QUALITATES.

Foris quidem corpori illi- Gale. 8. tum, discutiēdi vim ob- sim. me. tinet, intra verò in corpus assumptum, perniciosum non tantum hominibus, sed plerisque etiam pecudibus.

VIRE.

Flores, & folia mulis, as- Diosc. nis, canibus, & quadrupedum plurimis venena sunt: hominibus ve-

rò contra serpentium morsus præsidia è vino pota, & eo magis addita ruta. Imbecillæ etiam animantes, vt oues, & capræ, si aquam bibant, in qua folia maduerint, moriuntur.

FVNGI, Græcis, Μυκάρες.] Arabibus, *Hatar*, seu *Fater*.] Italis, *Fonghi*.] Germanis, *Pfifferling*, seu *Reiskn*.] Hispanis, *Hongos*, *Cogomelos*, seu *Cylerques*.] Gallis, *Capignon*, seu *Potyron*.

F V N G I

G E N E R A.

Diosc. Fungorū genera, numerosa quidē sunt, verū quædam esculenta sunt, quædam verò pernicioſa.

F O R M A.

Matt. Ut quidem vana spectatur facie, ac colore, ita hominibus maximè noti sunt fungi: plurimi tamen galleri modo formantur palmari: ac ēt minori pediculo nitentes, vario superius, inferiusq; colore.

L O C V S.

Matt. Nascuntur quidā in pratis, plerique in pascuis, nonnulli in sylvis, quidam in frutetis, & aliqui in arborum caudicibus.

Q V A L I T A T E S.

Gale. 8. Fungus, frigida, humidaq; **sim. med.** plāta est: quamobrem ēt proximè ad deleteriā, e necantēque facultatē accedit, & sanè inter eos sunt, qui interficiāt, præsertim, qui ex natura mistam habent qualitatem putredinosam.



V I R E S.

Diosc. Multis de causis venenosi gignuntur: vbi videlicet clauus ferreus rubiginosus, aut pāni marcor affuerit, aut si iuxta serpentis cauernam, arboresque, qui priuatim noxios pariunt fructus. Qui verò esculenti sunt, suauē in iuribus gratiā habent: largius tamen deuorati, nocent, & ægrius concocti strangulant, aut choleram morbum gignunt.

COLCHICVM, siue Ephemerum, Græcis, Κολχικόν.] Officinis *falso*
Hermodactylus.] Arabibus, *Surugen.*] Italis, *Colchico, & Zaffarano*
saluatico.] Germanis, *Zeittlofsz, aut bild soffran.*] Gallis, *Mort au chien,*
feu chiennee.

COLCHICVM.



FORMA.

Autumni exitu florem ge- **DIOSC.**
 rit croci, subalbicātem,
 postea verò folia bulbi,
 sed pinguiora, caulē pal-
 mo altum, ferentem ru-
 fum semen: radicē foris
 è nigro rufescētem, quæ
 delibrata cādida, & mol-
 lis spectatur. lacteo suc-
 co madet, gustu dulci:
 bulbus eius mediam ha-
 bet rimam, fissurāq; qua
 flos erumpit.

LOCVS.

Nascitur in pratis, & pa- **Matt.**
 scuis.

QUALITATES.

Strangulando necat: est e- **Gale. 6.**
 nim deleterię facultatis. *sim. med.*

VIREs.


Deuorata radix, fungorum **DIOSC.**
 more strangulādo necat.

COLCHICVM orientale. Italis, Zaffarano salvatico orientale.

COLCHICVM ORIENTALE.

F O R M A.

Matt. Minoribus exit foliis, angustioribus & magis acuminatis, caule rotundo, flore grandiori. Radice bulbosa evidenter scissa, & lacteo succo pregnante.



HERMODACTYLVS, Græcis, Ερμόδακτυλος.] Arabibus, *Surugen.*] Italis, *Hermodattilo*.

HERMODACTYLVS.



FORMA.

Folia mittit prelonga, binum dodrantum, ac etiam longiora, porri, aut asphodeli quadatenus similia, longè tamen angustiora, breuiora verò sunt, quæ circa radicem exeunt. Radices habet quatuor ex una eadèq; basi prodeûtes, digitorû figura, colore subrufescente, albis in summitate vnguibus: caulis è medio profilit tenuis, in cuius summitate oblongû prominet capitulû pyri figura, ephemeri colchici modo.

LOCVS.

Oritur in Orientalibus Regionibus, & in Arabia. *Matt.*

QUALITATES.

Excalfacit, & siccatur ordine secundo. Cum humilitate excrementosa, flatulenta. *Mesue Serap.*

VIRES.

Pituitâ crassam, & præsertim ab articulis trahit: ac proinde podagris, ac ceteris articulorum morbis confert. Impinguat, genitale semen auget, & vlcera purgat, & carnem in his putrem consumit. *Mesue*

CENSURA.

Errore magno ducuntur, qui Colchico, Hermodactyli loco vtuntur.

PSEUDOTHERMODACTYLVS, Italis, *Hermodattilo bastardo*.

F O R M A.

Matt. Folia habet aquaticæ plâ-
raginis, minora tamen,
infirmioraque, longo
pediculo nitentia: cau-
lem tenuem, singulârẽ,
in cuius summo flos e-
micat albus, stellæ figu-
ra. Radices habet bi-
nas, bulbosas, cãdidas,
teneras.

L O C V S.

Idem Prouenit in frutetis, &
propter semitas, & se-
pes.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem Sunt, qui radices probẽt
ad ea omnia, ad quæ le-
gitimus hermodacty-
lus cõferre potest. Nos
verò horum sententiã
nec probamus, nec im-
probamus, cùm nullã
certã de eo habeamus
experientiam.

PSEUDOTHERMODACTYLVS.



EPHEMERVM, quod aliqui syluestrem Irim appellant, Græcis, ἐφίμω-
por.] Italis, Giglio matto.] Gallis, Flambe blanche sauvage.

EPHEMERVM.



FORMA.

Folia habet lilij, sed tenu- **Diosc.**
iora, caulem parem, flo-
rem candidum, amarū,
femen molle : radicem
vnam, digitali crassitu-
dine longam, adstrin-
gentem, odoratam.

LOCVS.

Nascitur in syluis, & opa- **Idem**
cis.

QUALITATES.

Adstringens est, & boni **Gale. 6.**
odoris, vnde palàm est, **sim. me.**
quòd admistè sit facul-
tatis, temperaturèque
nempe repellentis, &
halitu digerentis.

VIRES.

Radix in dentium dolore **Diosc**
præcipua, si eius deco-
cto colluantur: folia in
vino cocta, tumores di-
scutiunt, & pariter tubercula, quæ nihil ad huc humidi cōtraxerunt.

HELXINE, Græcis, ἑλξίνη, ἢ περδίκιον.] Offic. *Panētaria.*] Ital. *Petriola.*]
 Germ. *Tagundnache.*] Hispanis, *Yerua del muro.*] Gallis, *Paritoire.*

HELXINE.

FORMA.

Diosc. Folia profert mercurialis,
 hirsuta, cauliculos subru-
 bentes, & circa eos velu-
 ti semina aspera, adhæren-
 tia vestibus.

LOCVS.

Matt. Nascitur in domorum pa-
 rietibus, sepibus, & mace-
 riis, arido solo.

QUALITATES.

Gale. 6. Vis ei inest abstergendi, &
 sim. med. leuiter constringendi, cū
 humiditate subfrigida.

VIRES.

Diosc. Folia illita, sacros ignes
 adusta, condylomata, in-
 cipiētes panos; tumores;
 inflammationesq; sanāt.
 Succus eius, cū cerussā vl-
 ceribus, quæ serpunt com-
 modè illinitur: imponi-
 turque podagris cū hirci-
 no adipe, veterem tussim
 emēdat, instar cyathi hau-
 stus: Gargarizat, ac illinit
 vtiliter tonsillarū inflāma-
 tionib⁹: auriū dolorē mul-
 cet, cū rosaceo instillatus.

Matt. ¶ Vis herbe quoque magna ad vulnera recētia sanāda: Si. n. recēs semi-
 cōtusa vulnere adalligetur, & tertiā diē soluiatur, nō erit opus alio me-
 dicamēto: foliorū succus defecatus, potus triū vnciarū pōdere: cū sac-
 charo, urinā mirificè ppellit: & renes abstergit: Folia sup regula igni-
 ta calefacta, & albo meraco aspersa: pubiq; illico imposita, calculosis,
 & vrinē malo affectis mirificè auxiliatur. Additur commodè in clyste-
 riis, qui ad ventris, & vteri dolores parantur. Stillatitia eorum aqua
 faciem abstergit, & eius nitorem conciliat.



ALSINE, Græcis, ἀλσίνη.] Italis, Centone, Paparina, Budello di Gallina, & Centouice.] German. Huener darm, seu Vogel kraut.] Gallis, Mouron.

ALSINE.

G E N E R A.

Plura eius sunt genera, *Matt.*
quæ in maiora, & mino-
ra diuidi possunt.

F O R M A.

Folia habet adsimilia hel- *Diosc.*
xinæ, sed humiliora, mi-
nimeque hirsuta, adeo
ut muscutorum auribus si-
milia videantur: cum te-
runtur cucumerem re-
sipiunt.

L O C U S.


Locis opacis gaudet. *Idem*

Q U A L I T A T E S.

Facultatem habet refrige- *Gale. 6.*
rantem, & humectantem: *simp. ma.*
est enim essentie aquæ
frigidae: quare, & citra
adstrictionem refrigerat.

V I R E S.

Vim refrigerandi, adstrin- *Diosc.*
gendi que obtinet: oculorum inflammationibus cum polenta illini-
tur, succus aurium doloribus infunditur. Ex oleo chamæmelino fer- *Matt.*
neta illinitur utiliter ventri contra tormina, & vteri dolores.



LENS palustris, Græcis, φακὸς ὁ ἐπὶ τῇ τελευτῇ.] Arabib. *Tahaleb*, seu *Taleb*.] Italis, *Lente aquatica*, & *Lenticulana*.] Germanis, *Vuasser hirs*.] Hispanis, *Lenteya della goa*.] Gallis, *Lentille de mer*.

FORMA.

Diosc. Muscus est aque innatans, foliis lenticulæ similibus.

LOCVS.

Idem. Inuenitur in aquis non fluentibus.

QUALITATES.

Gal. 8. Humide, frigideque temperaturæ est, vtrunque ex secundo quodammodo ordine.

VIRE.

Diosc. Illinitur conuenienter collectionibus, igni sacro, & podagris, tum per se, tum cum farina hordeacea.


Matt. Glutinat & puerorum interanea. ¶ Stillatitia eius aqua (quorundam testimonio) datur commodissime ad internas viscerum inflammationes, & ad pestilentes febres: præstat quoque, ad oculorum ruborem, & palpebrarum phlegmonas, & ad mammarum, testiculorumque collectiones, anteaquam augeantur. Herba ipsa recēs fronti adhibita, capitis dolores mulcet, vbi à calore prouenerint.

LENS PALVSTRIS.



LENS palustris altera. Italis, *Lente palustre del seme*.

LENS PALVSTRIS ALTERA.



FORMA.

Caulem gerit repentem, *Matt.*
 angulosum, à quo plu-
 ra, per intervalla ca-
 teruatim oriuntur fo-
 lia, praelongis, ac te-
 nuibus pediculis ni-
 tentia, quæ quaterna,
 crucis in modum se-
 se pandunt, subrotun-
 da. semen profert ra-
 cemosum, in ipso cau-
 le, lètium ferè effigie,
 subnigrum, densum,
 durumque.

LOCVS.

Nascitur in paludibus, *Idem*
 lacubus, & cæteris sta-
 gnantibus aquis.

QUALITATES,
 ET VIRES.

Nihil habeo, de qualita- *Idem*
 tibus, & virib⁹, quod
 probare possim, non
 tamen ambigo, quin
 sit frigide humideq;
 temperaturæ.

SEMPERVIVVM, sine sedum maius, Græcis, Αἰζών μέγα.] Arabibus, *Beia halalen*, seu *Hai alhalez*.] Ital. *Semprevivo maggiore*.] Germ. *Graszhauß vurtz*.] Hisp. *Semperuina*, seu *Yerva puntera*.] Gall. *Jou barbe*.

G E N E R A.

S E M P E R V I V V M M A I V S.

Matt. Plura sunt semperuiui genera, Maius, Minimum, & arborefcens.

F O R M A M A I O R I S.

Diosc. Caules cubiti altitudinē implēt: interdū excedunt, pingues, pollicari crassitudine, in cacumine lingue similia: alia in terram conuexa, alia inuicem in capite stantia, ita, vt in ambitu effigiem imitentur oculi.

L O C V S.

Idem Nascitur in montibus, saxis, testaceis, & supra domicilia etiam feritur.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 6. simp. me. Leuiter quidem desiccat, quandoquidem & mediocriter adstringit, omnis alterius vehementis qualitis expertus; quare in eo plus ceteris abundat essentia aquea: Ceterum nō mediocriter refrigerat. est enim ex tertio ordine, & recessu refrigerantium.

V I R E S.

Diosc. Medetur igni sacro, nomis, vlceribus, quę serpunt, oculorum inflammationibus, ambustis igni: folia per se, & cū hordeacea farina illita, podagris auxiliantur: succus illitus, capitis dolores mulcet: & præsertim si cū rosaceo infundatur: Datur potandum ad phalangiorum ietus, dysenteriam, aluique profuua: teretes tincas potus in vino excutit. subditus in vellere, mulierū abundantiam sistit: Idem oculorum lippitudinibus inungitur.



SEMPERVIVVM, sed Sedum minus, Græcis, Αἰζὼν μικρὸν.] Italis, *Sem-
preuio minore.*] Germanis, *Klein haus vurtz.*] Gallis, *lou barbe petit.*

SEMPERVIVVM MINVS.

F O R M A .

Caulibus prouenit ab vna ^{diose.}
radice multis, tenuibus,
crebro foliatis : exilibus
foliis, rotundis, pingui-
bus mucronatis : caule à
medio emicante, palmū
alto. vmbellā, herbidosq;
flores, & tenues gerente.

L O C V S .

In petris, parietinis, & ma- ^{Idem}
ceriis, nec non in scrobi-
bus opacis nascitur.

Q V A L I T A T E S ,
E T V I R E S .

Folia, eisdem cum priori, ^{Idem}
viribus prædita sunt.



SEMPERVIVVM minimum, siue tertium, Græcis, Αειζων εἶδος τρίτον.] Arabibus, *Halsebram*, *Handrachabara*, seu *Tilafon*.] Italis, *Herba grassella*, siue *Sempre viuo minuto*.

F O R M A.

DIOSC. Foliis prouenit pusillis, crassioribus, hirsutis, portulacæ proximis.


L O C V S.

DIOSC. Nascitur in muris, locis
Matt. saxosis, & secus itinera.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.


DIOSC. Vis ei excalfactoria, acris, exulcerans. illita folia cum axungia, strumas discutiunt.

SEMPERVIVVM MINIMUM.



SEMPERVIVVM Arborescens. primum : Italis *Semprevivo Arboreo.*

SEMPERVIVVM ARBORESCENS.



FORMA.

Patet forma, ex hic appi-
cta imagine.

SEMPERVIVVM arborescens alterum maius. Italis, *Semprevivo Arboreo maggiore*.

SEMPERVIVVM ARBORESCENS
ALTERVM.



UMBILICVS Veneris, siue **Acetabulum**. Græcis, Κοτυλήδων οἰδέεικος βαλίων] Italis, *Bellico di Venere*.] Hetruscis, *Copertoiole*.] Hispanis, *Scudettes*.] Gallis, *Escudes*.

UMBILICVS VENERIS.

GENERA.

Duū est generum. Alterum **Diosc.** acetabuli, alterū maioris foli figura.

FORMA PRIMI.

Folio est in acetabuli formā *Idem* tornato, laeenter cōcauo, breui cauliculo, in quo semen inest, radice oliuæ modo rotundo.

LOCVS.

Nascitur frequens in saxis, *Gale. 7. sim. med.* & vetustis ædificiorū parietibus, & in oppidorū mœnibus.

QUALITATES.

Mistæ est qualitatis, nempe **Diosc.** humidę subfrigidæ, & cuiusdam obscuræ adstringentis, & cum ea leniter amaræ. vnde refrigerat, re percutit, abstergit, & discutit.

VIREs.

Foliorum & radicū succus, *Gal.* cum vino circūlitus, in illilatusvè, contacta genitalia nudat: inflammationibus, sacris ignibus, stru-

mis, pernionibus illitu auxiliatur. Stomachi ardorem refrigerat: folia cum radice comesa calculos frangunt, urinam cient, hydropicis ex melle datur. ¶ Phlegmonas Erysipelatodeis: & Erysipelata phlegmonodeis curant.

UMBILICVS Veneris alter. Græcis, Κοτυλήδον ἐτέρε.] Italis, *Bellico di Venere secondo*.

UMBILICVS VENERIS ALTER.

FORMA.

Diosc. Pinguibus exit foliis, latioribus, ligularum modo densis, circa radicem, medium oculi ambitum describentibus, ut in maiore semperuiuo: adstringentis gustus: cauliculo tenui, in quo flores, & semina hyperici: radice maiuscula.

LOCVS.

Matt. Nascitur in saxosis montibus, & petris.

QUALITATES.
ET VIRE.

Diosc. Facit eadem, quæ semperuiuum.



CYMBALARIA, Italis, Cimbalaria.

CYMBALARIA.



FORMA.

E' muris comę modo de *Matt.*
 pendet, cauliculis nu-
 merosis, tenuibus, fu-
 niculi instar prelōgis,
 lentisque: è quibus fo-
 lia prodeunt hedera-
 cea, pingua, longis pe-
 diculis adnexa: floscu-
 lis parvis lutescenti-
 bus, qui è tenuissimis
 quoq; pediculis exeū-
 tes, clauicularum mo-
 do sese implicant.

LOCVS.

Nascitur in antiquis, vli- *Matt.*
 ginosisq; ædificiorum
 parietibus, maceriis,
 & saxis.

QUALITATES.

Facultatis est humidę fri *Idem*
 gidęque, cum adstri-
 ctione quadam.

VIREs.

Iis profectò hanc plantā *Idem*
 pollere facultatibus,
 facto periculo cōstat,
 quibus primi generis
 cotyledonē. sunt qui

ca vtantur ad alba vteri profluuia, eandem recētem in acetariis pro-
 pinantes.

CENSURA.

Tametī hęc planta Veneris vmbilici viribus prędita sit, errant tamē,
 qui putant hanc ipsam herbam esse veneris vmbilicum.

VERTICA, Græcis, *Ακαλύφη*.] Arabibus, *Humiure*, seu *Angiara*.] Italis, *Ortica*.] Germanis, *Nessel*.] Hispanis, *Ortiga*.] Gallis, *Ortie*.

V E R T I C A.

G E N E R A.

Trium est generum. Prima asperior. Altera nō æquē aspera, & tertia omnium minima.

F O R M A P R I M Æ.

Diosc. Syluestrior hæc est, aspe-
*Matt.*rior, latioribus, nigriori-
busq; foliis. semine lini,
sed minore. § Caule rotū-
do, aspero, hispidoque,
ac pungenti: pilulas in
caule gerit hirsutas, ac
vrentes, in quibus semē
gignitur. L O C U S.

Matt. Prouenit calidis tractibus,
aridis, & incultis locis.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 6. Semen, ac folia digerentis
fimp. me. sunt facultatis, sed &
quiddam flatuosum ob-
tinent, quo venerem ex-
timulant: porrò non ve-
hementer calefacit, sed
admodum tenuium est
partium. V I R E S.

Diosc. Folia cum sale illita, canum
lemb / cap. morsibus medentur, gā-
grenas, carcinomata, sor-
dida vlcera, & quæ cacoethe vocantur. Item luxata, panos, tubercu-
la, parotidas, suppurationesque sanant: lienosis cum cerato impo-
nuntur: cum succo trita, & naribus indita, sanguinem fluentē co-
hibent. Ciunt menses trita, & cum myrrha supposita: procidentes
vulvas restituunt, suo contactu: semen ex passo potum venerem sti-
mulat, & vuluæ ora patefacit, cum melle delinctū, orthopnea, lare-
ris, & pulmonū inflammationibus prodest: toracē expurgat. Cocta cū
eōchis folia, aluū emolliūt, vrinas mouēt, inflationes discutunt.



VERTICA altera, Græcis, Ακαλύφη ἑτέρα.] Italis, Ortica volgare.

V R T I C A S E C V N D A

F O R M A.

Foliis prouenit alterius si- *Mass.*
milibus, verū non æque
asperis : semen profert
racemosum, ac minutū :
caulem quadrangulum,
asperūque, tactu acuto,
ac pungente.

L O C V S.

Nascitur vbique.

Idem

Q V A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Iisdē cū altera est facultati- *Idem*
bus : atqui peculiariter
seminis puluis, sangui-
nem è cerebri membra-
nis manantē suppressit.



URTICA tertia. Græcis, Ακαλύφη τρίτη.] Italis, *Ortica minore*.

F O R M A.

Matt. Folia profert ceteris similia, sed longè minora, acutiora, vrentioraque: caule dodrantali, hispidiore, ac vrente, densioribus foliis, & in ambitu ferratis.

L O C V S.

Idem Nascitur secus edificiorum muros, in hortis, & ferè ubique.

F A C V L T A T E S,
E T V I R E S.

Idem Non minus valet, quàm cetera genera.

U R T I C A T E R T I A.



CARDIACA, Italis, *Cardiaca*.] Germanis, *Hertz gepan*.] Gallis, *Gripaume*, seu *Cheneuse*.

C A R D I A C A .



ad tertium siccantium accedere.

V I R E S .

Præstat (quorundam testimonio) ad omnes cordis affectus, ad cōuulsos, ac resolutos: obstructions reserat, urinā ciet, & mēses, pectus à pituita detergit. Lumbricos necat. foliorū farina, domestici cochlearis mēsurā in vino hausta, agrē parturientibus mirificē opitulatur.

F O R M A .

Facie vrticā quadantenus *Matt.* referre videtur, foliis tamen, quę prope terram sunt, rotundioribus constat, & ranūculi ferè modo per ambitum lacinia- tis: caulem habet quadrangulum, ramis copiosis pariter quadratis, in quibus bina vtrinque; folia, parib⁹ interuallis ab imo, ad summū exeunt, sed minora, & per ambitum magis diuisa: flores in purpura albicant & verticillato ambitu, marubij modo, caulem ambiunt. Radix in rubro pallescit.

L O C V S .

Prouenit in ruderibus: iux *Idem* ra semitas, & propè urbium mœnia.

Q U A L I T A T E S .

Gustu vsque adeo amarescit, ut facillè existimari possit ad secundū ex- calfacientium ordinem, &

GALIOPSIS, Græcis, Γαλιόψις.] Italis, *Ortica fetida*, seu *Ortica morta*.]
Germanis, *Velchnessel*.] Hispanis, *Ortica muerta*.] Gallis, *Ortie*.

GALIOPSIS.

F O R M A.

Diosc. Foliis, & caule constat vrti-
Matt. cæ similibus. tactu tamēn
non mordentibus, flori-
bus purpureis, tenuibus-
que, odore fætido, ac gra-
ui.

L O C V S.

Diosc. Prouenit in edificiorū areis.
in plateis, iuxta semitas,
& circa hortorum sepes.

Q V A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem. Folia, caules, semen, succus-
que duritias, & carcino-
mata dissipāt: strumas, pa-
nos, & parotidas discu-
tiunt: oportet bis in die
tepidū ex aceto cataplas-
ma imponere, & eius de-
cocto fouere: ad putrescē-
tia, gangrenas, & nomas,
cū sale efficaciter illinunt.



SCROFULARIA, Mille morbia, Ferraria, siue Castrangula. Italis, *Scrofularia*.] Germanis, *Braun vurtz*.] Gallis, *Grande Scrolaire*.

SCROFULARIA.



F O R M A.

Caules ab vna radice mittit plures, sesquicubitales, angulosos, subrufescentes, in quibus folia insunt nigricantia, robusta, ad verticem faciem accedentia, per ambitum leuiter denticulata, Flores mittit in caulium ramorumque summitatibus pusillos: purpureosq;, galeæ faciem referentes, & semen in capitulo, vt in lino, & lactaria herba, rotundo, acuto summa parte apice. Radicem habet magnâ, albicantem, strumosam. *Matth.*

L O C V S.

Prouenit plurimum secus riuos aquarum, & vliginosis locis. *Idem*

Q U A L I T A T E S.

Desiccat, extenuat, discutit, abstergit: est. n. gustu amara, & subtilium est partium. *Idem*

V I R E S.

Radix præstat recens ad strumas, & hæmorrhoidas sanandas, in quem vsum effoditur autumnò, & repurgata tunditur cum recenti butyro. & operculato fictili. vliginoso loco reponitur, bis quinque, aut pluribus diebus. mox lento igne colliquatur butyrum, & percolatum asseruatur: quo postmodum præscripti morbi illinuntur. Idem illitum scabiem sanat: Aqua è radicibus distillata, faciei rubo

rem illita tollit. Siccæ radiceis puluis impositus hæmorrhoidas siccat: Idem drachmę pondere potus, lumbricos ventris pellit.

C E N S V R A.

Cęcutiunt ad summum vsque, qui Scrophulariam Dioscoridis ocimastrum faciunt, nec minus aberrant, qui eandem Galiopsem esse contendunt.

GALIVM, Græcis, Γάλιον.] Italis, Galio.] Germanis, *Megerkrant.*] Hispanis, *Coia leche yerna.*] Gallis, *petit Muguet.* *Antu francu*
Brusno.

GALIVM.

F O R M A.

Diosc. Ramulum, foliumque habet aparine simillimū, rectum, florem luteum, tenuem, densum, copiosum, odoratum.

L O C V S.


Matt. Nascitur ferè ubique copiosum, prope sepes, & secus vias.

Q V A L I T A T E S.

Gale. 6. Facultatem obtinet desiccatoriam, & subacrem. est autem flos boni odoris, & coloris lutei.

V I R E S.

Diosc. Flos igni ambustis illinitur, & sanguinis profluvia sistit: radix venerem concitat: coma in lacte macerata, illud coaguli modo condensat, vnde illi nomen.



A P P E N D I X.

Est etiam Galium, qui flores albos edat.

SENECIO, Grecis, *Polypod.*] Italis, *Cardoncello, seu Spellicciosa.*] Germanis, *Crentz vurtz.*] Hispanis, *Bon varon.*] Gallis, *Senesson.*

SENECIO.



GENERA.

Duum est generum? Ma- *Matt.*
ius, & minus.

FORMA MAIORIS.

Cauliculo est cubitali, sub *diosc.*
rubro, foliis sensim per
extremitates erueq̃ mo-
do diuisis, sed minori-
bus multò: luteis flori-
bus, qui celeriter disse-
cti, euanescent in pap-
pos, radice superuacua.

LOCVS.

Nascitur maximè in mace *Idem*
riis, parietibus, & cir-
cum oppida.

QUALITATES.

Facultatem mistam obti- *Gal. 6.*
net, simul refrigerantè, *simp. me.*
& modicè digerentem.

VIREs.

Folia illita cum vini modi *diosc.*
co, vel per sese, testium
& sedis inflammationes
sanant. Quin etiã cum
manna thuris meden-
tur, cum reliquis vulne-
ribus, tũ iis, quę nerui
acceperũt. Illiti per se,

aut cum aceto pappi, idem munus præstant. verũ recentes epoti,
strangulant. totus caulis si coctus ex passo potui detur, stomachi do-
lores à bile contractos, persanat.

APPENDIX.

Cũ autẽ herba euidenter sit amara, vt siccet, abstergat, aperiatq̃; ne-
cesse est, quare nil mirum fuerit, si scẽminẽ Epoto foliorũ succo, aut
totius plãtę decocto, remorãtes menses sibi prouocet. ab anis edocta.

SENETIO maior, Italis, Cardoncello, seu Spellicciosa maggiore.] Germanorum Offic. Flos S. Jacobi: vulgari verò sermone S. Iacob blum.

SENETIO MAIOR, SIVE FLOS S. IACOBI.

F O R M A .

Matt. Folia mittit erucæ sylvestris æmula, per ambitū laciniata, nigricantia, amaro gustu, caulis illi est sesquicubitalis, artemisiæ similis, à medio ramosus, surculosusq; . Flos ī summitate aureus, q̄ flaccescens, in pappo sam euolat lanuginem, Radice est multifida ac breui.

L O C U S .

Idem Nascitur in cāpestribus inculto solo.

Q U A L I T A T E S ,
E T V I R E S .

Idem Excalfacit, siccit, aperit, abstergit, digerit, & reliquas minoris Senetionis vires obtinet.



MVSCVS marinus, Græcis, Βρύον θαλάσσιον.] Arabibus, *Tahaleb*, siue *Tha-*
bel.] Italis, *Corallina*.] Germanis, *Meer miefz*, seu *Mer moeff*.] Hi-
 spanis, *Mahor quiana*.] Gallis, *Coralline*.

MVSCVS MARINVS.



G E N E R A .

Duum est generum: Dio- *Matt.*
 scoridis alterum, alterū
 verò Plinij.

F O R M A P R I M I .

Gracilis, capillaceusq; pro *Idem*
 uenit caulis expers, colo-
 re cum siccatur subrufo-
 scente, salso sapore, odo-
 re concharum marina-
 rum simili.

L O C V S .

Nascitur in scopulis testa- *diosc.*
 ceisque.

Q U A L I T A T E S .

Compositus est ex terrena, *Gale. 6.*
 & aquea essentia, vtraq; *sim.med.*
 frigida, siquidem gustū
 adstringit, & calidis qui-
 busdā illitus, ea eviden-
 ter refrigerat, & adiu-
 uat.

V I R E S .

Præcipua ei spissandi vis,
 & collectiones cohibendi: podagras iuuat, quas refrigerare opus sit.
 ¶ Peculiari autē sicci dote, admirabilis est facultatis, ad teretes inte-
 stinorum vermes pellendos, potui datus drachmæ pondere ex passō,
 aut cum Ægyptiæ siliquæ pulpa.

A P P E N D I X .

Posse quidē marinū muscū, qui recens fuerit, refrigerare. facile cū Ga-
 leno, & Dioscoride concedam: q; verò siccum id efficere possit, q;
 gustu salso sentiatur. non ita facile mihi concedendum videtur.

MVSCVS marinus alter, Italis, Mosco marino di Tlinio.

MVSCVS MARINVS ALTER PLINII.

FORMA.

Pli. l. 27
cap. 8. Bryon marina herba, sine
dubitatione lactucę fo-
liis similis, rugosa, ve-
luti contracta, sine cau-
le, ab ima radice exeun-
tibus foliis.

LOCVS.

Idem Nascitur in scopulis, ma-
ximè testis terra com-
prehensis.

QUALITATES,
ET VIRE.

Idem Præcipua ei spissandi, sic-
candi que vis, & colle-
ctiones omnes, inflam-
mationes que cohiben-
di, præcipuè podagræ,
& quicquid refrigera-
re opus sit.



POTAMOGETON, Græcis, Ποταμογέτον.] Italis, Potamogeto.] Germanis, See halben kraut.] Gallis, Herbe des estagnes.

POTAMOGETON.



FORMA.

Folium fert betæ similem, DIOSC.
hirsutum, paululum supereminens extra aquâ.

LOCVS.

Nascitur in palustribus, & *Idem*
aquosis.

QUALITATES.

Adstringit, & refrigerat si- *Gale. 8.*
militer polygono, sed ef- *sim. me.*
sentia eius crassior polygono est.

VIREs.

Refrigerat, & inspissat, pru DIOSC.
riginibus vtile, & contra veterum vlcerū nomias.

SAGITTA, Græcis, Πισάρα.] Italis, Saetta.

G E N E R A.

Matt. Duum est generum. Maius, & minus.

F O R M A M I N O R I S.

Folia habet robusta, sagittæ auriculatæ figura; pediculo triquetro, spōgioso, sesquicubitali, maiori, aut minori pro aquarū profunditate, ī quibus viuit: caulem habet rectum, læuem, rotundū, spongiosum. ramulos hic superius mittit: ē quibus flores exeunt albi, tribus tantum foliolis circūscripti, ē quibus capitula producuntur subpurpurea, hirsuta, nucis Ponticæ magnitudine, in quibus minutum gignitur semē, rotundo intus globulo inherens. Radice nitē alba, multifida, fibrosa, plātaginis aquaticæ modo, cuius cognationis sagitta esse videtur.

S A G I T T A.



L O C U S.

Idem Nascitur in aquis cū stagnantibus, tum decurrentibus.

Q U A L I T A T E S, E T V I R E S.

Idem Temperamento est frigidus, humidoque, & iisdem cum plantagine aquatica viribus pollet.

SAGITTA maior, Græcis, Πισάνα μέγα.] Italis, Saetta maggiore.

SAGITTA MAIOR.



FORMA.

Minori est per omnia similis, sed omnia quæque maiora spectantur. verum folia non usque adeo acuminata habentur. *Idem*

LOCVS.

Nascitur, ut altera stagnatibus, & decurrentibus aquis. *Idem*

QUALITATES,
ET VIRES.

Paribus alteri viribus præstat. *Idem*

MILLEFOLIUM aquaticum. Italis, *Millesoglio aquatico*.

MILLEFOLIUM AQUATICUM.

F O R M A.

Matt. Foliis est coriandri, sed tenuioribus, caulibus tribus, aut quatuor, angulosis, in quibus per intervalla pusilla habentur folia, auicularum pennis similia. in cacumine singulis caulibus binæ exeunt umbellæ, subpurpurascens floribus.

L O C U S.

Idem Nascitur in aquis.



STRATIOTES millefolium, Græcis, Στρατιώτης χιλιόφυλλος.] Italis, Mil-
lefoglio.] Germ. Garben.] Hisp. Millboyas yerna.] Gallis, Mille feuille.

maistrot garben, maistrot blat, saffgarben

STRATIOTES MILLEFOLIVM.



GENERA.

Duum est generum. Maius, *Matt.*
& minus.

FORMA MINORIS.

Exiguus est frutex, palmi alti- *Diosc.*
tudine, aut amplius assurgit :
foliis auicularum pēnas imi-
tantibus : breui admodum
dissectoq; foliorum exortu :
folia sylvestre cuminū simu-
lant, præsertim breuitate, bre-
uiora paulò, densiore umbel-
la, & pleniora : Surculos in
cacumine gerit exiguos, & ca-
pitula in modum anethi : flo-
res paruos, & candidos.

LOCVS.

Nascitur in asperis agris, præci- *Idem*
pueq; circa semitas.

QUALITATES.

Non nihil habet adstrictionis, *Gale. 7.*
proinde & vulnera glutinare *simp. me.*
potest, & vlceribus esse vtile.

VIRE S.

Eximij est vsus ad vlcera vete- *Diosc.*
ra, recentiaque, profluentem *Matt.*
sanguinem, & fistulas. § Da-
tur vtiliter foliorum succus
ad sanguinis reiectiones. Idē
præstat sicci farina ex symphi-
ti maioris, aut plantaginis a-
qua pota, eadem naribus in-
dita, fluentem inde sanguinē
compescit : dysentericis cō-
modè infunditur, vnā cū sui
ipsius succo. Herba recēs tu-

sa, pubiq; illita, mensum abundantiam compescit : Candida millefolij umbella, tu-
ta, & cum sua ipsius aqua pota, aut caprino lacte, gonorrhæam in viris, in feminis
alba vteri excrementa colibet. Atqui felicius auxiliatur, si cum corallio, succino al-
bo, & ebore propinetur : foliorum, & florum farina vncie pondere, vnā cum Arme-
nię terræ drachma, ex vaccino lacte pota, præstat mirum in modū ad sanguinis mi-
ctum. commanducata radix, diuq; sub dente retenta, dolorem mulcet.

MILLEFOLIUM maius, Græcis, Σπατιώτης χιλιόφυλλος μέγα.] Italis,
Mille foglio maggiore.

MILLEFOLIUM MAIUS.

F O R M A.

Matt. Folia profert minoris similia, sed maiora, Tanacetum quadatenus proxima, caules quoque maiores, subhirsutos, atque grandiores umbellas: floribus in purpura albicantibus, odore medicato.

L O C V S.

Idem Prouenit in Montibus, & collibus.

Q V A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem Præstat eadē, quæ minus.



VERBASCUM, Græcis, φλόμος.] Officinis, *Tassus barbassus*.] Hetru-
scis, *Barbaraschio*.] Cæteris Italis, *Tasso barbasso*.] Germanis, *Uneyß* *glimigß gnuß*
3 *gull kraut*.] Hispanis, *Verbasco*.] Gallis, *Bouillon*.

V E R B A S C U M.

G E N E R A.

Plura Verbasci numerantur gene *Matt.*
ra, ut ex appictis iconibus pa-
lam fiet.

F O R M A P R I M I.

Primum, quod fœmina vocatur, *Diosc.*
folia habet brassicæ, pilosiora
multò, & latiora, candidiora-
que: caulis illi albus, cubita-
lis aut amplior, subhirsutus:
flores ex luteo pallescentes, se-
men nigrum, radix longa, gu-
stu acerba, crassitudine digiti.

L O C U S.

Nascitur in campestribus. *Idem*

Q U A L I T A T E S.

Radix gustu acerba est, & fluxio- *Gale. 8.*
nis affectibus prodest, attamē *sim. med.*
folia digerendi vim habet. om-
nium. n. folia desiccandi, & di-
gerendi vim habent.

V I R E S.

Radix datur ludicri tali magni- *Diosc.*
tudine conuenienter ex vino,
in alui profluuiio. Decoctum
dentium dolorem collutione
mitigat. ¶ Omnia genera, sed *Matt.*
fœmina magis, sedis ferè mor-
bis omnibus subuenit: semi-
nis, & florum farina, larigna
resina excepta, cum anthem-
idis floribus, procidentem sedē
suffitu cohibet, & tenasum
in dysentericis sanat, fœminę
radicis succus, anteaquā cau-



lescat, duarum drachmarum pondere ex vino Cretico haustus, in ipsa accessionis ho-
ra, quartanam fugat, sed ter, quaterve id repetendum est. Succus tam foliorum, quàm
florum asperis verrucis illitus, eas delet. Folia tusa, cineribusq; calefacta, sanāt panos,
quos bubones vocant: stillaticia florum aqua, oculis instillata, fluxiones cohibet, &
illita faciei ruborem tollit. eoq; magis si caphurę tantillum adiiciatur. Flores vnā cū
oui vitello, & mica panis, ac porri foliis illiti, per belle præstant ad cohibendas tu-
mentes, dolorificasq; hæmorrhoidas.

VERBASCUM mas, siue secundum. Græcis, φλομὸς ἀγρίῳ λευκός.] Italis,
Tasso barbasso maschio.

F O R M A.

Diosc. Oblongius est, albis foliis,
Matt. angustioribusq; tenuio-
 re caule. Floribus in ca-
 cumine minoribus, pal-
 lido colore. Radice mi-
 nori, minusq; carnosâ.

L O C U S.

Matt. Nascitur in campestribus,
 exoluto solo.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Isdem præditū est viribus,
 quibus & fœmina.

V E R B A S C U M I I.



VERBASCUM tertium, Græcis, Φλομὸς ἄρρι μέλανα.] Italis, Tasso bar-
basso minore.

VERBASCUM III.



FORMA.

Folia profert nigriora, ob- *Matt.*
longiora, saluæ ferè mo-
do aspera, sed latiora:
caulibus rotundis, ro-
bustis, tenuioribus; flo-
ribus in cacumine spica-
tis, aureo colore.

LOCVS.

Prouenit & hoc quoque *Idem*
in campestribus.

QUALITATES,
ET VIRES.

Easdem cum aliis habet *Idem*
vires.

VERBASCUM sylvestre, Græcis, φλομὸς ἀγρία.] Italis, Tasso barbasso saluatico.

F O R M A.

Prosc. Folia fert Saluicę, altas virgas, & lignosas, & circa eas ramulos, quales marrubium, flores luteos, auri æmulos, .

L O C V S.

Matt. Nascitur in cāpestribus, & apricis montibus.

VERBASCUM SYLVESTRE.



VERBASCUM lyncite, Græcis, Φλομὸς λυγνιτῆς.

VERBASCUM LYCNITE.

FORMA.

Folius est hirsutis, crassis, tomentosus, pinguibusq; atque idoneis, ad lucernarum lumina: floribus numerosis, & ramusculis eminentioribus, prodeuntibus. aureo colore.



VERBASCUM ALIUD.

Verbasum aliud est, cuius folia corniculati papaveris modo prodeunt per ambitum sinuata: Ideoque recte Dioscorides huiusce papaveris folia, verbalco similia fecit.



PRIMVLA VERIS, nonnullis, Brache Cuculi: Quibusdam Herba paralyfis. Italis, *Fiore di Primavera.*] Germanis, *Schluffel bluomen.*] Gallis, *Primeuere, seu Brayes de Cocu.*

PRIMVLA VERIS.



GENERA.

Duum est generum, alterū *Matt.* odoratum, alterum inodorum.

FORMA PRIMÆ.

Folia profert lactuæ qua- *Idem*
dantenus similia, oblonga, rugosa: Labri veneris ferè modo, humi iacentia, è quorū medio cauliculus exit dodrantalis, atque incanus, è cui⁹ fastigiis, flores exeūt cōplures lutei, per ambitum fimbriati odoratiq̃ue, vt in vrsi auricula, quam & radice quoque imitatur.

LOCVS.

Prouenit secus vias, propter *Idem*
sepes, & in pratis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Tota planta articularibus *Idem*
morbis auxiliatur. Radicum decoctum renum calculos eiicit: præstat idem additis salvia, & amaraco ad frigidos ner-

uorū, & cerebri morbos: quare resolutis ac tremore affectis potum cōfert: epotus foliorum succus, ac etiā illitus fractis, luxatisq̃ue ossibus cōfert. Stillatitia florentis plāte aqua cōmendatur ad animi deliquium. Flores illinuntur aduersus scorpionum ictus. Herba ipsa, aut flores, aut radices, trite, & illite vulnera glutinant. Mulieres è floribus, & polygonati radicibus in albo meraco maceratis, stillatitiam aquam faciunt ad faciei nitorem conciliandum.

Iisdem nominibus appellatur, quibus, & altera.

F O R M A .

Matt. Folia profert latiora, & in cacumine rotundiora, humi pariter accubantia, crispa, rugosaque, ac magis tenera: caule verò, floribus, ac radicibus, ab altera non differt.

L O C U S .

Idem Nascitur iisdem in locis, & frequenter in sylvis herbosis.

Q U A L I T A T E S ,
E T V I R E S .

Idem Easdem, quas altera possidet vires, imbecilliores tamen.

PRIMVLA VERIS ALTERA .



BLATTARIA, Dioscoridi verbascum aurei floris. Italis, *Blattaria*.

Wattenfrank

BLATTARIA.



FORMA.

Herba est similis verbasco, *Plin.*
foliis minus candidis : *Matt.*
cauliculis pluribus, flo-
re luteo. § Semine capi-
tulis concluso lini mo-
do, sed durioribus.

LOCVS.

Nascitur in campestribus. *Matt.*

QUALITATES.

Sapore est amaro, excalsa- *Idem*
ciens, & siccans.

VIRES.

Herba prostrata blattas in *Plin.*
se contrahit. *DIOSC.*

ÆTHIOPIS, Græcis, αἰθιοπῖς.] Italis, *Etiope*, & *Etiovide*.

ÆTHIOPIS.

FORMA:

Diosc. Folia habet verbasco similia, per quàm hirsuta, densaq; in orbē circa radicem imam redacta: caulem quadrangulū, scabrum similem apiastro, aut arctio, multis concavum alis. semen erui magnitudine: geminum in vno conceptaculo: Radices ab eo dē cespite numerosas. longas; crassas, gustu glutinosas, quę sicce nigrescunt, duranturque vt cornua imitari videantur.

LOCVS.

Idem Plurima nascitur in Ida, & in Mellēnia.

QUALITATES,
ET VIRE.

Idem Auxiliatur purulentis excreationibus, Ischiadicis, pleuriticis, arterię scabritiis decocta radix, & pota, quin etiam cum melle Eclegmatis vicem præbet.



PERSONATA, Græcis, Αρκεῖον.] Officinis, *Bardana*.] Italis, *Lappola maggiore*.] Germanis, *Gross kleiten*.] Hispanis, *Bardana*, seu *Pagamacera mayor*.] Gallis, *Gloteron*, seu *Bardana*.

PERSONATA MAIOR.



G E N E R A.

Duum est generum: intercedente notarum differentia. *Matt.*

F O R M A P R I M Æ.

Folia habet cucurbitæ *maiora*, nigriora, hirsutiora, crassioraque: caulē crassum, angulosum, albicantem, sesquicubitale, atque ramosum, fructu copioso, echinato, non magno, aculeis repandis, vestibis pertinaciter inhærentibus. Floribus purpureis, semine cnici minore. Radice longa, vegeta, intus candida, foris nigra. *Idem*

L O C V S.

Nascitur passim in agrorū marginibus, secus itinera, & ferè vbiq̃ue.

Q U A L I T A T E S.

Discutit simul, & desiccât, *Gale. 6.* & mediocriter adstringit. *sim. med.*

V I R E S.

Radix drachmæ pondere, *Diosc.*

cum pineis nucibus pota, purulenta, & cruenta extussientibus auxiliatur: trita dolores à contritione arctuum contractos, illitu sedat. Folia vtiliter antiquis vlceribus illinuntur. Semen potum calculosis auxiliatur. Idem facit radicis decoctum infusum. *Matt.*

PERSONATA altera: Plinio Persolata. Italis, *Lappola*.

PERSONATA ALTERA.

FORMA.

Matt. Foliis exit minoribus paulò, caule ramoso: capitulis pariter echinatis, sed minoribus, alba lanugine obductis: minoribus aculeis: flore capillaceo, purpurascēte: semine alteri simile.

LOCVS.

Idem Nascitur secus itinera, in ædificiorum vetustorum areis, & in agrorum marginibus.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem Eadem cum alia præstat.



PERFOLIATA : Italis, *Perfogliata.*] Germanis, *Durch wuchs.*

PERFOLIATA.



FORMA.

Folia præfert subrotunda, *Matt.* pinguia, sed in acutū delinētia, pisi ferè modo : venis compluribus secundum longitudinē protensis. caulis illi est gracilis, glaber, rotundus atque cū ramosus : folia, quæ in caule, & ramis sunt ab iis umbilicotenus trāsfiguntur, magno naturæ artificio : quare putarem ego, ut perforata magis, quàm perfoliata dici deberet : flores gerit aureos, è capitibus quibusdā prodeuntes in stellæ modum : semen nigrum, paruum psyllij modo pellucidum.

LOCVS.

Nascitur in vineis, campis, & aliis quoque locis, & in agrorum limitibus. *Idem*

QUALITATES, ET VIRES.

Gustu est subamaro, & adstringenti. Datur herbæ decoctum ex vino paratum, aut folia in puluerem trita, ad internas affectiones, & adrupta : quare bibuntur commodè ad umbilici eminentias, & enterocellas. illita strumas quoque resoluunt. *Idem*

ELLEBORINE, Græcis, *Επιράκτις*.] Italis, *Elleborina*.

EPIPACTIS SIVE ELLEBORINE.

F O R M A .

Diosc. Parua est herba, & exiguis foliis.

L O C V S .

Idem In Asia, & Græcia nascit̃.

Q U A L I T A T E S ,
E T V I R E S .

Diosc. Iocinoris vitiis utilis, & contra venena pota.

A P P E N D I X .

Matt. Epipactidis historiam adeo paucis cum à ceteris, tum à Dioscoride descriptam reperio, ut difficile admodum sit decernere, quænam plâta legitimam repræsentet, & præsertim cum in Græcia, & Galatia, Dioscoride, & Plinio autorib⁹ nascatur. Hâc autem quam nobis Elleborinâ vocare libuit, haud legitimâ facimus. verû, quòd nigri veratri quadâtenus effigiem referat, & similes quoque radices gerit, ita eam appellare volumus.



FUMARIA, Græcis, Καπνός.] Officinis, *Fumus terre*.] Arabibus, *Schehiterig*, *sive Sabeteregi*.] Italis, *Fumoſterno*.] Germanis, *Erdt rauch*.] Hispanis, *Palomelha*.] Gallis, *Fumeterre*. *Endeich. Männel.*

Jaubert. Grof.

FUMARIA.

G E N E R A .

Duum est generum. *Ma-Matt.*
ius, & Minus.

F O R M A M I N O R I S .

Fruticosa herbula est, præ- *Diosc.*
tenera, coriandro simili,
foliis cãdidioribus,
yndique numerosis, ci-
neracei coloris, flore
purpureo.

L O C V S .


Nascitur in hortis, vineis, *Matt.*
& campis.

Q U A L I T A T E S .

Acris simul, & amarę qua- *Gal. 7.*
litatis est. nec tamẽ pla- *simp. me.*
nẽ expers est acerbæ:
quam ob rem vrinam
biliosam multã trahit.

V I R E S .

Oculis claritatẽ facit, de- *Diosc.*
lachrymationẽq; succus *Matt.*
instillatus. Manducata
herba biliosam vrinam
trahit. ¶ Attenuat, pene-
trat, obstructions ape-
rit, ac deiectionis est fa-
cultatis, cohibet, aggre-
gat, & roborat Aluũ fa-
cilẽ ducit, bilẽm trahit,
& adustos humores. vis



eius non modo ad iecur, sed ad venas permeat, quare sanguinẽ expur-
gat. ineditur elephantiasi, carcinomatibus, lichenis, & ceteris cutis
infectionibus: quin etiam omnibus ferẽ morbis ex viscerum infarctu
prouenientibus: vëtriculũ, iecur, lienem, & cetera interna viscera ro-
borat, biliosasq; finit febres. & quæ à vasorum obstructione excitantur.

FUMARIA altera, Græcis, Καπνὸς ἑτέρας.] Italis, Fumoſterno maggio-
re.] Germanis, *Hol vurtz*, *Endraunſ*
des Weils.

FUMARIA ALTERA.

FORMA.


Matt. Planta est fruticosa, præte-
nera, foliis coriandri, ci-
neracei coloris : flore
purpureo. Radice tube-
rosa, inani, buxco intus
colore : odore aristolo-
chiæ.

LOCVS.

Idem Prouenit in hortis, & se-
getibus hordeaceis, &
propter sepes.

QUALITATES,
ET VIRE.

Radix amara est, & ea om-
nia potest vnà cū her-
ba, quæ altera Fumaria.
Radix ex vino pota, ve-
nenis, & pestilentiæ me-
detur. sudorem, & vri-
nā ciet, & ictericos iu-
uat : semen bibitur ad
diuturna alui proflu-
uia. Radicis farina, ma-
nantiæ quælibet vlcera
exiccat, & mundat.




CENSURA.

Non rectè sentiunt Germani medici, ac pharmacopei, qui hanc plan-
tam rotundam esse Aristolochiam putant. Alij verò pistolochiam.

CORYDALIS, Græcis, Κορύδαλις.] Quibusdam split.] Italis, Coridala.

F V M A R I A C O R Y D A L I S .



F O R M A .

Folia gerit coriandri, sed *Matt.* minora, tenuioraque : caules exiles, compluribus ramusculis : floribus in summitate a- uicularum speciē re- ferentibus : radicibus numerosis, tenuibus, prælongis, ac subalbi- cantibus .

L O C U S .

Prouenit in collibus cul *Idem* tis, & agris .

Q U A L I T A T E S ,
E T V I R E S .

Præstat vniuersa plâta ad *Idem* colicos dolores, siue recens mâducetur, siue sicca in puluerē su- matur ex vino pluri- bus diebus.

Lotus urbana, Græcis, Λοτὸς ἡμέρος.] Italis, Tribolo, seu Trifoglio Ca-
uallino.

LOTUS URBANA.

F O R M A.

Diosc. Caules edit bicubita-
Matt. les, ac etiâ maiores,
rectos, firmos, ramo-
sos, & in his folia tri-
folij pratensis æmula,
leuiter per ambitū de-
ticulata, beneq; olen-
tia: flores edit race-
mosos, tenues par-
uosque luteo colore,
aut albo, odoratosq;.

L O C U S.

Idem. Nascitur in hortis, pra-
tis, agris, & ubique se-
rè locorum.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 7. Vt mediocriter conco-
simp. me. quēdi vim possidet,
sic etiam exiccādi in
caliditatis, frigidita-
tisque cōiugatione,
media quodammo-
do est, & temperata.

V I R E S.

Diosc. Extractus succus, addi-
to melle, oculorum argemas, nubeculasque, ac ceteras caligines
Matt. discutit. ¶ Vsurpatur tota planta vnguentariis, quod odoratam ex
ea faciant aquam, in qua chirothecas macerant, ac lauant.



Lotus sylvestris, Græcis, Λωτὸς ἄγριος.] Italis, Loto saluatico.] Arabibus, Handa choca.

LOTUS SYLVESTRIS.



FORMA.

Foliis prouenit trifolij ^{DIOSC.}
pratenfis, caule cubi- ^{Matt.}
tali, & sæpe maiori,
alis multis (floribus
in capitulis cæruleis,) ^{DIOSC.}
semine fænogræci, sed ^{Matt.}
longè minore, odore
medicato.

LOCVS.

Plurimum in Lybia na- ^{DIOSC.}
scitur. ¶ Nascitur co- ^{Matt.}
piofum etiam in Boe-
mia.

QUALITATES.

Semen secundi est ordi- ^{Gale. 7.}
nis excafacientium, ^{simp. me.}
habetq; non nihil ab-
sterforium.

VIRES.

Vitia cutis in facie, macu- ^{DIOSC.}
lasque cū melle perun-
cta expurgat: trita per
fese, aut cum malue se

mine, bibitur aptissimè cum vino, aut passo contra dolores, qui
vesicam male habent.

CYTISVS : Græcis, ΚΥΤΙΣΟΣ.] Italis, Citiso.

CYTISVS.

F O R M A.

Diosc. Frutex est albus, in totum ut Rhamnus, ramos spargens cubitales, & maiores, in quibus folia fænogreci, minora, dorso medio prominente: Ea digitis trita, erucam olent, gustatuque ciccer recens sapiunt.

L O C V S.

Matt. Nascitur sponte in Capania propè Neapolim.

F A C U L T A T E S.

Gal. 7. sim. med. Folia digerendi facultatem obtinent, aque temperatæ mistam, si cut & maluæ folia.


V I R E S.

Diosc. Folia refrigerant, tumores inter initia discutiant, si cum pane tria illinantur. Decoctum potum, urinam ciet: non nulli, quod apes alliciat, prope alucaria ferunt.



MYRIOPHYLLUM, Græcis, Μυριοφύλλον.] Italis, *Myriofillo*.

MYRIOPHYLLUM.



FORMA.

Myriophyllum, siue mille- *Matt.*
folium, cauliculus est te-
ner, singularis, vnica ni-
xus radice, plurimis fo-
liis, leuibus, feniculo si-
milib⁹, caulis flauescit,
varius, ac veluti ex in-
dustria deliniatus.

LOCVS.

Nascitur in palustribus. *Idem*

QUALITATES.

Vsque adeo desiccatoriæ
est facultatis, vt vulne-
ra glutinet.

VIRES.

Vulnera recentia ab inflā-
matione vindicat, si vel

viride, vel siccum; ex aceto oblinatur. præcipitatis in potu cum a-
qua, & sale datur.

MYRIOPHYLLVM ALTERVM.

Si quis hanc Myriophylli
plantam, cuius hic ima-
go visitur, is facile My-
riophyllū Dioscoridis
esse consentiet. & præ-
sertim cū in palustri-
bus nascatur.



MYRRHIS, Græcis, Μύρρις.] Italis, *Mirrader*.

MYRRHIS.



FORMA.

Simillima est cicute, cau- DIOSC.
le, foliisque: radix ei
oblonga, mollis, rotun-
da, odorata, cibo non
insuavis.

LOCVS.

Nascitur in hortis, & a- Idem
liis cultis locis.

QUALITATES.

Radicem habet odoris iu Gale. 7.
cundi, & dulcis: exal sim.med.
facit ordine secundo,
adiuncta quadam par-
tium tenuitate.

VIRE.

Radix in vino pota, pha- DIOSC.
langiorū moribus au-
xiliatur: cit menses,
partus, & secūdas, pur-
gatque à puerperio fœ-
minas: subuenit & ta-
bidis cocta in sorbitio-
ne. Aiunt quoque ean-
dem bis die, teruè po-
tam ex vino, in pestilē-
tia salutarem esse. & ne
morbi contagia sentiā-
tur obstare.

CENSURA.

Non desunt, qui vulgare Cerofolium Myrrhim faciant. verū cum
caulis cicute non sit, nec radice vsus, sed foliorum: iis profecto
subscribere nequeo.

ANGELICA, Italis, *Angelica*.] Germanis, *Angelic*.] Gallis, *Angelique*.

ANGELICA.

G E N E R A .

Matt. Duum est generum, sativæ, & sylvestris.

F O R M A S A T I V Æ .

Idem Caulem edit geniculatum, cubitalem altitudinem excedens, inanem: multis alarū cauis: folia oblonga per ambitum serrata, umbellā magnam, albis floribus refertam: semine tenui, lētis modo compresso: Radice crassa, complurimis adnatis fibris longis, nigricanti colore, eximio odore præditis, sapore acri ac subamaro.

L O C V S .

Idem Seritur, coliturque in Germania in campis, præsertimq; in Misnia, & Saxonia.

Q U A L I T A T E S .

Idem Radix cuius est usus, acris est, atque amariuscula. Quare manifestò excalfacit, & siccatur, ordine secundo completo, aut tertio incipiente: proinde aperit, attenuat, discutit, penetrat, incidit, & flatus pellit.


V I R E S .

Idem Radix venenis mirificè aduersatur, manditur aduersus pestilentie contagia: per se sumpta, pituitosos, lētosq; humores digerit, & cruditates concoquit: Idem præstat radice decoctum, & tussicibus ex frigore, celeriter auxiliatur: Eodem epoto dissoluuntur sanguinis grumi: Radicis farina datur vtiliter in omnibus frigidis affectibus. valet ad rabiorum; & venenatorum morsus; tam intus sumpta, quàm exterius cum ruta imposita. māsā, & dentium cauis indita, dolores sedat. Anhelitum adeò commendat, ut præsumpti alli odorē facilè occultare valeat.



ANGELICA sylvestris : Italis, *Angelica saluatica.*] Germanis, *Vuild Angelica.* Gallis, *Angelique sauvage.*

ANGELICA SYLVESTRIS.



FORMA.

Pumilior est omnib⁹ suis *Matt.* partibus, sed viribus longè præstantior: Radicem profert minorè, paucis fibris, quæ secta liquorem subuiren-
tè mittit, acerrimi gustus, & qui lachrymas cient.

LOCVS.

Nascitur plurima in altis *Idem* simis mōtibus, in pratis, & pascuis, amœnis locis.

QUALITATES.

Cum acerrimi sit gustus, *Idem* longè valentius, quàm domestica excalfacit, & siccatur. Quare ad quarti ordinis principium accedit.

VIRES.

Omnia præstare potest, quæ domestica, sed longè valentius. cæterùm non adeo copiosius ea vti præstabit, quòd nimis corpus accēdat. mansa enim os, linguam, & fauces maximè vrit, atque inflamat.

PSEUDOMYAGRUM, Italis, *Miagro falso*.

PSEUDOMYAGRUM.

FORMA.

Matt. Caulem edit cubitalem, ramosum: & folia, quę in eis sunt, glasti, aut thlaspi quadātenus similia: floribus in summitate albis, tenuibusque: semine paruo, dulci.

LOCVS.

Idem Nascitur in campis inter linum, & frumenta.

QUALITATES.

Idem Modicè excalfacit: atque humectat.

VIRES.

Accedit omnino ad sesami vires semen: paratur pariter ex eo oleum, ad similes facultatis. Id auxillis gratissimum.



CIRSIVM, Græcis, Κίρσιον.] Italis, *Cirsio*.

CIRSIVM.



FORMA:

Caulis est tener, triangul- diosc.
laris, bicubitalisq; ab
imo foliis rosę speciem
referentibus, angulis
spinosis, per intervalla
mollibus. Folia ei bu-
glosso similia, lōgiora,
subcādida, modicē hir-
suta, per extremitates a-
culeata: cacumen cau-
lis orbiculatum, hispi-
dum, in quo capitula
in summo purpurea,
quæ in lanugines sol-
uuntur.

LOCVS.

Nascitur vliginosis locis.

ET VIRES.

Radix laborāti loco adal- Matt.
ligata, dolores varicum
sanat.

ASTER Atticus, siue Bubonium. Græcis, Ἀστὴρ ἀττικὸς.] Arabibus, *Astaraticon.*] Italis, *Asteratico.*] Germanis, *Sternkraut.*] Gallis, *Petite espargoutte, seu petit Mugue.*] Vergilio, *Amellus.*

ASTER ATTICVS.

FORMA.

Matth. Caules ab radice mittit rectos, solidos, ac lignosos, colore fusco lutescente: è quibus circa cacumen ramuli oriuntur tenues, in quorum summitate flores spectantur, vt in Anthemide, & Belli: sed in medio lutei, & per ambitum purpurei. Folia profert oblōga, oliuæ figura, minora tamē, aspera, hirsuta, nigricantia, aspero sapore, ac sub-amaro, radicem habet multifidā, odore rō ingrato. LOCVS.

Idem. Nascitur in asperis, incultis, collibus, & conuallibus.

QUALITATES.

Gale. 6. sim. me. Miste est facultatis, vti rosa, verum id non adstringit.

VIRES.

Diosc. Feruenti stomacho, oculorum inflammationib⁹,

prociduæ sedi, ac inguinibus illita auxiliatur: tradunt quoque purpureum in flore, si ex aqua bibatur, anginis, & pueris comitialibus, opitulari. Herba ipsa recens illita, inguinum bubones, inflammationesq; curat. Cum veteri axungia tusa, imponitur vtiliter rabiosorum canum moribus: & incensa serpentes fugat.

Cratena



ASTER ATTICVS ALTER.



F O R M A .

Visitur facies , ex iconē
 suæ ipsius plantæ: nos
 tamen eam delinean-
 dam duximus , vt e-
 tiam aliorum possit ef-
 se iudicium : cæterum
 nos priorem omnino
 probamus. Et præfer-
 tim cum in huius flo-
 re nihil purpurei ha-
 beatur.

STELLARIA, siue pes Leonis, siue Alchimilla. Italis, *Stellaria*.] Germanis, *Synnauu*.] Gallis, *Pie de Lyon*.

STELLARIA.

F O R M A.


Matt. Foliis prouenit maluæ similibus, robustioribus tamen, ac magis carinatis, octonis circūquaque angulis. Et per ambitum dēticulatis adeo, vt patefacta, stellę imaginē referāt: caulis ei tenuis, semicubitalis, lanuginosus, à quo cōplures exeūt rami, in quorū summo flores emergunt subpallidi, tenues, stellarum effigie. Radice coheret digitali crassitudine, sapore adstringenti.

L O C V S.

Idem Prouenit in montibus, in pratis, & pascuis.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem Exiccat, cohibet, atq; conglutinat: pota efficax est ad interna vulnera. quin etiam externa illita glutinat. Aridæ farina in sui ipsius decocto hausta, enterocellis medetur. Conceptū adiuuat, & steriles fœcundas reddit hausta continuis viginti diebus cochlearis mensura ex vino, vbi præsertim sterilitas, ab vteri humiditate prouenerit. quare datur quoque vtiliter ad alba vteri profluvia.



ISOPYRUM, Græcis, Ισώπυρον.

ISOPYRUM.

FORMA.

Foliis est aniso simili- DIOSC.
bus : capitula sunt in
summo caule tenuia,
plena seminis, melan-
thij gustum imitan-
tis.

LOCVS.

Nascitur in campis, & a- Matt.
pricis collibus.

FACULTATES,
ET VIRE.

Bibitur semen cōtra tuf-
sim, & cetera pectoris
vitia ex aqua mulsā,
quin etiam ad Epati-
cos, & sanguinem ex-
creantes .



Viola purpurea, Græcis, ἰὼν πορφυροῦν.] Arabibus, *Seneffige*, *Sonofrig*, seu *Benefesegi*.] Italis, *Viola*, & *Viola mammola*.] Germanis, *Merzen violen*.] Hispanis, *Violetta*.] Gallis, *Violette*.

V I O L A P U R P U R E A.

F O R M A.

Diosc. *Viola purpurea* foliū habet hederamaius, tenuius, ac nigrius, nec multo dissimile, cauliculus à radice medius prodit, in quo flosculus suavisimè olens purpureus.

L O C V S.

Diosc. Opacis, & asperis nascitur [propter sepes, & secus itinera.

Mitt.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 6. Folia aqueam, & subfrigidam substantiam superantem possident.

sim.med.

V I R E S.

Diosc. Refrigerandi naturam habet. Illinentur folia per se, aut cum hordeacea farina aptissimè stomacho æstuanti, & oculorum inflammationibus, seditque procidenti. [Refrigerant, & humectant ordine primo, sed sicce minus. Humiditas, quæ superflua recentibus inest alium emolliendo ciet, sicce verò deiectionis sunt facultatis, non quòd emolliat, sed quòd dissoluant. In summa soporifera sunt, calidos dolores mulcent, inflammationes extinguunt, leniunt, & solvunt. Bilem educunt, eiusque feruorem mitigant, conferunt capitis doloribus, quos caliditas excitauit; somnum conciliant. Pectoris, & tracheæ arteriæ scabriciem leniunt. Medenturque anginis, & columnellæ vitiis. Præcipuo autem auxilio sunt pectoris, & lateris inflammationibus, sitimque arcent.

Mesue



VIOLA arborescens. Italis, *Viola arborea*.

VIOLA ARBORESCENS.



F O R M A.

Crescit hæc duorum cu- *Math*
bitorū altitudine, plu-
ribus ab vna radice su-
blatis caulibus, in qui-
bus folia violę purpu-
reæ angustiora, per am-
bitum denticulata, at-
que paribus, interual-
lis distincta, flores e-
dit purpureos, con-
solidæ regalis vocatæ
haud absimiles, odore
purpureæ violę.

L O C V S.

Nascitur in Baldo monte *Idem*
in agro Veronensi.

IACCEA, seu herba Trinitatis. Italica, *Iaccaea*, seu *Minuti pensieri*.] Germanis, *Freyssam kraut*.] Gallis, *Penseés*, aut *Mennes penseés*.

Trifolium *summe*.

IACCEA, SIVE FLOS TRINITATIS.

GENERA.

Matt. Duum est generum, Maior, & Minor.

FORMA MAIORIS.

Idem. Foliis exit primo exortu rotundis, per ambitum serratis, quæ tamè per incrementum in longitudinem protèduntur. caulibus constat triangularib⁹, quadatenus striatis, inanibusque, quibus genicula supereminèt paribus intervallis, è quorū alii ramusculi exoriuntur, à quibus flores exeunt violæ purpureæ magnitudine tribus referti coloribus. Sunt. n. superne purpurei, in medio cædidi, & ima parte lutei, sed penitus in odori. LOCUS.

Idem. Nascitur in campis, & passim feritur in hortis, & viridariis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem. Sunt qui hanc ad enterocellam pollere credant, atq; egrè spirantibus, & pulmonum inflammationibus opem ferre, quin etiam scabiem sanare, & cetera cutis vitia delere.



IACCEA, siue herba Trinitatis altera. Italis, *Iaccea*, seu *Minuti pensieri minori*.

IACCEA ALTERA.



FORMA.

Crescit hæc minoribus, ac *Matt.* breuioribus tū foliis, tum floribus, qui tamē non tribus, sed duobus tantum constant coloribus, candido videlicet, & lutescente.

LOCVS.

Nascitur pariter iisdem in locis, & feritur in hortis.

BUGLOSSVM, siue Borrage, Græcis, βούγλωσσον.] Mauritanis, *Lisenalt liaur*, siue *Lesenalthaur*.] Italis, *Borrachine*.] Germanis, *Burretsch*.] Hispanis, *Borraia*.] Gallis, *Borrache*.

BUGLOSSVM, SIVE BORRAGO.

FORMA.

Matt. Foliis exit latis, atq; oblongis, asperis, eminentibus vbiq; bullis, tenuissimis armatis cu-
leis, qui totam plātam hispi-
dam ac rigidam reddunt, acu-
leato vndecunque ambitu. Caule est cubitali, & quan-
doque maiori, pingui, conca-
uo, aculeis vbiq; scatente, ra-
mis multis brachiato, flori-
bus in stellæ modum radian-
tibus, cæruleo colore, & quā-
doque candido, nigro è me-
dio prominente apice, semi-
ne nigro, striatoque.

LOCVS.

Idem Nasquitur per se passim in hor-
tis.

QUALITATES.

Gal. 7. Humidæ, calidæque temperiei
sim. med. est. Itaque vinis iniectum læ-
titiæ, ac hilaritatis causa esse
creditum est. Sed & his qui
ob faucium asperitatem tuss-
sunt, coctum in mellicrato
conuenit.

VIRES.

Diosc. Herbari abscessibus vtilem esse
Matt. volunt. § Herbe, & radici vis
sanè magna est, quinetiam &
floribus ad animi deliquiū,
& ceteros cordis affectus, at-
que melancolicos morbos, &
præsertim eorundem deco-
ctum ex vino, aut ex aqua pa-
ratum. Succus foliorum potus valet, contra lethalia pharmaca, & venenosorum
animalium ictus. Stillatitia totius plantæ aqua delitiis, quæ cum febre fiunt mirifi-
ce subuenit, quin etiam oculorum inflammationes mulcet, tam interius, quàm
exterioribus imposita.



BVGLOSSVM vulgare, Italis, *Buglossa*.] Germanis, *Ochsenzung*.] Gal-
lis, *Buglose*.

BVGLOSSVM VVLGARE.



G E N E R A .

Duo eius sunt genera, *Matt.*
Hortense, quod maius,
& minus est, & sylue-
stre quod pariter duas
habet species. Altera q-
dem minori hortensi si-
milis, Altera flore ni-
gro.

FORMA HORTENSIS.

Folia profert longa sym- *Idem*
phyti maioris modo,
hirsuta, aspera, hispida-
que, tenuissimis aculeis
scatentia, caule sesqui-
cubitali, rotundo, robu-
stoque, hispido, ac pun-
gente, à quo rami com-
plures exeunt sursum
spectantes, in quorum
summis partibus flores
emicant purpurei bor-
raginis minoribus, se-
mine nigro. Radix illi
est borraginis, crassior,
& carnosior, lētore quo-
dam prędita, ac crassio-
ri, pinguioriq̃ue libro,

Minor autem folia oblonga profert, sed longè angustiora, breuiora-
que, hirsuta, sed aculeis vacantia, cætera similia sunt.

L O C V S .

Seruntur passis in hortis.

Idem

Q V A L I T A T E S , E T V I R E S .

Eadem omnia præstare possunt, quæ Borrago.

Idem

BVGLOSSVM alterum sylvestre flore nigro: Italis, *Buglossa saluatica*
del fior negro.

*Wild oxlipington with flowers
blimy.*

BVGLOSSVM ALTERVM SYLVESTRE
FLORE NIGRO.

FORMA.

Matt. Foliis crescit breuiori-
bus, incanis, minime
aculeatis, caule cras-
so, pilosoque, ac sub-
aspero, floribus cete-
ris generibus simili-
bus, sed nigris. Radi-
ce digitali crassitudi-
ne, lenta, ac dulci. Ex-
tat & aliud sylvestris
genus hortensi mino-
ri per omnia simile,
sed in omnibus agre-
stius.

LOCVS.

Idem Nascuntur in campestri
bus.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem Viribus iisdem pollent,
quibus ambæ horten-
sium species.



CYNOGLOSSVM, seu lingua canina, Græcis, Κυνόγλωσσον.] Italis, Cino-
glossa, & Lengua di Cane.] Germanis, Hundszung.

CYNOGLOSSVM.

F O R M A.

Folia, Latifoliæ plantagi- diosc.
nis habet, arctiora, mi-
nora, lanuginosa, cau-
le vacat, & humi ster-
nitur.

L O C V S.

Prouenit in sabuletis. Idem


Q U A L I T A T E S.

Refrigerat, & siccatur. Matt.

V I R E S.

Folia cū suillo adipe ve- diosc.
teri medentur morfi-
bus canum, alopeciis,
& ambustis. Herbe de-
coctum ex vino po-
tum aluum emollit.

¶ Folia recentia medentur imposita tibiæ ulceribus. Matt.



CYNOGLOSSVM vulgare, Italis pariter Cinoglossa, seu Lingua canina.

Sin gnamo Cynidibung

CYNOGLOSSVM VVLGARE.

FORMA.

Matt. Folia edit lata, longa que hortenſis, ac maioris bugloſſi modo, numeroſa ab vna radice prodeuntia, tactu ſubſpera, ac piloſa, caulẽ cubitalem, teretem, robuſtũ, ac pariter ſubſperum, & à medio ramoſum, flores purpurcos Echij emulos, è quibus parua prodeunt lappe, aculeo quodã è medio prominente, magno nature artificio, quẽ matureſcentes veſtibus pertinaciter adherent.

LOCVS.

Idem Nascitur paſſim, ferẽ vbi que, ſecus vias, & in agrorum marginibus.

QUALITATES.

Idem Maniſeſto refrigerat, & ſiccatur.



VIRE.

Folia recentia imposita mirum in modum vulnerum inflammationes arcent, ac etiam alias quascunque.

N O M I N A .

CYNOGLOSSVM VVLGARE
FLORIDVM.



PHYTEUMA, Græcis, φύτευμα.] Italis, Phiteuma.

ΣΑΡΑΠΕΔΩΝ.

PHYTEUMA.

FORMA.

Diosc. Folia habet struthij minora, copiosum semē, perforatum, radicem parvam, tenuem, per summa terræ nitentē.

LOCVS.

Matt. Nascitur in mōtibus, & aliis quoque locis.

VIREs.

Idem— Ad amatoria tantum hāc herbam præstare Dioscor. scribit.



LEONTOPODIUM, Græcis, ΛΕΟΝΤΟΠΟΔΙΟΝ.] Italis, *Leontopodio*.

LEONTOPODIUM VERVM.



F O R M A .

Duum digitorum herbula est folia ferens angusta, longitudine ternū, Diosc.
quaternūve digitorum, hirsuta, quæ iuxta radicem lanosiore flocco
canescunt. Capitula in summo caule quasi perforata. Flores nigri,
semen vsque adeo spissa lanugine inuolutū est, vt sæpe fallat. Radice
parua coheret.

L O C V S .

Nascitur in montibus.

Matt.

V I R E S .

Idem

Hanc tradunt appensam ad amatoria prodesse, & tubercula discutere
prodidit Diosc.

G g g

HIPPOGLOSSVM, Græcis, ἵππογλωσσον.] Italis, Bislingua, siue Bonifacia.] Germanis, Zäpfflin kraut.] Hispanis, Lengua de Cavallo.] Gal-
lis, Bislingua. *Wüstenblatt.*

HIPPOGLOSSVM.

F O R M A.

Matt. Frutex est foliis rusci maio-
ribus, polygonati simili-
bus, secundum longitu-
dinem frequenter stria-
tis, è quorum medio li-
gulæ quædam foliosæ af-
surgunt, sub quibus ru-
bentes exoriuntur bacce,
vt in rusco. Radicem ha-
bet albam, geniculatam,
ac duram.

L O C V S.

Idem. Nascitur in syluosis, mon-
tibus.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Diosc. Capitis dolorem, corona ex
comis imposita minuit.
Matt.

§ Datur radix vtiliter ad
omnes vteri affectiones,
& præsertim præfocatis
ab vtero mulieribus, co-
chlearis mēsurā. Est quo-
que ad puerorum ente-
rocellas præstātissimum

auxilium si diutius radicis pulvis sesquidrachmę pondere quotidie
ex maioris symphiti decocto propinetur.



ANTIRRHINVM, Græcis, Αντίρρινον.] Italis, *Antirrino.*] Germanis, *Orantisterch kraut, seu streich kraut.*] Hispanis, *Cabezza de ternera.*] Gallis, *Mouron violet.*

A N T I R R H I N V M .

G E N E R A .

Quatuor nos obseruauimus genera, quorum facies ex sequentibus iconibus patebunt. *Matt.*

F O R M A .

Foliis omnes sunt oblōgis, *Idem* in altero latioribus, in altero verò angustioribus, caulibus ramosis, floribus in quibusdā purpureis, in ceteris verò cādidis. Semen proferūt minutum nigrūque, receptaculis quibusdā inclusum, quę vitulorum capita per quàm bellè referunt.

L O C V S .

Nascitur in aruis, & in collibus. *Matt.*

Q U A L I T A T E S .

Ad sanationes inutile est. *Gale. 6.*
Ipsū adsimilis est cum *sim. med.*
Bubonis facultatis.

V I R E S .

Tradunt perunctos huius semine ex oleo vetustiores fieri, nec vllō medicamento lēdi posse, si quis appensum gestet. Quin etiam principum gratiam sibi conciliari posse putant hoc tantum amuleto. *DIOSC. Matt.*

ANTIRRHINUM II.



ANTIRRHINUM III.



A N T I R R H I N V M I I I I.



ADIANTVM, Græcis, Ἀδίαντον.] Officinis, *Capillus Veneris.*] Arabibus, *Borsceguascen*, seu *Bersausan*, seu *Chulbare albir.*] Italis, *Capel venere.*] Germanis, *Frauen har.*] Hispanis, *Culantrillo de pozzo.*] Gallis, *Capil Venere.*

ADIANTVM.

FORMA.

Pusilla gerit folia coriandri similia, in summo incisuris diuisa, cauliculi quibus exoriuntur, nigro colore nitent, validi, pretenues, palmum alti, radice superuacua, neq; caulem, neq; florē, neque semen gerit. DIOSC.

LOCVS.

Vmbrosis, & palustribus, circa parietum aspergines, & fontium specus enascitur. Idem

QUALITATES.

Adiantum in caliditate quidem, & Gal. 6. frigiditate symmetrum est, verum simp. me. desiccatur, & extenuatur, & discutit.

VIRES.

Decoctum herbe potum prodest difficulter spirantibus, suspiriosis, lienosis, felle suffusis, & vrinae angustis, calculos frangit, aluum sistit, serpentium moribus auxilio est, contra stomachi fluxiones in vino bibitur. Menses, & secundas ciet, sanguinis reiectiones inhibet. Illinitur recens contra serpentium morsus. Alopecias densat, strumas discutit. Furfures, & manantia capitis vlcera ex lixiuio emendat, cum ladano, & myrtho oleo defluentes capillos continet. Idem præstat eius decoctum ex vino, & lixiuio paratum. coturnices, & gallinaceos pugnatiores facit in cibis eorum additum. DIOSC.

lem, & pituitam deiecit, crassaq; excrementa, quæ diu in interioribus inhesere, sanguinem clarificat, animam dilatat, & iecur, & ventriculum purgat præsertim si obstructione laborent. Decoctum eius foeminas à partu purgat. Eius cinis agilopas curat. Diluti libra epota commo- Mesue

TRICHOMANES, Græcis, Τριχόμανες.] Officinis, *Polytricum*.] Italis,
Politrigo.] Germanis, *Stain brech*.] Hispanis, *Politrigo*.] Gallis,
Polytricen.
Windmuffen

TRICHOMANES.

F O R M A.


Diosc. Est filici simile, sed exilius,
 foliis lenticulæ, tenuibus,
 in ordinem vtrinque di-
 gestis, in se aduersis, ra-
 mulis tenuibus, acer-
 bis, subnigris, pelluci-
 disque.

L O C V S.

Idem Nascitur eisdem in locis
Matt. quibus Adiantum, &
 præsertim in puteis, &
 antiquis parietibus.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Diosc. Eadem quæ Adiantū præ-
 stare posse constat.



XANTHIVM, Græcis, Σάνθιον.] Italis, *Lappa minore*.] Germanis, *Betlers Leijßz*, seu *Spitz kletten*.] Hispanis, *Lappa menor*.] Gallis, *Petis Gloutteron*, seu *Grappellas*.

XANTHIVM.



F O R M A .

Caule exit cubitali, angu- Diosc.
loso, pingui crebris ex
eo prodeuntibus alis .
Folia habet atriplicis ,
insecta, nasturtium odo
re imitantia, fructū grā-
dis oliuæ modo, & vt
platani pilula aculeatū,
qui cōtactu vestibus ad
hærescit .

L O C V S .

Nascitur lætō solo, & pin- Idem
gui, & lacubus exicca-
tis .

Q U A L I T A T E S .

Fructus discutiendi vim Gale. 8.
obtinet. sim.med.

V I R E S .

Fructus flauos facit capil- Diosc.
los, si acetabuli instar te-
pida aqua madescat ,
mox caput nitro ante
perfriktū illinatur. Alij

in vino tundunt, & ita asseruant. Semen aptissimè tumoribus im-
ponitur.

ÆGILOPA, sine festuca, Græcis, αἰγίλωψ.] Arabibus, *Dausir*, *Dauser*,
sine *Dafer*.] Italis, *Egilopa*, sine *Orzo saluatico*.

ÆGILOPS, SIVE FESTUCA.

FORMA.

Diosc. Folia habet tritici, sed
molliora, in summo
capite semina bina,
ternave, rubra, qui-
bus aristæ quasi capil-
laceæ exeunt.

LOCVS.


Matt. Nascitur in agris inter
segetes.

QUALITATES.

Gale. 6. Digerendi vim possidet
sim. mè. id quod ex gustu pa-
ter. leniter enim est
acris.

VIRE.

Diosc. Herba cum farina illita,
ægilopis medetur, du-
ritias discutit. succus
farinæ admixtus sicca-
tur, & eorundem gra-
tia reponitur.



ÆGILOPS altera, Italis, *Vena Vana*.] Ananienfibus, *Squala* .

ÆGILOPS ALTERA.



POLYGALA, Græcis, Πολύγαλον.] Italis, Poligala.

POLYGALA.

FORMA.

Diosc. Palmi altitudinē petit,
foliis Lenticulæ, gu-
stu adstricto.

LOCVS.

Matt. Prouenit in collibus a-
pricis, & incultis lo-
cis.

VIREs.

Diosc. Pota lactis abūdantiam
facit.



OSYRIS, Græcis, ὄσυρις.] Italis, pariter, & Hispanis, *Linaria*.] Germanis, *Harnkraut*.] Gallis, *Linaire*.

Unter fraiem gar
O S Y R I S.

F O R M A.

Frutex est niger, ramulos ^{DIOSC.}
ferens tenues, lentos,
fractuque contumaces,
& in his folia quater-
na, quina, senave, ceu li-
ni, nigra in initio, dein-
de colore mutato rube-
scentia.

L O C U S.

Nascitur ferè vbique in *Matt.*
campis, & agrorum ag-
geribus.

Q U A L I T A T E S.


Amara illi inest qualitas, *Gal. 8.*
& obstructions expe- *simp. me.*
diendi facultas, quare
& in iocinore, consistē-
tes obstructions adiu-
uat.

V I R E S.

Decoctum eius potum in ^{DIOSC.}
uat arquatos.

A P P E N D I X.

Tametsi hoc loco *Linarię* herbæ vulgo vocatę imaginem appinimus
vulgum secuti, non ob id tamen ipsam legitimam *Osyridē* facimus.



SMILAX aspera, Græcis, Σμίλαξιραχέα.] Italis, Rouo ceruino, siue Hederæ spinosa.] Germanis, Scharpffe vüinden.] Gallis, Tan, siue Smilax aspre.

F O R M A .

S M I L A X A S P E R A .

Diosc. Folia habet Periclymeni,
Matt. aut hederæ, aculeato
dorso, sarmēta tenuia,
multa, rubi, aut paliuri
modo aculeata. Arbo-
res scandit ab imo ad
summum perreptans,
seſe conuoluēs eis. Fru-
ctū habet racemofum,
qui maturus rubescit,
gūſtuque leuiter mor-
det. ¶ Clauiculis plena
eſt, quibus arboribus
ſe circunvoluit.

L O C V S .

Gal. Nascitur in paluſtrib⁹, &
Matt. aſperis. ¶ Ac etiam in
Syluis.

Q U A L I T A T E S .

Gale. 7. Folia guſtata aliquid ha-
fimp. me. bent acrimoniæ, & alio
qui ſi illis vtariſ calefa-
ciunt.



V I R E S .

Diosc. Folia, & acini, ante, & poſt epoti venenorum antidota ſunt. Tradunt
ſi infantibus nuper in lucem editis, quid ex his tritum propinetur,
nulla poſtmodum venena nocitura. Admiſcentur quoque & Ale-
xipharmacis.

ZARZA, seu salsa parilla, Italis, *Salsa pariglia*.] Hispanis, *Zarza parilla*.

ZARZA PARILLA.

FORMA.



Facie tota asperâ similacê *Matt.*
æmulatur, nisi qđ sar-
mēta aculeata nō sunt,
& folia paulò minora,
sed dorso minime acu-
leato. L O C V S.

Afferret ex India occidenta- *Idem*
li. QVALITATES.

Excalfacit, siccatur, atte- *Idem*
nuat, aperit, refoluit, su-
dorem prouocat.

VIRE S.

Radicū decoctū potum *Idem*
quadraginta diebus tā
mane quā vesperi sex,
aut septē vnciarū pōde-
re morbū gallicū mirifi-
cè curat, & p̄sertim vbi
papulæ, vlcera, ac tumo-
res p̄duri affuerint, sed
à potu sudorē prouoca-
re cōuenit, nā vbi mor-
bus in ambitu corporis
est, mirificè operatur,
adeò vt Guaiaco sit prę-
stantior. Quare sanat
quascunque cutis infe-
ctiones, nempe vitiligi-
nes, serpigines, alphas,

atque lichenās. Videtur quoque proprias habere facultates ad frigidos omnes cerebri morbos. Quinetiā pręstat ad salsas, acresque capitis fluxiones, ad cācros non vlceratos, ad omnes præduros tumores, qui egrè discutiuntur. Strumas quoq; mirificè curat, si contritę radicis pulvis semidrachmæ pondere cum tantundē radicis pulueris, quotidie quadraginta diebus propinetur ex albo, & dulci meraco. Curat eodē modo sumpta etiam Lienis induratos tumores.

SMILAX lævis, Græcis, Σμίλαξ λεῖα.] Italis, Vilucchio maggiore.] Germanis, *Viinden*, aut *Zauugloeklim*.] Hispan. *Correguela maior*.] Gal-
lis, *Liset*, seu *Campanette*.

F O R M A.

Diosc. Folia Hederæ similitudinē habent, molliora, leuiora, tenuiora, sarmenta habet asperæ smilacis similia, sed nullis spinis horrentia, conuoluitur arboribus, vt prior. fructum parit lupini modo nigrum, exiguum, floribus in cacumine perpetuis, multis, rotundis, folia per autumnū decidua sunt.

L O C V S.

Idem. Nascitur prope arbores quibus conuoluitur.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 7. Facultate quodāmodo prædictæ similis est.
sem.med.

V I R E S.

Diosc. Semine cum dorycnio potro ternis singulorū obolis, varia, & tumultuosa in somnis obuersari traduntur.

S M I L A X L Æ V I S.



C E N S V R A.

Non ausim ego affirmare an hæc planta legitimam smilacem læuē referat.

LUPULVS, Italis, *Lupolo*, *Bruscandolo*, seu *Forancefo*.] Germanis, *Hopffen*.] Gallis, *Houblon*.

LUPULVS.



G E N E R A.

Duum est generum. *Satium*, *Matt.*
& sponte proueniens, at facie
inter se non differunt, præter-
quam magnitudine, & exili-
tate.

F O R M A.

Planta est arbores scandens, & *Idem*
contextendis pergulis aptissi-
ma, foliis vitigineis, brionæ
modo diuisis, asperis cucume-
ris modo. Sarmēta habet præ-
longa, aspera, hirsuta, & qua-
dātenus aculeata. Flores edit
subpallidos, racemososq; &
folliculos numerosos, exiles,
compactili quadam serie de-
pendentes, in quibus atrum,
& amarum concluditur se-
men.

L O C V S.

Satium Germanis colitur in *Idem*
campis, syluestre in sepibus,
& frutetis sponte nascitur.

Q U A L I T A T E S.

Lupuli flores, folliculi, ac radi- *Idem*
ces excalfaciunt, siccant, exte-
nuant, aperiant, abstergant,
expurgant, sanguinem munda-
nt. Atqui turiones cū plus
humiditatis habeant parum
quidem tum excalfaciunt,
tum siccant.

V I R E S.

Turiones aluū emolliunt in ci- *Matt.*
bum sumpti, vbi prius probè

fuertintelixi. Florum, & folliculorum decoctum datur potandum cōmodè contra
hausta venena, scabiem, Gallicam luem, ac ceteros quosque affectus, qui extimā cu-
tim inficiunt. Datur idem contra diutinas febres ab infarctu prouenientes. Semen
tritum, & potui datum semidrachmæ pondere interaneorum animalia necat. men-
ses prouocat, & vrinam pellit. ¶ *Lupulus flauus*, bilem detrahit.

Mesue

Ruscus, Græcis, Μυρσίνη ἀγρία, & ὀξύμυρσιν.] Italis, Brusco, & Pongitopi.] Germanis, Brussch.] Hispanis, *Ius barba*, & *Gil barbera*.] Gallis, *Brus*.

FORMA.

RUSCUS.

DIOSC. Folium fert myrti, latius, in formā lanceæ mucronatum. Baccæ per maturitatē rubescunt, rotundæ à medio folio dependētes, ossæo intus nucleo. cubitales rami ab radice exeunt, vitiliū modo lēti, fractu contumaces, foliosi; radice graminis simili, acerba, & subamarā.

LOCVS.

Idem. In asperis, & præcipitibus locis nascitur.

QUALITATES.

Matt. Excalfacit radix, siccit, aperit, abstergit, extenuat.

VIRES.

DIOSC. Folia, & baccæ in vino potē vrinam cient, menses pellunt, vesicæ calculos frangunt, stillicidio vrinæ medentur, dolores capitis sanant, & regiū morbum. Decoctum radicis in vino potum eisdem præbet effectus. Cauliculi recentes asparagorum vice in cibo sumuntur; amari autem sunt, sed vrinam mouent.



LAVRVS Alexandrina, Græcis, Δάφνι Αλεξανδρεῖα.] Arabibus, Gar
Alexandriæ.] Italis, *Lauro Alessandrino.*] Gallis, *Laurier Alexandrin.*

LAVRVS ALEXANDRINA.

FORMA.

Folio est Hippoglossi, pat ^{DIOSC.}
 lō maiore, molliore, &
 candidiore, semine in-
 ter folia rubro, ciceris
 magnitudine, ramos
 spargit in terra dodran-
 tales, interdum lōgio-
 res. Radice Rusco simi-
 li, maiore, molliore, o-
 dorata.

LOCVS.

Inuenitur in montosis. *Idem*

QUALITATES.

Temperaturę euidēter est *Gale. 6.*
 calidę, simul & gustan- ^{siup. me.}
 tibus acris, & subama-
 ra.

VIRE.

Difficiles partus accele- ^{DIOSC.}
 rat, radicepota in vino
 dulci sex drachmarum
 pondere, & stillitidio
 vrinæ auxiliatur, sed
 sanguinem extrahit.



LAVRVS ALEXANDRINA ALTERA.



DAPHNOIDES, Græcis, Δαφνοειδές.] Arabibus, *Daphnides*.] Italis, *Laureola*.] Gallis, *Laureole*.

DAPHNOIDES.



F O R M A.

Cubiti altitudine fruticat, Diosc.
ramis flexilibus, obse-
quiosisq; multis à me-
dio sursum versus fo-
lios, cortex supra mo-
dum viscosus ramos ve-
stit, folia lauri, gracilio-
ra, & molliora, fractu
contumacia, quorū gu-
statu os, & fauces incē-
duntur. Flores candidi.
Bacca cum ematurerit
nigra. Radix inutilis.

L O C V S.

Nascitur in montosis. *Idem*

Q U A L I T A T E S.

Est viribus & ipsa perferri *Gale. 6.*
lis Lauro Alexandrinæ. *sim. med.*

V I R E S.

Pituitam extrahit folium Diosc.
recēs, vel aridum in po-
tu. vomitum, & menses
ciet. caput inanit cōmā-

ducatum, sternutamenta mouet. Baccae quindecim potæ aluum resol-
uunt. ¶ Folia recentia contusa illinuntur vtiliter ischiadicis, quousque *Matt.*
ruborem, aut vesicas excitent.

CHAMÆDAPHNE, Græcis, Καμῆδαφνι.] Italis, *Laureola minore*.

CHAMÆDAPHNE.

F O R M A.

Diosc. Virgas emittit cubitales, singulari ramulo constantes, rectas, tenues, læves, folia lauri similitudine, læuiora multò, ac viridiora, semen rotundum, rubens, annexum foliis.

L O C V S.

Matt. Prouenit in montibus, & in syluis.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 6. Viribus & ipsa est Daphnoidis persimilibus.
simp. me.

V I R E S.


Diosc. Trita folia illinuntur capitis doloribus, & stomachi ardores mulcent. Bibuntur cum vino ad sedanda tormina, potus cum vino succus menses, & vrinas ciet. Idem facit pello appositus.



ELLEBORVM, siue Veratrum album. Græcis, Εμβόρος λεῖκος.] Arabibus, Cherbachem, seu Charbechabaid.] Italis, Elleboro bianco.] Germanis, Veis insez vurtz.] Hispanis, Verde gambie blanco, seu Yerua de baleste.] Gallis, Veraire, seu Ellebore blanc.

*non modicum
griseum.*

ELLEBORVM ALBVM.



FORMA.

Folia fert plantaginis aut betæ sylvestris similia, sed breuiora, nigriora, rubescentia, caulem cauum quadrantelem, tunicis cōuolutum, quas abdicat cū arefcere incipit. Radicibus nititur multæ, tenuibus ab oblongo, & exiguo capite copaceo exeuntibus. Floribus in toto fere caule spicatis fuluo colore.

DIOSC.

Matt.

LOCVS.

Prouenit copiosum in montibus, & asperis.

DIOSC.

QUALITATES.

Elleborus vterque tum albus, tum niger extergentis simul & exalfaciētis est facultatis, quamobrē ad alphos, impetigines, scabies, leprasq; accomodi sunt, porro niger gustu calidior est, albus vero amarior.

Gale. 6.
sim. med.

VIRES.

Radix vomitione varios extrahit humores. Menses impositū pellit. Sternutamenta excitat. Mures interficit. Vomitiones concitant subditi ex oleo balani cū aceto. Mortiferum est medicamentū, quod sæpe homines strangulet. Ceterum prisci medici album elleborum propinabāt comitialibus, melācholicis, vertiginosis, insanientibus, lymphaticis, conuulsis, podagricis, resolutis, hydropicis Elephantiacisque, sed iam eius exoleuit vsus, vt in puluere propinetur. Eius autem diluto quamplurimū sine incōmodo vtuntur. Radix in lixiuo decocta pediculos, & lendes necat. Decoquitur in lacte ad muscas perimēdas. Mures quoque necat, & gallinas. Paratur à radicū succo in Hispania venenum quo venatores sagittas illinunt, quibus qui feriuntur breui tempore percunt, nisi cydonia poma vorauerint aut corundem biberint succum.

DIOSC.

Mesue

Matt.

cat, & gallinas. Paratur à radicū succo in Hispania venenum quo venatores sagittas illinunt, quibus qui feriuntur breui tempore percunt, nisi cydonia poma vorauerint aut corundem biberint succum.

ELLEBORVM nigrū, Græcis, *Ελέβορος μελὰς*.] Arabibus, *Cherbachem*, seu *Carbech asued*.] Italis, *Elleboro nero*.] Germanis, *Christ wurzt*.] Hispanis, *Verde gambre nero*, seu *Elleboro*.] Gallis, *Viraire*, & *Ellebore noire*.

F O R M A .

Diosc. Folia ei viridia, plitani similia, minora tamen, subaspera, nigriora, pluribus diuisuris incisa, caulis asper, flores in purpura albicātes, racematis coherētes, semēcnici. Radicibus coheret nigris, tenuibus à capitulo cepaceo cōfibratis. L O C V S .

Idem. In collibus asperis, & siccis locis nascitur.

Q U A L I T A T E S .

Gal. 6. Extergentis simul & excalfacientis est facultatis, est. n. ex tertio ordine excalfacientium, & desiccantium, gustuq; albo calidior habetur.

V I R E S .

Diosc. Ventrem purgat, bilem detrahit, pituitāque. prodest morbis comitialibus, melancholicis, insanientibus, articulariis doloribus, & resolutis. Menses inditū trahit, partus necat, fistulas purgat impositū, & tertia die detractū. Demittitur in aurem contra grauitatem auditus, & vsq; in alterum, aut tertium diem finitur. Scabiē illitū sanat, vitilignes, lepras, impetigines, ex aceto medetur. Dentium dolores collutione mitigat. Imponitur vtiliter hydropicorum ventribus farina hordeacea & vino exceptum.

ELLEBORVM NIGRVM.



ELLEBORVM alterum , Nobis Elleborum fœmina, seu pseudoElleborum.

ELLEBORVM NIGRVM ALTERVM.



FORMA.

Folia gerit digitis nouem *Matt.* ad pediculum vsque dissecta, aconiti Cynoctoni ferè modo, sed longioribus diuisuris , nigricantia, digitis circumquaq; ferratis. Caulem edit vegetum, subasperumque. Flores alterius similes , sed herbaceo colore, aut quadâtenus subpalescêtes, quinque , aut pluribus emergentibus è medio corniculis acuminatis , vtrinq; compressis , in quibus semen continetur . Radicibus coheret numerosis, tenuibus, palmari longitudine , ac per omnia alterius similibus, odore graui, nauseam commouente, sapore amaro .

CENSURA.

Sunt qui putent hanc plantâ Plinij esse Cōsiliginē, cuius sententiæ est clarissimus, ac doctissimus Fra-

castorius, qui etiam eiusdem Plinij Enneaphyllon eandem facit. Verùm nos nec hâc, nec illam esse putamus, quòd nullus sit autor qui ne vna tantū nota consiliginis faciē, & historiam describat, quòdque Plinius nusquam meminerit Enneaphyllon consiliginem latinis vocari, eamque vrentis facit facultatis, & lumborum, coxendicūque doloribus vtilem . consiliginem vero ad Pulmonis tantum morbos valere scribit.

PSEUDOELLEBORVM, Græcis, Ψευδοέλεβορος.] Italis, *Elleboro falso*.

PSEUDOELLEBORVM.

FORMA.

Matt. Assurgit hæc plāta ad duū palmorū altitudinem. Cauliculos emittit tenues, ac molles, folia longiuscula tenuia, Abrotani quadātenus æmula. Flores Buphthalmi, paulo tamen maiores, è quibus capitula prodeunt oblonga, ruborū moris similia. Radicibus cohæret nigris, nigrum veratrum emulātib, tenuioribus tamen, & nigrioribus.

LOCVS.

Idem Plurimū prouenit in Boemia in Pragensi præsertim agro.


QUALITATES,
ET VIRE.

Huiusce plantæ radicibus tum Medici, tum pharmacopei, qui Boemiam incolunt, vtuntur passim pro legitimo nigro veratro, ac priuatim ad suorum pecorum morbos.



OPHRIS, Italis, *Elleboro bianco falso.*] Germanis, *Zuneiblatt.*

O P H R I S .



F O R M A .

Duo tantum hæc folia pro *Matt.*
fert, albi veratri quadā-
tenus similia, inter quæ
caulis erumpit tenuis,
calyculis oblongis par-
uisque refertus, balu-
stiorum effigie, è quibus
flosculi exeunt candidi
paruarum linguarū fa-
ciem referentes. Radice
nititur gracili, complu-
ribus tamen adnatis, al-
ba, & odore præstanti.

L O C V S .

Nascitur in montibus, & *Idem*
in conuallibus.

Q V A L I T A T E S .

Mansa radix glutinosum *Idem*
létorem reddit, subdul-
ci sapore, Quare calida
fuerit, & humida.

V I R E S .

Præfertur vniuersa planta
ad denigrandos capillos, fracturas sanandas, & vulnera glutinanda.

SESAMOIDES paruum, Σησάμειδες μικρὸν, Græcis dicitur.

SESAMOIDES PARVUM.

FORMA.

Diosc. Cauliculos edit dodran-
tales, folia coronopi
minora, hirsutiora, &
in cauliculorum cacu-
mine capitula florum
penè purpureorū, me-
dio eorum albo, semē
sesamæ, fulvum, ama-
rum. Radix tenuis.

LOCVS.

Idem — Nascitur in asperis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem — Semen bilem, pituitam-
que detrahit ex aqua
mulsa potū dimidio
acerabulo, illitum ex
aqua tumores, ac tu-
bercula discutit.



Cucumis sylvestris, Græcis, Σίτος ἄγριος.] Officinis, *Cucumer asininus*.] Arabibus, *Chefe allimar*, *Kate allhenei*, seu *Cheta alhamar*.] Italis, *Comero saluatico*.] Germanis, *Uilder Cucumer*, seu *Esels Cucumer*.] Hispanis, *Cogombrillos amargos*.] Gallis, *Cogombre sauvage*.

CUCUMIS SYLVESTRIS.



F O R M A.

Folia illi sunt satiui cucumeri similia, sed rudiora, hirsutiora, asperioraque, auersa parte subalbicantia. Flores ex alarum cavitatibus, quæ in sarmentis habentur prodeunt aurei, stellarum figura, retro extuberante fructu, satiui cucumeris modo, qui tandem auctus, & oblongus factus, glandis magnitudinem superat, aut dactylos æquat. Is hispidus adeo est, ut quasi aculeatus sentiat, qui maturus factus candidat, & sponte, aut leuiter impulsus non sine impetu, à pediculo disiungitur, & tormenti instar, nigrum, maturumque semen unà cum succo in legentium manus eiacular. Radicem habet dodrantalem, ac etiam longiorē, brachiali crassitudine, candidam, succosam, & insigniter amaram, quemadmodum planta est tota, & fructus.

Matt.

L O C V S.

Nascitur in sabuletis, & ruderibus. DIOSC.
Incultis & viginosis locis. Matt.

Q U A L I T A T E S.

Vniuersa plāta in usu est. Succus summe quidem amarus est, leuiterque calidus, ut ex secundo sit ordine ex calfacientium. Digerendi etiam vim possidet & subtilium est partium. Radix similem succo facultatem obtinet. abstergit namque, digerit, & emollit. Porro cortex ea potentius desiccatur.

Gale. 8.
sim. me.

V I R E S.

Instillatus foliorum succus aurium dolori conuenit. Illita ex polenta radix veterem omnem tumorem discutit. Imposita cum Resina terebinthina, tubercula rumpit, Is-

DIOSC.

chiadicis infunditur. Arida farina impetigines, lepras & vitilignes abstergit nigris cicatricibus colorem reddit, & maculas in facie delet. Radicis succus sesquioboli pondere, & item cortex acetabuli quarta parte bilem, pituitamque deliciunt, præsertim in hydropicis. Deiectiones autem extra stomachi iniuriam mouet. Elaterium vero est fructuum succo paratum menses ciet, partus enecat in pectore subditum, naribus cum lacte infusum morbo regio medetur, & diuturno capitis dolore liberat. Efficacissime anginis illinitur, cum vetere oleo, melle, aut felle taurino.

STAPHIS agria, seu herba pedicularis, Græcis, Σταφὶς ἀγρία.] Arabi-
bus, *Alberas, Muibazagi, siue Muibezegi.*] Italis, & Officinis, *Stafu-*
saria.] Germanis, *Biszmiintz.*] Hispanis, *Fabaraz, & Paparraz.*]
Gallis, *Herbe aux poux.* *Enist agria*

STAPHIS AGRIA.

FORMA.

DIOSC. Folia habet Labruscæ di-
uisa, & cauliculos re-
ctos, molles, nigrosq;.
Florem fert Glasti, &
folliculos virides, simi-
les ciceri, & in his nu-
cleum triangulum, sca-
brū ex nigro subfulue-
scentem, intus album,
gustu acrem.

LOCVS.

Plin. Nascitur in opacis. [Co-
Matt. piofissima autē proue-
nit in Dalmatia, Istria,
Apulia, & Calabria.

QUALITATES.

Gale. 7. Vehementer acré obtinet
simp. me. facultatē, sed & vrendi
vim aliquam habet.


VIRES.

DIOSC. Pota quindecim seminis
grana trita ex mellicra-
to crassum humorem
per vomitū purgant,
atqui sumentes ambu-
lare debent, & aquam
mulsam continuo po-
tare, quoniā pericula
strangulationis inferunt, & fauces adurunt. Trita, & ex oleo illita
phthiriasi prodest: item prurigini, & psoris. cit cōmanducata pluri-
mā pituitā. coquitur in aceto, eoq; in dolore dentiū os vtiliter col-
luitur. reumatismum gingiuarum sistit. vlcera oris manantia cum
melle sanat.



THAPSIA, Græcis, Θαψία.] Italis, Thassia.] Mauritanis, Hiantum, siue
Drix.] Gallis, Turbit blanc.

THAPSIA.



FORMA.

Tota natura ferule similis DIOSC.
est, graciliore caule, fo-
liis fœniculi umbella
anethi in cacumine à
singulis furculis erum-
pente, flore luteo, semē
quale ferule latiusculū,
sed aliquanto minus .
Radix foris nigra, in-
tus candida, magna, a-
cris, crassiore libro ve-
stita .

LOCVS.

Nascitur plurima in Apu Matt.
lia Gargano monte .

QUALITATES.

Acrē habet, & vehemēter Gale. 6.
excalfaciētē facultatē sim.med.
cū humiditate. Quamo-
brē ex alto vehemen-
ter extrahit, & qđ extra-
xit digerit, vis eius post
annū multū resolvitur.

VIRES.

Tā cortex radicis, quàm DIOS.
succus purgandi vim
habet, & lacteus suc-
cus in aqua mulsa po-

tus, nā vtrinque bilē extrahunt . Radicis quaterni oboli cū tribus se-
minis anethi drachmis, succi terni oboli, lactis obolus vnus propi-
nantur. Quod eo amplius assumitur periculosum est. Conuenit hęc
purgatio suspiriosis, & diuturnis laterū doloribus, reiectionibusq; .
succus illitione, aut radix recens affrictu alopecias explent. Radix, &
succus cū thuris, & ceræ æquis portionibus sugillata, liuoresque tol-
lunt . Vitia cutis in facie emendant. Cū melle illitus succus lepras
tollit, & tubercula discutit, cum sulphure perunctus .

SPARTIVM, Græcis, Σπάρτιον.] Italis Sparto.] Germanis, Pfrimmen.] Hispanis, Spartio.] Gallis, Genêt de Espagne.

FORMA.

SPARTIVM.

Diosc. Frutex est lōgas ferens virgas, sine foliis, firmas, fractu contumaces, quibus vites vinciuntur. Semen Lenticulæ in folliculis phasiolorum modo nascens. Florem, vt albæ violæ luteum.

LOCVS.

Matt. Plurimum prouenit in Hispania, aridis, & siccis locis.

QUALITATES.

Gal. 8. *simp. me.* Semē, & virgarum succus non instrenuē trahentis est facultatis.

VIRES.

Diosc. Purgant per superna vehementer ellebori vice citra periculum flores, & semina quinis obolis in aqua mulsa pota. Semen deiectionem mouet. Ramis in aqua maceratis, mox tuis extractus succus, ischiadicis auxiliatur, si cyathi mediū ieiuni bibant. Quidā marina aqua macerant, & infundunt Ischiadicis clystere: strigmenta autem elicit cruenta.



GENISTA, Italis, *Gineſtra*.] Hispanis, *Geneſtra*, *Gieſta*, ſive *Gieſtrira*.]
Germanis, *Ginſt*.] Gallis, *Geneſte*.

G E N I S T A .



F O R M A .

Arbor eſt montana, è cuius *Mefue*
caudice complurimæ oriuntur virgæ, rectæ, flexi-
les, fractu contumaces,
acuminatæ, quibus vi-
tes & fasciculi ligantur.
Flores edit flauos lunari
figura, è quibus ſiliquæ
prodeunt oblongæ viciæ
modo, in quibus ſemen
illi quoque ſimile.

L O C V S .

Oritur in montibus, & col- *Matt.*
libus.

Q U A L I T A T E S .

Planta tota perturbat, pro- *Mefue*
uocat, incidit, attenuat,
cordique & ventriculo
nocet.

V I R E S .

Epotum ſemen pituitâ v- *Idem*
trinque valentiſſimè pur *Matt.*
gat, & ab articulis quo-
que humores trahit. Re-
nū excrementa pellit, vri-
nam ciet efficaciſſimè, &
calculos diſrūpit tam in
renibus, quàm in veſica,

prohibetque ne in poſterum renaſcantur calculi. Flores contriti ſtru-
mas auferunt, ſi cum melle roſaceo aut ſorbili ouo ſumantur. Fit ex iis
oximel, cuius uſu indurati lienēs reſoluuntur. Proſunt iſchiadicis, po-
dagricis, calculoſisque, ſi poſtquam ſumpſerint euomant.

NARCISSVS, Græcis, Νάρκισσος.] Arabibus, *Narces*, seu *Nargies*.] Italis, *Narciso*.] German. *Veth blumen*, *Hornungs blumen*, seu *zeitlossen*.] Gallis, *Narcisse*, *Campanette*, seu *Iaunette*.

G E N E R A.

Matt. Complura Narcisi visuntur genera, vt ex appictis hic iconibus seriatim palam fiet.

F O R M A P R I M I.

Diosc. Folia profert porro similia, sed multo minora, & angustiora, caulis vacuus, & sine foliis supra dodrantem attollitur, flos albus, intus croceus, in quibusdam purpureus, radix intus alba, rotunda, bulbosa, semen velut in tunica nigra longum. Flores, suauisunt odore.

L O C V S.

Diosc. Nascitur in montibus, & feri-
Matt. tur in hortis.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 8. Radix vsque adeo exsiccati facultate pollet, vt & maxima vulnera conglutinet, vel ad incisiones vsque quæ circa tendones accidunt. Habet vero quiddam absterforium, & attractorium.

V I R E S.

Diosc. Radix cocta, siue estur, siue bibitur vomitoria est, ambustis igni prodest cum exiguo melle trita, præcisos nervos illicitu glutinat, vitia cutis in facie, vitiliginesque cum semine vriticæ, & aceto emaculat, cum eruo, & melle vlcerum sordes expurgat, abscessus concoctioni repugnantes rumpit, infixæ corpori extrahit, illita cum lolij farina, & melle.



NARCISSVS II.




N A R C I S S U S I I I .



NARCISSVS IIII.



N A R C I S S U S V.



N A R C I S S U S V I .



N A R C I S S U S V I I .



N A R C I S S U S V I I I.



NARCISSVS IX.



RICINVS, Græcis, *Κικὶ ἢ κρότον*.] Italis, *Mirasole, & Girasole*.] Arabibus, *Cherna*.] Germanis, *Underbaum, seu Creutzbaum*.] Hispanis, *Figueira dell'inferno*.] Gallis, *Palma Christi*.

R I C I N V S .



li, & articulorū doloribus si ex veteris galli iure hauriatur. Oleū quod ex semine elicitur infunditur commodē ad colicos cruciatus, inunctū autē tū scabiē, tū capitis vlcera sanat. Medetur sedis inflātionibus, & cōuersis, ac præclusis sceminarum locis. Inungitur vtiliter indecoris cicatricibus, & aurium doloribus.

A P P E N D I X .

Suspicio in Dioscoridis exemplari subesse mendam. Grana. n. triginta seminis non sine periculo vitæ dari possunt. Quo fit vt cum Oribasio legam tria grana, non triginta.

F O R M A .

Prouenit parua fici altitudine, folio Platani, maiore, lauiore, & nigriore, ramis, caudicibusq; cauis in arundinis morē, semine in vis asperis, quod corticibus exutū, ricinum animal representat.

L O C V S .

Seritur in hortis, & in viridariis. In Ægypto sponte nascitur. *Matt.*

Q V A L I T A T E S .

Semen quemadmodum expurgat, detergit, & digerit, sic quoque folium, sed vndeque debilius. Oleū quod ex semine cōficitur, tū calidius, tum tenuiorum partium est, quā oleum commune, ac proinde etiam discutit. *Gale. 7. sim.med.*

V I R E S .

Grana triginta numero purgata, trita, potaque pituitas, bilem, aquamque per alium extrahunt, vomitionesq; mouent, sed iniucunda admodū est, & molesta purgatio, stomachum vehementer subuerterēs. Tusa, & imposita vitia cutis in facie, varosque expurgat. Folia cū hordeacea farina trita inflātionem oculorū, tumoresq; leniūt. Turgētes māmas cohibent. Eadem ex aceto illita ignes sacros restinguūt. *Diosc. Mesue*

TITHYMALVS, Græcis, Τιθυμάλος.] Arabibus, Xauser, seu Ethula.] Italis, Titimalo, & Tortumaglio.] Germanis, *Vuolffs milch*.] Hispanis, *Lecce tresna*, seu *Lecce tregua*.] Gallis, *Tithymale de montaigne*.

G E N E R A.

DIOSC. Septem tithymalorum habentur genera, nempe Characias, Myrtites, seu Myrsinites, Paralius, Helioscopius, Cyparissias, Donioides, & Platiphyllus.

F O R M A C H A R A C I Æ.

Idem Caules supra cubiti altitudinem attolluntur, rubri, lacteo succo, atque acri madentes, foliis oleæ circum ramos, angustioribus, & longioribus, radice crassa, lignosa. Pendet in caulium cacuminibus coma iunci, sub qua caueolæ foliolis balnearū similes, in quibus semen continetur.

L O C V S.

DIOSC. Nascitur in asperis, & montibus.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 8. Vincentē habent omnes acrem, calidamq; facultatem, inest verò & amaritas. Validissimus itaq; est eorū liquor. Secundum locū tenēt, semen, & folia. Radix verò dictarum facultatum particeps est, sed non ex æquo adurunt, & exulcerant quamvis corporis partem.

V I R E S.

DIOSC. Succis alium purgat, trahit pituitam, bilemque binis obolis in posca sumptus, & cū aqua mulsa vomitiones mouet. Reces lac perunctum in sole capillos ex oleo euellit, renascentesq; flavos & exiles efficit, deniq; omnes perimit. Dentium cauernis inclusum leuat dolores. Tollit illitū impetigines, fornicantes verrucas, & thymos. Valet aduersus prætergia, carbunculos, vlcerā, phagedænas, gangrenas, fistulasq;: Semen, & folia lactei succi effectum præbent dimidio acetabulo pota. Radix drachmæ pondere in hydromelite pota per inferna trahit, Acetum in quo decocta fuerit, collutione dentium dolores mulcet. & Omnia genera cordi, Iocinori, & ventriculo maximè nocent, vasa disrumpunt, intestina abrasunt, vniuersum exalfaciunt corpus, adeo vt inde febres faciliè concitentur.

Mesue

TITHYMALI.



TITHYMALVS Myrsinites, Græcis, Τιθυμάλος μυρτίτης, ἢ Μυρσινίτην.]
 Italis, *Titimalo Mirsinite* .

TITHYMALVS MYRSINITES.

F O R M A .

Foliis crescit myrti pro-
 ximis, sed maioribus ,
 firmis, ī cacumine acu-
 tis, & pungentibus. Ra-
 mulos ab radice mittit
 dodrantes . Fructum
 fert alternis annis, nuci
 similē, mordaci gustu .

L O C V S .

Nascitur in asperis .

Idem

Q U A L I T A T E S ,
E T V I R E S .

Succus, radix, semen, fo-
 lia consimilem antedi-
 cto sortiuntur faculta-
 tem, sed ad citandas vo-
 mitiones validior, atq;
 efficacior est.



TITHYMALVS Paralios, Græcis, Τιθυμάλος παράλιος.] Italis, Titimalo
marino.

TITHYMALVS PARALIOS.

F O R M A.

Diosc. Ramis nascitur subrubentibus, dodrantalibus, rectis, quinis, senis vè à radice exeuntibus, foliis lini, angustis, parvis, oblongis, in versus quosdam digestis, capite in cacumine orbiculato, denso, in quo semen, ut eruum vario colore emicat. Flos albus. Frutex totus cum radice lacteo succo turget,

L O C V S.

Idem. Prouenit in maritimis.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem. Similes ad vsus reconditur.



TITHYMALVS Helioscopius, Græcis, Τιθυμάλος ἡλιοσκόπιος.] Italis,
Titimalo Helioscopio.

TITHYMALVS HELIOSCOPIVS.

F O R M A.

Foliis prouenit Portulacæ *dioc.*
 tenuioribus, rotundio-
 ribusque, ramulis pro-
 deuntibus à radice qua-
 ternis, aut quinis, rubé-
 tibus, dodrantalibus,
 tenuibusq; , lactis co-
 piosi plenis, capite ane-
 thi, semine in capitibus
 incluso.

L O C V S.

Circa oppida nascitur, po- *Idem*
 tissimum in ruderibus.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Eadem illi quæ superiori- *Idem*
 bus sunt vires, non ta-
 men usque adeo validæ.



TITHYMALVS cyparissias, Græcis, Τιθυμάλος κυπαρίσσιος.] Italis, *Esula minore*.

TITHYMALVS CYPARISSIAS.

F O R M A.

Diosc. In caulem exit dodrantalē, vel maiorem, subrubrū, ex quo folia pini similitudine exoriuntur, molliora tamen, & tenuiora, in totum nascentem pinum æmulatur, candido succo madet.

L O C V S.


Matt. Nascitur ferè vbique circa oppida, & secus vias.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem. Eadem illi vis quæ superioribus.

A N N O T A T I O.

Mihi profectò mirum videtur, quòd Dioscorides hoc tithymali genus κυπαρίσσιον appellauerit, cū pinum non cyparissum referat.



TITHYMALVS Dendroides, Græcis, Τιθυμάλος. Δενδροειδής.] Italis,
Titimalo arboreo.

TITHYMALVS DENDROIDES.



F O R M A .

Ampliter opacat, in ca- DIOSC.
 cumine frōdosam spar-
 gens comam, succo la-
 cteo pragnātem, cau-
 liculis rubentibus, fo-
 liis myrti tenuioribus,
 fructu Characiæ.

L O C V S .

Nascitur in petris.

Q U A L I T A T E S ,
E T V I R E S .

Eiusdem est effectus, cu- Idem
 ius superiores.

TITHYMALVS, Leptophyllos, Græcis, Τιθυμάλος λεπτοφύλλος.

TITHYMALVS LEPTOPHYLLOS.

F O R M A .

Matt. Pater eius facies ex hîc
appicta figura.

L O C V S .

Idem Nascitur incultis locis,
& asperis.

Q V A L I T A T E S ,
E T V I R E S .

Idem Facultatibus iisdem pol-
let, quibus & reliqua
genera.



PITYVSA, Græcis, Πιτύουσα.] Arabibus, Scebram, & Pthias.] Officinis, Esula maior.] Italis, Esola maggiore.] Gallis, Turbit noir.

PITYVSA.



FORMA.

Caulis supra cubiti altitudinem assurgit, geniculatus, foliis pini, acutis, exilibus, flore parvo, vel purpureo, semine instar lenticulæ lato. Radice crassa, candida, succo referta. Quibusdā in locis prægrandis reperitur.

LOCVS.

Nascitur in montibus, ac *Matt.* etiam in campestribus.

QUALITATES.

Purgat similiter, ut Tithymali, ceterisque viribus *sim. me.* illis est adsimilis.

VIRES.

Detrahit per aluum radix *Diosc.* drachmis duabus data in aqua multa. Item seminis drachma: succi cū farina subacti cochleariū

in catapotio datur; modus foliorum drachmę tres. ¶ Multa verò sunt *Mesue* mentibus affert incommoda.

LATHYRIS, Græcis, Λατύρις.] Arabibus, *Mendana*, seu *Mahendane*.] Italis, *Cataputia minore*.] Officinis, *Cherua minore*.] Germanis, *Spring kraut*, *koerner*, seu *Tereib koerner*.] Hisp. *Tartago*.] Gal. *Esपुरge*.

LATHYRIS.

F O R M A.

Diosc. Caulem emittit, cubitali altitudine, digitali crassitudine inanem. Gignuntur in cacumine alæ, & folia ī caule oblōga amygdalinis proxima, latiora, & læuiora, quæ autem in summis ramulis exierunt minora conspiciuntur, aristolochiæ, aut oblongæ hederæ figura. In cacumine fructū in summis furculis gerit, triplici loculamento insignem, rotundū, ceu capparin, in quo grana intercurrentibus mēbranis inter se distincta continētur, cruīs maiora, rotunda, quæ dum corticibus exuuntur cādida sunt & gustu dulcia. Radix illi tenuis, & nullius vsus. Totus frutex lacteo succo turgēt, vti *Tithymalus*.

L O C V S.

Matt. Nascitur passim in hortis, & secus itinera exoluto solo.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 7. sim. med. Sunt qui dicant hanc esse *Tithymali* speciem, tum quod similem illis succum habeat, tum quod eodē illis modo purget totaq; illis facultate similis sit, nisi quod semen gustantibus videatur dulce, quod sanè etiā maximè purgatoriā vim obtinet.

V I R E S.

Diosc. Grana sex, aut septem in cataportio, aut cum ficis, aut palmulis deuorata, aluū purgant, sed aqua frigida postea sorbenda. Trahunt autem bilem, pituitas, & aquas succus *Tithymali* modo potus. **Matt.** eodē effectus præbet. ¶ Decem duodecimvè seminis grana à putaminibus delibrata, vomitum potenter citāt. Itaq; iis vtiliter propinantur qui philtrea deuorant, aut alia veneficia.



PEPLVS, Græcis, Πέπλος.] Italis, *Peplo*.

PEPLVS.

FORMA.



Frutex est lactei succi plenus, foliis parvis, ut rutæ, paulò rarioribus, rotunda coma ferè dodrā-tali, humi respersa, semine sub foliis paruo, rotundo, minore quàm candidi, papaueris. Vnicam habet radicē, ipsamq; superuacua.

LOCVS.

Nascitur inter vites, & in hortis. *Idem*

QUALITATES.

Succum habet similem Ti *Gal. 8.* thymalis, cū in aliis, *simp. me.* tū quia purgat ceu illi.

VIRES.

Semen acetabuli mensura *Diosc.* ex hydromelitis cyathopotum, bilem, ac pituitam purgat.

PEPLIS, Græcis, Πέπλις.] Italis, *Peplo*.

PEPLIS.

F O R M A.

Diosc. Frutice est latè opaco, fucci candidi pleno, foliis satiuę portulacę, rotundis, infernè rubentibus, semine sub foliis rotūdo, vti in *Peplo*, feruenti gustu, radice singulari, tenui, superuacua.

L O C V S.

Idem. In maritimis maximè nascitur.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 8. Succum obtinet, velut *Tithymali* validum, non tamè admodum vtilem.

V I R E S.

Diosc. Vires habet *Peplo* similes.



SCAMMONIA, Græcis, Σκαμμόνια.] Mauritanis, Scammonea.] Italis, Scammonea.

SCAMMONIA.



FORMA.

Ramos ab radice mittit **Diosc.** trium cubitorū, multos, pingues, & nōnihil crassitudinis præferentes, foliis helxinæ, seu hederaceis, mollioribus tamē, & triangulis, flore cādido, rotundo in calathi modū cauo, graueolente. Radice prælonga, crassitudine cubitali, candida, graui odore, succo prægnāte.

LOCVS.

Nascitur in Mysia Asię *Idem* regione, quin etiā in Syria & Iudęa.

QUALITATES.

Exuperat in ea acredo, *Mesue* quare corporis spiritus accēdit, flatus mordaces gignit, immoderatas alui fluxiones facit, intestina abradit, tormina, & dysenteriam excitat.

VIREs.

Succus per inferna bilē **Diosc.**

& pituitam extrahit. Illinitur vtiliter Ischyadicis Radix in aceto decocta, & cum hordeacea farina trita. Succus cum melle, aut oleo illitus tubercula discutit. Decocto in aceto perunctę leprę abiguntur. Diuturni capitis dolores ex aceto perfunduntur.

CHAMÆLEA, Græcis, Καμέλαια.] Mauritanis, Mezzercon, seu Athne-
zerion.] Italis, Chamelea.] German. Zylandt.] Gallis, Eoys gentil.

CHAMÆLEA.

F O R M A .

Diosc. Surculosa fruticat, ramis do-
drantalibus, folia oleæ si-
militudinem habent, te-
nuiora, & amara, quæ gu-
stata linguam mordent,
& arteriam deradunt.

L O C V S .

Matt. Nascitur in montibus.

Q U A L I T A T E S .

Gale. 8. Vincentem habet qualitatē
sim. me. amaram, quamobrē ad-
modū sordida vlcera, &
quæ maximas habēt cru-
stas cum melle purgare
potest.

V I R E S .

Diosc. Pituitā, bilēq; detrahīt, fo-
liis in catapotio deuora-
tis. Folia cum melle trita
sordida vlcera, & crusto-
sa repurgant.

Matt. §Cauendū
ab eius vsu, nisi ea admi-
sta fuerint, quæ eius de-
leteriam facultatem superare possunt, de quibus scripsit Mesue.



THYMELÆA, Græcis, Θυμελαία.] Italis, *Timelea*.

T H Y M E L Æ A .

F O R M A .

Virgas ædit pulchras, multas, tenues, binum cubitorū, foliis Chamelexæ, angustioribus, & pinguioribus, viscosis, gummosisque si mordeatur. Flore candido. Fructu myrti modo rotundo, qui inter initia viret, & tandem rubescit. Involucrū fructus durum, foris nigrum, intus album.

L O C U S .

Prouenit in altis montibus, *Idem* & asperis.

Q U A L I T A T E S ,
E T V I R E S .

Semen per inferna bilē, pituitas, aquasque detrahit, si viginti granorum pars interna bibatur, verum fauces adurit. Itaq; cū hordeacea farina, aut in vuæ acino dari debet. *Idem*



Herba stomacho infesta.

C E N S V R A .

Decipiuntur qui Cneoron Theophrasti, cuius duo ab eo produntur genera. Alterū quidē Chamelæā, alterū Thymelæā esse contendūt.

CNEORVM CANDIDVM.

Cneori cādidi, de quo me-
minit Theoph. hic ima-
ginem damus, vt qui
Cneoron Thymeleam,
aut Chameleā facunit,
ad mentem redeant.



SAMBUCVS, Græc. Ακτὴ.] Arab. *Iafaeti*.] Ital. *Sambuco*.] Germ. *Holler*,
ſeu Holder.] Hiſpan. *Sabuco*, *ſeu Caninero*.] Gallis, *Suſeau*, *ſeu Suyer*.

S A M B U C V S .



GENERA.

Quatuor habet genera. Domestici *Matt.*
 cum, Mōtanum, Aquaticum
 & Minus, quod Ebulus vo-
 catur.

FORMA DOMESTICI.

Arbor est furculos mittens arun *Diosc.*
 dinaceos, teretes, cævos, candi *Matt.*
 cantes, proceros, medulla in-
 tus candida, ac fungosa, folia
 iuglâdis terna, quaternavè ex
 interuallis circa ramos exeūt
 graueolentia, minutim in am-
 bitu secta, & in ramulorū ca-
 cuminibus cauliculisq; circi-
 natæ spectantur umbellæ, quæ
 florem candidum pariūt, odo-
 re nō ingrato, mox acinū in
 nigredine subpurpureum race-
 mosum, succo madentē, vino
 sumque.

LOCVS.

Nascitur passim, vbique in sepi- *Matt.*
 bus, & circa vrbes.

QUALITATES.

Desiccandi, conglutinandi, mo- *Gale. 6.*
 diceque digerendi facultatem *ſim.med.*
 obtinet.

VIRE S.

Vis illi detrahēs aquam, stoma- *Diosc.*
 cho inutilis. Folia olerū mo-
 do decoquuntur ad pituitam,
 bilemque detrahendam, cau-
 les teneri in patinis cocti ea-
 dē efficiunt. Radix in vino de-

cocta, & in cibis data hydropicos adiuuat; prodest, & viperarum morſibus, eodem
 pota modo. Vulvas emollit infidentiū decocto. Patefacit earum spiracula, & vitia
 corrigit. Acini in vino decocti eodē funguntur munere. Prætenera folia ex hor-
 deacea farina illita inflammationes mitigant, ambustis, & canū morſibus illita pro-
 sunt. Ulcera quæ dehiscunt in fistulā agglutināt. Illinatur vtiliter podagricis cū
 ſeuo taurino, aut hircino. ¶ Stillatitia ē floribus aqua fronti, & ſincipiti illita, ca-
 pitis dolores mulcet, succus ē radicis cortice expreſſus, vomitum valentiſſimè com-
 mouet, & aquam intercutem pellit.

Matt.

SAMBUCVS montana, Græcis, ἀκτὴν ὀφεινὴ.] Italis, *Sambuco montano*.

SAMBUCVS MONTANA.

F O R M A.

Matt. Virgis foliisque vrbano similis est, sed minori longè proceritate adolefcit. Flores non in umbellis, sed racematim coherent. Quin etiam bacce in vix modum dependent, rubro perpetuo colore, vinosæ ac succi plenæ.

L O C V S.

Idem — Nascitur in montosis, & algentibus locis.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem — Vires illi vrbano per omnia similes, imbecilliores tamen.



SAMBUCVS aquatica, Italis *Sambuco aquatico.*] Germ. *Scheuuelcken.*

SAMBUCVS AQUATICA.



F O R M A .

Virgis est sambuci dome
stici æmulis, genicula
tis, alba intus medul- *Matt.*
la, sed caduca, & fragi-
li materie. Foliis viti-
gineis. Flore albo Sā-
buci modo, odore nō
iniucundo, à quo bac-
cæ prodeunt rubētes,
oxyacanthæ magnitu-
dine, vinoso, ac ama-
ro succo refertę.

L O C V S .

Nascitur in aquosis, & *Idem*
vliginosis locis.

Q U A L I T A T E S ,
E T V I R E S .

Baccę deuorata vomitio-
nes citant. Succo vis
est absterforia.

FRANGULA, Italis, *Frangola*.

FRANGULA.

F O R M A.

Matt.

Arbor est mediocris proceritate, folio ferè corni, aut virgæ sanguineæ, cortice Alni, albis maculis exterius resperso, interius verò adeo flavescente, ut si mandatur croceo colore inficiat, Rhabbari modo. Flores edit albos, fructū paruum pisi magnitudine, per medium divisum, adeò ut duabus simul baccis constare videatur. Is primo exortu viret, deinde rufescit, postremò verò nigricat. Duo intra se habet ossicula lupinorum figura, sed lentibus paulò grandiora. Ligni materies omnino fragilis, imbecillaque est.

L O C V S.

Idem Nascitur passim in Boemiæ sylvis, & nemoribus.

Q U A L I T A T E S,

E T V I R E S.

Idem Cortici vis inest cum aluum exoluens, tum quoque adstringens. Quare Rhabbari modo operatur, quæ in extimo tñ cortice habetur, exoluit. in intimo verò adstrictoria viget facultas. Bilem eius decoctum, & pituitam expellit. Quinetiam hydropicorum aquas ducit.

Decoquitur cortex cum aperientibus medicamentis ad cachexiam, icteritiam, & aquam intercutem. Datnq; potandū decoctum quatuor uncularum pondere per q̄ commodè. Sed prius corpus expurgari debet. Soluit aluum absq; incommodo, belle iecur expurgat, & roborat, aperit omnium viscerum obstructions, & vasa à crassorum excrementorum infarctu expedit. Delibrantur cortices in ipso veris principio, & in umbra siccantur. Recentium. n. nullus debet esse usus, q̄ vomitiones moueant. Decoctum quod ex eis paratur quiescat, prius oportet, anteaquam propinetur duobus, aut tribus diebus, quousque flauus color niger fiat. alias vomitiones mouere quandoque solet.



EBVLVS, Græcis, Καμαίακτι.] Arabibus, Kameactis.] Italis, Ebulo, seu Nebbio.] Germanis, Attich, seu Niderel holler.] Hispanis, Hiezgnos. seu Subugo pecquenno.] Gallis, Hyeble.

EBVLVS.



FORMA.

Sambuco longè humilior Diosc.
est, magisq̃ue herbaceo
generi assignandus, cau-
le quadrangulo genicu-
lato, foliis amygdalæ ex
interuallo longioribus,
geniculatim expansis,
pinnatisq̃ue graueolen-
tibus, in ambitu serra-
tis, muscario sambuci,
flore & acino eiusdem.
Radice nititur lōga cras-
situdine digitali.

LOCVS.

Nascitur in plateis, & a- Matt.
reis, secus vias, & in tē-
plorum claustris.

QUALITATES,
ET VIRES.

Ea omnia præstat, quæ vr- Diosc.
bana sambucus.

APIOS, Græcis, ἀπιος.] Italis, *Apios*.

APIOS.

FORMA.

Diosc. Iūceos ramulos duos, siue tres spargit, rubros, tennes, qui à terra parum attolluntur, foliis rutæ sylvestris, oblōgioribus tamē, & angustioribus, herbaceis. Semine paruo. Radice in formā pyri turbinata. Succo fecūda, cortice exterius nigro, intus verò candida substantia.

LOCVS.

Theoph. Nascitur in montibus.
lib. 9. ca.


10. de p.
hist.

QUALITATES.

Idem Datur ad expurgandū corpus, q̄ altera radice par te superius, altera inferius purget.

VIRE.

Diosc. Superior eius pars vomitione bilem, pituitamque extrahit, inferior per aluum. Tota vtrunque purgationes mouet. Purgat vtraque parte succus sesquiobolo potus.



PSEUDO Apios. Italis, *Apio falso*.] Germanis, *Herdenuss* &.

Herdenuss

PSEUDO APIOS.

FORMA.

Multiplici crescit caule, *Matt.*
cubitali, ac sæpè maio-
ri humi procumbēte,
pisi ferè modo, foliis
oblongis, & subaspe-
ris. Floret Iunio præfer-
tim mense floribus pu-
niceis, pisi æmilis, odo-
ratis, racematim cohe-
rentibus, è quibus sili-
culæ oriuntur, in qui-
bus semen cōcluditur.
Radices habet fici, aut
pyri figura ternas, qua
ternasve è staminibus
dependentes, filipen-
dulæ modo, nigra exte-
rius cute, & alba intus
pulpa, nulla purgato-
ria vi prædita.

LOCVS.

Nascitur cum in campis, *Idem*
tum in vineis.



COLOCYNTHIS, Græcis, Κολοκυνθίς.] Arabibus, Chandel, Handel, seu Halandal.] Italis, & Officinis, & Hispan. Coloquintida.] Germ. Coloquint, seu Vuilder kurbiz.] Gallis, Coloquinte, seu Courge saunage.

F O R M A .

Matt. Folia, & iamenta emittit Anguria vulgo vocatæ, per terram repentia, diuisa, fructum in speciem mediocris pilæ conglomeratum, vehementer amarum.

L O C U S .

Idem Scritur in hortis.

Q U A L I T A T E S .

Gal. 6. sim. me. Colocynthis gustu amara est, sed quæ amarissimo medicamēto epoto adsunt opera, ea euidenter efficere nequit, ob purgatoriam facultatem, quam validam in se se continet, nimirum cum iis quæ expurgat, ante & ipsa per aluum excerni præuertens.

V I R E S .

Diosc. Medulla fructus purgatoriâ vim habet, si quatuor obolis in aqua mulsa, melle cocto, myrrha, & nitro excipiantur, & cogantur in catapotium. Arefactæ pilæ puluis clysteribus infusus prodest neruorum resolutioni, coxendicium doloribus, & coli vitiis, ut qui bilem, pituitam, & strigmenta, interdum etiam cruorem eliciunt. Fœtus admota pila enecat, si aqua mulsa, aut passum, in eadem incoquatur, & sub dio refrigeret. potu crassum. humorē, & alui strigmenta detrahit. Stomacho supra modum aduersatur, subdita pro balano alui excrementa eiicit. Virentis succo vtilissime ischiadici perfricantur. Potæ cerebrum, & nervos expurgat, quin etiam musculos, thoracem, & pulmonem. Quare vertiginosis, comitibus, resolutis, cōuulsis, hemicrania diuturnoque capitis dolore affectis, asthmaticis, & egrè spirantibus vtiliter in catapotis exhibetur. Collachrymantes conuulsi oculos, & diutina tussis laborantes. Est præterea vis eius efficax ad omnes frigidos articulorum dolores. Pellit aquas tam potæ, quam clysteribus infusa. Fit e fructu oleum ad retardandam canitiem, denigrandos capillos, & eorū desinium cohibendum, si exempta è fructu pulpa, cauitas oleo repleatur, & in cineribus calidis coquatur. eo mulcentur anrium dolores, atq; sonitus discutiantur. Quin etiam oleo ipso, & felle bubulo, interaneorum vermes necantur, si calida vmbilico illinantur.

Mesue

C O L O C Y N T H I S .



EPITHYMUM, Græcis, *Επίθυμον*.] Mauritaniis, *Efitimò, seu Efichemo*.]
Ita. *Epitimo*.] Hisp. *Cabellos, seu flores del Tomilho*.] Gall. *Tèigne de Tym*.

E P I T H Y M U M .

F O R M A .

Capillamenta sunt Epithy *Matt.*
mum tenuiora, quæ thy
mo adnascuntur flauo co
lore, floribus, & capitu
lis, perinde ac in cuscu
ta vocata.

L O C U S .

Nascitur, & viuit super *Idem*
thymi plantas apricis
praesertim locis, & ab
austro perflatis.

Q U A L I T A T E S ,

Thymi facultatem habet, *Gal. 6.*
ad omnia tamē effica
cius est. Desiccatur. &
excalfacit ordine ter
tio. *simp. me.*

V I R E S .

Potum cum melle pitui- *Diosc.*
tam bilēq; atrā per in
ferna detrahit. Priua
tim prodest melācholi
cis, & inflatis acetabuli
mensura, ad quatuor
drachmas cū melle, sa
le, & aceti exiguo. *¶ Va Mesue*
lētius ceteris aliis me
dicamentis atram bilē
expellit, citra vllā mō
lestiā. Efficax est ad cere



bri morbos, nēpe melancholiā, Epilepsiam, diuturnos capitis dolo
res, aliasq; atrabiliaras ægritudines. Confert cordis tremoribus, &
animi deliquiis, opitulatur eā ob causam omnibus lienis affecti
bus. Itē renū vitiis, & hypocódraca melācholia vexatis optimē cō
fert Epithymi vsus. Datur quoque vtilissimē aduersus carcinomata,
Elephantiasim, & vlcera maligna, & atra, & quartana febre affectōs
liberat.

CVSCVTA, Italis, *Cuscuta*.] Germ. *Flachs saiden*.] Gallis, *Couche in'icy*.

F O R M A.

CVSCVTA.

Matt. Eius est natura, ut in frutices, & herbas Epithymi modo, profiliat, & vivat, earum adminiculo fulta, nulla radice nixa, sed velut ab alarū sinu prodeuntibus cirris capillamentisvè longissimis. Hæc statim ab exortu plātis se se implicat, & adeo crebris inuolucris his se circūvoluit, ut breui plātas ipsas strāgulet, atq; enecet. Foliis nullis vestitur, flores tamen edit albos cōplurimos, quibusdā in capitulis, à quibus semē tenue prodit, sed superuacuum. cirri rufescūt, vitū capreolis crassitudine & facie pares. L O C V S


Idem Nascitur ferè vbiq; , atque in sepibus, aut propè eas frequens visitur variis, ac diuersis plantis connexa.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem Excalfacit ordine primo, siccaturque secundo, abstergit, & quadā cum adstrictione roborat. Iecoris obstructions aperit. Infarcti lienis vitia expedit, venas pituitosis, atque biliosis exonerat excrementis, vrinas pellit, & regiū morbum sanat. Puerorum febribus auxiliatur, sed diuturno vsu ventriculum grauat, quæ tamen noxa tollitur admisto Anisi semine.

C E N S V R A.

Non rectè sentiunt qui Plinij Cassytam in Syria nascentem nostratē Cuscutam faciunt.



ALYRVM, Græcis, Αλῖπον.] Italis, *Alipo*.

ALYRVM.



FORMA.

Surculosa herba est, sub-
rubra, gracilibus ramu-
lis, tenuibus foliis, flo-
re molli, leui, & copio-
so, radice betę, tenui a-
cri succo referta, semi-
ne Epithymi.

LOCVS.

Gignitur ī maritimis ma-
ximè Libiæ quàm lar-
gissima, Iquanquā a-
libi quoque plurima
prouenit.

QUALITATES,
ET VIRE.

Semen atram bilem deii-
cit, si mensura Epithy-
mo pari cum sale, & a-
ceto sumatur. Verum
interanea leuiter exul-
cerat.

VITIS sylvestris. Græcis, Ἀμπελος ἀγρία.] Italis, Vite saluatica.

VITIS SYLVESTRIS.

F O R M A.

Diosc. Sarmenta mittit prælonga vitis viniferæ modo, aspera, lignosa, foliis hortensis Solani longioribus, ac latioribus, racemoso flore, & capillaceo, fructu exiguis vuis simili, post maturitatē rubente, rotūda acinorū facie.

L O C V S.

Matt. Nascitur in dumetis, sepibus, sylvis, & montibus.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 6. Racemi abstergēdi vim habent, sed & adstrictionē quādam extrema germina tenent.

V I R E S.

Diosc. Ferrefacta radix in aqua, & in ciathis duobus vini aqua marina diluti pota, humorē alui ciet. Ideo hydropicis datur.

Vuē eius vitia cutis in facie, & maculas omnes expurgant. Enascentes viticulę cibi gratia sale condiuntur.



VITIS alba, siue Bryonia. Græcis, Ἀμπέλως λευκή.] Mauritanis, *Fesirè*, *Alfesirè*, *Fessera*, seu *Alfescera*.] Italis, *Brionia*, seu *zucca saluatica*.] Germanis, *Stic vurtz*, seu *Teufelkirbsz*.] Hispanis, *Neuxa*, siue *Anorca*.] Gallis, *Colubrine*, seu *Couluree*, aut *Fen ardent*.

VITIS ALBA.



F O R M A.

Foliis viticulis, pāpinisq; satiuam vitē imitatur, sed hirsutiora sunt omnia. Ea quos propè nacta frutices, suis clauiculis complectitur. Fructus rubeus in vva dependet, quo coria pilis spoliatur. ¶ In Germania, & Vngaria fructum fert nigrum. DIOSC.
 Matt.

L O C V S.

Prouenit passim secus vias, & propter sepes. Idem

Q V A L I T A T E S.

Prima germina adstringunt modicè cum quadā acrimonia, & subamarore. Radix abstergentem, desiccantem, & tenuium partiū, ac moderate calidā vim obtinet. cōrymbi depilatorij sunt.

V I R E S.

Folia fructus, & radix vlcerū phagedenis, cancrenis, chironiis, putentium tibiārum tēdio efficaciter cū sale illinūtur. Radix corpus abstergit, & cutem erugat, vitia cutis in facie varosque, lentigines, & cicatrices nigras emēdat: cum Eruo, Creta Chia, & fœnogræco, suggillata tollit, & reduuias committit, suppurationes rumpit. Infracta ossa extrahit trita; & imposita. Datur comitialibus in potu drachmę pōdere quotidie anno toto. Prodest attonitis, vertiginosisque eodem modo sumpta. Auxiliatur cōtra viperarum ictus potā duarū drachmarum pōdere. subposita partus, & secundas trahit, & pota ciet vrinam. Lienem consumit ternis obolis triginta diebus ex aceto bibita. Illinitur ad eadem cum fico, ad muliebres quoq; infessus decoquitur, siquidem vulvas pur-

gat, sed abortum facit. Succus cum aqua mulsa potus pituitam extrahit. Ad pforas & lepras, semē efficaciter illinitur. ¶ Idem vrinam trahit & cerebrum mundat, viscerum obstructions aperit, renes à calculis expedit.

Vitis nigra, Græcis, *Ἀμπέλως μέλαινα*.] Arabibus, *Fesire sentanim Alsese-
siresim, siue Faserim*.] Italis, *Vite nera, seu Tamaro*.

VITIS NIGRA.

F O R M A.

Matt. Folia fert hederæ, sed ma-
iora, smilaceis proxima,
caules etiam cognatos,
capreolis suis arbores,
quasi adminicula cōpre-
hendit. Fructus racema-
tim cohærent, qui inter
principia virent, & post
maturitatem rufescunt,
& quandoq; nigrescunt.
Radix foris nigra, intus
buxeo colore nitet.

L O C V S.

Idem Nascitur in dumetis, in se-
pibus, & in sylvis.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 6. Viti albæ ad omnia similis,
simp. me. nisi quòd imbecillior.

V I R E S.

Diosc. Viticuli quæ primo germi-
nati erumpunt in olera
recipiuntur, menses pel-
lunt, urinam cient, lienē
absumūt, vertiginosis, co-
mitialibus, & resolutis
profunt. Radix eadē quæ
vitis alba præstat, sed inef-
ficacius. Folia cum vino:

Matt.

exulceratis iumentorum ceruicibus cōmodissimè illinuntur. Quin
etiam luxatis articulis. ¶ Nihil eius radicis succo valentius fuerit ad
strumas sanādas, si cum vini, ac mellis æquali potione is hauriatur.
Præstat ad idem quoque eadem radix, si tusa, & melle excepta il-
linatur.



MOMORDICA, seu Viticella. Italis, Balsamina, Viticella, Momordica, seu Pomo di Gierusalem.] Germanis, Balsam kraut, seu Menn lin.] Gal-
lis, Marueilles.

Momordica

BALSAMINA, SIVE MOMORDICA.



FORMA.

Planta est, quæ prælongis, tenuibusq; viticulis vltro, citroq; reptantibus proximas plantas comprehendit, foliis vitis albæ, aut viniferæ similibus, sed longè minoribus, magisque per ambitum diuisis, capreolis tenuibus ex alarum sinu prodeuntibus, quibus sese appositis implicat adminiculis. Florem promit cucumeri similè, paruum, subluteum. Fructu vtrinque turbinatū, gallinaei ferè oui magnitudine, cute carnosâ, acutis tuberculis scatente. Huic maturo puniceus color, qui præterea facillè dissilit: vltimam maturitatem adeptus. Semen includit Anguriæ vocatæ similem, minus tamen, contextum cute crassâ pingui, lubrica & per quàm rubente.

Matt.

LOCVS.

Nusquam nisi sata in Italia provenit; vbi in hortis, & fictilibus colitur.

Idem

QUALITATES,

ET VIRES.

Folia vulnera recentia glutinat. Fructu in oleo immaturo insolato, paratur oleum præstissimum ad arcendas vulnerū māmillarūq; inflānationes, & dolores mulcendos. Valet

Idem

idem Siphone infusum ad exulceratos, inflāmatosq; vteros. Doloribus hæmorrhoidum quoque mirificè auxiliatur, in quem vsum Fructus oleo Amygdalino dulci, aut de semine lini macerantur. Idem medetur ambustis tam igne, quàm aqua. punctis, sauciatisq; nervis vtiliter illinitur. quin etiam vulnerum cicatrices delet, & vesparum ictus sanat. Foliorum pulvis cochlearis mensura ex equiseti decocto potum, intestinorum vulneribus medetur.

BALSAMINA altera. Italis, *Balsamina maggiore, siue semina.*] Germanis, *Balsamkraut vneibele*.

BALSAMINA ALTERA.

FORMA.

Matt. Caulis illi est crassus sesquicubitalis, pinguis, & succo prægnās, ramis multis abūdè vegetibus. Folia profert Salicis modo lōga per ambitum serrata, flores prægrādes purpureos retro inflexè caudicatos. E quibus poma suboriuntur, alterius Balsaminæ haud admodum dissimilia, turbinata, hirsuta, viridi primum colore, & per maturitatem lutescente. internū semē lenticulæ faciē exprimit. Radice nititur numerosa, crassa, robustaque.



LOCVS.


Idem Seritur in hortis, & fictilibus.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem Putant quidam (id quod etiam scribunt) & hanc iisdem esse cum altera viribus. Verum nos nullam eius experientiam habemus.

FILIX, Græcis, Πτέρις.] Arabibus, *Sarax*, seu *Sarachs*.] Italis, *Felce*.] Germanis, *Wualdt farn*.] Hispanis, *Helecho yerna*.] Gallis, *Osmunda Regale*, seu *Fengiere masse*.

FILIX.



quatuor drachmarum pondere latus ventris tineas excurit. Laborantes lienis incremento recreat. Radix cum pota, tum cum axungia illita, vulneribus sagitta arundinea factis, medetur. ¶ Est enim inter eam, & arundinem non parva inimicitia.

GÈNERA.

Duo eius habentur genera Mas, & Fœmina. Diosc.

FORMA MARIS.

Filici folia, sine caule, sine fructu, sine flore ex vno pediculo cubitali lōgitudine exeunt, multifida, è lateribus priuata, & expāsa velut ala, subgravi odore. Radice per summa cespitū nigra, oblonga, filices multos fundente, substringenti gustu. Idem

LOCVS.

Nascitur in montibus, & saxosis. ¶ Quin etiam a- libi vmbrosis locis. Idem Matt.

QUALITATES.

Mas radicem habet maximè vtilem. latum. n. lūbricum interficit. Est. n. amara paulum habens adstrictionis, valentem desiccādi facultatē obtinet, nec tamen mordax est. Gale. 8. sim. med.

VIRE.

Radix ex aqua mulsa pota Diosc.

FILIX fœmina, Græcis, Θηλυπέρης.] Italis, Felce femina.

FILIX FOEMINA.

FORMA.


Diosc. Filix fœmina foliis est altioris filicis, furculosis, altioribusq; & quæ nō singulari, ut illa pediculo fulciantur. Radicibus longis, pluribus, obliquis, quæ ex nigro in luteū flavescent, aliæ etiamnum rubræ inveniuntur.

LOCVS.

Matt. Nascitur in sylvis, & in montibus, & ferè ubique, maximè frigido solo.

QUALITATES,
ET VIRES.


Diosc. Radices pellunt cum melle sumptę lata interaneorū animalia. cum vino autē drachmis tribus teretes tineas eiiciunt. Datę fœminis sterilitatem faciūt, & prægnantibus abortū, si supergrediantur. Farina humidis vlceribus, & cicatrici repugnantibus inspargitur. Iumentorum ceruicibus medetur. Folia recentia in oculis cocta mandantur ut ventrem emolliant.



FILICVLA, Græcis, Πολιπόδιον.] Mauritanis, *Bisberg Aibeig*, *sive Bef-
faigi*.] Italis, *Polipodio*.] Germanis, *Engel suez Baumfarz*, *sive drop-
ffannörz*.] Hispanis, *Filipodio*, & *Polipopio*.] Gallis, *Polypode*. *Stemumy*
Engelsbaumy

FILICVLA, SEV POLYPODIVM.

F O R M A .



Palmari altitudine assur- *Matt.*
git, filici similis, subhir-
sutis, & robustioribus
foliis, aduersa parte ful-
uescētibus, maculis re-
spersis. caulem, florē,
fructūq; nullū profert.
radicibus nitē per sum-
ma cespitū vagantibus,
polyporū pisciū cirris
similibus, vnde illi no-
mē, fibris, pilisq; propē
innumeris refertis, co-
lore exterius subfulue-
scente, interius verò vi-
ridi, sapore dulci, & au-
stero simul.

L O C V S .

Nascitur in muscosis pe- *diose.*
tris, & vetustis arborū
caudicibus, præsertim
Quercuum.

Q V A L I T A T E S .

Dulcē simul, & austerā ha *Gale. 8.*
bet vincētem qualitātē, *simp. ms.*
vt facultatis sit admodū
desiccantis, citra mor-
sum tamen.

V I R E S .

Purgādi vim habet, coqui- *diose.*
tur cum gallina, aut piscibus, aut beta, aut malua, ad aluum soluen-
dam Aridæ farina aquę mulsę inspersa detrahit bilem, & pituitā. Tri-
ta luxatis efficaciter illinitur, & aduersus rimas quę inter digitos sunt. *Actua-*
Bilem præsertim atram extrahit. *viss.*

Asplenium murale L.


POLYPODIUM ALTERVM.

F O R M A.

Matt. Folio est Aspleni quodatenus æmulo, sed oblongiore, viridiore, magisq; per ambitum diducto. Radice priori simili, graciliore tamen paulò.


L O C V S.

Idem Nascitur plerūque in montium sylvis.



DRYOPTERIS, Græcis, Δρυοπτέρις.] Italis, *Felce Quercina.*] Germanis, *Baum Farn.*] Gallis, *Fuchiere des chesnes.*

DRYOPTERIS.



FORMA.

Filici similis est, sed multo Diosc.
 minori foliorum incisura. Radicibus inuicem
 implexis, hirsutis, gustu
 acerbis in dulcedinem
 vergentibus.

LOCVS.

Nascitur in veterū Quer- Idem
 cum musco.

QUALITATES.

Gustu mistam facultatem Gale. 6.
 præfert, dulcē, acrem, sim. me.
 amaram, in radice vero
 item acerbam, faculta-
 tem habet lepticam.

VIREs.

Psilothrum est cum radi- Diosc.
 cibus trita. Illinitur. n.
 postquam corpus exu-
 dauerit, mox sudor ab-
 luitur, & recens im-
 ponitur.

CNICVS, Græcis, Κνικὸς.] Mauritanis, Kartan, seu Charthan.] Italis, Zaffarano Saracinesco.] Officinis, Cartamum.] German. *Wilderßaffran.*] Hispanis, Alacor, & semente de Pappagaios.] Gallis, Saffran baslard, & saffran sauvage.

F O R M A.

C N I C V S.

Matt. Singularē emittit caulē sesquipedalem, & quandoque maiorem, teretē, rectum, subalbicātem, striatūque, firmū, atq; lignosum, ramis à medio caule copiosis dodrantalibus. Folia oblōga, crassiuscula, robusta, glabra, in mucronē desinētia, infirmis aculeis circūuallata, & sine pediculis è ramis pdeūtia. spectantur in ramorū summitatibus acanacea capitula in latum turbinē fastigiata, oblōgis, ac spinosis squamis radiātib⁹ circūquaque, ima parte foliolis, aculeis pariter rigentibus, & syderis faciē referētibus. Flores mediis è capitibus erūpunt, capillacci, ac graciles, vt in ceteris acanaceis, aureo colore, ad rubrum inclinante, crocinis staminibus æmuli. Semen inest albū, angulosum, leni putamine ac duro, alba intus medulla. Radice nititur oblonga, fibrata, sed superuacua.

L O C V S.

Idem. Seritur in hortis, & campis.

Q V A L I T A T E S.

Gals. 7. Semine dūtaxat ad purgationē vtimur, tertij est ordinis exalfaciērium, si quis foris eo vti volet.

V I R E S.

Diosc. Seminis tussī & delibrati medulla ex aqua mulla aut iure gallinacci aluum purgat pota. seminis succus lac cogit, & magis ipsum resoluendæ alui facultate donat. Idē pituitā, & aquas extrahit, quo fit vt coli dolore affectis, & hydropicis opē minificè prestet nō modo haustum, sed etiam clysmate infusum. Seminis medulla, à putaminibus repurgata, & saccharo eclegmatis modo excepta pectus, & pulmones abstergit, vocem clarificat, & prolificum semen auct.



MERCVRIALIS, Græcis, *Ανοξώσις*.] Italis, *Mercorella*.] Germanis, *Bingelkraut*.] Hisp. *Mercuriale*, & *urtigua morta*.] Gall. *Mercuriale*.

MERCVRIALIS.



vt mares gignātur, hunc facere, vt fœminæ illam si à purgatione bibantur, & trita folia genitalibus admoneantur. Obseruatum quoque est *Matt.* tolli verrucas omne genus illitis vtriusque foliis, aut eorum sacco. Malis item quæ serpunt succus cum aceto medetur. Fœmineis locis supposita menses cict.

GENERA.

Duum est generum, Mas al- *dirose.*
terum. Alterum fœmina.

FORMA MARIS.

Frutex est dodrantalis, aut *idem*
maior, foliis Ocimi, hel-
xinæ cognatis, sed mino-
ribus, ramis duplici geni-
culorū modo cinctis, ala-
rū cauis multis; fructu è
foliorum sinu dependen-
te, paruo, rotūdo, ceu bi-
nis testiculis vnà coharē-
tibus. LOCVS.

Nascitur in hortis, vineis, vt *Matt.*
bium plateis, & inter ru-
dera.

QUALITATES.

Mercuriali vtūtur omnes ad *Gale. 7.*
vētris purgationes dūta- *sim. me.*
xat. verūm enimvero, si
quis eius facere periculū
volet in cataplasmate, sa-
nè eam digerentis admo-
dum facultatis esse expe-
rietur. VIRES.

In oleribus manditur ad al- *dirose.*
uum ciendam, cocta in a-
qua epoto iure bilem, a-
quāque detrahit. Cōstat,

MERCVRIALIS fœmina, Græcis, Λινόξωσις θήλυς.] Italis, *Mercorella femina.*] Germanis, *Bingel kraut vneible.*] Gallis, *Mercuriale femelle.*

F O R M A.

Matt. Caule, ramis, foliis per omnia alteri similibus provenit. verum fructu differt, quod in hac racemosum spectetur & semine copioso, in illa vero ceu binis testiculis una coeuntibus.

L O C V S.

Idem. Nascitur simul cum fœmina iisdem locis.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem. Adsimili Mari facultate præstat, nisi quod hæc à purgatione bibita fœminas gignat, illa mares.

MERCVRIALIS FOEMINA.



CYNOCRAMBE, siue Canina brassica. Græcis, Κυνοκράμβη.] Italis, *Mercorella bastarda*.] Germanis, *Wild Bindel kraut*.] Gallis, *Mercuriale sauvage*.

CYNOCRAMBE.

FORMA.

Cauliculum binum do- **diosc.**
drantum altitudine e-
mittit, mollem subal-
bidum, folia mercuria-
li, aut hederæ similia,
certis interstitiis, subal-
bida, semen foliis ad-
hæret paruum rotun-
dum.

LOCVS.

Nascitur omnibus ferè lo *Matt.*
cis in vineis, campis,
& propter vrbiū mæ-
nia.

QUALITATES,
ET VIRES.

Folia cum caulibus pota **diosc.**
aluum cient, oleribus
cōmendantur. Ius de-
cocti & pituitam, &
bilem, & aquas detra-
hit.



HELIOTROPIVM maius, Græcis, Ηλιοτρόπιον μέγα.] Officinis, *Ver-rucaria*.] Italis, *Eliotropio maggiore*.

G E N E R A.

Diosc. Heliotropiū duū est gene-
rum Maius, & Minus.

F O R M A M A I O R I S.

Idem. Folia habet Ocimi, hirsu-
tiora, cādidiōra, & maio-
ra, ramuli a radice terni,
quaterni, aut sæpe quini
exiliunt, multis alis con-
caui. Flos in cacumine cā-
didus aut subfuluus, in-
curuatus, vt scorpionis
cauda. Radix tenuis est,
& inutilis.

L O C V S.

Diosc. Nasct̃ in asperis. § Quin-
Matt. etiam in ædificiorū pla-
teis, in hortis, & agris
incultis, & sabulosis.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.


Diosc. Herbæ ex aqua decoctū fa-
sciculo manus plenę po-
tu pituitā, bilemque per
aluum extrahit. Prodest
in vino potū, quin etiam
admotum, ad scorpionū
ictus. Adalligatur ad con-
ceptus arcendos. Aiunt
per horam vnam ante ac-

cessiones seminis grana quatuor cū vino pota quartanas finire, tria
verò tertianas. Illitū semen formicantes verrucas, pensilesque, & thy-
mos exiccat. Folia podagricis, luxatisque vtilissimè illinuntur. Men-
ses cient, partus trita, & imposita pellunt. § Epotū horū decoctū vnā
Matt. cū cumino renū calculos pellit, ac frāgit, & intestinorū animalia ne-
cat. Formicę quoque necantur earum foraminibus Heliotropio ob-
turatis. Foliorum succus carcinomatis, ac contumacibus vlceribus
miri ficè auxiliatur illitus.



HELIOTROPIVM minus, Græcis, Ηλιοτρόπιον μικρόν.] Italis, *Heliotropio minore*.

HELIOTROPIVM MINVS.



FORMA.

Heliotropium paruum fo³ diosc.
Iis est antedicto proxi-
mis, rotundioribus, se-
mine acrochordonum,
verrucarūque modo pē
fili, rotundo.

LOCVS.

Nascitur in palustribus, & *Idem*
iuxta lacus.

QUALITATES,
ET VIRES.

Herba cum suo semine po³ diosc.
ta adiecto nitro, hysso-
po, nasturtio, & aqua la-
tas tineas, teretesque
excudit. Pensiles verru-
cas, quæ acrochordones
vocantur, cum sale illi-
ta tollit.

HELIOTROPIVM ALTERVM.

Sunt qui hanc quoque
plantã Heliotropij ge-
nus faciunt, quòd &
hæc verrucas deleat.



CALTHA, Italis, *Fior rancio*, *sive Fior d'ogni mese*.] Officinis, *Calendula*.] Germanis, *Ringel bluom*.] Gallis, *Poussij*.

C A L T H A .



F O R M A .

Foliis exit oblongis, minimè acuminatis, Leucoij quadatenus similibus, latioribus tamen, ac longioribus, caulem edit singularē, subpinguem, sesquidodrantalē, ramosum. Flores in cauliū summitatibus aureos, speciososque, odore cū gravitate haud iniucundo, è quibus semen provenit in capitulis apertis; quod si diducatur auicularū vnguibz quadatenus simile spectatur. Radice nititur alba, rectaque. *Matt.*

L O C V S .

In tota Hetruria spontè per se nascitur, secus itinera. Atqui in compluribus Italiæ locis, & in Germania in hortis ad coronamenta seritur. *Idem*

Q V A L I T A T E S .

Excalfacit, attenuat, aperit, digerit, & prouocat, quāvis gustu adstrictione non vacare deprehendatur. *Idem*

V I R E S .

Constat, multis admodum fœminarū factis periculis, herbam valere plurimum ad menses ducendos, epoto eius succo, aut herba ipsa recēte diutius deuorata. Succus vnciæ pondere, cum drachma pulveris terrestriū lumbricorū, *Idem*

potu ictericos iuuat. Sunt qui dicant huiusce herbæ vsu iuuari maximè oculorum aciem. Constat tamen stillatitiam floridæ plantæ aquam oculorum ruborem, & inflammationem arcere, si in oculos instilletur, aut linteolis applicetur, in ea madefactis. Siccata pulvis, dentium cauernis impositus dolorem sedat.

SCORPIOIDES, Græcis, Σκορπιοειδές.] Italis, Scorpioide.

S C O R P I O I D E S .

F O R M A .

Matt. Herbula est foliis paucis,
femine caudæ scorpionis
effigie.

L O C U S .

In hortis tātum hanc plan-
tam fatam vidimus.

Q U A L I T A T E S .

Idem Excalfacit ordine tertio,
deliccat verò secundo.

V I R E S .

Gale. 8. Illita scorpionum ictibus,
simp. me. presentaneo est auxilio.



VITIS vinifera, Græcis, Ἀμπέλως ὀινοφόρος.] Italis, *Vite vinifera*.] Arabibus, *Harin Karin, seu Karm*.] Germanis, *Queinreb*.] Gallis, *Vigne*.

VITIS VINIFERA.

F O R M A .

Vitium omnium genera, ac formas adeo tam claris quam obscuris viris, tam nobilibus, quam ignobilibus, tam denique urbanis quam rusticis innotuerunt, ut nemo sane sit, qui de vitium generibus, earundemque historiam scite, ac distincte loqui possint.

Q U A L I T A T E S .

Folia refrigerant, & adstringunt. DIOSC.
Idem præstant, & capreoli.

V I R E S .

Folia & tritici capreoli capitis dolores illitu mitigant, & inflammationes stomachi, ardoresque cum hordeacea farina. Potus eorum succus dysentericis, sanguinem excreantibus, stomachicis, & gravidarum malaciis medetur. Eadem efficiunt madefacti in aqua capreoli, & poti. Lachryma quæ veluti gumi in caudicibus crescit, ex vino pota calculos pellit, illita lichenas, & psoras, leprasque nitro prius perfrictas sanat. Eadem cum oleo pilis sapius illitis psilothri effectum habet, maximeque sanies quæ ex accensis sarmentis exudavit, quæ perunctæ verrucarum informicationes extrahuntur. Vinaceorum, & sarmentorum cinis ex aceto illitus detractis in sede codylomatis, & thymis medetur. Prodest luxatis, & viperarum moribus, & contra lienis inflammationem illinitur, cum rosaceo, ruta, & aceto. ¶ Acerba vix succus admiscetur utiliter coeliacorum & dysentericorum cibis, quinetiam medicamentis quæ ad sanguinis reiectiones parantur. Id quod etiam præstant acinorum nuclei in fa-

Idem

Matt.

rinam tritici, & ventri, stomachoque illiti. Vva pensilis matura, manibus confracta, & illita, recentibus ambustionibus mirifice auxiliatur, statim enim dolorem mulcet. ¶ Vva probe matura inter fructus autumnales principatum in cibis obtinent. Itaque fugacibus omnibus magis nutriunt, minimūque pravi succi habent. Pensiles si prius maturæ sunt, & dulces, ceteris minus ventriculum inflant, & aluum convenienter emolliunt.

Gal. 2. de
aliment.
facil.

ERRORES CALCOGRAPHIAE.

In Epistola ad Calceolarium.

linea 18. ut tibi. lege ut ubi. ibidem lin. 31. maledicentium. lege maledicentiam.

folio 7. linea 14. longis. lege olinarum modo oblongis. folio 14. linea 12. similis. lege simili. f. 21. 15. styria, Syria. f. 22. 5. nō differt forma, adde, ab aliis calamis. f. 24. li. ult. celtica, celtice. f. 26. l. antepen. illinant, illinantur. f. 55. l. 21. spatiosa, spetiosa. f. 65. l. 30. imposita, imposito. f. 68. 1. Itali Aquifoliū, Agrifolio. f. 70. 11. acutissimis, adde, scater. f. 90. 28. similes, adde pferr. f. 92. 30. Succ^o ob, succ^o &. f. 100. 21. conaceo, coriaceo. 107. 18. parū racemosi, pariter racemosi. f. 108. 31. bellarij, bellariis. ibid. l. ult. Bacca, Baccē. f. 116. 18. nitrosē, vinosē. f. 146. 28. q̄, qua. f. 150. 13. Bino, Primo. 159. li. pen. canis, canis. ibid. li. ult. ficulneo, adde, ramo. 160. 24. p̄sit, parit. f. 163. 29. fragilius, frugalius. f. 167. 40. insipitēib⁹, incipiētib⁹. 195. li. ult. dissidet, dissidēt. f. 222. 9. intybæ, intybi. ibid. 14. librata, fibrata. f. 224. 12. inclusis, inclusum. f. 228. 27. dirigēdū, digerēdūq̄;. f. 260. lin penult. à, deleatur. ibid. cæna, à cæna. f. 263. 12. crenatis, crenatos. fol. 275. 16. lutinosa, glutinosa. f. 280. 1. Ἐρωμον, Ἐζωμον. Idem in sequen. Eruca syluestri. f. 288. 27. fructu, fractu. f. 294. 9. siquidem, deleatur. f. 297. 6. κεφακότον, κεφαλότον. f. 300. 1. κρομμυον, κρόμμιον. f. 302. 1. χισον, χισον. f. 310. 24. contectum, coniectum. f. 354. 19. capillo, capitulo. f. 359. 11. hirsutis, hirsuti. f. 372. 8. ille, illi. 380. 9. faminc, famina. ibid. 31. rotūde, rotūda. 400. 13. in ambitu, ambitu. 408. 6. refertæ, referta. 422. 18. acri, deleat. f. 432. 31. ut causa, ubi causa. f. 436. 12. cdores, odores. f. 244. lin. penult. indica, indita. f. 487. 6. Rosmarino, rosmarinū. 499. 13. cādica, cādida. 503. 23. ea, id. 512. 3. Maroto, Maroio. f. 533. 5. numerosus, ramosus. 547. 5. fœniculaturæ, faniculaceum. 584. 2. Atanana, Atanasia. f. 591. 15. repentis, repentibus. 593. 6. minutis, à minetis. 626. lin penul. quarta, quartana. f. 662. l. antep. men, semē. 670. 12. foliis, floribus. 683. 7. pulchra, plura. 704. 10. pratis, petris. f. 714. 8. quo, quod. 729. 26. at, ac. 738. li. ult. sumunt, sumuntur. 750. 2. amitora, amitora. f. 753. lin. ult. resoluta, resoluunt. 756. 11. vana, varia. 767. 1. sed, seu. 771. 9. soli, sedi. ibidem 15. rotundo, rotūda. ibid in marg lin. 22. Diosc. lege Gal. ibid. 30. in marg. Gal. lege Diosc. f. 779. 16. lactaria, blactaria. 781. 8. MAIORIS, MINORIS. 385. lin. antepen. uenustiores, venustiores. f. 839. 34. Myrtho, myrino. 903. lin. ult. mandamur, mandantur.

Errores in collocandis plantarum figuris.

folio 16. figura Phu minoris, stat loco maioris, & maior loco minoris.

fol. 235. & 236. Plantago minor stat pro maiori, & maior pro minori.

fol. 251. & 252. Sonchus primus & secundus peruersè stant. Nam aspera titulum falsum habet. Et primo in loco esse debet cum titulo sonchus aspera: & non lenis.

fol. 257. Cichorij figuræ malè positæ sunt: syluestris enim pro domestica, & domestica pro

syluestri posita est.

fol 318. Irionis figura prima debet esse secunda, & secunda prima.

fol. 386. Chamæleonis nigri planta prima in secundo loco, & secunda in primo esse debet.

folio 525. & 526. Polij figuræ transpositæ sunt.

fol. 624. figuræ Clematis alterum inuersa sunt: ultima enim in primo, & prima in ultimo loco esse debet.

Iter Baldi ciuitatis Veronę montis,

In quo mirabili ordine describitur Montis
ipſius, atq; aliarum quarundam ipſum
contingentium partium
ſitus .

*Recenſentur præterea quædam inſignes plantæ,
ac herbæ ibi nascentes, quæ uſui Medico
plus cæteris conferunt .*

Recens in lucem editum

*Ab honeſtiſſimo viro FRANCISCO CALCEOLARIO Veronenſi Pharmacopola,
in Campanæ aureæ officina .*

CLARISSIMO DOMINO

PETRO ANDR. MATTHIOLO SENEŒSI,

Sereniſſ. Principis Ferdinandi Archiducis Aſtrix &c.

Conſiliario, atque Medico primario.



Franc. Calceolarius Pharmacopola Veronenſis. S. P. D.



OPUSCULUM meum, quod antea Italico sermone edideram, tibi Latinum factum (ut petis mitto) cum tuo de plantis compendio in lucem edendum. siquidem communi hac lingua nunc conscriptum. omnibus in Europa nationibus tuo auspicio facile innoteſcet, cum tua mirifica monumenta per uniuersum ferè orbem circumferantur. Etenim non in Italia solùm, sed apud cæteras nationes, tantæ tu autoritatis extas, tamq̃ latè tua fama, nomenq̃ diffunditur, ut nedum libri de materia medica, sed & cuiusvis generis descripti, merito tibi dicari, & nuncupari possint, quòd à tuo tantum clarissimo nomine facile protegantur. Accessit etiam, ut hoc tuæ authoritati voluerim commendatum, illa iam diu animo inherens meo tuæ in me beneuolentiæ opinio, tot experimentis tuorum in me officiorum comprobata. quæ quidem me inducit ad credendum opusculum hoc meum non solum tibi carum futurum, sed tuo patrocínio apud omnes studiosos, & bonos viros non modicam gratiam initurum. Commodum sanè (ut scribis) huic libello in tuo de plantis Compendio futurum esse locum non diffido: nam ad medicam materiam re ipsa cognoscendam, non parum afferet commoditatis, atq; etiam quasi comitem præstabit, quo plantarum studiosi in montem illum stirpium ferè sæcundissimum ducantur, illasq̃ certis locis reperiant. Siquidem ab urbe in montem cunctas ipsius itineris partes explicat, & quo comineatu in eo persuiendo sit opus. Locaq̃ omnia speciatiim ostendit, in quibus diuersarum plantarum genera virescunt, ac florent, hac tamen serie, ut copiosiores tantum eorundem locorum stirpes connumerentur, nè cum plura genera eodem in loco

in loco oriantur, studiosorum ingenia confundant. Quod verò copiosius reperitur, id locum sibi vendicabit, eiq; nomen tribuet, & nostrā considerationem ad se conuertet. Præterea cū multa loca iisdem plantis abundant, is modus descriptioni adhibebitur, ut eo adnotato, qui prius in itinere obuius fuerit, cætera deinceps prætercantur. ne sint aliqua præstantiorum fortasse generum, de quibus ob earum dignitatem, meminisse oporteat, in quocunque habeantur loco; alioqui quantum possumus breuitati studebimus. Vinam verò de cæteris montibus, atq; locis, qui plantis raris, & mirificis abundant, similes extarent historiæ, quæ non solum indagatores ad loca illa perlustranda animarent, sed iter ostenderent, ac materiam medicam tot difficultatibus plenam suæ pristinae claritati, te duce, restituerent. Nunque tuis doctissimis commentarijs theoriam continentibus, instructi homines discendi cupidi, ad alteram partem in scientijs omnibus necessariam, nempe experientiam ipsam, facilius sese addicerent. cuius in plantarum notitia primas partes esse tu bene nosti. qui illam tam diligenter adhibueris: Optarem sane cæterarum eiusmodi regionum, posse me tibi historias conscribere tuo ipsius compendio alioqui numeris omnibus absoluto adnectendas. At verò id à me scio non requires, quod præstari ab uno homine non possit: quare velim, ut animi mei propensam erga te voluntatē (ut tua est humanitas) gratam suscipias. cupio enim pro virili modis omnibus, tibi semper gratificari. Cæterum Baldus mons non modico simplicium medicamentorū numero refertissimus est: in quibus ego conquirendis, examinandisq; non mediocres impendi sumptus, atq; labores, doctissimis semper ac peritissimis viris adiunctus. Inter quos fuisse Iulius Moderatus, Antonius Tolomeus, Aloisius Anguillarius, Ulixes Aldrouandus, & alij complures in Academijs Italicis studiosi. Præteream præclarissimos illos senes Hieronymum Fracastorium, & Lucam Ghinum. qui (quicquid in hac scientia profecerim mihi autores, ducesq; extiterē.) Taceo Excellentiss. Montesaurum, Iulianum Fumanellum, & alios præstantissimos huiusce ciuitatis medicos, qui tantum laboris per inuia, aspera q; ipsius montis loca, quandoq; mecum subire non sunt grauati, ut varios, ac mirificos naturæ effectus in plantis contemplarentur. Quibus non minus grata fuit mea herbarum obseruatio, quàm mihi illorum de plantis doctrina iucunda, adeo ut iam possim multa de rei plantariæ controuersijs in medium proferre, atq; ex sententia determinare, quæ breuitati studēs & vitandæ arrogantia causa prætermittam: quāuis (proh dolor) hoc tempore à quocunq; vix in re plantaria tyrunculo hoc iam usurpetur, ut vel peritissimis contradicere audeat. ignarus quisque. Huius autem Libelli forma tanquam cuiusdam catalogi earum omnium plantarum erit, quæ in celeberrimo hoc monte reperiuntur: suis locis particulatim descriptarum ut cuilibet aditus, & lustratio locorum omnium.

nium, atque herbarum inuentio facile pateant. Erit igitur in tuo hoc stir-
pium compendio satis congruens, quoniam illi plantas communiter exponenti
ac figuris veras imagines ostendenti, loca inueniendarum illarum describens,
tanquam famulus erit atque minister. Quinetiam commodissimè in tam præ-
claro herbarum omnium volumine, facile hoc exiguum meum poterit il-
lustrari, atque à calumniis omnibus quæ aliquam posse videntur caliginem ob-
ducere, tueri. ut non minus hæc loci mihi facta liberalitas, concessio, atque
tutela cara sit futura, quàm hæc mea voluntas tibi in hoc ministerio tuis scri-
ptis suggerendo grata. Bene vale.

Veronæ Idibus Februarij, M D L X X I.

ITER BALDI MONTIS, FRANCISCO CALCEOLARIO

Veronæ in Officina Campanæ aureæ Pharmacopola

Auctore.



BALDVS Mons in Italia celeberrimus in faucibus alpium quibus Rhetia ab Italia diuiditur, altissimus, latissimusq; residet, in ipsis Veronensis, & Tridentini agri confinibus. Hic itaque cacumen ad sydera extollens, ceteros vicinos montes altitudine superat, atq; excellit, adeo vt amœnitate, situ, pulchritudineq; non sit quouis altero inferior. Radices habet, qua Solem orientem spectat in Athesis fluminis littore : qua verò ad occidentem in amœnissimis Benaci oris. Ab Austro deinde campe-

pestrem quandam planitiem, & ab Aquilone alios alpium montes contingit. E cuius summo iugo magna cum lustrantium voluptate atq; admiratione à sinistra parte furibundum spectatur flumen, quod à præruptis & altissimis scopulis erumpens, per angustum admodum, & anfractuosum iter rapidissimo cursu descendit ad valles. Ex aduerso autem latere humiliores visuntur colles, & fertilissimæ quoque vallecule, quas maxima campestris antecedit planities, spatiosa admodum, æqualis, inculta tamen & nulla arbore impedita, adeo vt planè mare latum representet. Huius secundùm latus Athesis flexuoso itinere permeat, qui quâuis magnus sit fluuius, ob distantiam tamen è summo montis vertice prospicientibus paruus riuus apparet, & in ciuitatem ingredi cernitur. Visitur & Ciuitas ipsa Veronæ, adeo, vt eius situs, forma, ædificia, ambitus totus, ac quæque eiusdem partes distinctè ac particularim internosci queant. Quod si contigerit cœlum perspicua serenitate clarescere, vniuersa agri Veronensis planities liberè perspicì potest. Visuntur quoq; vicinæ vrbes, & oppida, quæ adeo lucidè insipientium oculis apparent, ac si Belgici pictoris penicillo, omni cum arte, ac venustate, aliqua in tabella, aut potius linteo depicta spectarentur. Ab altera verò parte Benacus occurrit Lacus, qui quâuis sex milia passuum distet, adeò tamen vicinus, ob culminis altitudinem videtur, vt si quis velocissimo cursu, minimè sibi temperans deorsum contenderet, exterrefieret quidem, veritus ne in eum collabiturus irrueret. Spectantur hinc circum lacum ipsum horridi admodum, ac inaccessi montes, saxæq; crepidines, ac rupes, scopuli eminentissimi ac nudi : propius verò non procul à littore amœnissimæ videntur oræ oleis, & myrtis refertæ : quin & virentes colles odoratis, ac densis admodum lauris vestiti. Pagi quoque multi, atq; oppida. Insulæ, Peninsulæ; nauigationes, piscationes, vndæ iamiam placidissimæ, mox in altum elatæ : littora fremere, nauigantes ad portus properare ex ipso montis iugo cernuntur. Præterea, quod fortasse nonnullis mirum videbitur, sereno in montis cacumine existente Cœlo, paulò tamen inferius densissimis nubibus obscuro, non solum tonitrua horrenda, coruscationesq; quandoque fiunt, sed & grandines, & pluuiæ impetuoso admodum bombo, in ipsum decidunt lacum, non sine magna nauigantium iactura. Quæ quidem omnia tam pulcherrima, admiranda, delectabiliaque spectacula faciunt, vt præ stupore nonnulli veluti attoniti fiant. Quemadmodum enim nullus spectantium oculus horum prospectu satiari potest, ita nec lingua reperiri, quæ omnia rectè narrare ac exprimere posset. In ipso autem monte tanta est locorum, & rerum varietas, quòd prorsus longum.

longum foret omnia ex ordine recensere. Sunt enim vales ex puro saxo non par-
 uæ, acclives, declivesque, scopulose, atque admodum squallidæ: è contra verò spa-
 tiosissima, amplissimaque; pratorum pascua, numerosa herbarum, & florum varietate
 referta, & ex his quidem plana quædam, atque umbrosa, quædam declivia atque aprica.
 Extant etiam amplissimorum fontium frequentes, ac limpidissimæ scaturigines, non
 solum in imis montis ipsius loci, sed in mediis, atque etiam in summis eiusdem iugis
 è quibus tam copiose emanant aquæ, ut earum potu numerosæ pecudum greges sa-
 tis superque; satiari queant: ad quorum scaturiginum fontes non gregarii pastores
 modo, & syluan i homines, verum & qui conquiendis plantis insudant, expositis
 in gramine cibus, sese refocillare solent, paucis adiunctis obsoniis. Prætereo, ne lon-
 gior sim, frondosas, ac densas fagorum, quercuum atque ilicum sylvas, quin etiam
 quasdam castaniferis tantum arboribus stipatas, atque nonnullas, in quibus sylue-
 stres proveniunt pinus, atque excelsissimæ abietes atque larices. Ceterum quid dicam de
 aeris, cœlique varietate? Mira profecto. Siquidem qui montem circûquaque; perlu-
 strant, breuibus etiam intervallis, magnam aeris inæqualitatem experiuntur, adeo,
 ut plerique non modo regionem, sed clima se mutasse opinentur. quod hæc quidem
 pars exorienti Soli, illa vero Occidenti aduersa fuerit: quædam, quæ à Sole torrea-
 tur, alia quæ umbras perpetuas habeat. Hic niuib, ac glacie perpetuis æstate tota
 alget locus, ibi verò æstus est magnus. Aliis verò quibudam in partibus, omni ferè
 anni tempore vernalis quædam adest temperies; qua quidem locorum ac situum di-
 uersitate, fit quidem quod tanta etiam plantarum varietas in hoc monte proveniat,
 quanta usquam in Italia tota reperiatur. Distant igitur à Verona huiusce admira-
 bilis montis radices viginti milibus passuum: ab iis verò imis ad summam, quin-
 que aut sex milibus. Discedendo itaque Verona ad montem Baldum, statim extra
 urbem iter est per campestrum, latissimamque; planitiem, vbi copiose virescunt.

Tithymalus { *Characias.*
Paralius.
Helioscopius.
Cyparissias.

Pityusa.

Sed paulò ulterius reperiuntur.

Paliuri genera plura, quorundam opi-
 nione descripta.

Blattaria.

Cotinus Plinii *Rosola*, vulgo dicta.

Geranium multorum generum.

Eryngium.

Lupinus domesticus & *sylvestris.*

Anchusæ tria genera.

Mille grana ab aliquibus *Epipactis*
 dicta.

Securidaca.

Dipsacus.

Attractylis.

Rubea.

Tlaspi multorum generum.

Plantago aquatica.

Sium.

Glaucium.

Sisymbrium aquaticum duplex.

Xiphium.

Ocimoides.

Interea peruenitur ad pagum quendam, qui distat ab vrbe quinque milia passuum
 super dextra Athesis parte in campestris planitiei latere positus: cuius nomen multis
 innotuit gentibus. & præsertim Transalpinis militibus, qui è Germania profecti
 in Galliam Cisalpinam contendunt. Buxolengus ei nomen est ita à viuo colle ap-
 pellatus, qui totus Buxo arbore vestitur. Hinc itaque ulterius proficiscendo, quæ
 sequuntur hic plantæ reperiuntur.

Botrys.

Hypecoum Matt.

Amellus Vergilij.

Alisma.

Acanthus.

Erishrodanum maius & minus.

Astragalus.

<i>Astragalus.</i>	<i>Rhamnus tertius.</i>	<i>Aparine.</i>
<i>Terebinthus.</i>	<i>Spergula. i. Apparine.</i>	<i>Gallium flore albo & luteo.</i>
<i>Abrotomum album.</i>	<i>Tragoponum flore purpureo, & luteo.</i>	<i>Alyssum quorundam.</i>
<i>Mahaleb.</i>	<i>Bellis maior & minor.</i>	<i>Althea.</i>
<i>Helichrysum.</i>	<i>Anthemis flore albo, & rubro.</i>	<i>Colchicum.</i>
<i>Flammula Iouis.</i>	<i>Adonis Matthioli.</i>	<i>Pseudomyagrum.</i>
<i>Onosma.</i>	<i>Cotula fetida.</i>	<i>Lagopus.</i>
<i>Berberis vulgaris.</i>		<i>Aegylops.</i>
<i>Holostium.</i>		<i>Polium alterum.</i>
		<i>Lycium.</i>

Hinc peruenitur ad quandam meam posselliunculam, quæ Riuole (quasi Ripa) nostra vulgari lingua vocatur, vbi fuit antiquitus in summo colle Arx loci natura tunc temporis munitissima, de qua in historia Veronensi frequens fit mentio, cuiusque adhuc diruta visuntur vestigia, atque ruinæ. Hic quoque suos habet fines vallis Lagarina, qua iter est, quo Tridentum, & in Germaniam itur. Ad hanc vsq; Arcem creditur Athesim olim peruenisse. anteaquam fauces illę montis hominum industria diducerentur, quæ la Chiusa vulgo dicuntur. Quoniam autem merces ratibus per Athesim allatæ, ad hanc vsque arcem, ad ripam tanquam in portum conuehebantur, facile locus hic Ripæ nomen adinuenit, vnde nos Riuole corrupta appellatione vulgari idiomate appellamus.

Hinc per quandam vallem iter dirigitur, frugiferis campis, & pratis, atque gelidissimis fontibus, vtilissimisque refertissimam, in qua, in ipso itinere inueniuntur, stirpes non paucae; quæ hæc sunt.

<i>Pulsatilla Matthioli.</i>	<i>Chondrylla.</i>	<i>Periclymenum.</i>
<i>Ligustrum.</i>	<i>Digitalis lutea, & purpurea.</i>	<i>Chamepitys.</i>
<i>Reseda Plinij.</i>	<i>Cacalia.</i>	<i>Hermodactylus Mes.</i>
<i>Polygala.</i>	<i>Centaurea media.</i>	<i>Stachys.</i>
<i>Dryopteris.</i>	<i>Ageratum.</i>	<i>Lunaria odorata.</i>
<i>Polypodium.</i>	<i>Aristolochia utraque.</i>	<i>Draba.</i>
<i>Tribulus terrestris.</i>	<i>Euphrasia.</i>	<i>Atriplex sativa & syluestris.</i>
<i>Amellus.</i>	<i>Oenanthæ. i. Filipendula.</i>	<i>Iberis.</i>
<i>Vincetossicum, seu Asclepias, ut quidam volunt.</i>	<i>Galiopsis.</i>	<i>Crocus syluestris.</i>
<i>Alliaria.</i>	<i>Eupatorium Diosc.</i>	<i>Frumentum Saracen.</i>
<i>Psyllium foliis Coronopi</i>	<i>Heliotropium maius.</i>	<i>Matthioli.</i>
<i>Polemonia.</i>	<i>Ballota.</i>	<i>Thymbra.</i>
<i>Olyris.</i>	<i>Populus utraque.</i>	<i>Elleborus niger.</i>
<i>Lupinus syluestris.</i>	<i>Alnus.</i>	<i>Daphnois.</i>
		<i>Bryonia.</i>

In postremo huiusce vallis loco, pagus est Caprini, vbi ab imo Baldus mons incipit attolli. Quo in loco opus est in montem ascensuris, sibi com meatum comparare, nisi cum secum è Verona tulerint, quinetiam de vestimentis sibi providere, ad sustinendum si opus fuerit die quidem imbrem & ventos, nocte verò frigus: vltcrius enim pagi non sunt, vbi necessaria nancisci possint, sed tantum pastorum tuguria & syluanorum hominum casæ. quam ob causam non esset ab re etiā iumenta habere, quæ tentorium militare, & alia utensilia deferrent. Ceterum transmissio Caprini pago, hæc in propinquis locis reperiuntur.

Viola arborescens.
Scabiosa.
Morsus diaboli.
Consolida Regalis.
Viola alba Theophr.
Oxys.

Anagallis utraque.
Iaccea nigra.
Sideritis Achillea.
Mithridatica.
Alectorolophos, seu
crista galli.
Pes anserinus.
Xanthium.

Symphytum maius.
Alopecuros.
Delphinium. i. flos Regius ma-
ior & minor.
Dictamnium album.
Flos Solis Matthioli.
Anthyllis.

In ipso autem ascensus initio, inuenitur Coronæ templum Deiparæ virginis dicatum: magnæ sanè religionis, ac non minus loci ferè inaccessibilis natura, mirabile, quò in quibuscunque festis diebus D. Mariæ virgini consecratis, ac solemnibus, magna admodum hominum confluit multitudo. Cæterum confluentibus transeundum primum est ab vnius montis iugo in alterum per longum admodum subliceum pontem: deinde verò ascendendum accliu admodum calle, adeoque angustio, vt vix singuli commodè incedere valeant, quo sæpe fit vt obuiis factis vix locus ad transitum superfit. Ab ipsa solummodo natura angustus iste transitus factus est in montis ipsius latere in marmore, quod vtrinque instar parietum ad perpendicularum excurrit. A calle verò ipso ad summum montis fastigium tantæ altitudinis ipsum est latus, vt vix telum validissimo arcu excussum summum locum attingat: ab eodem verò ad imum, quingenti aut fortasse plures intercedunt passus. At quò iter hoc spectantibus terribilius est, proficiscentibusq; laboriosius, tanto magis ad ascensum inuitat animi voluntas videndi ac perlustrandi tam solitariæ religionis Fanum: & quoniam in calle ipso nascuntur.

Saxifraga maior Matthioli. *Daucus Creticus.* *Corydalis, spile*
quibusdam dicta, atque etiam pyrethrum, non frustra iter illud perficitur. A Coronæ deinde templo recedendo multæ sese offerunt stirpes. nempe

Palma Christi diuersarum
generum.
Chamæleon albus.
Gratia Dei.
Conyze omne genus
Seseli Aethiopicum.
Myrrhis.
Cicuta.
Perfoliata
Aizon multorum generum.
Phalaris.
Oxylapathum.
Sesamum.
Rhus.
Castanea
Oxyacanta magna.
Thalictrum.
Caryophyllata montana
Matthioli.

Bistorta.
Egipyros.
Campanula Fuchsi.
Pecten Veneris.
Pes anserinus.
Centaurium minus.
Epimedium.
Clymenum Matth.
Spina alba.
Virga aurea
Batrachium Apuleij.
Gingidium.
Elatin.
Pityne Theophr.
Auricula muris.
Triticum vaccinium.
Seseli Creticum.

Lamium Plinij,
Hastula regia flore albo.
Hornithogalum.
Phyllirea.
Verbasci plura genera.
Ophioglosson.
Samicula Diapensia.
Sanguisorba.
Aram minus.
Seseli Peloponense.
Phalangium copiosum.
Cardiaca.
Eruca.
Clymenum Plinij.
Tilia.

Post Coronam haberi potest hospitium in pago Ferrario, à quo parum inuicem absunt Prabazarius, Maon atque Nouetia loca sanè ceteris altioribus cultiora, atque mitiora. Hinc item ascenditur in latissima ac vberissima prata, fontibus pulcherrimis

cherrimis referta; vbi numerosæ, ac magnæ ouium, & armentorum greges aluntur, à Maio mense in Septembrem vsque. Hæc inter spatia nascuntur.

<i>Peplus.</i>	<i>Erysimum.</i>	<i>Sagitra Matthioli.</i>
<i>Horminum sylvestre.</i>	<i>Picris maior & min.</i>	<i>Onobrichis.</i>
<i>Trinitas.</i>	<i>Orchis multorum generum.</i>	<i>Louchitis aspera.</i>
<i>Aconitum Pardalianches quorundam.</i>	<i>Antirrhinum duarum specierum.</i>	<i>Sferra cauallo.</i>
<i>Solanum maius, seu Bella donna.</i>	<i>Tussilago duorum generum.</i>	<i>Seseli peleponense.</i>
<i>Asarum.</i>	<i>Bellis cæruleus.</i>	<i>Hastula regia flore luteo.</i>
<i>Crocus martius.</i>	<i>Hyoscyamus albus.</i>	<i>Primula veris</i>
<i>Polygonatū angustifoliū</i>	<i>Phu paruum.</i>	<i>Ambrosia duorum generum.</i>
<i>Prunella. i. consolida minor.</i>		<i>Amellus.</i>
		<i>Allium anguinum Matth.</i>

Per hæc itaque prata proficiscentes in Atilonem perueniunt, vbi à dextra vallis est ingens, quæ a summo ferè montis iugo vsque ad Athesim profundissima permeat: in qua imbrium aquæ, atque fontium circum scaturientium excurrant: Quæ quidem vallis a loco superius citato, vernacula lingua, La valle de Aitillon nuncupatur. Hæc itaque ab his qui plantarum cognitione delectantur commemoranda, ac celebranda fuerit, quòd in ea complura præstantissimarum plantarum genera abundè proueniant, quæ non dixerim in Italia solùm, sed fortasse in vniuersa Europa vix reperirentur. E quidem ego hoc profectò asserere possum, me hanc in vallem non venisse vnquam, quin nouam aliquam pulcherrimam; nec antea visam repererim plantam: Hic autem etsi plura plantarum genera ex iam commemoratis nascantur, earum tamen, ne prolixior sim, haud iterum meminero, verùm de his tantum sermonem faciam, de quibus hætenus non scripseram. Et sunt hæc.

<i>Scorodonia.</i>	<i>Sambucus racemosa.</i>	<i>Taxus arbor.</i>
<i>Pilosella.</i> { <i>Maior.</i>	<i>Sorbus torminalis.</i>	<i>Arisarum.</i>
	<i>Sorbus sylvestris Matth.</i>	<i>Cyclaminus duorū generū.</i>
	<i>Aconitorum diuersa genera.</i>	<i>Phyllirea.</i>
<i>Phu minimum.</i>	<i>Chrysanthemum flore albo.</i>	<i>Myrtillus Matthioli.</i>
<i>Gnaphalium.</i>	<i>Noli me tangere.</i>	<i>Chamæcerasus.</i>
<i>Semperuiuum utrunque.</i>	<i>Tithymalus maior.</i>	<i>Tora.</i>
<i>Pulmonaria.</i>	<i>Angelica.</i>	<i>Nardus montana.</i>
<i>Nardus Celtica.</i>	<i>Napellus flore albo.</i>	<i>Tragium Germanicum siue vuluaria.</i>
<i>Sideritis prima.</i>	<i>Cirsium.</i>	<i>Cyanus maius, & minus.</i>
<i>Rubus Idæus.</i>	<i>Vua ursina.</i>	<i>Dryopteris.</i>
<i>Onagra.</i>	<i>Filix utraque.</i>	<i>Satureia.</i>
<i>Solidago Saracenica.</i>	<i>Tilia arbor.</i>	<i>Muscus terrestris.</i>
<i>Bisolium.</i>	<i>Clynopodium.</i>	<i>Herba paris.</i>
<i>Petasites quorundam.</i>	<i>Erica utraque.</i>	<i>Combretum Plinij.</i>
<i>Samicula Cordi.</i>	<i>Meu.</i>	<i>Daucus cretensis.</i>
<i>Digitalis.</i>	<i>Viola lutea.</i>	<i>Lychnis sylvestris.</i>
<i>Virga sanguinea.</i>	<i>Panax Chironium.</i>	<i>Campanula cærulea.</i>
<i>Arbutus.</i>	<i>Saxifragia alba.</i>	<i>Hyssopus Montana.</i>
<i>Clematis altera.</i>	<i>Diapensia.</i>	<i>Costum amarum vulgare.</i>
<i>Senetium maius.</i>	<i>Tormentilla.</i>	<i>Phylon.</i>
<i>Senetium minus.</i>		

Antitoræ .
Lunaria racemosa .
Betonica .
Viola marianna .
Orobanche mag.

Lucciola .
Gentianula flore purpureo .
Luparia, aconiti species.
Napellus retiformis .
Sigillum Salomonis .

Carum .
Genista alpina .
Dentaria .
Martagum .
Fragaria .
Lampfana .

In superiori huiusce vallis parte quædam pastorum sunt tuguria, vbi Veronensis agri & Tridentini fines habentur, a quibus non longè abest Sylua ingens resiniferarum arborum, Tiliæ, Betulæ, Carpini, Anagyris vtriusque. Aquifolij atque aliarum arborum, refertissima, in qua Monticolæ, ac Syluani homines resinam ferè omnigenus, nempe Larignam, Pineam, Abiegnam, Piccamque colligunt, quin etiam, & è Larice Agaricum. Circum hæce pastorum attegias prata similiter habentur, in quibus album Veratrum, albusque Chamæleon, Calamintha montana, Gentiana, & Napelli genera omnia abunde proueniunt.

Dum autem hinc ad summum montis iugum ascenditur, reperitur longo satis spatio Silermontanum, & Sefeli Peloponense. Cuius radices impostores quidam legitimi costi vice suis in Theriacis vsurpare voluerunt. Hic vera reperitur Cistus atque Hypocistis. A dextra relinquuntur altissimæ, atq; asperrimæ môtis summitates quæ ab Vrsis, Lupis, Syluestribus capris & id genus feris quadrupedibus frequentantur. Quibus in locis inter durissimos lapides enascuntur tria illa plantatum genera, de quibus quoque superius meminimus. Nempe Montana, & Celtica nardus, atque Cretenfis daucus.

Hinc haud longè Mons distat, quem maiorem appellant, quòd cætera Baldi montis fastigia excellat. in cuius summa parte planities est herbosa, nec omnino inæqualis, e qua amplissima spectatur regio. pagis & oppidis numerosis referta. Mantuam, Ferrariam ac etiam Patauiam vsque sese diffundens: Ex altera verò parte omnes citra, vltraque Benacum ora, à Ripæ Tridentinæ oppido, vbi Benacus ipse Lacus initia sumit, ad Pischeriam vsque, vbi ad exorientem Mintium fluium terminatur, oculis subiectæ sunt: quæ quidem amœnitate, venustate, pulchritudine, omnique deliciarum genere adeo nitent, vt nihil delectabilius inueniri possit. Ibi enim ferè vbique viridaria habentur, in quibus Armenica mala, Aurantia, Limonia, & quæ Adami poma vulgus appellat perpetua fronde virent. adeò vt toto ferè anno perpetuo vere fruantur accolæ, cum non solum odoratissimis floribus, sed fructibus, hæ præciosissimæ arbores onustæ perpetuo ferè spectentur. Hic secus itinera sepes vbique ferè sunt ex Lauris artificiosissimè concinnatæ, nullo ramusculorum discrimine. Nec hoc mirum videri debet, cum Laurus frequentissima in collibus, & nemoribus sua sponte proueniat. cæterum & illud quoq; omnè superat admirationem, odor, nempe suauissimus, qui afflatu quodam mirabili ab Auratiorum & Myrti floribus spirat. Si quidem hæc Hesperidum plantæ absque multa cultorum opera in agris & collibus propagantur, & in eâ se attollunt proceritatem, qua aliis in locis, & Salices, & Ulmi prouenire solent. De viridariorum horum prouentu ac vberitate, vix quispiam crediderit, quippe ex vno tantum terræ iugero Medicorum Maiorum confito, centum, & quinquaginta, & quandoque plures ducatos coloni annuarim recipiunt. Succurrit nunc dum de his verba facio, me pluries non sine admiratione obseruasse in hoc ipso agro viniferas vites, numerosis admodum oleis ipsisq; pulcherrimis, & speciosis, adalligatas, & sub ipsis copiosas crescere segetes. adeò vt vno tantum agro, frumentum, oleum, & vinum recipiant. Hic fontes multiplices inspicias crysalli instar limpidos, & riuulos labentes, qui per pagos illos grato murmure excurrunt; propè quos ædificia magni sanè vsus erecta sunt tum ad frumenta

monta molenda, oleum exprimendum chartamque parandam, tum ad ferrum excoquendum. & malleis ducendum effigiandumque. cuius metalla his in locis copiosa habentur, atque, vt vno verbo dicam, ora Benaci lacus, quantulacunque sit, ceteras Cisalpinæ Galliæ oras amœnitate, prouentu, pulchritudine, ac omni deliciarum genere facile antecellit: Sed hæc obiter dicta velim, vt plantarum cognoscendarum studiosos, qui ad montem Baldum videndum proficiscuntur ad hanc quoque fertilissimam, amœnissimamque oram inuisendam inuitarem. Quod si fecerint non solum magna cum voluptate dies noctesque transigere poterunt, sed prompta his erit occasio tres singulares videndi plantas. Etenim in Turri vallecula, citra lacum posita Mandragoram copiosam inuenient: Ad Diuum verò Vigilium montem habebunt, cuius totum latus Rhododendris stipatum cernitur, floribus tum albis, tum rubris, admodumque speciosis. Quin etiam in minoritarum monachorum insula, floridam, ac pulcherrimam videbunt Palmam, quæ quidem hac in nostra regione arbor spectatu rara admodum est. Sed vt iam ad rem propositam redeamus. In ipso itaque monte maiori, de quo dicebamus nascuntur

<i>Lunaria racemosa.</i>	<i>Auricula muris.</i>	<i>Pinus sylvestris montana.</i>
<i>Pseudo doronicum.</i>	<i>Calamintha.</i>	<i>Lampsana.</i>
<i>Sanniculæ variæ species.</i>	<i>Aquileia fusca.</i>	<i>Fabaria.</i>
<i>Leontopodium Matthioli.</i>	<i>Cynocrambe</i>	<i>Scorpioides.</i>
<i>Geranium argenteum.</i>	<i>Cneorum Matthioli.</i>	<i>Lunaria Græca.</i>
<i>Alchimilla argentea.</i>	<i>Picea sylvestris ab incolis appellata.</i>	<i>Chamaelea</i>
<i>Polium primum.</i>	<i>Mughus Matthioli</i>	<i>Thymelea.</i>
<i>Orobanche valde magnum.</i>		

Propè montem ipsum maiorem vallis est de ossibus dicta, eam (vt puto) ob causam, quod in altera propinqua vallecula circum theatri instar, omni ex latere, lapides complurimi exesi ac perforati extent, ac promineant, quæ humanæ caluariæ speciem, ac cetera ossium genera repræsentent. cur autem lapides hi excauati, attritiq; videantur, aliunde prouenire non crediderim, quàm ab ingentibus frigoribus. Si quidem locus is raro à solis radiis incalescit. Nam cum hic essem Iulio mense ardente iam Syrio, & niues, & glaciem copiosam inueni. Hic circūquaque copiosa est

<i>Iberis.</i>	<i>Acacalis</i>	<i>Apocynum.</i>
<i>Ilex</i>	<i>Antyllis</i>	<i>Pistolochia, i. Capnos magna</i>
<i>Filipendula duplex.</i>	<i>Anemones multorum generum.</i>	<i>Sphondilium.</i>
<i>Mentha utraque</i>	<i>Chondrylla multiplex</i>	<i>Serpyllum utrunque.</i>
<i>Menthastrum.</i>	<i>Hedera terrestris</i>	<i>Panax Heracleum.</i>
<i>Solanum maius. i. herba bella donna</i>	<i>Carduus vulgaris</i>	<i>Collutea.</i>
<i>Eptaphyllum</i>	<i>Libanotis</i>	<i>Pentaphyllum album.</i>
<i>Aparine</i>	<i>Kerbenaca.</i>	<i>Umbilicus Veneris alter.</i>
<i>Simphytum petraum.</i>		<i>Phyteuma Matthioli.</i>
		<i>Sambucus montana.</i>

Paulò ultra ossium vallem in ipso primo descensu, per vniuersum ferè latus, cui vallis vaccaria nomen est, pratorum spatia sunt, minutissimarum herbarum tam plena varietate, vt subnigricantem ferè colorem repræsentent, mira interim florum emergente varietate: quæ quidem nullo cespite aut lapide impeditæ adeo firmæ, vegetæq; assurgunt, vt quanuis die tota à pecudibus depascantur, resumentes noctu quicquid diu. deperdiderunt, primo statim mane florentes, & prorsus intactæ sese ostendunt.

ostendunt, nullo erosionis vestigio apparente adeò, vt longè magis valeant, ac adolescant, quàm quæ in hortis sepibus & muris obductæ diligenter excoluntur. In his itaq; locis pululant, ac florescunt

<i>Arthetica.</i>	<i>Peucedanum.</i>	<i>Herba gattaria.</i>
<i>Galiopsis</i>	<i>Nerium alpinum.</i>	<i>Gramen Parnasi</i>
<i>Caryophyllata montana Matth.</i>	<i>Potamogetum.</i>	<i>Ageratum.</i>
<i>Gentiana.</i>	<i>Ferula.</i>	<i>Ptarmica</i>
<i>Thapsia.</i>	<i>Anonis</i>	<i>Pæonia.</i>
	<i>Carduus lacteus</i>	

Mediis hisce priuatorum spatiis locus est paruus, ac planus, montis lateribus, nescio an ab arte, aut natura excisis in semicirculi modum. Ibi interiori, ac superiori parùm loco ex ipso viuo saxo, aqua clarissima prorumpit, quæ non sine grato murmure in planitiem delabens, magnum, ac nitidissimum alueatum conficit fontem. quæ verò super defluunt aquæ à summis fontis ipsius labris exiguam planitiem illam circum eunt ac deinde diuersos in riuulos diuisæ, per virentes defluunt herbas. Pastores hunc fontem Brigaldellum vocant. Insignis quidem, ac celeberrimi nominis fons hic est, tum ob aquarum scaturientium vbertatem, tum quòd potu omnium opinione ceterorum fontium saluberrimus habeatur: qua propter quoscūque in ipsum aduenientes montem, itinere defatigatos suo murmure ad se inuitat, & ad gratissimas vmbras circumstantes allicit. Circum huiusce fontis riuulos Imperatoria copiosa prouenit, & aliæ quoque plantæ. Cæterum haud longè à vaccaria valle adiacet Ime, seu vallis Bassiana, vbi proueniunt

<i>Abutilon</i>	<i>Radix rhodia.</i>	<i>Alisma.</i>
<i>Cruciata</i>	<i>Caprus.</i>	<i>Cirsium.</i>
<i>Barba capræ.</i>	<i>Rubea satiuæ.</i>	<i>Centaureum magnum</i>
<i>Aconitum luteum roseo flore.</i>	<i>Iaccea.</i>	<i>copiosum.</i>

Post vallem Bassianam vallis frigida paulò inferius est. In quibus vallibus pratidem habentur. verùm non adeo pulchra, lataq; vt in valle vaccaria. Cur autem ita vocentur hæc valles, quid asseram non habeo. Scio tamen infrigida ipsa valle prouenire hæc, quæ sequuntur simplicia.

<i>Polygonatum angustifolium.</i>	<i>Genista Germanica.</i>	<i>Coronopus serpens Matt.</i>
<i>Clymenum Plinij</i>	<i>Chelidonium minus.</i>	<i>Hypericum</i>
<i>Erithrodanum.</i>	<i>Cirsium.</i>	<i>Ascyrum</i>
<i>Elaphoboscum.</i>	<i>Daphnois</i>	<i>Androsænum</i>
<i>Echium.</i>	<i>Chamælea.</i>	<i>Cori.</i>

Ad hæc vsque loca non vulgares illæ repertiuntur plantæ, de quibus superius hactenus meminimus, nec reliquum est, vt de iisdem vltèrius sermonem faciamus. Qui verò in montem veniunt, & si redeant Veronam aut eodem, quo venerunt itinere, aut alia, qua velint via, plura tamen simplicia, quæ vsui aliquo esse possint, quàm quæ à nobis conscripta sunt, profectò non inuenient: quare de itinere redeundi, nihil mihi scribendum fuit, ne verbosius quàm par sit, historiam hanc prosequi videar. Breuitati ergo indulgens, vt ab initio mihi proposui de reuersionis itinere nil aliud scribam, quàm quod poterit vnusquisque pro suo arbitrio vel hunc vel illum tramitem sibi deligere. Cæterum ego quidem breuem hunc plantarum libellum, in


Baldo

Baldo monte, nascentium, scripsisse volui, vt nonnullorum precibus obtēperarem, atq; etiam in publicum vsum edere. quem si quis legere, & secum habere non dedignabitur, is quidem per se se ad stirpes sibi comparandas in montem ipsum ascendere poterit: indeq; simplicia fere omnia asportare, quæ in cōmunem pharmacopæorum vsum esse debent, eaq; præsertim quæ non vbique reperiuntur. Quandoquidem noster iste Mons, non lecus ac pulcherrimus hortus in quem coloni ex diuersis regionibus complurimas raras attulerint plantas, sua sponte refertissimus, fœcundissimūsq; habetur. Poterit quoque meum hoc opusculum non solūm his, qui medicæ materiæ dant operam, quique medicam. facultatem profitentur, sed & quibuscūque qui rem plantariam excolunt, esse non solūm vtile, sed etiam iucundum. Nam perceptis prius apud Dioscoridem plantarum historiis, notis, ac saponibus, atq; amplius ex doctissimis, refertissimisq; Matthioli cōmentariis, ac ex nouo eiusdem plantarum compendio, in quo pariter extant plantarum icones ad viuū expressæ quod secum quocūque venerint deferre poterunt: quin etiam si contigerit ibi esse quenquam plantas conquirentem, vbi non vna, sed cuiuscūque generis sexcentæ vel plures breui etiam spatio conspiciuntur, poterit proculdubio spontè, & per sese illas iam instructus inuenire, atq; cognoscere. Similiter quandocūque alicui studiosorum aliorūvè bonorum virorum comitatu, aut animi refocillandi gratia, aut speciosæ, raræq; alicuius plantæ visendæ desiderio in suo natali solo, ad hæc amœna loca se conferre libuerit, id illis vnus huiusce nostræ admonitionis auxilio, factu facile futurum spero. vbi forte perito, atq; exercitato duce carerent. Neque (vt ego reor) eos suscepti laboris pœnitebit, cū senserint, atque nouerint non modò delectationem ferè incredibilem, sed maximam inde se percepisse vtilitatem. Tantam enim re vera, animi tranquillitatem, lætitiāq; ex hoc itinere percipient, quantam mente concipere, aut verbis exprimere nemo vnquam possit. Cuius rei fidem facere possent Claris. ac Reuerendis. Antistes Hieronymus Lipomanus, Franciscus Ianuarius, Iacobus Moschaleus. ambo non solūm nobilitate clari, sed benignissimi quoque, & mei amantissimi. quin etiam Excellentis. Fumanellus & Gerrinonus acerrimus simplicium indagator, ac nobilissimi Veronensium complurimi, & aliarum Ciuitatū Proceres illustresq; viri, rei plantariæ studiosi, qui solitarios hos tractus peragrans, tantum delectationis, & voluptatis capiunt, vt ad vitales spiritus exhilarandos, & ad animum vel curis, vel studiis, laceffitum subleuandum, potiore locum non inuenientes, istuc quotannis summa cum iucunditate sese conferūt. Inuiserunt quoque mecum, ac perlustrarunt vnīuersum hunc montem Ioannes baptista Olius Cremonensis, & Nocerus Pontremolensis medici excellentissimi & non simplicium modo, sed compositorum quoq; medicamentorum admodum studiosi. Ceterum vt iam finem dicendi faciam, qui, rariores, prætiosioresq; expetunt plantas, quàm, quæ in Baldo monte proueniunt, ij in Cretam, Cyprum, Syriam, Ægyptum, atque orientalem Indiam nauigare poterunt, vt superioribus annis faciebat honestissimus Cecchinus Martinellus Venetiis pharmacopæus in Angeli officina, vir quidem apprīmè medicæ materiæ peritus, nec vnquam satis laudatus. Id, quod ego quoque facerem, si per illum in quo nunc sum vitæ statum, liceret.

F I N I S.

Venetiis, in Officina Valgrisiana. 1571.

*Radices Impatiens. Tormentilla. an. ʒj. Corti: Citri. 3.ij.
 Terre sigill: ʒjs. Ros. Armen. orient: ʒij. Myrræ. Aloes. Liqri: an. ʒj.
 Croci. 3.ij. Mastice. 3.ij. Sacchari. ʒiij. fiat Pulvis contra
 Pestem p[er] preservatione quantu[m] tribus digitis potest capi, tempe
 necessitatis
 Ducat[ur] in Aqua Borraginis uel Baylosa
 cu[m] aceto modico*



Zum Vieß fassen,

Nimm die Nimmlein, die in den Kolllein der Handtrunde sein,
waschen, kochen sie an den Augl. pellen, alth. Vieß fassen
ganz annehmen. fo: 388.



ARCHIVE

